

30626/1

vol II

(also containing t.p. to vol I)

20 July 1955

18/1/56
718



THEATRUM UNIVERSALE OMNIUM ANIMALIUM

PISCIUM, AVIUM, QUADRUPEDUM,
EXANGUIUM, AQUATICORUM, INSECTORUM,
ET ANGIUM,

CCLX. TABULIS ORNATUM,

Ex Scriptoribus tam antiquis quam recentioribus,

ARISTOTELE, THEOPHRASTO, DIOSCORIDE, ÆLIANO, OPIANO, PLINIO, GESNE-
RO, ALDROVANDO, WOTTONIO, TURNERO, MOUFFETO, AGRICOLA, BOETIO,
BACCIO, RUVEO, SCHONFELDIO, FREYGIO, MATHIOLO, TABERNOMONTANO,
BAUHINO XIMENE, BUSTAMANTIO, RONDELETIO, BELLONIO, CÆSIO, THE-
VETO, MARGRAVIO, PISONE, & aliis maxima curâ à J. JONSTONIO collectum,

Ac plus quam Trecentis Piscibus


Nuperrime ex INDIIS ORIENTALIBUS allatis,

Ac nunquam antea his terris visis, locupletatum; cum Enumeratione morborum,
quibus Medicamina ex his Animalibus petuntur, ac Notitiâ Animalium,
ex quibus vicissim Remedia præstantissima possunt capi; cura

HENRICI RUYSCH M. D. Amstelæd.

VI. PARTIBUS, DUOBUS TOMIS, COMPREHENSUM.

TOMUS I.



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS.

MDCCXVIII.

MUSEUM AMBONENSE

T O M U S I. Continet

*Collectionem Novam Piscium Ambonensium ac Historiam Naturalem
Piscium, & Avium,*



5515



THEATRUM
UNIVERSALE OMNIUM
ANIMALIUM

PISCIUM, AVIUM, QUADRUPEDUM,
EXANGUIUM, AQUATICORUM, INSECTORUM,
ET ANGIUM,

CCLX. TABULIS ORNATUM,

Ex Scriptoribus tam antiquis quam recentioribus,

ARISTOTELE, THEOPHRASTO, DIOSCORIDE, ÆLIANO, OPIANO, PLINIO, GESNE-
RO, ALDROVANDO, WOTTONIO, TURNERO, MOUFFETO, AGRICOLA, BOETIO,
BACCIO, RUVEO, SCHONFELDIO, FREYGIO, MATHIOLO, TABERNOMONTANO,
BAUHINO XIMENE, BUSTAMANTIO, RONDELETIO, BELLONIO, CÆSIO, THE-
VETO, MARGRAVIO, PISONE, & aliis maxima curâ à J. JONSTONIO collectum,

Ac plus quam Trecentis Piscibus & Animalibus

Nuperrime ex INDIIS ORIENTALIBUS allatis,

Ac nunquam antea his terris visis, locupletatum; cum Enumeratione morborum,
quibus medicamina ex his Animalibus petuntur, ac Notitiâ Animalium,
ex quibus vicissim Remedia præstantissima possunt capi; cura

HENRICI RUYSCH M. D. Amstelæd.

VI. PARTIBUS COMPREHENSUM.

TOMUS II.



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS.

MDCCXVIII.

T O M U S II. Continet

*Historiam Quadrupedum, Exangium Aquaticorum, Insectorum
& Anguim.*



SSIS

PRÆFATIO AD LIBRUM

D E

QUADRUPEDIBUS.



Placet & de Quadrupedibus in genere aliquid præfari, Benevole Lector, satis facturumque me confido, si aliquid *de Nomine, Partibus, Loco, Nutritione, Augmento, Generatione, Vita, Animalibus actionibus, Usu, & Differentiis*, præmiserò. Horum verò nomine Animalia illa nobis veniunt, quæ mediæ inter aërea & aquea naturæ, pilis ut plurimum, testis quandoque, obduncuntur, & quaternis pedibus incedunt. Græcè τετράποδα, τετράπολα, τετρασκελή, & τετραβάμωνα, dixero. In reliquis omnibus multiplex & incomprehensa occurrit varietas, quæ tibi, si bene perpenderit, stuporem injicere poterit. Partes mihi primò externas vide. *Pilos* habent, quæ animal pariunt, quæ ova testam. *Equis* sunt in juba largi, in armis leoni: dasypodi & in buccis intus, & in pedibus. Villosissimum animalium lepus. Omnibus senectute crassescunt. In solo equo canitiem contrahunt. *Setis* suæ & histrices teguntur, oves lana, capræ aruncum de mento demittunt. *Corium* Hippopotamo tam crassum, ut inde torrentur hastæ: elephantis etiam & rhinocerotibus ferè impenetrabile. Nullibi major naturæ lascivia, quam in *Cornibus*. *Sparsit hæc in ramos, ut Cervorum. Aliis simplicia tribuit, ut in eodem genere subulonibus ex argumento dictis. Aliorum finxit in palmas, digitosque emisit ex iis, unde platycerotas vocant. Dedit ramosa capreis, sed parva: nec fecit decidua. Convoluta in anfractum arietum generi, ceu cæstus daret: infesta tauris. Rupicapris in dorsum adunca, damis in adversum. Erecta, rugarumque ambitu contorta & in leve fastigium exacuata, strepsiceroti, quem addacem Africa appellat. Mobilia eadem ut aures, Phrygiæ armentis: Troglodytarum in terram directæ: quæ de causâ obliquâ cervice pascuntur. Aliis singula, & hæc medio capite, aut naribus. Jamque aliis ad incursum robusta, aliis ad ictum. Aliis adunca, aliis redunca; aliis ad jactum pluribus modis, supina, conversa, connexa: omnia in mucronem migrantia. Auriculæ omnibus duntaxat animal generantibus, & quidem mobiles. Minores aliis vel majores. Cervis tantum scissæ ac velut divisæ; foricibus pilosæ. In equis & omnium jumentorum genere, indicia animi præferunt: fessis emarcidæ: micantes pavidis: subrectæ furentibus: resolutæ ægris. Os magno hiatu, cani, leoni, & venatu viventibus rescissum; mediocre, suum generi. *Promuscis* soli elephanto. *Maxillæ* longæ jumentis, rotundæ simiis. *Collum* leoni tantum, & lupi & hyenæ ex singulis ossibus rigens. De *Mammis* hoc observatum à Plinio: Quibus solida ungula, nec supra geminos fœtus, hæc omnia binas habent mammæ, nec alicubi quam in feminibus. Eodem loco bisulca & cornigera: boves quaternas, oves capræque binas. Quæ numerofo fœcunda partu, & quibus digiti in pedibus, hæc plures habent toto ventre, duplici ordine, ut sues: generosæ duodenas, vulgares binis minus: similiter canes. Alia ventre medio quaternas, ut Pantheræ: alia binas, ut leonæ. Elephas tantum sub armis duas: nec in pectore, sed citra in alis occultas. Nulli in feminibus digitos habentium. Digiti quibus ex rapina victus, quini in prioribus pedibus, reliquis quaterni. Leones, lupi, canes, & pauca alia, in posterioribus quoque quinos ungues habent, uno juxta cruris articulum dependente: reliqua, quæ sunt minora, digitos quinos. Ungues omnibus quibus & digiti. Sed simiæ imbricati: rapacibus unci: cæteris recti, ut canibus, præter eum qui à crure plerumque dependet. Ungulas solidas habent quæ non sunt cornigera: cornigera ferè bisulca sunt. Sues in Illyrico quibusdam locis solidas habere dicuntur. Veterino tantum genere renascuntur. *Caudæ* denique omnibus, præter simias, & ova gignentibus pro desiderio corporum. *Nudæ hirtis, ut apris: parvæ villosis, ut ursis: prælongis setosæ ut equis. Amputatæ lacerti renascuntur. Boum longissimus caulis, atque in imâ parte hirtus. Idem asinis longior quam equis, sed setosus veterinis. Leoni infima parte ut bubus & forici: pantheres non item: vulpibus & lupis villosus, ut ovibus, quibus procerior. Haud minor internorum diversitas. Dentes exertiverri, apro: ferrati, cani, leoni: continui, equo, bovi: acuti primores: plani interiores. Altero ordine carent cornigera. Nullis exerti, quibus ferrati. Nulli exerti vel ferrati, cui cornua: sed omnibus concavi, cæteris solidi, simiæ ut homini. Ruminantibus, leoni & cani mutantur. Suibus deciduum unquam. *Lingua* Crocodilis tota adhæret: leonibus ac felibus imbricatæ est asperitatis, ac limæ similis: Elephanto præcipuè lata. *Costæ* suibus denæ, cornigeris tredecim. *Cor* omnibus in medio pectore est. In equorum boum & cervorum**

vorum ossa reperiuntur. Maximum proportione, muribus, lepori, asino, cervo, hyænis, & omnibus propter metum maleficis. *Pulmo*, testudine sine sanguine: Chamæleoni portione maximus, & nihil aliud intus. *Venter* solidipedum asper & durus: terrestrium aliis denticulatæ asperitatis, aliis cancellatim mordacis. De ruminantium ventribus libro secundo diximus. *Lien* rotundus bisulcis & cornigeris: prolixus multifidis: prælongus solidipedibus: minimus pecori in regione Asiæ, quæ Scepsis dicitur. *Renes* omnia habent, quæ animal generant: ova parientium, testudo sola. *Vesica* nulli ova gignentium præter testudinem: nulli, nisi sanguineum pulmonem habenti: nulli, pedibus carentium. De *Adipe* & *Sævo* observatum, *Cornigera* unâ parte dentata, & quæ in pedibus talos habent, sævo pinguescere: bisulca scissive in digitos pedibus, & non cornigera, adipe. Concretus hic & cumrefrixit fragilis: semperque in fine carnis. Contra pingue inter carnem cutemque succo liquidum. Quædam non pinguescunt steriliora cuncta pingua. Medulla in juvena rubet & senecta albescit. Non nisi cavis hæc ossibus nec cruribus jumentorum aut canum. *Pinguis* iis quibus adeps: sævosa cornigeris: *Ursis* nulla: *Leoni* in feminum & brachiorum ossibus exigua. Et tantum de partibus. *Locum* plærisque terram natura designavit: paucis, ut Crocodilo, hippopotamo, castori, testitudini marinæ, & aquam. Ex his & illis quædam latibula habent: quædam in arboribus degunt. In frigido climate nonnulla; in calido alia invenies. Negata in eodem situ quædam aliquibus. In *Cilicia* (Lycia alii legunt) *dorcadæ* non transeunt montes *Syris* vicinos: *onagri* montem qui *Cappadociam* à *Cilicia* dividit. In *Helleponto* in alios fines non commeant cervi: & circa *Arginussam* elatum montem non excedunt. In *Pordoselene* insula viam *mustelæ* non transeunt: in *Bæotiæ* *Lebadia* illatæ, solum ipsum fugiunt, quæ juxta in *Orchomeno* tota arva subruunt talpæ. In *Ithaca* lepores illati moriuntur, extremis quidem in littoribus: in *Ebuso* cuniculi non sunt. *Cyrenis* mutæ fuere ranæ: illatis è continente vocalibus durat earum genus. In *Olympo* *Macedoniæ* monte non sunt lupi, nec in *Creta* insula. Mirabilius, cervos in eadem insula, præterquam in *Cydoniadarum* regione, non esse. In *Africa* nec apros, nec cervos, nec capreas. Frustrà & in victu uniformitatem quæris. Herbis & frugibus boves, cervi, equi, fues vescuntur: humiliorem deprædantur oves; altiore, ramos, & germina capræ. Carnes lupis, leonibus & canibus in deliciis: pisces fibro & feli: muscæ chamæleoni. Ruminant cibum quædam, quædam non item. Simiam & Cercopithecus inter pamphaga fortè rectè posueris. *Ursus* hyeme in latebris, eo humore quem ex prioribus pedibus tum intumescantibus exfugit, vivere creditur. De *Generatione* habe, concipere quædam citra coitum, ut post Nili à terris recessum in *Ægypto* mures. Congredientium plæraque autumnò æstate vel vere coire: cum ferocitate tauros & ursos: sine ea canes. Vivos fœtus maximus numerus profert: ova testudines, Crocodili, lacertæ &c. Molam ex vento in *Lusitania* equas concipere ex *Refendo* disco: boves gravidos dextro duntaxat vulvæ sinu ferre, etiam cum geminos ferunt, aliunde. *Gestationis* tempus mirè variat. *Lupus* mensem, vel ad summum XL. dies, gestatur: canis novem septimanis: sus quatuor mensibus: capra quinque: ovis circiter sex: bos decem: equus undecim. Idem de numero partus intellige. Mula nunquam parens creditur: lupus semel duntaxat in vita eniti: lepus etiam superfætat. De *Augmento* hoc dixisse sufficiat, *μονοχολεῖ* & bisulca, digitatis majora, rhinocerotem, camelum, hippopotamum &c. si exceperis: differreque in eadem specie propter loca magnitudinem. In regione *Camadu* arbetes asinis non cedunt. Testudines ad *Taprobanam* tantæ ut CIII. pondo pependerit: lacertæ in *Æthiopia* Cubitor. octo. *Vita* brevis quibusdam, diuturna aliis. Lepores & feles septimum duntaxat annum attingunt: aries & caper rarò decimum. Sus ad vigesimum pervenit: Canis ad eundem aliquando: Bos decimum sextum vix excedit. Equi mares ad trigessimum aliquando attingunt. Ad septuagesimum quintum pervenire, apud *Plinium* legimus. Mulum octoginta annis vixisse, ex *Atheniensium* monumentis apparet: Cervos centum, in *Historia* invenies. Ad *Animales actiones sensus externi & interni appetitus, & locomotiva*, pertinent. *Dorcadæ* & *lynceæ visu* excellunt: hyenæ & feles de nocte vident: talpæ parum aut nihil. Acutè audiunt lepores: Cameli, cervi, & equæ *Lybiæ* cantu tibiæ oblectantur. *Odoratu* canes valere nemo ignorat: fues adeò sunt debili, ut ne fætores cœni moveantur. Simia nos gustu vincit, ut vulgari versiculo traditur. *Internos* si attendamus, insignis sunt amentia quædam, ut bubalus, qui capite abdito totum se latere credit: Sagacissima quædam. Simiæ nihil non imitantur. *Vulpes* glaciem transmissuræ, admota aure, ejusdem crassitiem explorant. Canes quamvis longa itinera meminere: nec ulli præter hominem memoria major. Cervi audito canum latratu, secunda fugiunt aura, quò pariter recedat vestigiorum odor. Reliqua in capitibus de equis, capreis, lupis, & aliis vide. Maximè verò mirandum quod tam multæ quadrupedes sciant, quæ morbis suis medeantur. *Panthera* stercus humanum quærit. Testudo cunilæ, quam bubulam vocant, pastu, vires contra serpentes refovet: mustela, rutæ, in murium venatu, cum iis dimicatione conferta. Bos in *Cypro* contra tormina hominum

excrementis sibi-medetur. In *Appetitu Amor & Libido* præcipuè occurrit. Simiarum erga Plin.H.N. l. 8. c. 42. færus tantus, ut *magna ex parte complectendo necent*. Sues fœminæ libidine turgentes adedè efferantur, ut hominem lacerent. Tanti furoris & tauri, ut *vacca aenea Syracusis, ab agresti tauro, qui pecore aberrasset, inita sit, ac semine aspersa*. E contra Camelus coitum in propatulo refugit. Equum detractò oculorum operimento, & cognito eum matre coitu, prærupta petiisse, atque exanimatum, Plinius author est. Circa *Locomotivam* veloces quosdam, tardos alios novimus. Nullum animal cursu leporem æquare, credidit Xenoph. l. de Venatione. Xenophon: Horatius verò cum celerrimum cursum dicere veller, *ociorem cervis* dixit. Alce tantum itineris uno die conficit, quantum equus triduo. Nil de Arabicis asinis dicam: nam vulgares tardissimi sunt, ut & Tigres, docente nos Bontio. *Vocis* ferè obliti fuissetus: Vox. cuius tamen insignis in isto animalium genere est varietas. Equus namque hinnit: Taurus mugit: Asellus uncat: Aries blaterat: Ovis balat: Sus grunnit: Verres quiritat: Cervus onager glocitat: Caper circus murit: Aper frendet: Leo rugit: Tygris raucat: Panthera caurit: Pardus felit: Lupus ululat: Barrus barrit: Canis latrat: Vulpecula gannit: Catulus glaucitat: Lupus vagit: Mus mintrat: Mustela dentrit: Sorex disticat: Rana coaxat. Sed ad *Usus* deveniamus. Bono enim nostro à Deo condita, nemo negaverit. Hinc nobis, usus. *Alimonia, Medicamenta, Vestitus, & alia*. *Alimonia*. Lac namque nobis suppeditant pilis prædita, ex quo butyrum & caseus conficitur. Carnes jumenta, & quæ in desertis vivunt cervi, apri, damæ, alce & alia. Nec tantum ad necessitatem provisum est, deliciarum etiam oblivisci noluit Natura. Leporis carnem, *primam mattyam* Martialis vocat. Caro verò etiam domesticæ suis quinquaginta modis ita condiri potest, ut rotidem ferinæ carnis species videantur. *Medicamenta*. Docuere enim quædam: nec unum est, quod suppeditet. Cunilam & rutam contra venena valere à mustela & testudine accepimus. Venas secandi artem Hippopotamus docuit. Ductu cervorum dictamnum sagittas extrahere scimus. De remediis contra morbos, Historia consulatur. *Vestitum*. Magna pecori gratia in usu velle-
rum: corporum tutela ipsi debetur. Caspiorum ditissimi vestimenta ex pilis camelorum conficiebant. Ex lanis etiam illa fiunt, quæ Cæsar *subcoacta*, Helmoldus Presbyter *feltra* & *filtra*, Græci *πλητὰ* & *πλωτὰ* vocant. Ex his, aut ex centonibus, aut ex coriis, tunicas aut tegmenta milites faciebant, quibus tela vitarent. Mortua pelles suppeditant. Primæ tunicæ quas Deus fecerat, ex istis. Pelle leonis induebatur Hercules. Ex agninis Rhonones Germanorum erant. Perones ex corio conficiebantur: nobiliorum calcei ex aluta. Frisii denique, jussu Drusi, coria boum in usus militares pendebant. De *aliis usibus* hoc dun-
taxat dicam. Canes ad custodiam facere. Feles alimenta à muribus defendere. Equum, a-
finum, mulam, Camelum, ad vecturam adhiberi. Ex nervis fiunt fides. Camelorum ve-
retro optimè arcus intenduntur. Funes, quibus brachia catapultarum continentur, torquen-
tur è nervo. Dentibus aprorum lævigatur charta. Plebeios ministri apud Romanos qui-
dam bovillis cornibus insonantes, ad cætus cogeabant. *Per cornu fluentia in fauces homi-
num vina decurrere*, dixit Ambrosius. Urorum certè barbari septentrionales potabant. Plin.H.N. l. 28. c. 7. Plin. Delii Apollinis ex cornibus ara, inter septem orbis miracula recensetur. *Taurino felli præ-
cipua potentia, etiam in ære, pellibusque aurea colore ducendis*. Quid de *Fimo* dicam,
de cuius discrimine ita Plinius: *Humanas dapes ad hoc inprimis advocant. Alii præfe-
runt hominum potus, in coriariorum officinis, pilo madefacto. Proximè spurcicias suum
laudant: Columella solus damnat. Varro præceptis adjicit, equino, quod sit levissimum,
segetes alendas: prata verò graviore, & quod ex hordeo fiat, multasque gignat herbas.
Quidam etiam bubulo jumentorum præferunt, ovillumque caprino: omnibus verò asini-
num, quoniam lentissimè mandant*. De *Differentiis* in infinirium agi posset. Quomodo Differen-
tia. verò in suos ordines, totum Quadrupedum exercitum digesserimus, historia docebit. Occurrent primò Solidipeda; mox Bisulca, tam ruminantia, quæ vel cornuta vel non, quàm non ruminantia: Digitata tandem, tam vivipara, quæ vel terrestria vel aquatica, quam ovi-
para, quæ vel reguntur testâ, vel non. Sed nolo in hanc rem plura. Tu *Benevole Lector*, laborem boni consule, & proximis nundinis, Historiam Serpentum & insectorum, quam Sublimium, Subterraneorum, & Hominis Historia, si Deus voluerit, excipiet, expecta.

ENUMERATIO MORBORUM,

QUIBUS PETUNTUR REMEDIA

E X

QUADRUPEDIBUS.

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A Bortus 62. b. 119. b. bis. | Capillorum fluxus 119. b | Destillatio 124. b |
| Abcessus maturans 52. b | Capitis dolores 20. b. 32. a. | Difficultas meiendi 62. b |
| Affectioes Aurium 93. a | 120. b. 146. b | Dolores leniens 62. a |
| Affectus Uterini 104. a | Capitis Ulcera 146. b. bis | --- dysentericos adjuvans. ib. a |
| Æger an moriturus sit, nec ne tentamen 119. a | Carbunculi Ventris 50. b | Dorsi dolores 127. a |
| Alopecias sanans 50. a. 93. a. | Carcinomata 80. b | Dyspnœa 62. b |
| 111. a. 147. b | Carnes excrecentes 41. a. 43. b | Dysenteria 30. b. 32. b. bis. 49. |
| Alvi exulceratæ fluores 42. b | Catharrus 33. b. 106. b | a. 50. a. 52. b. 63. a. 104. b. |
| Alvum solventia 91. a | Cervicum rigores 31. a | 111. a. 124. b. 131. b |
| Ambusti 31. b. 50. b. 88. a | Chronici morbi 104. a | E. |
| Amoris ardores mitigans 16. b | Cicatrices 148. a | E Lepthantiasis 33. a. 50. a. |
| Angina 124. b. bis. 131. a | Cicatrices faciei 124. b | 139. a. |
| Anhelitus 148. a | Cicutæ efus 62. b | Epilepsia 14. b. 66. a. 80. b. |
| Anodynum 143. a | Cimices pellens 49. b. 146. a | 88. b. 106. a. bis. 111. a. 131. |
| Antidotum 145. b | Cœliacus dolor 42. b. 49. b. 52. | b. 134. b. 138. b. 141. a |
| Antepileptica 66. a. 91. a | a. 111. a | Erifypula 131. b |
| Apoplexia 109. b | Coeundi impotentia 163. a | Exanthematis conduens 49. b |
| Apostemata 33. a | Coitus 62. b | F. |
| Apostema dissolvens 32. b. 88. a | Coitum juvantia 93. a. 111. a | F aucium dolores 52. b |
| Arthritis 54. a. 102. a. 127. a. | Coitum stimulan 14. b. 163. a | Faciem erugantia 139. a |
| 132. b | Colicus dolor 43. a. 62. b. 63. a. | Faciem splendidam reddens 30. |
| Articulorum contractiones 50. b | 90. b. 91. a. 104. a. 105. b. | b |
| Articulorum dolores 88. b. 131. | 109. b. 111. a. 124. b | Faucium tumores 93. a |
| b | Comitialis morbus 14. a. bis. 41. | Febris 77. b. 143. a |
| Articulorum Vitia 104. b | a. 49. a. & b. 50. a. bis. 50. b. | Febrium algores 131. b |
| Asthmaticos juvans 104. a | 73. b. 93. a. 104. a. bis. & b. | Febres ardentes 131. b |
| Atra bilis 33. a | 106. b. 145. b. 147. b | Febrile incendium 133. b |
| Aurium dolor 31. b. 80. b. 131. | Conceptio mulieris 111. a | Febres malignæ 62. b |
| b. 146. b | Conceptio facilis mulierum 8. b | Febres periodicæ 90. b |
| Aures purgans 42. a | Conceptionem adjuvantia 104. a | Febris quartana 32. b. 42. b. |
| Aures purulentæ 148. a | Contagium arcentia 133. a | 50. a. 88. a. 111. a. 124. b. bis |
| Auruginem tollens 52. b | Contorsio vultus 131. b | 137. b. 139. a. 141. a. 146. b |
| B. | Contractio membrorum 102. a | Fistulæ 31. a |
| B ilem expurgans 42. b | Convulsiones 23. b. 84. a | Flatus 56. a |
| Bulimo laborantes 114. b | Crustæ oris 91. a | Fluxus 49. b |
| C. | Cutem emaculantia 106. a | Fluxus dysentericus 30. b. 111. |
| C alculus 42. b. 54. a. 84. a. | D. | a |
| 93. a. 114. b. 127. a | D entes. 32. a | Fluxus uterinus 16. b |
| Calculus vesicæ 42. b | Dentium albedo 63. a | Fœtus mortuus 124. b. 127. a |
| Caliginem abstergentia 127. a | Dentium ortus promoventia | Fœtum in utero cohibentia |
| Calli vitia 62. b | 91. a | 106. a |
| Cancer 50. b | Dentitio infantum 8. b. 63. a. | Fungorum efus 62. b |
| Canis rabidi morsus 124. b | 111. a | Furfures 31. a. 33. a. 49. b |
| Canis rabiem sanans 33. a | Dentitionis dolor 80. b | Furunculis medens 42. b |
| Canities 14. b | Dentitiones faciles facere 50. a | G. |
| Capilli 119. a. & b | Dentis dolor 111. a. 119. a. 124. | G enæ 43. a |
| Capillorum defluctio 14. b | b. 131. a. 133. b | Generum & Palpebrarum |
| Capillos augens 55. b | Dentes vacillantes 63. a | scabritia 52. b |
| Capillorum affectus 93. a | Desiderium coeundi adimentia | Genua dolentia 73. b |
| | 91. a | Genitalium dolores 31. b |
| | | Gin- |

Gingivas extenuantia 90. b
Gonorrhœa 93. a. 104. a

H.

Hœmoptoicos adjuvans 63. a
Hœmorrhagia 49. b
Hœmorrhoides 104. b. 127. a.
131. b. bis. 132. b. 144. a
Hœmorrhoides cœcæ & aper-
tæ 77. b
Hœmorrhoides occlusas ape-
riens 31. b
Hectici 133. b
Hemiæ 43. b. 134. b
Hemicraniæ 33. a
Humorum crassitatem exte-
nuans 33. a
Hydrops 42. b. 49. a. 111. a.
124. b. 132. b. 133. b. 144. a
Hypochymata 141. a
Hysterica affectio 66. a. 139. a

I.

Iecinoris affectus 93. a
Ignis sacer 50. a. 144. a. 146. b
Infantum morbi 42. b. 49. b
Inflamatio 84. b. 131. b
Impetigo 32. a. 131. b
Intercoctalis dolor 91. a
Intestinorum tormina 62. a
Intestinorum inflatus 62. b
Intestina solidans 49. b
Intestina vulnerata 32. b
Intestinorum vitia 49. a
Ischiadicus dolor 50. b. 54. a.
93. a. 124. b
Jugulorum dolores 84. a

L.

Lepra 31. a. 33. a. 50. a. 102. a. 124. b
Lethargus 104. a
Lens 32. a
Lentigines tollens 49. b. 62. b.
63. a. 134. b. bis
Lichenes 31. a
Lienis vitia 14. a. 42. a. 49. b.
93. a. 119. b. 145. b
Lippitudo 93. a. 131. b
Lithiasis 111. a. 119. b
Lotium provocantia 132. b
Lumbricos egerens 31. b. 32. a.
63. a. 105. b
Luxata membra 50. b

M.

Maculas de facie tollens 33. a. 138. b. 139. a
Maculæ oculorum 139. a
Mammarum fissuræ 102. a. 144. a
Mania 41. a
Melancholia 29. b
Melancholicus 50. a
Memoriam reddentia 141. a
Membra à frigore adusta 80. b
Menses provocantia 93. a
Menses cohibens 32. a
Mensium suppressio 30. b
Mensium & secundinarum re-
media 50. b
Menstrua provocans 50. b. 62. a
Mictus involuntaria 73. b
Morbus caducus 66. a

Morbi insanabiles, ut curentur 23. b
Morbus sacer 23. b

Morsus animalium 131. a
Morsus aranci 42. b
Morsus Canis rabidi 43. a. 49. b. 62. b. 88. b
Morsus serpentum 62. b
Morsus venenosi 52. b
Mulier utero dolens ac cibos
aversans 50. a
Mures enecans 32. a

N.

Nephritici dolores 14. b. 102. a
Nervorum contractura 31. a
Nervorum morbi 93. a
Nervorum dolores 131. a
Nervi intumescens 104. b
Nervos mulcentia 112. b
Nyctalopiæ 49. b. 52. b

O.

Oculus 42. a. 114. b. 148. a. bis.
Oculorum promovens acies. 31. b
Oculorum caligines 52. b. 93. a. 106. b. 134. b
Oculorum cicatrices 31. b
Oculi dolores 50. a. 111. a. 119. a. 124. b
Oculorum nubeculæ 106. a. 111. a
Oculorum suffusiones 145. b
Odontalgia 77. b. 188. b
Opisthotonon 50. b
Oris vitia 148. a
Ossa fracta 124. b

P.

Paralyfis 104. b
Paronychia 119. a
Parotidæ 31. a
Parturientes 131. b
Partus mulierum 111. a
Partus difficiles 88. b
Parituras adjuvans 90. b
Partus ut contineatur 62. b
Pavores 80. b
Pavores nocturni infantum 88. a
Pedes attriti 134. b
Pedium rimæ 88. b. 145. b
- - - ulcera ibid.
Pedes & manus à frigore servan-
tia 93. a
Pedium dolores 104. b
Permeientibus in somno 42. a
Perniones 31. b. 42. b. 62. b. 80. b
Pestis 50. b. 102. a. 132. b
Phantasmata 80. b
Phtisis 32. a. & b. 91. a. 93. a. 131. a. 144. a
Pilos producentia 119. a
Pinguefacientia 139. a
Plica Polonica 119. a
Podagra 33. b. 42. a. 49. b. 62. b. 90. b. 93. a. 106. a. 111. a. bis. 124. b. 127. a. 141. a. 144. a

Præfocaciones uterinæ 63. a
Prærygia digitorum 31. b
Profluvium muliebre 50. b. 63. a. 127. a
Proluvia virorum 84. a
Pruritus corporum ibid.
Pterygia 42. b
Puerpera 104. a
Pulmo 32. b
Pulmonis affectiones 106. a

R.

Rabiem compescencia 124. b
Ramices infantum 134. b
Renum dolor 119. b. bis. 139. a
Renum ulcera 8. b
Regius morbus 8. b. 14. b.
Restauratio virium 56. a
Rubor faciei 131. b

S.

Sagittas extrahentia 134. b
Sanguinem coërcencia 111. a
Sanguinis excretiones 50. a
Sanguinis profluvium 30. b. 32. a. & b
Sanguis ex naribus 42. b
Sanguinem reprimens. 49. b
Sanguinem sistens 52. b. 102. a. 104. a. 124. b. 131. b
Sanguinis vomitus 49. a
Scabies 49. b. bis. 131. b
Scirrhus 50. b. 80. b
Scroti dolores 31. b
Serpentum morsus 77. b. 105. b. 106
Somnum inducentia 90. b. 114. b. 138. b. 139. a
Spasmus 8. b. 50. b. 66. a. 148. a
Sperma augmentia 139. a
Splenis dolor 62. b
Spinæ extrahentia 134. b
Sterilitas 16. b
Stillicidia Vesicæ 84. a
Stomachus 32. b
Stomachus exulceratus 14. a
Stranguria 106. a. 119. b
Stranguria Equorum 134. b
Strumas discutiens 49. b. 50. b. 106. a. 131. a. 132. b. 134. b. & c. 145. b
Stupor membrorum 138. b
Succi mobilitas 131. a
Sudorifera 62. b
Surditas 90. b. 127. a
Suffocatio mulierum 66. b. 104. a
Suffusiones 106. b. 134. b. 139. a. 145. b
Synanchis 91. a
Syncope 56. a
Syriasis 124. b
Suspiria 62. b. 93. a

T.

Tabis 14. a
Tenefmus 32. b. 42. b
Testes ardentes 148. a
Testium tumores 124. b
Tormina alvi 32. b
Torpor membrorum 134. b
Tumorem sanans 30. b
Tussis

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| Tuffis | 88. b. 91. a. 133. b | 144. a. 146. b | Ulcera faciei | 32. a | |
| Tuffis infantum | 144. a | 104. b. 106. a. 109. b | Ulcera interna | 124. b | |
| V. | | 41. a | Ulcera purgans | 50. a | |
| Venenum | 16. b | 111. a | Ulcera tibiæ | 88. b | |
| Venenorum antidota | 131. b | Vigilias in fomnum convertens | Ulcera inveterata | 124. b | |
| Venena expurgans | 32. a. bis. 67. a. 145. b | 50. a | Urina | 84. a. 112. b | |
| Venenati morfus | 132. b | Vifus | 143. a | Urinæ ardor | 119. b |
| Ventrem purgans | 8. b | Vifus claritas | 145. b | Urinæ incontinentia | 111. a |
| Ventris profluvium | 62. b | Vomitus | 63. a | Urinam provocans | ibid. |
| Venus | 77. b | Vulnera | 42. b. 62. b | Uterus | ibid. |
| Venerem cohibentia. | 134. b. 144. a | Vulnera inteftinorum | 104. a | Uterorum durities | 62. a |
| Venerem excitantia | 82. b. 91. a. 93. a. bis. 104. a. 133. b. 238. b. 139. a. 143. a | Vulnera machinis bellicis inflita | 124. b | Uterus exulceratus | 62. b |
| Verendorum vitia | 42. b | Ulcera cancrofum | 133. a | Uterum muliebrem purgans | 33. a |
| Vermes ulcerum | 131. b. | Ulcera capitis | 31. a. 93. a. 144. a | Uteri putredines | 50. a |
| Verrucæ | 119. b. 124. b. 138. b. | Ulcera emolliens | 43. a | Uteri morbi | ibid. |
| | | Ulcera ex frigore | 146. a | Uteri fuffocatio | 163. a |
| | | Ulcera ex aduftione | ibid. | Uteri fterilitas | ibid. |
| | | | | Uteri fuffocationes. | 109. b |

NOTITIA
ANIMALIUM QUADRUPEDUM,

cx quibus

Remedia præstantissima capiuntur.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
| A Lce. | 68. a | Equa | 8. b | Pardus | 82. b |
| Afinus | 14. a | Felis | 127. a | Rana | 131. a |
| Afinus Cornutus | 23. b | Genetta | 109. b | Ranunculus viridis | 133. b |
| Bos | 23. b. 30. b. 31. a. 32. a | Glis | 114. a | Rhinoceros | 67. a |
| Bufo | 132 | Hippopotamus | 77. b | Salemandra | 137. b |
| Canis | 124. b | Hircus domesticus | 49. 50. a. b | Sincus | 139. a |
| Capra domestica | 49. a. 50. a. & b | Ibex | 54. a | Stellio | 138. b |
| Capra Sylvestris | 52. b | Ichneumon | 105. b | Sus | 73. b |
| Capra Plinii | 55. b | Lacerta | 134. b | Talpa | 118. a |
| Capra Moschi | 56. a | Lacerta viridis | ibid. | Taurus | 33. a |
| Castor | 104. a | Leo | 80. b | Taxus | 102. a |
| Cervus | 62. a | Lepus | 111. a | Testudo | 144. a |
| Chamæleon | 141. a | Lupus | 90. b. | Testudo terrestris | 145. b. 146. b |
| Civetta & Zibethum | 163. a | Lutra | 104. b | | |
| Crocodilus | 143. a | Lynx | 84. a | Testudo marina | 147. b |
| Cuniculus | 112. a | Monoceros | 23. b | Vacca | 32. b |
| Echinus terrestris | 118. b. 119. a | Mula | 16. b | Vulpes | 93. a |
| Elephas | 21. b | Mustela | 106. a. & b | Vitulus | 30. a. 31. a |
| | | Ovis | 42. a | Ursus | 88. a |

SYLLABUS.

| P. | P. | T. | S. | P. | T. | P. | T. | |
|------------------------------|------|----|-----------------------------------|----------|-----|------------------|------|--------|
| Panthera minor Oppiani | 109. | 53 | Salamandra | 137. | 77 | Tejuguacu | 136. | 77 |
| Pardus | 81. | | aquatica | | 77 | Tejunhana | 136. | 77 |
| Pardalis | 151. | | terrestris vera nigra maculis lu- | | | Temapara | 136. | 77 |
| Papio Pabijon | 100. | 61 | teis distincta | | 77 | Testudo | 143. | 80 |
| Peva | 150. | | Scincus | 138. | 78 | aquatica | 146. | 80 |
| Porcus Guineensis | | 46 | Sciurus | 113. | 66 | marina | 147. | 80 |
| Porcellus Indicus sic dictus | 112. | 65 | Senembi seu Ignava | 135. | 77 | terrestris | 144. | |
| Puma Peruan. | 81. | | Simia | 96. | 59 | Tigris | 84. | 53 |
| Putorius | 107. | 64 | Stellio | 138. | 77 | Gesneri | | 54 |
| Pygargus | 54. | 34 | Stelliones ex Matth. | | 77 | Tlacaxolotl | 149. | |
| Pyradus | 63. | | Strepsiceros | 38. | | Tlacuatzin | 118. | 73 |
| Pyrandus | 63. | | Su | 150. | | Tlalmitzli. | 81. | |
| | | | Suhak Scytharum | 57. | | Tragelaphus | 63. | 34 |
| | | | Sus | 70. 47. | 48 | Tupinambis | 136. | 77 |
| | | | Cornuta | | 48 | | | |
| | | | domesticus | 73. | | Vacca | 26. | 13 |
| | | | Guineensis | 73. | 46 | Indica | | 16 |
| | | | Sylvestris | 73. | 47 | Verres | | 47 |
| | | | Tapierete Bras. | 73. | | Vervex | 22. | 23 |
| | | | | | | Æthiopicus | | 58 |
| | | | Tajacu Caaigora | 3. | | Alius | | 23 |
| | | | Tajibi | 94. | | alius peregrinus | | 23 |
| | | | Talpa | 118. | 66 | Vitulus | 27. | 15 |
| | | | Tamandua-gvacu | 95. | 62 | marinus | | 68 |
| | | | Tamandua-i | 95. | 62 | Upalim fera | 100. | |
| | | | Tapirouffu | 146. | | Ursus | 86. | 55 |
| | | | Taraguira | 136. | | Urus | 36. | 19 |
| | | | Taraguiyca Aycuraba | 136. | | jubatus | | 19 |
| | | | Tarandus | 63. | 37 | Lybicus | | 19. 20 |
| | | | Tatus seu Echinus Bras. | 120. 62. | 63. | Vulpes | 92. | 56 |
| | | | | | 80 | Indica | 93. | |
| | | | Taurus | 26. 15. | 30 | Vulpi congeneres | 194. | |
| | | | castratus | | 14 | | | |
| | | | Pœonius | | 30 | | | |
| | | | Taxus | 101. | 63 | Zainus | 65. | 46 |
| | | | suillus | 102. 48. | 64 | Zebra Indica | 15. | 5 |
| | | | | | | Zibeth | 159. | |

INDEX

Tabularum : quo quævis loco sit inferenda.

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----|----------|-----|
| Tabula. | I. | XXIX. | 55 | LVI. | |
| | II. | XXX. | 65 | LVII. | |
| | III. | XXXI. | | LVIII. | 89 |
| | IV. | XXXII. | 52 | LIX. | |
| | V. | XXXIII. | 54 | LX. | 195 |
| | VI. | XXXIV. | 64 | LXI. | |
| | VII. | XXXV. | 55 | LXII. | 100 |
| | VIII. | XXXVI. | 64 | LXIII. | 101 |
| | IX. | XXXVII. | 66 | LXIV. | 107 |
| | X. | XXXVIII. | 68 | LXV. | 109 |
| | XI. | XXXIX. | 69 | LXVI. | 115 |
| | XII. | XL. | | LXVII. | 105 |
| | XIII. | XLI. | | LXVIII. | 102 |
| | XIV. | XLII. | 67 | LXIX. | |
| | XV. | XLIII. | | LXX. | 122 |
| | XVI. | XLIV. | | LXXI. | |
| | XVII. | XLV. | 76 | LXXII. | 109 |
| | XVIII. | XLVI. | | LXXIII. | 154 |
| | XIX. | XLVII. | 74 | LXXIV. | 97 |
| | XX. | XLVIII. | | LXXV. | 131 |
| | XXI. | XLIX. | 76 | LXXVI. | 134 |
| | XXII. | L. | 77 | LXXVII. | 136 |
| | XXIII. | LI. | 85 | LXXVIII. | 140 |
| | XXIV. | LII. | 81 | LXXIX. | 141 |
| | XXV. | LIII. | 83 | LXXX. | 143 |
| | XXVI. | LIV. | 86 | | |
| | XXVII. | LV. | | | |
| | XXVIII. | | | | |

FINIS.

HISTORIÆ NATURALIS

DE


QUADRUPEDIBUS,

LIBER I.

De Quadrupedibus Solidipedibus.

CAPUT I.

De Equo.

Aldrov.
de Solidi-
ped. c. I.

Rutis animantibus, quæ sanguinem habent, aliis binos, aliis quatuor pedes, largita est natura. Quæ tot habent. Latinis Quadrupes, Græcis τετραπύδα, Aristoteli πίζα dicuntur, & sub tribus sum-

mis generibus continentur. *Unum est* ἀσχιδής, μονόπυλον, seu μόνουχου, aut μονώνυχ, seu μονυξ, Euripidi μονόχυλον, quasi unâ tantum præditum unguâ, dicitur. Plinius Solidipedem, Gaza Solipedem vocavit. *Alterum est*, quorum pedes binis fissuris utrinque, hoc est, à parte priore & posteriore deducuntur. Unde *bisulca* Latini, δίχουλα Græci vocaverunt, eaque chelas seu forcipes pro ungulishabere, Aristoteles dixit. *Tertium* πολυσχιδής & πο-λυδάκτυλον, multifidum, & multipliciter digitatum, quod pedes manuum nostrarum instar, multifidos habeat. Omnibus pedes ad ingressum dati sunt: sed digitata prioribus præterea ad manuum officia uti nituntur, quod solidipèdes posterioribus facere, Aristoteles annotavit. Ex *Solidipedibus*, sunt, *Equus, Asinus, Onager, Mulus, Monoceros, & Elephas*, de quibus ordine hoc primo libro agemus. Ab *Equo* autem incipimus, quod ejus singularis sit, inter *jumenta*, quæ à juvando nostras operas Latinis ita dicuntur, præstantia. Demosthenes eum inter urbis munitio-nes recenset. Romani in ejus emptione denisæris millia è publico persolvebant, adimebantque bello inutilibus Consulibus aut cujusvis Imperatoris equus, phaleris exornatus, ornamentum, ut apud Halycarnassæum legimus. In multis regionibus cautum, ne quis equos extra provinciam emittat. Circassii equos plebeis permittere nolunt. M. Antonius in civitaribus sedere in equis prohibuit. Atheas Scytharum Rex ipse equum suum strigili purgabat, ut Plutarchus meminit. Andromache Hectoris conjunx, manibus suis ave-

nam & fænum Equis mariti præbuit, quod eum hisce delectari sciret. Theophylactus Lacapeni Imperatoris F. Patriarcha Constantinopolitanus ultra duo millia equorum habuit, & in eis alendis adeò fuit intentus, ut pistachia, pineas, palmulas, uvas passas, caricas, eaque omnia lectissima, vino fragrantissimo temperata, admixtis etiam, croco, cinnamomo, aliisque preciosissimis aromatis, iis apponeret; in hoc luxu, Verum Imperatorem superans; qui, ut ait Capitolinus, equo suo nomine volucris, uvas passas, & nucleos, in vicem hordei in præsepe ponebat. Moxii Tartariæ populi, constituto & solemni quotannis die equum post aliquot ceremonias corio exuebant, carneque in mensa absumta, paleâ, implebant, & mox erectæ aræ impositum, ut propitium numen adorabant, pellesque preciosiores offerebant, ut Josephus Barbarus in suo itinerario reliquit. Vixit Petrarchæ tempore in Italia quidam, qui ægrotanti equo quem amabat, aureum pulvinar, ac sericum cubile substravit: Cumque ipse interim podagrâ vinctus atque immobilis medicorum legibus regeretur; nihilominus tamen, aut servorum vectus manibus, aut equo altero vix injectus, & suos medicos secum ducens, equum ægrum suum bis terque quotidie visitabat, illi suspirans atque anxius assidebat, illum leniter manu tractans, blando murmure solabatur. Tradit denique Ludovicus Romanus, Narlingæ Regis potentissimi equum tanti pretii esse credi, propter incredibilem margaritarum quibus oneratus est copiam, quanti est quæpiam ex nostris urbibus. In tanto apud plerasque gentes æstimo equus habetur, ut pluribus Aldrovandus ostendit: Cæterum, ut ad *Nomen* ipsum accedamus, varia tam apud Græcos, quam apud Latinos sortitus est. Græcis dicitur ἵππος, πῶλος, quod de pullo propriè sumendum est; ἀλλὰ Caribus; unde Allabando cuidam nomen; καλπίς Hefychio & Varino, quod tamen equo gradario duntaxat competere videtur; δῆμιος Liguribus, ἱμῆος & Ethymologo, καβέλλος & καβίλλος, ὁ ἀπὸ καλπίος ὄντις ἵσθιαν, quod ex præsepi abundè comedat; quo tamen

A

voca-

Aristot.
H. A. I.
2. C. I.Dionys.
Haly-
carn. I.
10. An-
tiq.
Rom.Lib. 4.
Navig.
C. II.

Nomen:

vocabulo ἱππῶν, seu operarius equus tantum venit, ut apud Latinos vilitatis significationem habet; ἵππος hinnus, & ἵππος quorum illud equum, qui equum habet patrem, matrem asinam: hoc matrem equam, patrem mulum, significat: ab Aristotele tamen, pro pumilo equo, ut & Suida, cui ἵππος, ἢ κλέος πᾶν ἵππων, sumitur; κλέος non simpliciter equus est, sed qui ab uno sessore agitur, Varino ἑξουκλῆς & ἑξουξ. Aristophanis interpretes equum generosum intelligit: alii sellarem, sellarium, & nudum interpretantur; quidam, sed malè, defultorium χερσάμπυξ epitheton potius est quam synonymum. Siquidem sic dicitur, quòd ἀμπυξ: teste Eustathio, dicatur, Ἐπειὰ κατ' ἑξουξ τὰς περὶ τὸ μέτωπον τρίχας τῶν ἵππων συνδύσσει: id est, catena seu funiculus auratus, quo comæ in equorum frontibus sparsæ colligantur. A Latinis vocatur *Equus*, seu ab æqualitate, quod pares antiquitus iungebantur; seu quòd quando quadrigæ iungebantur, æquabantur, paresque forma & cursu iungebantur, ut Isidoro placet; *Eniochus*, apud Firmicum, ut Scaliger notat; *Canterius*, seu quasi carenterius, quòd castratus sit & semine quòd careat Varroni visum; seu quòd ipsi cauterium inustum sit. Ab aliis tamen pro viliori sumitur. *Veredus* est equus viatorius, qui neque rhedam neque cisium trahit, vice rhedæ tamen est, ut Turnebus voluit. Isidorus tamen & Festus rhedarium esse vult, Procopius cursus publici. *Mannus*, parvus equus dicitur Acroni & Porphyrio apud Horatium, quòd mansuetudine manuum ductus familiaris sequatur, solutos *tollutares* cognominat Seneca. Dicuntur & *Burdones*, *Burichi*, *buridi*, *buridi*, & *burici* apud Vegetium, fortè ἀπὸ τῶν φόβων ab oneribus, ut Gesnerus reliquit. Strabo *Gygenios* appellat. *Musimones* fortè dicuntur, quòd iisdem ex locis habeantur. Et tantum de Nominibus. Equum *Describere*, utpote animal omnibus notissimum, non est opus. Itaque de *partibus* tantum agemus, & vocabula quæ apud authores occurrunt, explicabimus. *Ungula* ὄππαι Græcis, quasi ὀππαι, quòd nec bifidæ, nec multifidæ sint. *Chelidon* seu hirundo, est ungularum concavitas à nido hirundinis dicta. *Batrachos* sive Rana, est ea pars quæ clavis solearum sæpe malè adactis læditur; seu teneritas ossium referens formam ungulæ, quam nutrit etiam, ejusque radices in se continet. Barbari *Tuellum* vocant, Germani *einen Kern* / nucleum. Si ungulæ pleniores fuerint carnosæque; citra civitatem, Xenophon teste Cælio, χαμῆλας vocat. Commisuram ungulæ cum pede, seu ungulæ exortum, Græci σφαγγόν, Hippocrates τοῦ διουχῆ ἀρρυνίαν dicit. κύνας Hefychio & Varino sunt ungularum pars; alii vicinam iis esse volunt, ideoque κύνοπλον vocari. Ges-

neres putat à Ruffio appellari *Falcem*. Dicit enim (inquit) locum esse delicatum & nervosum, parumque carnosum, quòd forsitan erit μεσοκώσιον. *Talos* nulli solidipedum esse scribit Aristoteles, Asino Indico excepto. *Suffrago*, id est in posterioribus pedibus quadrupedum, quòd in prioribus genu, vel, est nodus aut articulus sub crure quo pedis versura constat, tibiæque ita annectitur pes, ut verti possit. Barbari *garrectum* nominant. *Basis* sunt ossa quædam sub tibiis Vegetio, Calcaneos fortè intelligit. περὶν est os tibiæ, quòd radius vocatur. *Cirri* & *subcirri*, equorum sunt ornamenta. Crura equi Vegetius vocat *gambas* quasi campas: Hippiatri Græci βραχίονας & χέλην vocare videntur. Vegetius etiam Latinè *brachiola* in equis dixit. *Coxendices* maximas & validissimas habet, iisque ut plurimum valet. Inde fieri putat Ambrosius Nolanus, quòd sessorem ephippiumve juxta humeros amet, contra ac asini & muli. Εἶδος Xenophonti est dorsum ea pars qua insidetur. κόκκυρα vocant veterinarii partem quandam inter armos, seu ἐν σπυρμῖα interscalpio: Absyrtus κόκκον appellat. Hinc Ætogenes equi, quòd genitivam quandam notam ἐν τοῖς ὀμοῖς καὶ τῷ κόκκῳ habeant. Gesnero verò, *Coccyx*, est pars in medio dorso, juxta spinam emnens. *Armus* idem quòd humerus. *Dorsum* *Garretum* barbari vocant. *Mammæ*, tam mares in hoc genere, quam fœminæ habent; & fœminæ quidem omnes binas inter femora, mares, illi tantum, qui matri similes prodire, ut Aristoteles testatur. *Caudam* habet bovillæ contrariam, tenorem videlicet brevem, quem Plinius causam appellat, pilos prolixos Illam Vegetius *muscerium*, à muscarii flabelli similitudine; hos Plinius *fetas*, & longiones quibus muscas abigunt, Græci σέβας vocant. Duriore, sunt in equis quam equabus, quòd harum caudæ urinâ madefactæ, fetas invalidas habeant. Quæ de Sertorio fetas vellere jubente dicuntur apud Plutarchum vide. Qui ex collo dependent crines, *Iuba* Latinis, Xenophonti χρίτη, Aristoteli λοβία, seu crista, dicuntur: qui à vertice juxta oculos & tempora propendent, capronas Latini, Protocomium, Vegetius, πρὸς μίον Xenophontes dixit. *Palpebra* inferior pilis caret: ideo reprehensus pictor. (Apelles is Ephesius an Nicon, Micon, vel Polygnostus fuerit, ambiguum) quòd eos addidisset. Soli præter hominem canescere, præter Aristotelem, Plinius prodidit, quòd os in quo cerebrum, tenuius quàm cætera pro magnitudine habeat, sed falsò. Nam & canes canescunt, sub ephippiis etiam in cicatrice semper albi proveniunt, seu quòd cum ea pars sit debilis, nutrimentum non ut antea digeritur, sed quodammodo corrumpitur, ut Aristoteli placuit; seu aliam ob causam

Uni-

Isidor.
Orig. l.
12 c. 43.

Partes
Equi.

Plutarch.
de solert.
animal. in
Sertorio.

Unicolores tamen evadunt, si hordeum totum & in pulverem redactum, quod vim discutiendi, detergendique obtinet, insperferis. De Coloribus in Differentiis agemus. *Dentes* utraque oris parte habere continuos, tradit Plinius & Aristoteles inter ἀντεπλάκτα recenset. Habet autem præter agnatos qui lupini & sylvestres aliis & proximâ maxillæ parte, pullis præsertim adnascuntur, (ἐκ τῶν πρόσφυων) quadraginta. Ante cæteros, dentes parvi, magnitudine fabæ, in cibo capiendi impediunt, unde jumentum strigosius evadit. Aristoteles maribus quàm fœminis plures esse notavit. Eos pro ætatis ratione equus mutat, ut & alia veterina. Anteriores qui prius mutantur, Græcè ἐμπροσθίους & πρόμεις vocant, quasi sectores, aut incisores, Latini medios, Vegetius lactentes, Plinius fortè pullinos. Sunt autem numero duodecim, sex nempe in superiore, totidem in inferiore maxilla. Xenophon γνώμονες ut & alii Græci nominarunt, quasi ætatis indices Equus enim triginta mensium, primum dentes medios dicitur amittere, duos superiores, totidem inferiores. Incipientes quartum agere annum, itidem ejiciunt & totidem, proximos eorum quos amiserunt, & incipiunt nasci quos vocant Columellares. Quinto anno, incipiunt iterum eodem modo amittere binos, quos caninos habent, tum renascentes eis sexto anno impleri. Septimo omnes habere solent renatos & completos, ut Varro, exposuit. A complemento, inquit Absyrtus, cum reliquum trimatum agunt, dens rumpitur & rotundatur, & in triangularem figuram exit, quo tempore præcipue defluxio in ora equorum decumbit. Fiunt nonnunquam à septimo anno prominuli, quos προπεπλωκότας Absyrtus, Varro brochos vocavit. Columella quoque & Palladius, septimo anno omnes expleri æqualiter, asserunt, & ex eo cavatos gerere, postea verò quod annorum sit comprehendi non posse: decimo tamen anno, tempora cavari, & supercilia canescere, & dentes prominere. Duodecimo anno nigredinem in medio dentium apparere, Vegetius adjecit: at Aristoteles & Varro, nitescere in senectâ scribunt. Plinius rubescere legit. Ab hac dentium varietate sunt & aliquot equorum cognomina; λευκογόμους Hefychio & Varino dicitur, qui nullum ex dentibus reliquum ætatis habet indicium, qui προβατογόμους & ἀγνώμους dicitur. ἁεολοῖ & ἀεολήταρ qui eos dentes non amisit. δευτερόεολοι qui secundum eos dentes projicit. πρωτοεολοι qui primum. Petrus Crescentiensis præter indices istos, habere scaliones & molares, ait: fierique posse, ut nonnulli plures habeant: sed tunc dentes esse duplices. Dentibus autem ad senectutem firmis utitur, quamvis durissimis cibis vescatur, quod à calidis abstineat, si Cardano credendum. γνώμους & in homine

maxillam denotat, dicitur tamen de equis potissimum. Eandem vel saltem proximam partem ^{ψάλλον} Hippia tri appellare videntur. Maximæ illis maxillæ, & à maximis moventur musculis, quia proni erant sumpturi cibum. In *Corde* os aliquando reperiri, præter Aristotelem, Plinius prodidit. *Fel* quidam habere dicunt, habere, superius citati & cum iis Absyrtus negant. Hic tamen de fellis vesica in hepate intelligendus est, quam non habere ait; sed quendam inhærere solutorem nervulum, in quem se genus hoc humoris insinuet. Ruinus verò, qui Anatomen equi edidit, istiusmodi bilis receptaculum, à dextris hepatis esse ait, in ipsa cavitate, plurimisque in ipsius visceris substantiam, ramulis inferi, atque adeò facillimè ab omni bilioso onere jecur exonerare; deponere verò etiam in duodenum intestinum: additque etiam, naturam in hoc animante, folliculo, ut in homine, & aliis animantibus, recludi bilem noluisse, quod cum animum habeat semper in patinis, voracitatisque modum nullum, ventrem quoque exonerare multo quàm alia cogatur frequentius, ideoque bilis stimulus semper in promptu adesse debeat. In *figura* hoc observandum tradit Aristoteles, quod pulli paulò submissiores suis parentibus sint, atque adulti caput attingere non possint, quod novelli faciliè faciunt. Proditur iis innasci amoris veneficium, *hippomanes* appellatum, in fronte, caricæ magnitudine, colore nigro, quod statim edito partu devorat foeta, aut partum ad ubera non admittit. Id apud Aristotelem, Plinium, Theocriti scholiasten, & alios invenies. Est & alterum quod ex genitali equæ manat, cujus & Aristoteles, cum de immoderata equarum libidine agit, meminit. Plinius, qui hoc equarum virus à coitu vocat, tantas habere vires, ait, in veneficiis, ut affusum aris mixturæ, in effigiem equæ Olympiæ, admotos mares equos ad rabiem coitus egerit, quod etiam apud Pausaniam & Ælium invenies. Ælianus confundit cum hippomane pulium seu *pullum*, quod Aristoteli est ^{πώλειον} Plinio, teste Hermolao Barbaro, polea, estque illud quod equa prius emittit quàm pullum. Plinius eo nomine alicubi puli asinini finum, quem primum edidit, intelligit. *Locum* si spectes, ubique ferè locorum hoc animal invenitur. Paludibus & riguis gaudet, gaudet & ipsa planicie: nec montes, modò rigui sint, aspernatur. Quin Columella, equorum gregibus, inquit, spatiosa & palustria, nec non montana pascua eligenda sunt; rigua, nec unquam siccanæ, vacuæ magis quàm stirpibus impedita, frequenter molibus potius quàm proceris herbis abundantia. Locum pascendis idoneum ^{ἐμπροσθεν} vocant. Pompicus & bellator stabulo continetur. Id equile alii, Varro

Plin. H. N. l. 8. c. 42. Aristot. H. A. l. 2. c. 15. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Theophrast. de animal. in vident.

Plin. H. N. l. 8. c. 42. & l. 24. c. 11. Arist. Hist. An. l. 6. c. 15.

Ælian. H. A. l. 3. c. 17. & l. 14. c. 18.

Columella R. R. lib. 6. c. 27.

Equarium, Grapaldus propriè præsepe dixit. Græcis ἵππων, ἵπποσσις, σάβρος, φατνι, ut Pollux annotavit. Hesychius & Varinus apud Lacones ἵππικον dicitradunt. Lignum ad quod capistris alligantur, vacerra nominatur. Plura de loco in Differentiis vide. Quantum ad *Cibum*, frugibus victitare, ideo inter sapientissima animalia censeferi inquit Plinius. Inter has præcipua sunt, Hordeum, quod minus quam avena vel triticum inflat; & tum equus ἀκοήσαι dicitur; quod hordeum Nicandro acoste vocetur; Avena, cujus usus apud nos fuetus. Triticum, quod tamen Serapio reprehendit; Panis denique, qui in Anglia & alibi ex fabis & Pisis in hunc usum conficitur. Victitant tamen frequentius gramine & aliis, propriumque hoc equorum alimentum. Melilotus ideo in Italia Trifolium Cabalinum dicitur. Medicam herbam, quæ in Media crescit, præcipuè equos nutrire, apud Strabonem habemus. Prima falx, teste Aristotele, vitio datur, & cum fætida aqua rigatur, incommoda est. Quater autem rectè, interdum sexies demetitur per annum, ut Columella prodit. Ad maciem equorum nulla res tantum quantum illa prodest. De *Cyrifo* hæc Plinius. Datur animalibus post biduum semper, hyeme verò quod inaruit, madidum. Satiant equos denæ libræ, pauciores, minora animalia. Multis in locis vicia manipulatim collecta apponitur. Damasci ervilia & ervum, ut Bellonius prodidit. Necessitas ut & alia apponerentur, coegit. Equi Cæsaris à Scipionis exercitu in Africa obfessi, referente Hirtio, algæ è littore collectæ, & aqua dulci elota nutriebantur. Pompejani ad Dyrrhacium obfessi, foliis ex arboribus strictis, & arundinum radicibus. In regno Senegæ, ob aridam tellurem, phaseolorum laceramentis & milio utuntur. Thraces, qui ad Strymona amnem habitabant, tribulifoliis. Parthi Hippace herbâ. Tartari arborum ramis & corticibus, herbarumque radicibus, ungulis è terra excussis. In provincia Aden piscibus, quorum ibi ingens copia, ut apud Paulum Venerum legimus. Idem siccati in Golcondâ provincia Persiæ apponuntur: quod & de Gedrosiis, Celtis, Macedonibus, Lydis, Pæonibus qui Prasiadem paludem habitant, Ælianus & Herodotus prodidere. Arabes camelino lacte bis de die nutriunt. Vere tantum teneris herbis pasci sinunt. *Potum* amant aquam, seu turbidam, ut Aristoteles voluit; seu limpidam ac frigidam, perennem ac profluentem, ut Vegetius: seu leniter fluentem & parum turbidam, ut Crescentiensis, seu palustres, ut Baccius. Sunt qui vinum præbuere, cum animosos vellent. Sed & sanis, verum macilentis, Columella propinat. Cerevisiam quoque & olim præbitam, ex Varino colligi

potest, cui ῥοβλαχῶ est avena, & secundum alios frumentacea equorum potio. *Ætatem* si attendamus. In hujusce animalis genere ætas longior maribus: legimus sanè equum ad usque septuaginta annos vixisse. Jam illud non venit in ambiguum, quod in annum tertium & tricesimum generet, utpote qui etiam post vicesimum mittatur ad sobolem reparandam. Notatum etiam advertimus, Opuntem nomine equum ad gregariam venerationem durasse annis quadraginta. Annotatis proditum à veteribus indicium, si contracta armorum pellis lentè explicetur: in juvenibus ad suum statim locum redit. Sunt qui ex juncturis caudæ judicent, ubi ex dentibus non amplius dignoscitur. Quinquennio equas finem crescendi capere; mares anno addito, à Plinio habemus. Addit Aristoteles, post, annis sequentibus totidem crescere in corpulentiam, & ad viginti usque annos pergere proficiendo: verum celerius fœminas quàm mares perfici. Salacissimum omnium animalium equum esse, Aristoteles prodidit. Hinc ἵππικον, ἵπποπύριον, ἵππορῶς & ἵππορῶ, ille inter homines dicitur, qui plus æquo veneri addictus est; & ἵππομανῆν ille, qui more equini generis, furiis ad eandem agitur. Famosior tamen equarum quàm equorum salacitas. Ideo Pœtæ Cupidinem inter equarum armenta natum fingunt: mulieresque libidine prurientes caballæ, meretrices vero πᾶλοι dicuntur. Has societate conjunctas, olfactu mares dignoscunt, etsi paucis admodum diebus unâ fuerint: quod si fœminæ diversæ permisceantur, mares alienas morsu expellunt, suasque singuli seorsim habentes, pascuntur. Gravidæ coitum pati apud Aristotelem legimus: Absyrus negat. An sint homine salaciores, Gryllus apud Plutarchum in dubium vocat, quod capros, porcas, equas, iniverint viri, & fœminæ infano bestiarum amore exarserint: ad coitum verò nullum à bestia sollicitatum. Fuit tamen Athenis locus qui diceretur ad equum & puellam, quod quidam Codridarum Hippomanes nomine, quid & postremus imperavit, filiam in loco quodam cum equo furibundo inclusit, quod clandestino concubitu virginitatem læsisset, & equus puellæ vim intulit. De *Ætate* coitu apta diversa produntur. Coire incipere bimum, tam marem quàm fœminam, prodidit Aristoteles. Sed hoc in paucis fieri, & pullos imbecilliore esse: ut plurimum trimatu seu tricesimo mense incipere, & proficere subinde ad prolis præstantiam in vicesimum usque annum: dignè procreare posse, cum dentibus mittendis cessare: sed idoneum maximè tempus cum annum & sex menses complevere: juniorum, aliquando pabuli bonitate & copia contingere. Plinius verò equas post tertium annum aut post unum ab enixu utiliter admitti putari

Plinius
H. N. l.
13. c. 24.

Hirtius
de bello
Africa-
no.

Scalig.
Ex. 206.
5.
Ælian.
H. A. l.
14. c. 15.

Ætas.
Plinius
H. N.
l. 4. c. 42.

Genera-
tio.
Aristot.
H. A.
l. 6. c. 12.

Aristot.
l. 4. de
gener.
animal.
cap. 5.

Aristot.
H. A. l. 5.
c. 14. &
l. 6. c. 21.

Plin. H.
N. l. 10.
cap. 63.

Columella R.
R. l. 6. 1.
28.

tari ait, cogique invitas: domitas autem sexaginta diebus equire, ante quam gregales dici. In Hispaniola, si Petro Martyri credimus, decimo postquam natæ sunt mense concipiunt, & geminos sæpe unico partu excludunt. Columellæ equa bima rectè concipere potest; equus mas non trimo minor. Illa post decennium inutilis, quod ex annosa iners proles prodeat. Sic ad vicesimum durat. Anatolius vult, ut admissarius (sic latinis vocatur, qui ad prolem diligenter servatur, Græcis ὀχεύων, ἵππων, ἀναβάτης, κίλων Hippiatricis, ut opus ipsum ὀχεύειν, & Proriga ille qui admittit) sit quinquennis, decimum quartum vero ingressus annum, ut conquiescat. Prurire agnosces, cum sese colligere, caudam frequentius jactare, humorem è genitalibus genituræ similem emittere, pluries etiam mingere, videris. Mas aliquando uno, aliquando duobus tribusve, aliquando pluribus diebus implet. Equa intermisso tempore, & melius quarto aut quinto anno interposito procreat. Omnino si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi novale fecere necesse est. *Fatura* initium ab æquinoctio verno ad solstitium, locis calidis mense Aprili, frigidioribus Majo. Sic, quia mense duodecimo partum edit, circa herbescentem & temperatissimam anni constitutionem pariet. Elei finibus suis eductas iniri faciebant, quod sexcentis experimentis cognitum haberent, miræ felicitatis prolem sic provenire. Mares matutinum tempus appetunt, foeminæ post meridiem blandiuntur. Dantur & salacitatis irritamenta. Absyrtus, ustam cervi caudam cum vino terere, & genitalia illinire jubet. Alii cicer exhibent; nonnulli urticam ori indunt; pulverem testiculorum equi in potu exhibent; deterfa foeminæ sponsia loca naribus admovent: scillâ cum aqua ad mellis crassitudinem contrita, naturam equarum cum menses ferunt, tangunt: urtica vulvam perfricant: quidam denique fimo gallinaceo cum Terebinthina trito partes oblinunt. Lybicæ & Mysiæ equæ, tibiæ cantu excitantur, & gravidæ fiunt, ut apud Ælianum legimus. Genustibiæ Hippophorbium Pollux vocat: materia, laurus detracto cortice. Non omnes tamen concipiunt; nec omnes postquam concepere, edunt. Cujus rei indicium ajunt, quod foetus circum renes alia quædam, specie prope modum renum, ita continet, ut rescissus, quatuor renes habere videatur. Si, quot equæ uni equo sufficiant quæras, Columella, nec minus quàm quindecim, nec rursus plures quàm viginti, unum implere debere inquit. Aristoteles tricenas foeminas & paulò plures singulis maribus tribuit. Palladius æstimatis unius cujusque admissarii viribus, pauca vel numerosa conjugia submitti consulit: juveni equo & viribus & forma con-

Ælian.
H. A. l.
12. c. 44.

Columella R.
R. l. 6.
cap. 27.

stanti, duodecem vel quindecim adscribit. *Concepisse* comperies, secundum Aristotelem, cum menses cessarunt; secundum Absyrtum, si marem respuat; secundum Plinium, quod colorem illicò rubriore pilo, aut quocunque pleniore mutant. *Marem edituram* ajunt, si tertio ante plenilunium die admittatur; si tertio post, foeminam. Illum seminum colligunt, si dextra admissarius desiluerit; hanc, si sinistra. Justa equa in Pharsalia dicebatur, quæ semper similem equo cui conjuncta erat, produxit. Vento in Lusitania concipere; Columellæ, Varro, Plinio, Solino, Alberto, Avicennæ visum; in Cappadocia idem fieri Augustinus prodidit; at Justinus in fabulis id recenset, Aristoteles fieri posse negat. Circa prægnantem quanam facienda sint, Oeconomi docerunt. Abortiunt si fumigantis lucernæ odorem persenserint, vel cum prægnantibus asini coiverint. Annum, secundum pluresque, uterum ferunt, secundum Absyrtum, undecem menses & decem dies. Uteri durities in causa, si Aristotelem sequimur. Facillimè omnium quadrupedum partus edunt, & quidem erectæ. Eumelus author est, cum tardius pullitium enititur, continuò parituram, si comprehensas leniter nares constrinxeris. Pariunt magna ex parte singulos, aliquando gemellos. Vacat admodum à purgamentis in partu, minimumque emittit sanguinis profluvium, pro corporis magnitudine. Cum peperit, statim secundinas devorat, illudque fronti annatum hippomanes. Visum prodidiisse & hermaphroditos. Nero tales equas ex agro Treverico, carpento suo subjuges ostentabat, ceu planè viscenda res esset, principem terrarum insidere portentis. De *androgyno* Princivalli Vicecomitis ita Cardanus. Unum habebat tantum testem proprio loco, cum mammis tumidis, ut equæ habent. Inde vulvam proprio loco, & ex vulva penis emittebatur, non major palmo cum eum exereret. *Vocem* equi cum exprimere Græci volunt χρομελίζειν, & ἐπιχρομελίζειν, vel potius φρυμάττειν, ut Ammonius monet, dicunt; Latini fremere & hinnire. Vox ipsa, χρομελισμός, βόρυχα, μέρυμ, vocatur. De ejus mutatione ita Aristoteles. Equorum etiam voces, differre palam est. Foeminæ enim simul ac natæ sunt, vocem exiguam mittunt ac tenuem: Mares exiguam quidem & ipsi, sed plenior tamen & gravior quàm foeminæ & indies majorem reddunt. Bimus cum est, atque inire incipit, vocem magnam gravemque mas mittit: foemina majorem quàm ante & clariorem, usque ad vigesimum ætatis annum, magna ex parte: sed ab hoc tempore imbecillior tam mares quàm foeminæ reddunt. Qui nunquam in aliorum equorum turba hinnit, hunc mutum esse scribit Mizaldus. Cum incedunt,

Columella l. c.
Varro R. R. l. 2.
Plinius H. N. l. 8. c. 42.
Solin.
Polyhist. cap. 36.
August. de Civit. Dei l. 21. cap. 5.

Plinius H. N. l. 11. c. 47.

Cardan. de rer. var. l. 7. c. 33.

Vox.

Morus.

Cardan.
de Var.
Rer. l.
13. c. 3.

sonitum edunt, pedibus terram pulsantes. Inde Latinis sonipedes, Homero *ὠκίπδες*, quasi altisoni dicuntur. Quoniam poplites non adeò flectere possunt, ascendendo magis fatigantur, & lapsi, majore cum impetu ruunt: descendendo, quòd quatuor habeant crura, magis contra pondus obnuntur. Agilitatem & epitheta quæ apud authores occurrunt, & exempla testantur.

Homero *ὠκίπδες, ἀερίπδες, ἀλλήπδες, ταχύπδες, ἐλαφρόπδες* &c. vocantur. Oppianus, tantæ Iberos scripsit esse celeritatis, ut solæ cum

eis, Aquilæ, aut Circi accipitres comparari possint. Persei Pegasus alatus fingitur. Sarmatas longinquafacturos itinera, etiam si nihil offerrent pabuli, per centena & quinquaginta miliaria insedisse, non nemo prodidit. In Arabia, si Vartomanno credimus, citatissimo cursu diem ac noctem integram nunquam cessant. In Alanico bello captum à Probo Principe memorant, qui unius diei spacio centum obiret miliaria, vel in decimum haud interpellato labore. Cæterum

an equi equabus, aut vice versa velociores sint, disquiritur. Homerus equabus Pheretiadis palmam tribuit. Menelai Ætha pernicissima erat. Horatius quoque equum quàm equam quadrigis aptiorem dicere maluit. Equas inter currendum urinam emittere Plinius dixit. Crauxidæ equa octava Olympiade omnes vicit desultorios.

Horat. l.
2. Car.
od. 16.

Plin. H.
N. l. 15.
c. 21.

Hecratitis Thessali (Echecratidem Plinius vocat) prægnantem equam Olympia vicisse invenimus. At Oppianus mares ad venationis uium præstare tradit; foeminas minus celeres ad longos per nemora decursus.

Aldrov.
P. 40.

Quid equus admissus Ciceroni sit, in Aldrovando vide. Imminuitur, imò perditur celeritas, si ocio domi marcescat. Quamobrem Antigonus Rex cum suo equitatu obsessus, cum exercere equos propter loci angustiam non posset, eorum capita loco substrinxit altius, quàm ut prioribus pedibus terram possent attingere: deinde cogebat ipsum equitatum posterioribus exultare ac calces emittere; qui motus non minus sudorem excitabat, quàm si terræ spaciū decurrissent. Ex putrescentium

Natura.

medullis evolare vespas, notissimum. *Naturam* si spectes, *φοβιάδες* quoque sunt, seu *ἀγλαῖοι*: bibunt sorbendo, & os profundius aquæ immergunt, quod audaciæ inscribitur: animum & os semper in patinis habent, & facilius sitim quàm famem tolerant: equæ crebrius mingunt, & per menses purgantur: plus excrementi sicci quàm humidi, quòd siccis magis vascantur, egerunt: Spumant si cursu defatigantur, cujus causam Galenus exactè prodidit; somniant de iis quibus assuevere: dormiunt plerumque stantes, canterii magis, qui quod castrati sint, somnulosiores videntur. Cum irascuntur, canum modo dentes denudant mordentque:

Galen. in
Aphorif.
l. 2. 45.

blanditiis maximè deliniuntur: pullos vehementer amant: Hinc factum ut Darius equâ consensâ, quæ domi pullum habebat, ex prelio ad Issum rebus suis inclinatis evaderet: & Tartari, prædæ gratia regionem quandam, in qua multo per annum tempore sol non apparet ingressuri, pullos in limitibus relinquunt. Sic enim equæ nocturno itinere diligentius observato, rectâ ad suos pullos in reditu contendunt. Rara denique, sed nota equarum rabies est, ut cum in aqua suam viderint imaginem, amore inani capiuntur, & per hunc oblitæ pabuli, tabe cupidinis intereant. Mentis error discutitur, si deducas ad aquam detonsâ jubâ: tum demum specularæ deformitatem, pristinae imaginis aboletur memoria. Lycospadas equos maximè dare operam, ut aurigis suis formosi videantur, Ælianus prodidit. Ad *sensus internos*, ingenium, docilitas, memoria, amor & fides erga dominum, pudicitia, & magnanimitas pertinent. *Ingenio* debentur, quod inimicos partis suæ norunt, adeò ut inter prælia hostes morfu petant: quòd rectoribus perditis quos diligebant, mortem fame accersant: quòd auribus quæ audire indicent: & quòd equitationis peritum agnoscant. Bucephalus Alexandri, accepto regio stratu, neminem unquam alium præter dominum vehere dignatus est; & vulneribus altis in prælio acceptis, non prius concidit, quàm dominum extra periculum deposuisset. Equum Caii Julii Cæsaris nullum præter Cæsarem dorso recepisse Solinus & Suetonius author est. Cujusdam medici Pannonici præforibus solutus, etiam per integrum diem, donec ab ægris rediisset, expectabat; adventanti gratulabundus occurrebat. Choreas tripudique *edoceri* Sybaritarum exemplo notissimum, qui eo devenerant dementiæ, ut in symposiis equos ad tibiam saltare docerent. De illo verò quem Scaliger vidit, ita idem. Equum pusillum deformem circumducebat agyrta quidam, cujus jussu atque etiam loco interdum ille omnia faceret; ambulare, succussim properare, currere, saltare, vel quadrupes, vel bipes. Vinum bibere vidimus, in clunibus sedentem; anteriores pedes ad pateram ferri: pelvim sive malluvium cruribus sustinere, quasi à tonsore lavaretur; qualem pictum videmus asellum cucullatum: humo se sternere; porrectum atque projectum jacere: ciliorum compressione annuere: caput ad heri nutum attollere: in terga vertere: supinus ostendere, quo corporis situ mulier ineuntem admittat virum. Stabulum agnoscere, & sponte domum reverti, notum. Ideò Galba cum de equi possessione disputaretur, velatum duci ad flumen præcepit, & ubi bibisset, amoveri velum oculis, ut stabulum petere posset. Deuxippi equus,

Pau'us
Venetus
l. 9. c.
47.

Ælian.
H. A. l.
16. c. 24.
Sensus
interni.

Sueton.
in Cæsare.

Scaliger
Exercit.
209. f. 1.

Suidas in
ππ.

ita

ita erat edoctus, ut & sine habenis ocysimè ferretur, & illo pedetentim procedente, placidissimè staret. Nigritarum quoque equos non aliter dominos ac canes sequi, Strabo author est. In ventre cubare edoctos à Jarcis, apud Herodotum legimus. Nervam in Parthia equus adorabat. Lutetiae alter Reginam Ludovici xii. conjugem, genibus flexis salutabat. Circulos ligneos transiliisse, more canum, saltuatimque vivacissima pernicitate sese gylando revolvisse, Venetiis anno 1636. vidimus. *Mémoria* valere inprimis tubæ sonus indicat, quo audito, aures arrigit, nares inflat, hinnit, frena cum strepitu rodit: pedibus terram quatit, loco manere difficulter potest. Parasitus etiam quidam apud Tzetzem, cum equo veheretur curili, prandio frustratus est, quod equus, cum in columnam metæ forma incidisset, circum esse putans, usque ad vesperam circum eam se flexisset, cum impetu semper currens. Taceo quod Tholossanus de equo cujusdam Episcopi scribit, quem frater ejus ita adfueverat, ut quoties verba, Deus in adiutorium meum intende, audiret, saltibus crebris se extolleret. De *Amore, gratitudine & fide erga Dominum*, quorundam exempla testantur. Antiochi equus, occiso in prælio domino, se & suum sessorem Centeretrium Gallum præcipitem dedit. Sytharum reguli, hostem cum victor ad spoliandum venisset, ictibus & morsu confecit. Dionysii, ab eodem in cœno relictus, ut apud Plinium ex Philisto legimus, ut sese exemisset, vestigia Domini secutus est, etsi apum examen tergo hæreret. Homerus Patrocli equos flevisse dicit, Virgilius Pallantis, Cæsaris Suetonius, suum Asturconem Cardanus. Plinius quoque, eo effectum pluresque equorum in dominos esse ut affectos lugeant, lachrymasque interdum desiderio fundant, tradidit. Interfecto Nicomede Rege, equus ejus vitam inediâ finiit. Idem de Soclis juvenis Atheniensis equo, postquam ab eo venditus fuisset, dicitur. De *Pudicitia* apud Ælium, Varronem & alios invenies. Plinius ita brevissimè. Alium, inquit, equum, detracto oculorum operimento, & cognito cum matre coitu, petiisse prærupta atque exanimatum. Equam eadem ex causa in Reatino agro, laceratumque pariter aurigam invenimus. Namque & cognationum intellectus in iis est: itaque in grege prioris anni sorore, libentius etiam quam matre, equa comitatur. De pulli ex incesto domini concubitu nati zelotypiâ, vide Aldrovandum De *Magnanimitate* idem prolixè agit, sufficiat dixisse, quod Plinius habet, nempe, Equorum jubas tonderi præcipere, ut asinorum in coitu patiantur humilitatem: comantes enim gloriâ superbire: Inveni quoque qui

sine auriga certamen vicissent. In Circo, inquit Plinius, ad currus juncti, non dubiè intellectum adhortationis & gloriæ fatentur. Claudii Cæsaris secularibus Circensibus, excusso in carceribus aurigâ, albatos equos palmam occupasse, opposita effundentes omnia, quæ contra æmulos debuissent, perito auriga insistente, facientes: cum puderet hominum artes ab equis vinci, & peracto demum legitimo cursu ad metam ititisse. Moxque subjungit. Majus augurium apud præcos, plebeis Circensibus excusso auriga, ita ut staret, in Capitolium cucurrisse equos sedemque ter lustrasse: maximum verò, eodem pervenisse ab Vejis, cum palma & coronis, effuso Ratumena, qui ibi vicerat: unde postea nomen portæ est. Phidoti Corinthii etiam equa, cui Auræ nomen, apud Pausaniam, ab ipsis statim carceribus sessore suo collapsa, & cursum pristinum æquè ac si rectorem haberet retinuit, & circa metam se convertit: audito verò sono tubæ ad cursum concitata est vehementius: cumque ad ludorum præfectos antevertisset, jam quasi victoriæ se comitem intelligens, constitit. *Sympathiam & Antipathiam* si attendas, singularis equo cum gallinis & otide amicitia: cum *camelo*, *elephante*, *lupo*, *urso*, *leone*, *sue*, *ovibus*, *asino*, *serpentibus*, *trachuro pisce*, *phoca*, *pomis & ficubus*, *hordeo quodam*, *gentiana*, *colore atro*, & cadaveribus, inimicitias exercent: *Camelos* cum Cyrus equitatu Cræsi opposuisset, in fugam equos conjecere. Xerxes Arabes camelis usos, ultimos in exercitu locavit, ne equi consternarentur. In bello Tarentino elephantorum tum magnitudine tum deformitate, & novo colore simul ac stridore consternati equi, cum incognitas sibi belluas amplius quam erant, suspicarentur, fugam stragemque latè dederunt. Cæsar ingentem fluvium in Britannia trajecturus, consenso elephante, equos Britannorum terruit. Ne tympana quidem ferre posse, si expellibus vel elephantis, vel cameli, vel lupi facta fuerint, à Porta author est. Rumpi eos traditum est, teste Plinio, qui vestigia *luporum* sub equite sequuntur, si calcaneum equi quadrigam trahentis conculcent, fisti, tanquam cum quadriga congelati essent, apud Ælium legimus. Nunquam transituros equos, ubi lupi intestina sint defossa, Pierius Valerianus prodidit. Dentes verò maximos, infatigabilem cursum præstare equis dici, si eis alligentur, Plinius author est. De Lycospadis & Lycophoris equis in Differentiis agemus. *Ursos* in solitudine tympano ex equi pelle confecto, terreri Portæ quoque debemus. Castrati *leonem* nulla ratione accedunt, dextrarii seu non castrati adoriuntur. *Oves* si stabulo in quo mulæ, equi, aut asini steterunt, faciliè in scabiem incidunt. Rudentes *asini*, in Darii

Plin. H.
N. l. 8. c.
42.

Pausan. in
Corin-
thiacis.

Sympa-
thia &
Antipa-
thia.

Herodot.
Hist. l. 1.
p. 15.

Plin. H.
N. l. 20.
c. 20.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 19.

Columel-
la R. R. l.
6. c. 30.

contra

Plin. l. 8.

Plin.

contra Scythos expeditione, equos perturbarunt. De *serpentibus* Silius Italicus prodidit. Cauda *trachuri* ventri equæ appensa, abortum procurat, si Æliano credimus. *Phocæ* aspectum ferre nequeunt. Animo linquuntur, si aut mala aut ficius dorso comportarint; exanimati, panis objectu revocantur. Hordeo illo abstinent, quod in quodam, circa Scytharum & Medorum dictam Thraciæ regionem, loco, provenit. In rabiem, aguntur, si lasere nares illiveris. Gentianam abortus equabus causam esse, Gesnerus ex quodam sene audivit. Securi-dacæ si calca verint, soleas exuunt. Si equi ex Sybari fluvio biberint, stérnutamentis exagitantur: si ex Cossinire Thraciæ, quod in agrum Abderitarum defluit, in rabiem aguntur. Idem de puteo haud procul à Potniis Bæotiæ urbe dicitur. Equum Catonis in Maurum aterrimum, aterrimis armis indutum, calcaribus adactus, sese inferre recusasse, Silius Italicus reliquit. A cadaveribus abhorre apud Homerum habemus. *Ufus.* Maximus quidem equorum in Cibis, medicina, bello, venatione, itineribus, triumphis, & aliis usus est; nos tamen, quo loco duntaxat in *Cibis* & *Medicina* habendi sint, videbimus. *Carnibus* usos non tantum obfessos, quod in Veronensi sub Maximiliano I. Novariensi, sub Ludovico Aureliano; Rupellensi, sub Ludovico XIII. Gallorum Rege Christianissimo, ut alia taceam, factum, sed & gentes, apud authores habemus. Notum est, Nomadum, Scytharum, Sarmatarum, & Tartarorum modernorum nomen. His volupe, vulnerare incidereque equos, carnibusque etiam semicrudis vesci: caballos pridie tum spontè tum morbo absumptos, excisco loco apostemato comedere; eorundemque reges, si quando comematum suis distribuerent, quadraginta hominibus equum unum dare solebant. Sed & apud Persas, in conviviis die cuiusque natalis, assii toti aponebantur: à Germanis verò tam agrestes quàm domestici caballi, tam diu comedebantur, donec à Gregorio III. abrogaretur. Ab Alpinis populis pullos edi, Bruyer. 1. Brujerinus se audivisse refert. Fuit & *Sanguis* in deliciis. Plinius sanè Sauromatas è milio, maximè pulte, & cruda etiam farina sanguine è cruris venis admixto vivere, prodidit. Miechovius verò & Paulus Venetus, equitantes si fames invaserit, sitisque molesta fuerit, venas aperire, haustoque eorum sanguine, famem sitimque pelleret, reliquerunt. Gavisos eodem Cancanos, qui secundum quosdam Virgilio Bifaltæ, secundum Acronem & Porphyrium Hispaniæ gentes, apud Horatium habemus. De *Lacte* nullum dubium. Scythæ namque liberis statim atque nati sunt, lac equinum porrigunt. Inde Hippomulgorum, & Galactophagorum nomen. Idem Soli exponunt, ut crassior

pars subsideat, mox fervefaciunt. Evadere produnt, ut vinum album esse putetur. Moschi verò olim Tartarorum servi, potum lactis equini illis tributum petentibus perducem suum in itinere offerre consueverant. De Hippace quid sit, inter scriptores non constat. Pippocrates, Dioscorides, & Plinius, caseum esse scribunt, quem ille virus redolere, & bubulo propotione respondere, adjicit. Alii equinum coagulum esse credunt. Theopompus scythicum ex lacte equino, edulium esse scribit. Ut ut sit, hâc & glycyrrhizâ, undecim & duodecim dies vitam tolerari apud Theophrastum legimus: plurimam temporis partem caseo equino usos Hippocratis testimonium est. Nec est quod quisquam illud miretur; cum Zoroastrem interdum solo lacte sex menses transegisse, quod de quodam alio Athenæus narrat, referant. *Medicinam* quod spectat, habet in calocum, lac, serum, sanguis, axungia, coagulum, dentes, lingua, os de corde, jecur, testes, fel, pili, ungula, sudor, spuma, saliva, urina, & stercus. Lac maximè perpurgat, ut purgare Dioscorides tradat. Serum ad ulcera renum perpurganda, conducit, si Ætio credimus; illud nempe, quod per decoctionem ex lacte separatur. Rhasis mulierem quæ non concipit, si lac equinum ignorans biberit, & mox cum viro congressa fuerit, concepturam scribit. Invenio & apud Plinium, vulvas collutas juvari eodem lacte. Sanguis septicus est: Equarumne quæ admissuram expertæ sunt, an verò marium *ἰχθυῶν* quod Hermolao Barbaro placet, vel equorum utriusque sexus, quod Plinio, experientia dirimere potest. Eundem Plinius regio morbo prodesse scribit: & hippiatri eodem ad deversos morbos utuntur. Phragmaticum de matrice detractum, cum oleo vinoque tepefactum, & toti jumento contra pilos inunctum, curat. Fel, maleficæ naturæ est, si Plinio credimus, qui tantum inter venena damnari tradit, ut ideo flamine sacro equum tangere non liceret. Axungia suffumigata, partum mortuum, si Sexto credimus, foras ejicit, & secunda sequitur. Medulla unguentis ad spasmus miscetur. Coagulum inter dysenteriacorum & coeliacorum remedia censeret, Dioscorides, Galenus, Avicenna, & Haly authores sunt. Dentium farina verendorum vitiiis inspersa, medetur. Qui primi equo cadunt, infantibus adalligati, dentitionem facilem præstant, idque efficacius, si terram non attigere, ut Plinius prodidit. Sextus eos, si dentem qui doluerit, tetigerint, remedio esse scribit. Nam & infans, addit, si equi rostrum basia-verit, dentium dolorem non sentit, & nec equus mordebit infantem. Lingua, ex vino inveterata, ad lienem præsentaneo remedio sedandum datur, si Cæcilio Bioni apud Plinium

Cromer-
rus Hi-
stor. Po-
lon. l. 29.
Hippo-
crat. l. 4.
de mor-
bo. Plin.
H. N. l.
28. c. 9.

Theophr.
H. P. l.
9. c. 13.

Ufus in
Medici-
na.

Dioscor.
M. M. l.
2. c. 75.

Veger. l.
1. c. 17.

Bruyer. 1. Brujerinus se audivisse refert. Fuit & *Sanguis* in deliciis. Plinius sanè Sauromatas è milio, maximè pulte, & cruda etiam farina sanguine è cruris venis admixto vivere, prodidit. Miechovius verò & Paulus Venetus, equitantes si fames invaserit, sitisque molesta fuerit, venas aperire, haustoque eorum sanguine, famem sitimque pelleret, reliquerunt. Gavisos eodem Cancanos, qui secundum quosdam Virgilio Bifaltæ, secundum Acronem & Porphyrium Hispaniæ gentes, apud Horatium habemus. De *Lacte* nullum dubium. Scythæ namque liberis statim atque nati sunt, lac equinum porrigunt. Inde Hippomulgorum, & Galactophagorum nomen. Idem Soli exponunt, ut crassior

Horat. l.
3. Car-
mina.

Galen. de
Euporist.
l. 2. c. 38.

Plinium fides. *Os de corde*, dentibus caninis maximè simile est. Hoc Scarificari dolorem, aut exemto dente demortui equi maxillis ad humerum ejus qui doleat, demonstrari, Plinius author est. *Jecur* thecâ cedrinâ repositum, dein vino Chio & aqua dilutum, ne jecur amplius exedatur, efficit. *Lien* ex aqua dulci potus, mortuum partum ejicit, apud Plinium. *Testiculi* aridi hausti Venerem stimulant. *Lichenes* in genibus, & super ungulas inflexu harum partium indurati *calli*, triti & in aceto exhibiti, comitialibus profunt, ut Dioscorides, Galenus, & Plinius, scribunt. *Pilus* ad ostium domus alligatus, ne culices, aut Cniphes per ostium involent prohibet. Id Rhasis & Albertus prodidere. In inguinum ulceribus equi setæ tres, totidem nodis alligatæ intra ulcus, remedio sunt. Eorundem ex capite & femine cinis, sanguinis profluvium sistit. Pilo circumligato verrucæ tolluntur, quod propter adstrictionem alimento privatæ arescant. *Ungularum* cinis cum oleo & aqua illitus, panos & apostemata, in quacunque parte discutit: sed & strumas, si urina calefacta admisceatur. Ex vino & aqua potus adversus calculos prodest. Suffitus partum deturbat. Ramenta per nares equo infusa, urinam ejusdem promoveri, Hierocles scribit. *Sudor* cum urina in balneo bibitus, tineas & serpentes è ventre hominis exigit, si promissis quorundam credendum. Mistus cum vino & à gravida potus, abortum facit. Si cultelli vel gladii calefacti eum imberint, inficiuntur adeò, Alberto prodente, ut locus ab eis vulneratus, sanguine, ante mortem animantis, manare non desinat. *Sputa* equi recens detracta, & cum oleo rosaceo infusa, auricularum quamvis vehementes dolores resolvit. Eadem, Marcellus, si ab equitando vexata fuerint inguina, aut intertrigines doluerint, fricari tanquam præsentaneo remedio, jubet. Ex *Saliva* commendat Gesnerus, in fervido faucium malo, quod æstate nonnunquam, pestilenti lue, in milites inprimis grassatur, remedium. *Saliva*, inquit equi, *avenam aut hordeum pasti*, *os aegroti diligenter colluitur*: deinde ex cancriis vivis contusis, humorem exprimes, eodemque rursus lavabis. Quos si vivos habere non potes, pollinem de cancriis aridis in clibano tostis insperge: postquam equi saliva ablueris. Phthificis jam desperatis, salivam vel spumam cum aqua calida per triduum dabis. Ager sine cunctatione sanabitur, sed equus morietur. Id à Plinio, Marcello, & Sexto proditum habemus. De *Urina* & *Stercore* hoc dixisse sufficiat: illam aquæ ferrariæ ex officinis contra comitalem morbum misceri: hoc, ad colicam in vino albo decoctum, contra scorpionum ictus, & fluentem ventrem in aqua, Dioscoridi, Plinio & Sexto adhiberi. Recens naribus admotum, sanguinem reprimit,

Gesnerus
de Equo.

inprimis si cum creta & aceto accerrimo agitetur. Cum putaminibus ovorum in cinerem redactum missum, ne ex vulnere immodicè fluat, prohibet. *Anhelitum* præservare à peste quorundam commentum est. *Differentie seu Genera* equorum varia sunt: præcipua, à *Locis*, *partibus*, & quibusdam *accidentibus* sumuntur. A *Locis* equi sunt, *Acarmanici*, qui maximi fuisse dicuntur. Unde in proverbium de re maxima cessere. *Athiopici*, quos, feros credo, & pennatos, cornibus ornatos ferunt: malè à calore habentur. *Agigentini*, qui olim ad agones Græciæ mittebantur, & victores recedebant. *Alanici*, qui veloces & robustissimi. Probi tanta celeritate fuisse perhibetur, ut diurnis spaciis centum obiret milliaria, vel in decimum diem haud interpellato labore ut diximus. *Angli*, quorum bona pars non succussat, ut Polydorus Virgilius prodit. *Apamienfes* in Syria, ubi supra triginta millia alebantur equæ, & emissarii trecenti. *Apuli*, quos Varro laudat, & Volaterranus bello aptissimos facit. *Arabes*, celeritatis, equæ inprimis, tantæ, ut per diem noctemque circiter, centena milliaria itineris conficiant, si Vartomanno credendum. *Arcades*, à quibus idèò Arcadia *ἵππων χώρα*. Equis & asinis admissariis ad mulos procreandos clara erat. *Armenii*, qui à Parthis genus ducunt, nisi quòd capite sint graviore, idèò *ῥαυνέπαροι* Absyrto. *Astures*, seu *Asturcones*, quibus forma minori præditi, mollis est alterno crurum explicatu glomeratio, fuere olim in precio: sed bellis apti non sunt. *Attici*, qui Sophocli præstantissimi. *Barbari*, qui ex regno Tunetano, & Numidia habentur, sunt perniciosissimi. *Bengalenses*, qui tam duras ungulas habent, ut ferreis soleis non indigeant, utcunque per saxa & montes currant. In Bisnagar quadringentis aut quingentis nummis aureis venduntur, octingentis quandoque, quòd aliunde advehantur. *Britones*, qui cruribus & auribus sunt mutili. *Burgundiones*, qui injuriæ tolerantes. *Calabri*, qui itineri peragendo aptissimi. *Cappadoces* omnium ferè optimi Solebant incolæ Persis mille quingentos annuatim persolvere. *Carajani*, qui à mercatoribus in Indiam ducuntur, & quibus incolæ auferre de offe caudæ nodos duos vel tres solent, ne sessorem feriant. *Celtiberi* *ὑπόχαροι* subalbidi, in exteriorem Hispaniam traducti, colorem mutant. *Cilices*, quorum trecenti sexaginta albi Dario pendebantur. *Corfici*, qui breves admodum, sed generosi Procopius tradit, paulò supra oves magnitudine esse. Alii, nisi clausis obequitari oculis, addunt. *Cretenses*, elatioris animi, & qui accessum ægrè ferunt. *Cyrenaici*, ilibus substrictis & parvis, pedibus bonis, longiore inter equitandum animæ ductu, magnitudine pollent. *Daci* perniciosissimi, quibus juba ab armis ad terram usque, cauda prolixa, caput parvum.

Polydor.
H. Angl.
lib. 1.
Strabo
Geogr.
l. 16.

Martial:
Epigr.

Dani speciosi, & viribus clari. *Oelandi* ex Gothici maris insula, totius orbis minimi, sed perdociles. *Élei*, qui à pernicitate laudabantur. Incolæ equas finibus suis eductas iniri faciebant, quod esset experimento cognitum, miræ felicitatis prolem inde provenire. *Epiotici*, qui mordaces & perversi. Apud Elidem palmas merebantur. Nunc *Albanos* vocant. *Frigisci*, quos non minus velocitate quàm continuatione cursus, invictos commendat Vegetius. *Germani*, qui plærumque succussatores. *Transylvani*, qui docilitate ab aliis vincuntur: cursu verò jugi & longo nulli cedunt. *Græcanici*, quos Absyrus scribit, pedibus bonis fultos esse, vasto corpore, capite venusto, ardua antica parte statura, concinnoque corpore, sed clunium compago incommoda, nec respondente; pernices & animosos. *Hetrusci*, arguto capite, & densâ juba. *Hispani*, qui teste Absyrto, magno sunt corporis habitu, concinno & erecto, eleganti capite, compage corporis luculenter dividuâ; sed adstrictis clunibus, itineribus obeundis pares & robusti, corpore nec gracili, nec ad maciem opportuno; cæterum ad cursum habiles, qui in equitatione calcaribus non incitantur. Quin & ab ortu ad integram usque ætatem morati & obsequentes: deinde improbi & mordaces fiunt. Tantam eorum fidem, Rodericus Santius ait, ut cum se percussos in bello sentiunt, fessores suos incolumes extra prælium reponant. *Ianettos* vulgò vocant. *Hollandi* australes inprimis, lacertosi sunt. In Frisia generosi, torosi, & panopliæ ferendæ idonei. *Hunniscis* est secundum Vegetium, grande & aduncum caput, extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta & rigida cervix, jubæ ultra genua pendentes, majores costæ, incurva spina, cauda sylvestris, tibie validissimæ, parvæ bases, plenæ & diffusæ ungulæ, ilia cavata, totumque corpus angulosum, nulla in clunibus arvinâ, nulli in musculis tori, in longitudine magis quàm altitudine statura, propensior venter exhaustus, ossa grandia, macies grata, & quibus pulchritudinem præstet ipsa deformitas. Animus moderatus & prudens, vulnere patiens. Hunnicos aliàs vocant: fortè sunt Ungarici, seu Pannonii, quibus Camerarius dentes cadere negari ait. *Iberi* Oppiano sunt celeres, sed cursus celeritatem paucementi stadia amittunt, corpore venusto, sed ungulâ minus solidâ. Fortè sunt diversi ab Hispanis, & ex Iberia inter Armeniam & Colchidem sita oriundi. Oppianus tamen eosdem facit. De *Indicis* dicit Ælianus, difficulter currentes coerceri, nisi ab iis, qui à prima ætate in equestri scientia instituti sunt. Hi currum in orbem versare planè norunt. *Insubres*, sunt arduâ præ cæteris cervice, & micantibus oculis. *Istirii*, proceri, individuâ spinâ cavaque. *Lybies*, corpore

oblongo, costis & lateribus crassioribus, & ampliore ad rectum impetum pectore. Solis æstus & sitim meridianam faciliè tolerant. *Massæyli* sunt parvi & celerrimi, & solâ virga reguntur, quod & de Mauris dicitur. *Menapii* seu Geldri, Germanicorum equorum soli bellatores, & ideò in precio. Eosdem & *Sicambros* dici volunt. *Moschi* soleis carent, ut Herbersteinus prodidit. *Murcibii*, vix ora tenacia ferro concedunt. *Neapolitani*, sunt animosi, speciosi, & robusti. *Nigritis* ob æstum nimium ferè nulli. Idem facit, ut eorum inguina intumescant, ne mejere possint. Pro fæno utuntur faselorum lacera-mentis, sole exsiccatis: loco avenæ, milio. Pro equo phaleris & reliquo ornatu instrato, dant mancipia novem, ad summum quatuordecem. *Nisæi*, quos maximi Oppianus facit omnium pulcherrimos, gressu molli, & freno faciles, capite parvo, jubâ longa & multa, comis utrinque demissis, subflavis. Medicos fuisse Stephanus & Ammianus Marcellinus testantur, qui & Neseos vocant. Viginti millia quotannis ad Regem Persarum mitti fuisse solita, sub tempus quo festum Mithræ celebrabatur, Strabo author est. *Norvegia* mediocris magnitudinis alit, sed admirandæ fortitudinis & pernicitatis, in saxosis viis, eosdem. *Numidici*, neque hordeum, neque triticum gustant, solo gramine & fæno contenti. *Parthi*, teste Absyrto, magno & amplo sunt corpore, Oppiano βαθυπλόκων id est comam gestantes densis cincinnis nexam. De *Persicis* ita Vegetius. Persis & statura & positio à cæteris equorum generibus non plurimum differt, sed solius ambulatoriæ quadam gratia discernuntur à cæteris. Gradus est minutus & creber, & qui sedentem delectet & erigat, nec arte doceatur, sed naturæ velut jure præstetur. Inter tollutarios enim & eos quos totonarios vulgus appellat, ambulatoria eorum media est, & cum neutri sint similes, habere creduntur ab utrisque commune. In brevi amplius gratiæ, in prolixo itinere sævior patientia, animus superbus & nisi labore subjugatus, assiduè adversus equitem contumax, tumens, prudens: & quod mirum est, in tanto fervore, cautissimè decoris est observator: incurvata in arcum cervix, ut recumbere videatur in pectore. Inter *Pharsalicos* equam fuisse asserit Aristoteles, nomine justam, que pullos pateret omnes admissariis equis similes. Unde fortè ei nomen factum. *Poloni*, ut scribit Cromerus, partim ob pernicitatem & laboris incommodorumque tolerantiam, partim propter molliorem incessum, à remotioribus expetuntur. Apud *Pssyllos* arietibus non majores esse Ælianus nugatur. Qui sint *Saphareni* quorum simul cum Armeniis Vegetius meminit, postquam Persicos laudasset, apud neminem reperitur. Egò à Saphara Arabiæ foelicis opido

Oppian.
l. c.Aristot.
H. A.
l. 7. c. 5.Ælian.
H. A. l.
16. c. 37.
Veget. in
Veteri-
naria.Santius
Histor.
Hispan. p.
1. c. 2.Oppia-
nus Cy-
neger. l. 1.Ælian.
H. A.
l. 13. c. 9.

pido in mediterraneis, cujus apud Plinium mentio, quodque Ptolomæo σαφάρι, dictos puto. *sardi* laudatissimi sunt, caudâ pro-cera atque lata, juba brevi, ungulis asininis; lacertoso corpore, arrectis auribus, si benè Stradanus expressit. *Sarmatici*, genusequo-rum est, teste Absyrto, non inelegans, & in suo genere concinnum, ad cursum ido-neum; simplex, grandi corporis habitu, valido capite, cervice decora. Castran-tur, ne aut fœminarum visu exagitati raptentur, aut subsidiis ferocientes, pro-dant hinnitu deniore vectores. Plinius hosce populos cum longinqua acturi sunt iti-nera, inediâ pridie præparare equos ait; exiguum tantum potum impartientes, at-que ita per centena millia, & quinquaginta continuo cursu euntibus insidere. *Scenita*, tantæ habent pernecitatis, Eva-grio teste, ut propter velocitatem eorum vinci nequeant. *Suecia* & *Gothia* magnos & ad cataphractorum præliâ aptissimos, teste Olao Magno, producit, qui, regio edicto extra regnum educi prohibentur. *Tartarorum* plerique sunt albi. Venetus magnum Chamum numerum XM. ale-re prodidit. Tantæ velocitatis sunt Mie-chovio, ut uno die XX. milliaria Ger-manica magna equeant. Sunt depressâ cervice, & pedibus aquam & pabulum sub nivibus quærunt. Perniciores sub Tar-taris quàm aliis esse, Mosci affirmant. *Theffalis* nota bovilli capitis inuri solebat. *Thraces* Absyrto turpes esse scribit, de-formi specie, rigido corpore, prægran-dibus armis, spinâ curvâ, varos, ideo-que ingressu vacillante, cursuque. Delphi-cum tamen oraculum & Virgilius laudat. *Toringos* quoque Vegetius commendat, & proximos Hunniscis facit. *Tyrrheni maris* insularum præsertim Sardinia & Corsica equos, breves admodum, sed animo ge-neroso, & ingressu irrequeto, Volater-ranus facit. Et tantum de generibus à lo-cis desumptis. A *Partium* constitutione haud paucæ quoque occurrunt differen-tiæ: præcipuæ *Elaphopodes* sunt à corvino pede sunt qui suffraginum articulo ossa-continent, & ideo pessimo gressu nitun-tur, vectoremque contundendo fatigant. *Cynobata*, qui iisdem in locis breviter con-dunt ossa & humilia, ob idque ungulas ad internam calcium partem adferunt, ac pedes tractim agunt, in eisque claudi-cant. *ἑτεροσκελῆς* & *ἑτερόποδας* dicit Absyrto illos qui in alteram partem vergunt seu inclinant. *ὁψύχην* Homero *ἑρεαύχην*, est il-le qui cervicem attollit. *ἑτερόγναθος*, qui dispare maxillas, unam nempe durio-rem, alteram molliorem habet. Ex acci-dentibus color nobis aliquot præbet dif-ferentias, alia prætermittimus. Hujus ra-tione sunt, *maculati*, *trabeati*, *transstra-*

beati, *unicolores*, *albi*, *nigri*, *spadices*, *ba-liarde*, *cerulei*, *parvi*, *heterophthalmi*, *ac-togenes*, & *alphorynchi*. *Maculati* ἀργυροὶ Oppiano inprimis maximis nigris maculis & zonis, seu per crura extensis, seu per dor-sum, seu in collo distincti, nobilissimi ha-bentur, eoque præstantiores fore credun-tur, quo natura in his ordinem quendam servasse videbitur, seu numeri seu parita-tis ac loci, seu rectitudinis: post hos sunt qui maculas rubras aut rubiginosas habent. Ad hos spectant *Scutulati*, qui oblongis tæniis ornantur: *Guttati* σικτοὶ qui rotun-dis fasciantur, ut pantheræ: & *Variegati*, ποικιλοδέρμονες, *pica* nonnullis, aliis Homeri αἰολόπαλαι, qui picæ instar albo & nigro va-riant. *Trabeati*, dextros ambos aut fini-stros pedes albos habent, & pessimi esse censentur. *Transtrabeati*, alternatim pe-des habent candidos, & omnium deterri-mi sunt. Causa utriusque quod illorum pedes in utero materno juncti fuerint, ob id simul contraxisse maculam. *Unicolores* Palladius admissarios legi jubet. *Albi* Clau-diano sunt veloces, Platoni laudatissimi. Cæsius habent oculos; quod cum hi tri-plici ratione distinguantur, nigro, capri-no, & cæcio, corporis totius colorem, oculi quoque color consequatur. *Nigri-cantes* laudibus efferuntur, maximè si in fronte, vel asteriscum, vel lineam albi-cantem, vel denique altero pede, candor-aliquid habeant. *Αἰθόνας* Homeri quidam interpretantur, id est nigros & quasi igne exustos quales αἰθόνας & πυριλαμπέας in apro-rum venatione commendat Oppianus. *Spadices*, sunt sanguinei fulgoris, à co-lore palmei furculi. Alii palmatos vo-cant, Varro badios, Cassius Medicus balios, nonnulli Castanei coloris, & ba-liardas. *Ceruleos* Becanus celeres fa-cit. *παράδες* equos τὸ χεῶμα πυρρὲς, Hesychius & Varinus vocant. *Heterophthalmi* ocu-los habent, aut non æquè magnos, aut alterum altero humiliorem. Lacuna malè monoculos vocat. Parthi eos fortè probabant, quod pavidi & fugæ aptissi-mi essent. *Αἰτορῶντες* à genitiva quadam macula quam in armis & cocco referunt, Absyrto dici putat, Sarmatæ eos ut pro-bos adsciscunt: illos verò, qui aquilinam notam ponè ferunt circa coxas & caudam, (iisdem hi cum superioribus nam αἰεὶ ἀquila est) rejiciunt. *Αἰφορύχοι* denique, tardius senescere dicuntur.

CAPUT II.

De Asino.

Plin. H.
N. l. 8. c.
43.

Descri-
ptio.

Locus.

Cibus.

EQuum excipit Asinus, despectum quidem, sed non minus utile jumentum. Incredibili sanè lucro dominus fuisse memoratur, compertumque tradunt, fuisse asinam quæ omnium prædiorum fertilitatem superarit: siquidem in Celtiberia visum est, singulas asinas quadringentis millibus nummorum fuisse enixas, ut apud Plinium legimus. Non est ergo mirum à Q. Axio Senatore quadringentis nummis asinum emptum: & Heliogabalum eosdem tanquam magnifica dona P. R. distribuuisse. *Nomen* apud Latinos sortitus est, non ab a & sinos, ut esset quasi sine sensu animal, ut Bartholomæus Anglicus nugatur: sed à sedendo, ut Isidorus scribit, quasi assedum dicas: vel potius ab Ebraico Ason, quod ipsum asinum significat. Græcis est ὄνῳ, παρὰ τὴν ὄντισιν, quod nostra opera juvet; nisi melius à livido colore ita dicatur, à quo & asello pisci, nomen inditum arbitrantur. Dicitur Cyrenensibus βριχὸς ab improbitate; Aristophani βέπαλον, quasi bovis instar stupidus; Nicandro βρωμῆς ruditor; & à nimia vocis absurditate μεγάλων; Eustathio & Suidæ κἀνθων, à clitellis, & κἀνθήλιον, Hesychio κελλός, quomodo & Dores eundem appellant. Aliis κωδυλός, λέπαρτον, quod ei ilia albicent; μεμμέναν, μονιός Cyrillo, μυχλός, quod tamen vocabulum Phocenses, nonnisi τῶ ἐπὶ ὀχείαν πεμπυδίο tribuunt, qui & κήλιον vocatur; ὀκρίδας, agrestis nempe, ὀγκιστὴς à ruditu; dicitur. *Descriptionem* si spectes, aures ipsi pro portione totius longissimæ & latæ; labia crassa: caput magnum: in collo & pedibus, nigræ quædam lineæ, quas Hesychius μέλας vel μέλας vocat: In *tergoris* exordio, crucis effigiem gerit, quo etiam loco quàm juxta renes, onera difficilius portat, quod ossa sint minus robusta. *Pilus* corporis duriusculus & lanificio ineptus. *Ilia* alba. *Membrum genitale* præ cæteris quadrupedibus grande. Nicander κορώνιον, quæ propriè est ῥαβδὸν κεφαλῶν, vocavit. *Dentes* priores mense trigésimo tum mas tum fœmina amittit: secundos sexto: quod si non prius peperere quàm decidant postremi, sterilitas certa. *Cutis* ei durissima & solidissima ut vix fustim sentiat. *Cor* portione maximum ut omnibus timidis, aut propter metum maleficis, ut ait Plinius. *Sanguis*, crassissimus, pinguis, & nigerrimus. Quantum ad *locum*, Nomades asinis carere propter regionis frigus scribit: itaque in Septentrione paucos invenias. In Italia, Gallia, Germania, Græcia, haud pauci, ut in Differentiis dicemus, habentur. *Cibus* ipsi vilissimus. Nam & eo rure quod pascuo

caret contineri potest, exiguo & qualicunque pabulo contentus. Quippe vel foliis spinisque, vel perticis salignis alitur: vel objecto fasce sarmentorum. Paleis verò quibus ferè omnes regiones abundant, gliscit: Ideò Tzetzes maximum urbis excidium indicaturus, vereri se, acutè dixit, ne asinus eam depascat. Delectatur & ferula, quæ aliis animalibus venenum est; & ficubus, quas cum devorasset, & verò puer ut vinum asello daretur postulasset, in tantum cachinnum Polemon, vel Chrysippus resolutus est, ut eodem perierit. At in Christiani Moguntini Episcopi, teste Krantzio, asinos, tantæ impensæ factæ, quantæ in potentissimi Principis familiam alendam impendi possent. Adjunt etiam potu aquæ pinguescere, & excibo eo magis proficere, quo plus biberint. *Moximè* libidine pruriunt, id & Ambraciotarum æneus asinus, quem Delphis dedicavere, postquam victoriam de Molossis, pugna nocturnâ, reportassent, ostendit. Segnes tamen esse & infœcundos, ob tantam veretri enormitatem, pro comperto habetur. Ideò Ægyptiis exosos Ælianus prodidit. De generatione ita Plinius: Partus à trigésimo mense ocysissimus, sed à trimatu legitimus, totidem quot equæ & eisdem mensibus & simili modo. Parit duodecimo mense; singulatim magna ex parte procreat prolem: eâ namque naturâ est, ut unum pariat, sed nonnunquam gemellos etiam edit, rarissimè tamen. A partu die septimo mari jungitur, eodemque die juncta, maximè recipit initum, sed postmodum etiam patitur. Solet hæc, nisi priusquam gnomonem amittat pepererit, nunquàm postea initum recipere: sin antea pepererit, parere tota sua ætate potest. Gignit rotavitâ, quæ ei est ad trigésimum annum. Prægnantes opere levant. Venter enim labore nationem reddit deterio-rem. Marem non disjungunt ab opere, quod rem illione laboris fit deterior. Admittuntur antè solstitium, ut eodem tempore alternis annis pariant: duodecimo enim mense conceptum semen reddunt. *Huc usque Plinius.* Dolent eis à foetu mammæ; ideò sexto mense arcent partus cum equæ anno propè toto præbeant. Lac gravidæ habent mense decimo; vel ut Plinius, prægnantes continuò lactescunt. Pullis ubi pingue pabulum, biduo à partu maternum lac gustasse lethale est. Genus mali vocatur *Colostratio*. Hana focer Esau primus equis asinos copulavit: sicque isti se gerunt, ut si asinas, quas equi inivere, supervenerint, semen, propter ejusdem sine dubio frigiditatem, pervertant. Quod facile implent, membri, ut Cardano visum, productio in causa; quâ ad intima uteri equæ penetratur. Observatione dignum, quod tradit Plinius, ad mularum maximè partus, aurium referre in his & palpebrarum pilos dici. *Quamvis* enim unicolor toto

Columella R.
R. l. 7. c.
1.

Krantz-
ius Sax.
l. 6.

Genera-
tio.

Ælian.
H. A. l.
10. c. 28.
Plin. H.
N. l. 16.
c. 20.

Genes. c.
36.

Inimici-
tie.

toto corpore, totidem tamen colores quot ibi fuere, reddere. *Inimicitias* cum *Ægitho*, & *Spino* avibus, ex plantis cum *cicuta*, gerunt. *Spinetis* se scabendi causa atterens, nidos *ægithi* dissipat: quod adeo paver, ut voce omninò rudentis auditâ, ova ejiciat, pulli ipsi metu cadant. Igitur advolans ulcera ejus rostro excavat. *Spinus* ideò eos odit, quòd flores *spinæ* devorent, is in *spinis* degat. *Cicutam* si in *Hetruria* depascantur, profundissimo somno & torpore corripuntur, ut planè mortui videantur. *Scaliger* testatur, multos ex ejus esu oscitantes, deinde in anfractuosos gyros circumactos concidisse. Quæ de corvo, lupo, scorice, & equo dicuntur, manifestam rationem habent.

Scalig.
Ex. 152.Amici-
tie.

Amicitiam verò cum *scorpio*, & *vitis* palmitē colit. De illo ita *Merula*. Si percussus à *Scorpio*, superasino rectus desideat ad caudam, pro ipso dolorem sensiturum asinum: ejusque rei signum esse, quòd pedendo moritur. Vel si is, quem *Scorpio* pupugerit, in aurem dicat asino, *Scorpius* me pupugit; non amplius doliturum dolore in asinum transeunte. Abrafo verò ab asino *vitis* palmitē, vindemiam inde ferociorem provenisse, observatum est: idque cum multa secuti diligentia mortales, lætiores sibi proventum quotannis compararunt. *Stygis* aquam nonnisi ungula asini pati; & *Empedoclem* utribus ex coriis asinorum flatus *Etesiarum* validos compescuisse, nescio an inter sympathiæ exempla recenserī debeat.

Vita.

Vitam ad trigesimum produciunt annum, nisi nimis laboribus exhauriantur. Fœmina vivacior mare est. *Vox* ipsorum ruditus & oncatio, ut *Scaliger* voluit. Sed & *βρομῶμαι*,

Morbi.

& *μυκδῶμαι* de asinis prolata invenies. Soli inter animalia pilosa, non à pediculo tantum, sed etiam à reduvio immunes esse dicuntur. Laborant & catarrho & bulimo; & hoc maximè, si caricas & mala gestaverint. Illum *Malida* vocant, quod vitium in capite oritur, facitque ut per nares pituita multa ruffaque effluat, quæ si ad pulmonem descenderit, mori feruntur. *Ælianus* author est *Maurusios* asinos primum ut se in viam dederunt, incredibiliter incitata celeritate iter conficere, ut evolare non excurrere videantur. Deinde eos citò fessos de via, & pedes & spiritum deficere, ac pedum tarditate ad currendum constrictos insistere, & acerrimas lachrymas profundere. Claudicationis remedium vide apud *Aldrovandum*. Quod ab aqua sibi, ut *Plinius*, prodidit cavent; ita omninò, ut pedes tingere metuant: quod mirum dictu sitiant, & si immutentur aquæ, ut bibant cogendi exonerandive sint: quòd rictu labiisque latè ductis & dentibus deformiter denudatis irridere videantur: quòd mingant ubi alii prius minxerunt, aut super fimum: quod mensibus multò ex proportionē minus pur-

Ælian.
H. A. l.
14. c. 10.

Natura.

gentur: quòd cum bibunt parcè admodum os mergant, propter aurium sine dubio umbram: quòd denique tam exquisiti sint auditus, ut præter solos mures cæteris animalibus eo præstare dicantur, ad *Naturam* eorum pertinet. Singulari *stupiditatis* privilegio damnatos esse, omnes norunt, ita ut hujus vitii homines nomen asinorum meruerint, de quo prolixè *Aldrovandus*. Doceri tamen posse, aliquot exempla comprobant. Scribit quippe *Cardanus* ex *Leone Africano*, asinos ad tibiam saltare, & voce in aurem infusurrata spontè supinos concidere: clausis oculis inflari quasi venenum bibissent, nec minis interim, nec precibus, nec verberibus adduci posse ut surgant: Cæterum blanditiis adulationibusque ac spè potissimum vehendi formosas mulieres proposita, subito alacres exsurgere: ubi verò audierint vehendos esse annis, demissis auribus se claudos simulare. Interrogati etiam an formosæ juvenulæ illis placeant, capite annuere: demum etiam formosissimum in cœtu adstantium, deligere. Similia ferè de circulatoris *Johannis* à *Grua* asina, oculatus testis *Gesnerus* prodit. Asina, inquit, ter primum pro soni diversitate tripudium immutabat: tripudiabat autem anterioribus pedibus erectis summa cum alacritate: mox velut gaudio in maximum converso mœrorem, in terram se prosternebat, ac velut apoplectica immobilis jacebat, & si pedibus calcaretur, ut se moveret, adduci non poterat: dein jussu ut spectatores omnes salutaret, oculos caputque erga omnes humano velut more convertebat, flexisque anterioribus pedibus salutabat: & quod maximè mirum erat, cum adstantium omnium stupore, ad nutum heri, per ligneum circulum trajecto corpore saltabat, ad canis imitationem: postremò more canis sagacis, projectum in terram vel sudarium vel chirothecam colligebat, & domino referebat. Tantus in iisdem foetus sui amor est, ut per ignes etiam ad eos accedant; tantus erga genus suum, ut si viderint mori, animo deficient: observatumque est, asinam impendio cavere, ne vul in conspectu hominum, vel in luce pariat. Ponderis magnitudine imparem se esse, ostendit, aures demittendo. Fuisse carnis asininx in *Cibis* usum *Galenus* testatur: sed & historia *Caroli V.* ab Hispanis aliquando comestam. Novimus etiam in obsidione *Veronæ* Anno M.D.XVI. cum vix lentem & fabam in quotidiano usu haberent, in deliciis fuisse. Infesto quoque Natalitiorum integer apud *Persas* assabatur, inter regias epulas censitus. *Mecœnas* verò, referente *Plinio*, primus pullos asinarum epulari instituit, eo tempore onagris prælatos: post eum interiisse auctoritatem saporis. Pessimi esse saporis; & concoctu difficillimas, stomachumquè lædere, ii qui vescuntur, testari

Ingenium.

Johannes
Leo in
descript.
Africæ.Gesnerus
Hist.
Quadruped. de
Asino.Usus in
Cibis.
Galen. l.
3. de Ali-
ment. fa-
cult.Plin. H.
N. l. 8. c.
43.

Ufus in
Medicina.

Galen. l.
6. de
tuenda
sanit.

Plin. H.
N. l. 23.
c. 5. 28.
c. 12.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 41.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 41.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 16.

Hart-
mann. in
Praxi
chymiat.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 16.

poterunt. Medici *Lac*, *Sanguinem*, *Carnem*, *Iecur*, *Renes*, *Lienem*, *penem*, *testes*, *ungulas*, *lichenem*, *urinam*, & *stercus*, in usum traxe-
re. *Lac* Galeno tenuissimum; si ad jumen-
torum quæ apud nos mulgeri solent lac
comparetur: crassum, si cum camelino &
equino conferas. Nisi ita distinguas, con-
tradicare sibi dicendus est: cum & Plinius
tenuissimum lac camelis esse scribat, mox
equabus, crassissimum asinæ, ut coaguli vice
utantur. Optimum verò erit, si asina sana sit,
bene nutrita, juvenis, nec longè à partu.
Tabidis, à quibusdam Medicis ita exhibe-
tur, ut ipsimet id exugant, ne quid à nativo
tepore remittat. Galenus melle mixtum, ju-
veni cuidam, qui ferè contabuerat, à balneo
statim exhibuit. Idem stomachum exulce-
ratum per se potum reficit: & ad tussim, ex-
tenuationem & sputum sanguinis commen-
datur. Si doleant ubera, lactis ejusdem potu
mulcentur, ut Plinius tradit; si verò addito
melle sumatur, purgationes mulierum ad-
juvat. Capiti tamen infirmo, & vertigine
laboranti non convenit. Privatim contra gyp-
sum, & cerussam, & sulphur, & argentum
vivum prodest. Gargarizatur quoque fau-
cibus exulceratis utilissimè. Sunt inter ex-
empla, qui lac asinum bibendo, podagrâ,
chiragrâve liberati sunt. Alii verò feri asini-
ni potu, eosdem cruciatus evasere. Confer-
re aliquid & candori in mulierum cute exi-
stimatur. Poppæa certè Domitii Neronis
conjug, quingentas secum per omnia trahens
fætatas, balnearum etiam folio totum corpus
illo lacte macerabat, extendi quoque cutem
credens. *Sanguine* fluxum sanguinis ex ce-
rebro sedari; sunt qui dicant. Plinio verò,
est genus febrium quod amphemerinum
vocant, hoc liberari tradunt, si quis è vena
auris asini, tres guttas sanguinis in duabus
heminis aquæ hauserit. Eundem post aures
captum, Hartmannus in mania vehementer
commendat. Linteola munda, nulli usui
ante exposita. in eo macerantur & exsic-
cantur. Ex his portio in haustu aquæ fon-
tanæ maceratur, & aqua ebibitur. Idem de
Carne Ælianus testatur. Tradit enim Ba-
thylin Cretensem rabie periclitantem, ab
hoc gravissimo malo asininæ carnis impe-
rato usu, restituisse. Phthisicis easdem me-
deri Plinius prodidit; hocque genere maxi-
mè in Achaja curari id malum: quod &
apud Avicennam legitur. Sed & contra co-
mitialem morbum bibendam dari, idem au-
thor est. *Iecur* etiam comitialibus usu prodest,
sed jejunis edendum præcipitur. Ali admix-
tâ modicè panace, ori instillandum docent,
Lien ad lienis vitium tam efficaciter datur,
ut triduo sentiat utilitas. Idem contritus,
& ex aqua impositus, mamillis lac provocat,
Si Sexto credimus. Inveteratas vulvas suffi-
tu corrigit, ut Plinio placet. *Renes* triti &
in vino mero dati, vesicæ medentur, & uri-

næ incontinentiam prohibent. Cinere *ge-
nitalis* spissari capillum putant, inquit Pli-
nius, & à canitie vindicari, si rasis illinatur,
plumboque tritis cum oleo. *testis* dexter in
vino potus, vel brachio adalligatus, ad coi-
tum stimulat. Uterque contra fascina valet.
Pellis injecta impavidos infantes facit. An-
nulus ex *Ungula*, in qua nihil sit nigri, ab
epileptico gestatus, prohibet ne concidat.
Cinis per dies multos potus eosdem adju-
vat, & oleo subactus strumas discutit. Ta-
rentinus illis ad multos pisces capiendos
pro esca utitur. *Lichen* combustus, tritus, &
ex oleo vetere impositus, tam validus est in
producendis capillis, ut si mulieri inde ma-
xillam unxeris, barba ei nascatur. Ex aceto
illitus lethargicos excitat. *Urina* cum suo
luto illita, & clavos abolet, & callis mede-
tur, ut Marcellus prodidit. Savanorola in
narium foetore utilem esse scripsit. Diosco-
rides nephriticis mederi in potu. Idè ab
ea minimè sibi temperavere antiqui. De
Stercore ita Plinius. Fimum asinini pulli,
quod primum edidit à partu, poleam vo-
cant. Syri dant in aceto mulso contra lienis
vitium. Idem cæliacis & dysentericis con-
fert: in sapa decoctum, colo magnopere
prodest: datum fabæ magnitudine è vino,
medetur morbo regio intra diem tertium.
Eadem & ex equino pullo similiterque vis
est. Idem ad sanguinem fluentem adhibetur.
Tarentinus in Coriandri succo madefactum,
& cum similagine in massas redactum, ad
trachuros melanurosque capiendos sum-
moperè commendat. De usu in oneribus
ferendis, in mola, & bello ad aratrum &c.
taceo. Hoc addi potest, tibiae ex ossibus
asininis fieri, & argutiores cæteris esse: ex
corio cretato palimpsestos, ex pilis pannos
apud Arabes; parari. *Differentiæ & Gene-
ra* aliquot sortiti sunt. Dantur *Mysii* à My-
siæ regione ita dicti, quibus parrarò recta
sunt ilia. *Varii*, qualem Turcarum Rex Fer-
dinando Regi Neapolitano misisse, Pon-
tanus author est. Miraculoso erat pilo, vir-
gato corpore, diversicoloribus ac paribus
lineis. *Parvi*, quales Illyria, Thracia, &
Epirus proferunt. *Magni*, quales Antron
Thesaliæ urbs producebat. *Veloces*, qua-
les apud Euphratem Xenophon inventos
fuisse ait, qui equos cursu facilè superarent.
In Ægypto verò eam esse asinorum tollu-
tiorum tum patientiam tum velocita-
tem, Scaliger scribit, ut X L. M. passuum
diei unius opera expediant absque ulla
noxa.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 19.

Plin. H.
N. l. 26.
c. 16. &
28. c. 15.

Plin. H.
N. 28. c.
16.

Differen-
tia.

Scalig.
Exercit.
117.

CAPUT III

De Onagro.

O Nager, asini sylvestris nomen est,
Græci *ὄναγρος* dixere, quasi *ὄνος ἄγρος* seu *ἀγρὸς*
De-

Niceph.
H. Eccl.
l. 9.

Describere eum videtur Nicephorus Callistus agens de India, cum dicit. Hæc eadem regio, & asinos feros, magnitudine ingentes fert, pelle mirificè præter morem versicolores, albo scilicet & nigro colore admodum inter se varietatis. Et zonæ quædam à summa dorsi spina ad latera & ventrem demissæ, atque ibi divisæ, & conversionibus quibusdam inter se implicatæ, mirificam & novam efficiunt plicaturam & varietatem.

Oppian.
Cyneg.
l. 3.

Oppianus argenteum colorem illi adscribit, quod Gesnerus de cinereo splendido sumit, eodem *περόντα* pertinere existimat. Quod totus albus non sit exinde patet, quod Oppianus addat, nigram lineam per mediam spinam decurrere, hinc atque hinc niveis pulchrè distinctam corollis. Pelles ipsorum *ἐξ* dicuntur, teste Suida. *Deunt* in solitudinibus, locis inprimis petrosis & præaltis, in Africa, Lycaonia, Narvinga. In Lycia montem qui Cappadociam ab ea dividit transire negant. Garamantes eos maxime venantur, si Luciano credimus. In Psara Ægæi maris insula, species habetur, quæ alio translata non vivit. Apud Scythas non haberi quidam volunt. At Strabo apud Mæotidis paludes incolas venationem eorum institui reliquit. *Aluntur* herbis, virentibus, inprimis, in quas si inciderint, præ gaudio rudiunt, nec ab iis, etiamsi insidiis se peti viderint, avelluntur. Unde fortè Strozæ segnes dicti. Oleribus maxime delectari, miraculum ab Hieronymo in vita Hilarionis ostendit. *Naturam & mores* quod concernit.

Natura
& Mores.

Isidorus & Bartholomæus Anglicus æquinoctio verno, per singulas noctis & diei horas semel rugire, inde æquinoctium cognoscere scribunt: quod potius Cynocephalo competit. Homine conspecto in iisdem stare vestigiis; mox rudentes immotis anterioribus pedibus, posterioribus calcitrare, Scaliger prodidit. Ubitam propè venator accessit, ut manu queat contingere, fugâ se subtrahit. De eorum zelotypia ita Plinius & Solinus. In hoc genere singuli imperitant gregibus fœminarum. Æmulos libidinis suæ metuunt. Inde est quod gravidas suas servant, ut in editis maribus, si qua facultas fuerit, generandi spem morfu detrucent; quod caventes fœminæ, in secessibus partus occulunt, & furto parere gaudent. Sitis impatientes, ex sacris literis colligimus. Nonnulli pro mulorum procreatione, onagros prius mansuefactos eligunt. Mansuescit hoc animal facillimè, nec, cicuratum, ad pristinam solitudinem redit. Carnem Ongrorum amaram Ælianus voluit; Galenus, bono habitu prædicatorum ac juvenum, cervinæ & bubulæ propinquam. Scaliger, dum calet, fætere; refrigeratam neque olere neque benè sapere. Plinius verò scribit Mœcenatem pullos asinorum epulari instituisse, multumque eo tempore fuisse onagris prælatos, post eum ta-

Plinius
H. N.
l. 8. c. 44.

Ujus.

Scalig.
Herc.
c. 206. f. 4.

men, interiisse authoritatem saporis. Medici *fella* super abscessuum vestigia utiliter illinunt, admiscuntque emplastris contra ignes sacros, si Avicennæ credimus. *Adeps* cum oleo costino ad lumborum & renum flatulentiam commendatur. *Caro* dorsi cum oleis articulis dolentibus utiliter applicatur. *Urina*, teste Avicenna, calculum in vesica frangit. *Medulla* inuncta podagras curat, & dolorem extinguit. Fimus cum vitello ovi permixtus fronti illinitur, ut sanguis erumpens sistatur. Idem cum felle bublo inunctus, capillos crispat. Saliger duo nobis *Genera* describere videtur, dum ait. In monte qui Narvingæ regnum dividit à Malabaris, multæ feræ habitant. Alit idem onagros equi facie, colore cinereo, agiles adeo ut capi haud facile queant. Africanis quoque ea est celeritas, ut cursu illi uni cedent feræ, quam Lant, vocant.

Genera:
Scalig.
l. c.

C A P U T IV.

De Mulo, & Zebra Indica.

MULI nomen quatuor animalibus commune est. Mula enim non solum ex equa & asino, sed ex asina & equo, itemque onagro & equa, Columella prodente, generatur. Ex asina & tauro Gratianopoli in Gallia, sub nomine Jumar, habentur. Qui ex equo & asina nascuntur, mares, *Hinnulos & hinnos* secundum Plinium antiqui vocabant: contraque mulas, quos asini & equæ generent. Varro tamen ex equa & mulis tales dici putat, si Nonio credimus. Fortè sunt Martialis pumilii. Hinnus enim (verba sunt Varronis) ex equo & asina procreatus, minor est quam mulus corpore, plerumque rubicundior, auribus ut equi, jubam & caudam similem asini habet. Cæterum Muli nomen, ex Græco tractum existimat Isidorus, ex eo scilicet, quod iugo pistorum fabactus, tardas molendo ducat in gyrum molas. Melius vel à *μολα* labor, vel ab Ebraico Maal, quod prævaricationem significat, deduxeris. Laboriosum quippe est animal; & per quandam ordinis naturæ transgressionem, quod Græcis est *μολωειν*, nascitur. Apud Græcos plurima sortitum est nomina. Dicitur namque *ἡμίονος*, quod ex asino & equa originem ducat. *ἀσράβης*, à robore corporis; *ἀγρονομέχθης* à sterilitate; *ἐπερόγονος ζῶον*, quod ex diverso semine nascatur; *θίρης*, *ζεύγος ἡμιονων* *θίρης*, *ὄλκας*, quod tamen mule duntaxat competit, ut *ὄρεος* mulo; *ἀειδάρους*, quod *ἐν ὄρεσι* laborare magis possit, quam cætera jumenta; *ἑρὺς παρὰ τὸ ὄρεϊν*, *ὀρμήτικον ὄντα*, *ἢ ἐπεὶ ὄρειν τὸ ζῆον*, *αὖν ὄργοι*. *Ὀπρεα* denique *σίνος*, & *σίρος*, de quibus consulantur Lexicographi. Cum equam habeat matrem, asinum patrem, partim matri, partim etiam patri similis est; magis tamen patri quàm matri, cujus quoque

Nomen:

Columella R.
R. lib. 6:
c. 36.

Plinius
H. N.
l. 8. c. 44.

Varro
R. R.
l. 2. c. 8.

Descriptio.

que vocem refert. In Hinno omnia contra se habent. *Auricula* ipsi asini instar longæ, easdemque procomii loco ad oculos defendendos, ut ait Xenophon, accepit; crux in humeris, *pedes* exigui, & *corpus* macilentum, reliqua sunt equi, nisi quod cervix erecta non sit. *Dentes* triginta sex uterque habet, *κὴν τὰς προφύλας*, seu agnatos & annexos, ut Ruellius vertit. Mutari eos ex Aristotele notum est. In quorundam *corde* os inventum esse tradidit Hierocles. *Felle* caret, ut solidipeda omnia. *Locus* si spectes, lædi calidis & obscuris ajunt, & quodammodo amentes reddi: gaudere verò stabulari sub dio, tectique, vel tantum illis sufficere, si caput solummodò operiatur: cætera ab aëre non offendi. Nulli sunt in Arabia Felice, Anglia, Scotia, Polonia, finitimisque regionibus. In Eleo agro ex imprecatione quadam gigni non potuisse, Herodotus prodidit. Carebant illis & Orientales Indi, ut refert Franciscus Lopez. In Scythia nec incipientem quidem hyemem ferre. Insula quædam, Diodoro Siculo, nutrit quidem aliquos, sed eos magno & sonora voce. Abundat eis Themisita, teste Strabone. Cappadoces duo millia Persis quotannis solvebant. Persiam, Mesopotamiam, & Babyloniam iisdem refertam, velexinde patet, quod Alexander M. Susis captis, ad tria millia abduci curaverit, qui & dossuales & jugales essent. *Vescuntur* frugibus & herbâ, potu maximè pinguescunt: ad maciem depellendam nihil Medicâ nobilius: ex frequentiore Hordei usu hinniunt. Vigent à dentium ortu, & ad multos annos vitam producant. Quendam octogesimum annum egissè cum templum Athenis ædificaretur, quidam authores produnt. An steriles sint, disputatur inter authores. Aristoteles ita de Mulo. Mulus mas septennis duntaxat generat, ut ajunt: foemina improlis omninò est, quia perducere ad finem, quod conceperit, nequeat: sed mas generare interdum potest, quoniam & calidioris naturæ quam foemina mas est, & nihil corporis per coitum confert ad generationem: quod autem facit, *ginnus* est, quod mulus oblæsus & pumilus est, ut in porcis *metachærum*. Idem de Mula apud Juvenalem invenies. Prodiderunt tamen non dissimulandi Authores M. Varro, & ante eum Dionysius & Mago, mularum fætus regionibus Africæ adeò non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis partus earum, quam sint nobis equarum. Causam sterilitatis in libris de Natura explicabimus. *Odorandi* sensu præcellere, atque ejus beneficio derelictos alicubi vel odore solo in semitam redire, proditum à quibusdam. Hinc fit ut facilius vim tabidam aëris concipiant, & peste inficiantur, quod & canibus accidit. De *Morbis* vide Aldrovandum. *Symphatia* ipsis cum

nantibus avibus, sive hæ anseres sive anates, singularis, eorundemque conspectu sanari dicuntur. Contra Rhododaphnes flores & folia homini saluberrima, venena ipsis sunt. Iphis verò mulis nescio quid inest muribus exitiale. Si enim muli ungula sinistra domus suffiatur, fugantur. Semper cicures sunt. Foeminas vivaciores esse compertum quàm mares, easdemque ferius senescere. Eadem urinæ profluvio purgantur: mares olfactu urinæ prius senescunt. Volutationi indulgent, ut à lassitudine recreentur. A patre patientiam laboris, à matre celeritatem accipere. Ab illo & audaciam mutuârunt. Scio, inquit Varro, mulorum gregem dum pasceretur, eoque venisset lupo, ultro mulos circum fluxisse, & ungulis cædendo occidisse. Expavescunt tamen rerum insolitarum visu, & quidem ita ut in discrimen adferant. Calcitrant contumacissimè. Visus qui uno domino excepto, cæteros non admitteret. Pertinaciæ sunt infamis. Vidi, cum Romam Neapoli tenderem, quæ nulla ratione ut præiret cogi poterat. Ab aliis destituta, procubuit, nec quidem sine nostrum omnium risu, & infidentis sacerdotis indignatione. De astutia exemplum apud Plutarchum in mulo Thaletis habes: de beneficii memoria apud Plinium. Mulum, inquit, octuaginta annis vixisse, Atheniensium monumentis apparet: Eo gavisum cum templum in arce facerent, quod derelictus senecta, cadentia jumenta comitatu nisuque exhortaretur, decretum fecere, quo caveretur, ne frumentarii negotiatores ab incerniculis eum arcerent. Non calcitrare cum vinum biberint, quidam scripserunt. De veritate rei alibi agemus. Magnæ sunt contra venena efficaciam. Infusus recenter occisi ventri, qui veneno infectus est, evadit, si tam diu manserit, donec calor animantis omninò evanuerit. Eò tutius evasurum, si pluribus usus fuerit, fuisseque Principes qui triginta & quadraginta impendio, mortem censerint, Maranta author est. Pulverem in quo semula volutaverit, corpori inspersam ardores amoris mitigare à quibusdam apud Plinium proditum. Cor, testes, renes, caro, fordes aurium, sterilitatem inferre dicuntur. Cogunt concipere invitas, inquit Plinius, setæ ex cauda mulæ, si junctis evellantur inter se colligatæ in coitu. Stercus combustum, tustum, ac cibratum, vino dilutum, in fluxu uterino Hippocrates bibere jubet. Genera quod attinet, duplex genus Aristoteli fuit notum. *Sterile* nempe, de quo jam egimus, & *facundum*, de quo ipse ita. Sunt in Syria quos mulos appellant, genus diversum ab eo quod coitu equæ & asini procreatur, sed simile facie: quomodo asini sylvestres, similitudine quadam nomen urbanorum acceperunt. Et quidem, ut asini ipsi feri, sic muli præstant celeritate.

Pro

Locus.

Strabo
Geogr.
l. 11. &
12

Cibus.

Genera-
tio.Aristot.
l. 2. de
Generat.
c. ult.Varro
l. c.

Odoratus.

Sympa-
thia &
Antipa-
thia.Varro
R. R.
l. 2. c. 8.Plutarch.
l. Utr.
animal.
Plinius
H. N.
l. 8. c. 44.
Aristot.
H. A.
l. 6. c. 24.

Usus.

Plinius
H. N.
l. 8. c. 45.Genera.
Aristot.
H. A.
l. 6. c. 35.

Aldro-
vand.
Hist.
Quadrup.
l. 1. c. 8.
Purchaf-
Navig. 1.
7. c. 13.
f. 7.

Pigafeta
in def-
cript.
reg. Con-
go.

Procreant ejusmodi mulæ suo in genere, cujus rei argumento illæ sunt, quæ tempore Pharnacis patris Pharnabazis in terram Phrygiam venerunt, quæ adhuc extant: tres tamen ex novem, quot numero olim fuisse ajunt, servantur hoc tempore. Theophrastus vulgò parere in Capadocia tradit, sed esse id animal ibi sui generis. Mulo per omnia similis est *Zebra*, nisi quod fecunda sit. Fimbriatis autem lineatisque pilis miro aspectu videri. Etenim à dorsis penna ad ventrem usque, pictas habet lineas triplici colore, nigras nempe, candidas, ac fulvas, justâ proportionem dispositis fimbriis, ac tres ferè digitos latis. Sylvestris est gregalis; & pernici cursu incluta: possetque, cicurata, in equi locum succedere. Mulam fecundam Aristotelis quidam esse opinantur. Ita de ea Pigafeta. Nascitur quoque in hoc tractu, (Congo) ut & in aliis Barbariæ & Africæ locis, animal aliud *Zebra* dictum: quod cum mulæ quoad formam & staturam sit simile; mula tamen, (parit enim) non est, & colore non tantum à mula, sed etiâ ab omnibus aliis animalibus differt. Tribus enim diversis coloribus, nigro, albo & spadicio, qui per lineas tres digitos latis, corpus à dorso versus ventrem hemicycli in modum abiunt, per totum corpus distinctum est, caudâ colore rubicundo & lucente. Pes & ungulæ ut mulæ, incessu alioqui levi & alacri similes equo, quem rursus velocitate multum superat, ita ut Lusitanorum proverbio ansam præbuerit, qui, cum celerem aliquem dicere volunt, *Zebra* velociorem dicunt. Parit quotannis, unde & maxima habetur copia; sed incolis, qui eâ uti nesciunt, est inutilis: equorum eum loco ipsi tam pace quam bello esse possent, naturæ eas equorum loco; quibus hoc regnum destituitur, subministrante. Incolæ verò ignari, cum equos non habent, & boves jugo subdere nesciant, zebras insuper domare & frænare non valeant, variisque aliis animalibus uti non possint, hominum ad hæc omnia operâ uti coguntur. Atque ita ut omnia hominum superimponuntur humeris, ita quoque ipsi ab hominibus vel in lecticis, aut sedibus portatilibus à Sole coopertis circumferuntur; ad manus semper servos aut alios ad id conductos habentes. Et si magnum aliquod iter brevi tempore est absolvendum multos tales quasi ἀνδροπορόους circumducunt, ut prioribus defessis, alii atque deinceps alii possint substitui; qui etiam ita alternatim subinde mutati, tantæ sunt celeritatis ut equos cursores antevertant. Tantum Pigafeta.

CAPUT V.

De Elephanto.

Aldro-
vandi
Hist.
Quadrup.
l. 4. c. 9.

Datur & Elephanti inter *μυζήνια* locus. Etsi enim ungula ejus in digitos

videatur efformari, quia tamen indivisihi, nescio quomodo à solidipedibus excludi possit. *Nomen* fortitus est, non tam à magnitudine, quòd formam montis præferat, ut Isidoro apud Vicentium Bellunensem placet: quam vel ab Ebræo Alaph discere, quòd docilitate reliqua animalia superet: vel ab Eleph bos, quia magnum est animal; & βέ augendi vocabulum: vel quasi ἐλέως, ab ἔλας palus, & βένω, quòd ob gravitatem ibi faciat τὰς μύζεις: vel ab ἐλεφαίρω lædo: vel ab ἐλάω involvo, quod involutam habeat proboscidem: vel denique ab ἄλφος, albus, quod ebur de colore triumphet. Hesychio & Varrino *πυλίσκος* dicitur. Alii simpliciter *θηρία*, quod Plinio belluæ, vocant. Romani, qui elephantes primùm Pyrrhi Regis bello videre, Lucas boves, appellarunt; seu à Lucania, ubi primò visi; seu à luce, quòd longè propter inauratos regios clypeos; quibus eorum turres erant ornatae, à longe relucere. Indis *Barrum*, à voce dici, Isidorus author est: alii tamen linguâ Sabinâ ita appellari volunt: unde & Ebur vocatum Servius putat. Magnitudo Elephantis diversa est, ut in Differentiis exponemus. Gillius mensus est Constantinopoli quendam, cui erant ab oculo ad extremum tergum pedes undecim, ab oculo ad extremam promuscidem octo. In proceritate alii ad duodecim, alii ad decimum tertium, alii ad decimum quintum dodrantem, accedunt. Aloysius Cadamustus vidisse scribit, plus habentem carnis, quàm tauri nostrates quinque. Nigri sunt omnes præter Æthiopicos: Narsingæ tamen Regem album habuisse, Indicarum navigationum scriptores prodidere. *Cutum* habent cancellatam, seu ut Cassiodorus loquitur, ulcerosis vallibus exarâtam: in tantamque duritiem solidatur, ut putes esse ossileam. Ideo Mauri eadem pro clypeo utuntur, & Peguani loco armorum gestant. Durior tamen in dorso quàm in ventre, ut Solinus verè dicat. Durissimum dorso tergus, ventres molles. Pilosane sit an glabra, nec Plinio quidem constat. Alibi enim, setarum nullum tegumentum, ne in cauda quidem præsidium abigendo tædio muscarum; esse dicit: albi verò elephantorum corpora impenetrabiles setas habere (nisi fortè cetras sit legendum) scribit. Cardanus quoque non solum nudam ait, sed & cur talis esse debuit rationem reddit. At Cadamustus sese pilos qui nigricabant, & quasi duorum palmorum mensuram excedebant, evulxisse testatur. Gillius quoque author est, ad duorum palmorum magnitudinem accessisse. Vartomannus denique, caudam habere similem bubulis, trium fortè dodrantum longitudine, paucis in extremitate pilis prodit & invenitur in descriptione Guineæ istiusmodi caudis muscas ab idolis mulieres arcere.

Nomen.

Martin.
in Lexico

Descriptio.
p. 10.

Plin. H.
N. l. 8. c.
9.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 39.

C

ipse

Ipsè denique Plinius, quasi sui oblitus, sic scribit. Indi mirè gaudent longitudine eorum, (smaragdorum) solosque gemmarum esse prædicant, qui carere auro malint; ob id, perforatos elephantorum setis religant. *Caput* quoque deforme habent: secundum tempora spiramentum quoddam, per quod mas pingue quoddam tempore congressus emittit, idque & foeminæ tum patens, si Straboni credimus. *Aures* pro corporis ratione, secundum Oppianum, exiguæ sunt; quæquæ versum gemini palmi magnitudine, subque illis locus, cui Scalpro ictu mallei adactò interficiuntur. Livius Hasdrubalis inventum esse credidit. Apud Sambros *Æthiopiæ* populos, auribus carere ex Solino & Plinio habemus. *Oculi* quoque magni, sed pro tanti corporis magnitudine exigui apparent; illique graviter se moventes. *Os* in pectore, ut Cadamustus prodidit, atque hoc, non proboscide fugunt, teste *Æliano* & *Aristotele*; qui & *linguam* eis esse scribit perquam exiguam, atque interius positam, quàm sit in cæteris, ita ut vix eam videre possis. *Dentes* ipsis intus ad mandendum quatuor: præterque eos qui prominent, masculis reflexi, foeminis recti atque proni. Quamprimum nascuntur, habent: sed grandes illos; non tam perspicuos. His cibos conficiunt, atque in farinæ speciem molunt. Siti sunt in superiore mandibula, & quidem stupenda aliquando magnitudine. Vidit Vartomanus in Sumatra duos, qui appensi, libras trecentas & triginta sex pendebant. Vidit & Cadamustus occisum, cujus dentium amplitudo palmos ternos excedebat, eminebant ad duos palmos. De eorundem magnitudine ita Plinius. Magnitudo dentium videtur quidem in templis præcipua. Sed tamen in extremis *Africæ*, qua confinis *Æthiopiæ* est, postium vicem in domiciliis præbere, sepesque in iis & pecorum stabulis pro palis, elephantorum dentibus fieri Polybius tradit, autore Gulussa regulo. Gillius sæpe ad longitudinem decem pedum augescere, memorat. Venetus verò mercator, unum aureis triginta sex emisse dicitur, longitudine dodrantum ipsius quatuordecem, crassitudine dodrantum quatuor; tanto pondere, ut humo tollere non potuerit. Sed & *Sabellicum* authorem habemus, fuisse Firmo, duos elephantinos dentes, tam enormi magnitudine, ut *Aurelianus Firmi* victor, eos pro miraculo Romam deportandos curaret, longitudinem horum duorum pedum fuisse dicunt. Dentes hos alii cornua dicunt; an rectè, *Aldrovandus* & *Cardanus* explicant, nos alibi dicemus; hoc duntaxat hic addere placet, mandibulam inferiorem, edendo solum moveri, superiorem semper quiescere. Quo loco aliis animantibus nasus est, elephantibus habeant partem quandam pen-

dentem, angustam ac longam, adeò ut ad terram pertingat, in fine perforatam, cortilem, flexilem, lubricam, volubilem, serpentis in morem. Latinis dicitur *Proboscis*, *tuba*, *manus*, quod apud Plinium & *Ciceronem* invenies, manus nasuta, quod apud *Cassiodorum*, promuscis, quod apud *Varium*. Græci vocant *προβόσκιδα*, *μικτήρα*, *μυκασμόν*, & *προνομαίαν*. Is ipsius usus quæ manus. Eâ namque cibos tam siccis quàm humidos colligunt, capiunt & ad os admovent. Eadem spirant, bibunt, odorantur. *Lucretius* ideò *Anguimanos* vocavit. *Malleolos* posterioribus imis cruribus, teste *Aristotele*, possident: sed de *Crurum* flexu aliter alii tradunt. Alii enim crura sine nodis articulisque habere, ossa solida & inarticulata, ideò crura tibiaeque flectere non posse, & si cadant, nec surgere, scribunt: alii, ut *Plinius*, in posterioribus articulos breves obtinuisse, & poplites intus hominis modo flectere, prodidere, quod & experientia docuit. *Pedes* ejusdem cum equinis sunt rotunditatis, sed ampliores, ut planta, quoquo versum ad binos dodrantes accedat. *Vartomannus* rotunditatem orbi mensario assimilât. Ex callo nigerrimo & amplissimo constant. *Digit*i in pedibus informes, numero quidem quinque, sed indivisi, ac leviter discreti, ungulisque non unguibus similes. *Mammæ* habent sub armis duas; nec in pectore, sed citra in alis occultas. *Genitale* equo simile, sed parvum, nec pro corporis magnitudine. *Plinius* averfa dicit, averfosque coire, foeminæ inter femora. *Testes* non foris conspicui, sed intus circa renes conditi, quo circa initum celerius agunt. *Crescias* nugatur, semen adeò indurari siccescens, ut electro simile efficiatur. *Ventres* ipsis quatuor *Plinius* tradit: *Aristoteles* verò ita sinuosum intestinum, ut quatuor ventres habere videatur; inque hoc etiam cibum reperiri. *Galenus* idem latissimum & equo simillimum facit; exta suillis proxima. *Iecur* quadruplo majus est bubulo, & reliqua pari ratione excepto liene: hic enim ex proportionem minor. *Pulmonem* *Plinius* bubulo quadruplo majorem facit. *Fel* in jecore adesse negat *Aristoteles*: incisâ tamen parte, qua adhærere solet, humorem felleum plus minus effluere. *Galenus* etiam *χολήδοχον* vesiculam habere affirmat. Idem ex dissecti *corda* magnum os exemit; illud vero duos tantum ventriculos, non tres ut apud *Aristotelem*, habere observavit. De eodem ita *Ælianus*. Duplici tum corde tum sensu animi elephantus esse dicitur, & altero quidem irascendi, altero mitigari & leniri, Maurorum sermonibus pervagatum. Duorum descriptionem apud *Aldrovandum* vide. Inveniuntur, in *Africa*, *Asia*, & vicinis hisce insulis. Et in *Africa* quidem in saltu post *Syrtes*, solitudinibus *Salæ Mauritanicæ* oppido vicinis,

Plin. H.
N. l. 35.
c. 5.

Strabo
Geogr.
l. 15.
Oppian.
Cyneget.
l. 2. v.
519.
Solin.
Polyhist.
c. 43.
Plin. H.
N. l. 6. c.
30.

Aristot.
H. A. l.
2. c. 6.
Aristot.
H. A. l.
2. c. 5.

Plin. H.
N. l. 8. c.
10.

Cicero l.
2. de Nat.
Deor.
Cassiodor. l. 10.
Variorum.

Aristot.
H. A. l. 2.
c. 1.

Plin. H.
N. l. 8. à
c. 1. ad
12.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 46.
Aristot. l.
c.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.
Aristot.
H. A. l.
2. c. 17.

Ælian.
H. A. l.
4. c. 31.

Locus.

Aristot.
H. A. l.
1. c. 11.

vicinis, Lybia, Getulia, proximis Atlanti monti saltibus, &c. Symbari inter Arabiæ montes & Nilum, ipsorum venatibus vivunt. Sunt & in Æthiopia Ophiophagorum eorundem venatus à Ptolemæo Philadelpho Ægyptiorum Rege instituti. Quantum ad Asiam, Rex Parthalis, prodente Plinio, DCC. aluit, Audatæ mille, Palibrotorum IX. M. Chrysæi, Parafangæ, Afangæ, CCC. armabant. In Taprobana, Onesicrito Alexandri M. præfecto prodente, majores & bellicosiores quàm in India habebantur. In Zeilana hodie maximos & summi ingenii esse, Johannes Metellus prodidit. Siamensis Rex XII. M. habere dicitur, è quibus quatuor millia semper ad subitos casus armata sunt. Sub imperio magni Mogul L. M. habentur. In Mosambique quoque insula, armenta eorum offendit Vartomanus, & in Benomotapa Johannes de Baros. At insulam quoque Zanzibar multos mercatores eboris emendi causa venisse M. Paulus Venetus prodidit. Roscidis autem & palustribus locis maximè delectantur, amnesque amant, in calidioribus imprimis regionibus. Frigoris sunt impatientissimi. *Victum* Elephantorum quod spectat, vescuntur herbis palustribus, arborum foliis, truncis, fructibus Musæ, & ficus Indicæ radicibus. Devorant aliquando & terram & lapides. Eam tamen edisse, iis tabificum est, inquit Plinius, nisi prius mandant. Cicures hordeo vescuntur, ejusdemque novem interdum Macedonicos modios absumunt. Antuerpiæ ostentatus, quatuor modios pomorum in diem absumsit. Lusitani melonibus vehementer delectari scribunt. Potus ipsis aqua, sed non nisi turbida, vinum ex oryza & aliis frumentis factitium, nec non nostras. Antuerpiensis illè, unâ vice plures quàm sedecem libras bibeat, idque toties eterabat, ut mensuram potus ab Aristotele proditam, facilè æquaturus videretur. Sitis tamen sunt patientissimi, & sine potione octo dies peragunt. De *Coitus* tempore & modo diversa ab authoribus produntur. Plinius marem coire quinquennem, decennem foeminam, ex Aristotele prodit. Aristoteles modo vigesimum annum utrique assignat, modo foeminæ duodecimum, cum celerrimè, decimum quintum, cum lentissimè congregiuntur. Aversè coire apud Solinum ex Plinio invenies, cui & Horatius de Canida succinit: foeminam in coitu sedere, marem supervenire Albertus M. seu ut Aristoteles, clunibus submissis insistere pedibus ac inniti, marem supervenientem comprimere. In aqua autem precipuè iniri desiderant: indeque tam foeminæ quàm mari commoditas accedere creditur, quoniam is & coiturus per aquam facilius tollitur, & post congressum facilius descendit. Nunquam autem nisi in abdito coeunt, & mas

coitum triennio interposito repetit, eandem præterea nunquam patitur. Biennio coire quinis, nec amplius in anno diebus Solinus ex Plinio scribit: nec prius ad gregarium numerum reverti, quàm vivis aquis abluantur. Tempore verò coitus, maximè efferantur, & stabula Indorum sternunt. Quandiu uterum gerunt, in dubio quoque. Alii annum & sex menses, alii triennium, quidam decennium statuunt. Aristoteles biennium assignat; Strabo menses ut minimum sexdecem, ut plurimum octodecem, cui Diodorus Siculus & Ælianus accedunt. Sunt qui octavo à coitu anno parere pronunciant. Pariunt enitentes posterioribus cruribus & subsidentes cum dolore. Partus annotante Æliano, in caput procedit in lucem. Unicum edere, apud Aristotelem & Diodorum Siculum legimus: quaternos uno partu, apud Cadamustum & Scaligerum. Magnitudo fætus instar porci integræ ætatis secundum Ælianium, vituli trimestris secundum Plinium. Statim ac natus est, cernit & ambulat, & ore fugit, non promuscide. Lactant usque ad annum octavum. *Inimicitias* gerunt cum *Rhinocerote*, *Leonibus*, *Trigidibus*, *arietibus*, *porcis*, *serpentibus* & *Draconibus*, quibusdam coloribus & igne. De *Rhinocerote* ita Plinius. In ludis Pompeii Magni visus est Rhinoceros. Alter hic genitus hostis elephantò, cornu ad saxa limato, præparat se pugnae, in dimicatione alvum maximè petens, quam scit esse molliorem. Longitudo ei par, crura longè breviora. Apud Hesperios Æthiopas leones elephantorum pullos aggrediuntur, quos cum vulneraverint, matribus supervenientibus fugiunt. Trigidem in caput Elephantì insilire, facileque eundem suffocare, Arrianus author est. Si feritate effertur, ad arietis conspectum statim mansuescit. Grunnitum porci exhorre apud Ælianium, Stabonem, & Senecam invenies. De Draconum & Elephantorum pugna ita Plinius. India fert elephantès, bellantesque cum eis perpetua discordia dracones tantæ magnitudinis, ut & ipsos circumflexu facili ambient, nexuque nodi præstringant. Commoritur ea dimicatio: victusque corruens complexum elidit pondere. Mira animalium pro se cuique præcipua solertia est, ut iis (draconibus) una scandendi in tantum altitudinem difficultas. Draco itaque ad pabula speculatus, excelsa se arbore injicit. Scit ille imparem sibi luctatum contra nexus: itaque arborum aut rupium attritum quærit. Cavent hoc Dracones, ob idque gressus alligant cauda. Resolvunt illi nodos manu. At hi in ipsa nare caput condunt, pariterque spiritus præcludunt, & mollissimos lancinant partes. Iidem obvii deprehensi erigunt se in adversos,

Aristot.
H. A. l. 6.
c. 27.
Strabo l.
c.

Ælian.
H. A. l.
4. c. 31.

Scalig.
Exercit.
204.

Antipatria.

Plin. H.
N. l. 8.
c. 20.
Ælian
H. A. l.
16. c. 44

Ælian.
H. A. l.
16. c. 36.

Plin. H.
N. l. 8. c
11. & 12.

oculosque maximè petunt. Ita fit, ut plerumque cæci ac fame ac mœroris tæbe confecti reperiuntur. Inter colores puniceum inprimis & candidum refugiunt, cujus causa alibi explicabitur. Terreri igne, Elephantorum Hannibalis exemplo docuit Livius, qui per ignem in Capuana obsidione exacti sunt. In tantum autem consternantur, ut nulla ratione, ut gradum revocent, adduci possint. De *Ætate* haud eadem traduntur. Alii enim ducentos, alii trecentos, quidam centum & viginti annos vivere ajunt. Onesicritus apud Strabonem ad trecentimum annum vivere, raros ad quingentesimum prodiit: circiter ducentimum robustissimos esse. Philostratus quendam ex illis qui contra Alexandrum M. pugnaverant, quinquaginta supra trecentos post Alexandrum annus superfuisset tradit, ut de Elephantio Jubæ, Ptolomæi Philadelphi, & Seleuci Nicanoris taceam. A sexagesimo juventam incipere, apud Plinium ex Aristotele habemus: ex quantitate dentium ætatem futuram cognosci, apud Cadamustum. Frigoris impatientes sunt: maximum hoc malum, inflationemque & profluvium alvi, nec alia morborum genera sentiunt. Huic potionem aquæ calidæ, & cibo fæni melle imbuti succurritur. Ælianus tamen oculorum affectionum quarundam mentionem facit. Vulnera captorum primò aquâ tepidâ eluuntur: mox, si luculenter sunt alta, butyro inunguntur, postea, suillæ carnis recentis & sanguine madentis ad motu, inflammatio lenitur. Quotannis etiam in furorem agi reperio, tuncque nulli obvio parcere. Indicium instantis, oleosa materia, quæ ex illorum auribus effluit. Medela ab objurgatione. Rationibus rectores demonstrant, vilis & degeneris esse animi, ob amorem ita in furias agi. Catarrho laborare, eumque in lapidem aliquando abivisse, cujus & iconem exhibemus, proditum. Gradatim ambulant, propter corporis gravitatem. Neminem tamen ajunt tantæ esse pernicitatis, quem suo incessu non comprehendat. Poplites intus flectit, hominis modo, ut Plinius loquitur. Et quia articulos crurum non tam sublimes habet, ut aliæ animantes, sed humiliores terram versus, idè insidendi insuetis, nauseam commovet. Quod tamen de provectioribus intelligi debet. Siquidem, Vartomanno & Gyllio attestantibus, ex adolescentium molli gradu, sessor tantopere delectatur, ac si mula gradaria veheretur. *Naturam & ingenium* singulare multa testantur, ut non mirum dixisse Plinium, omnium quadrupedum subtilitatem animi præcipuam perhiberi illis. Ab aquis sibi metuerè superius diximus. Idè difficulter ab Hannibale, Polybio & Livio testibus, perducti sunt: & apud Plinium, Puteolis aversis vestigiis, earundem metu, è navi abivisse,

legimus. Attamen L. Cælius Metellus junctis doliis per mare Siculum eos transmisit, cum naves deessent: & aliquando interdum flumina transmittunt. Fœmina mare multò est robustior, easque in hoc genere planè viriles, Vartomannus testatur. Aristoteles tamen timidiore affeverat. Fagos, oleastros, & palmas dentibus subvertere Oppianus author est: ædificia evertere Aristoteles. Ab uno arboris truncum prostratum tantæ vastitatis, ut vix à viginti quatuor movere potuerit, Vartomannus prodidit, & addit, à tribus maximam Liburnicam in siccum pertractam. *Pugnant* inter se vehementer, ut tradit Aristoteles, & alter alterum dente ferit. Victus vocem fugit victoris, terram ac verbenas porrigens. Herbam victori à victo porrigi, vel proverbio constat, quod tamen vix cum Vossio concessero. *Injuriam* ulcisci apud Acostram habes. Nucis putamine à milite in fronte quidam petitus, servatum, in eundem in platea deambulanti, aliquot post diebus conjecit. Singulari & *rectores amore* prosequuntur, injuriarum quoque ipsis illatarum memores, ut optimè Seneca scripserit, Elephantorum feritatem usque in servile obsequium demereri cibum. Sanè à quibusdam aurigas suos, qui in certamine ceciderant, ex prælio, exemptos, alios ab aliis servatos, Strabo author est. Cassiodorus verò scribit, cum magistri compendia sua putet alimenta, motu corporis à diversis postulare, quod ei porrigat. Quod si, inquit, aliquis præbere contemserit postulata, vesicæ collectaculo patefacto, tantam dicitur alluvionem egerere, ut in ejus penatibus quidam fluvius videatur intrasse, contentum vindicans de fatore. Quidam Cochini, militem magistro suo de viâ cedere renuentem, aliquoties flumine merfit, si Christophoro Acostræ credimus. Plurarchus denique refert, Poro Indorum Rege vulneribus confecto, elephantum sensim ac leniter multa spicula promiscue retraxisse, & ipsum jam malè affectum, non prius tamen procubuisse, quàm sentiret Regem ex sanguinem delabitum demum, ne corrueret, paulatim se demissime, ut Rex commodius se ad solum inclinare posset. *Timere* naturaliter hominem, Plinius scripsit. Elephas, inquit, vestigio hominis animadverso priusquam homine, intremissere insidiarum metu, sustinere ac olfactu circumspicere, iras proflare; nec calcare, sed erutum proximo tradere, illum sequenti, unico simili usque ad extremum, & tunc agmen circumagi & reverti, aciemque dirigi. Adè omnium odori durare virum illud majore ex parte, ne nudorum quidem pedum. *Amicos* homine Cicero innuit, dum dicit, opinionem ejusmodi esse, quandam illi belluæ cum genere humano societatem. Innuit & Philostratus, dum scribit,

Oppian.
Ixeut. l.
2. v. 513.

Vartomann. l. 4.
c. 10.

Strabo
Georg. l.
15.
Cassiodorus. l. 10.
Varior.

Plutarch.
de solert.
animal.

Plin. H.
N. l. 8.
c. 10.

Cicero l.
3. de Nat.
Deor.
Philostrat. de
vita Apollonii
l. 2.
ubi

Ætas.

Philostr. l.
2. c. 6.

Morbi.

Natura
& Ingenium.

Polyb.
Hist. l. 5.
Livius
Hist.
l. 21.

ubi semel ad hominem adsuescit, ab eo omnia pati, ex eoque morum similitudinem in se transferre, neque aliter quam parvos canes, ex hominis manu gaudere cibum sumere, atque ad se accedentem promuscide complecti; eumque caput intra fauces immittere facile tam diu pati, quoad homini libitum fuerit. Quæ de cuiusdam elephantis erga infantem amore produntur, apud Athenæum & Ælianum vide. Traditur quoque unus amasse quandam in Ægypto corollas vendentem; ac ne quis vulgariter electam putet, mirè tum gratam Aristophani celeberrimo in arte Grammatica. *Docilitatis*, esse singularis multa sunt argumento. Plinius enim per auras arma jacere non auferentibus ventis, inter se gladiatorios congressus edere, aut lasciviente pyrrhiche colludere, scribit. Ubi, ut idem ait, mirum maximè, adversis quidem funibus subire; sed regredi magis utique pronis. Sic se rem habere, præter Plinium, Seneca & Suetonius, ne de Xiphilino dicam, innuunt. Romæ quidam gyros facere explicatu difficiles doctus, increpatus, noctu sua sponte se ad lunam exercere deprehensus est. Ille quem Emanuel Lusitanæ Rex Leoni X. Pontifici dono miserat, eundem de fenestra prospectantem ter genibus flexis, & demisso corporis habitu, venerabundus salutavit, Ostorio prodente. Augerius similiter Busbequius in epistolis Turcicis scribit, visum sibi elephantum juvenem, qui ad cantum tripudiantium more alternos moveret pedes. Eundem & pilâ lusitasse quam palmæ vice feriret proboscide. Linguas, intelligere Zeilanenses, apud Metellum habemus; quendam literarum ductus Græcarum didicisse, solitumque perscribere ejuslinguæ verbis. Ipse ego hæc scripsi, & spolia Celtica dicavi, apud Plinium. Humano more convivatos aliquando apud Ælianum invenies: neque ex iis visus est quispiam vorax, neque majoris partis capax. Cum esset bibendum, unicuique crater exhibebatur, & hi quidem promuscidibus potionem haurientes, moderatè bibebant: deinde circumstantes leviter & festivè adspergebant. Mimi magistrive officium exhibere, & aliis salientibus choreasque ducentibus præcinere, Arrianus se vidisse jactat. Inter cætera solertæ documenta, est & hoc, quod cum profundas & superatu difficiles fossas transeunt, major stans medius tanquam pons omnes transmittit: alii ingerentes fossæ sarmenta, eundem servant. Sed & pabuli consueti quantitatem agnoscere, Plutarchus prodidit, permistamque eidem farinam artificiosissimè secernere posse Ælianus. At quod Acoſta de quodam lebetem utrum pertusus esset, aquæ hausta probante, scribit, stupendum est. Solum & Lunam novam venerari; homini erranti viam monstrare;

humana adulteria & homicidia observare, ac detegere; sed &, patrium intelligere sermonem, loqui, vel scribere, inter fabulosa repono. De *Uſu* elephantum, in bello, spectaculis, triumphis, & aliis, alibi dicitur. In *Cibis* fuisse quibusdam certum. Unde & Elephantophagorum nomen, qui circa Drabam, in montibus Asachæis, & contra Meroën habitabant. Adiabaros, seu Magabaros authores vocant. Quin & Plinius, Trogodytas solo elephantorum venatu ali tradit. Caro ponderosa, frigida & abominabilis Rhafi. Ælianus præter promuscidem, labrum, & cornuum medullam, nihil esculentum in iis esse ait. Æthiopes, teste Gyllio, posteriores partes appetunt. Renes tamen maximè in deliciis, & regum epulis, si Vartomanus vera prodidit. *Medicinam* quod spectat. Ælianus adipem contra omnia genera ferarum remedio esse, reliquit, eoque inunctum, etiam nudum inter ferocissimas illæsum versari posse fabulatur. Proboscidis tactu, capitis dolor levatur; efficacius, si & sternutat. Dextra ejusdem pars, cum Lemnia rubrica adalligata, impetus libidinum stimulat. Jecur, comitialibus morbis prodest. Fimo, si illinatur, pediculi fugantur. *Eboris*, cujus nomine Plinius illam præcipuè partem dignatur, quæ circa os est, quodque alibi elephantis, & dentis indici appellationem sortitum est, singularis est & natura & usus. Gaudet humido & siccitate offenditur, cariemque sentit. Emolliri posse Democritus ostendit; emolliturque potioris genere, quod zythum vocatur, ut apud Plutarchum extat. Emollitum, conformatur, & in varia tornatur. Parabantur quippe ex eo mensæ, lecti, capuli cultrorum, enses, vaginæ, pharetræ, sceptræ, fellæ curules, portæ, & alia, de quibus Aldrovandum consule. Politur ut ligna, ac potissimum squatina, ut testatur Plinius: nitor verò, hebetatur mensibus muliebribus. Vis ipsi adstringens, quæ tamen gustu non percipitur. Conceptum juvare, & ventriculo humido prodesse, Practici prodiderunt. Ramentis cum melle illitis, nubeculæ in facie tolluntur. Scobe, paronychia sanantur. Contra lumbricos cum cornu cervi miscetur. Si uratur, ut decet, Spodium vocatur, pro quo tamen aliorum animalium ossa obtruduntur. Frequentior hujus quam eboris usus. Præparationem vide apud Aldrovandum loco citato. *Differentiæ*, & *Genera*, à locis inprimis sumuntur, seu Philostratum, Ælianum, & Plinium spectes, seu recentiores. Sunt enim alii palustres, alii montani, alii campestres, alii sylvestres, alii Lybici, alii Indici. Solinus Prasiorum, & Taxilarum meminit. *Palustribus* dentes sunt lividi, rari, tractuque difficiles, & in plerisque partibus foramina; in aliis verò quasi grandinis grana tumores quidam insurgunt, & arti minimè ob-

Uſus.

Plin. H. N. l. 8 c. 8.

Ælian H. A. l. 10 c. 12.

Ebur.

Plutarch. l. An ad infelicit. &c.

Aldrovand. Hist. Quadrup. l. 1. c. 10.

Differentiæ.

temperant. Dementes levesque esse, Philostratus addit. *Montani* perversi sunt, & insidiosi, & nisi alicujus rei indigeant, erga homines minimè fidi. Dentes habent minores, sufficienter albos, & in quibus nihil est difficile reperire. *Campestres* benigni habentur, mansueti, & imitationis amatores. Dentes habent omnium maximos, albissimos, & sectu faciles, ut nullo labore in quamcunque manus voluerit partem deducantur. *Sylvestres*, in regno Senegæ, ad fluvium inprimis Gambram invenies. Ibi enim gregatim, ut apud nos apri, incedunt. *Lybici*, seu Mauri Indici sunt minores, & nec vocem, nec odororum horum ferre possunt, ut apud Polybium habes; imò nec contueri quidem eos audent, ut apud Solinum legitur. *Indici*, sunt quidem maximi; non ejusdem tamen omnes magnitudinis. Ideò Solinus duo eorum genera tradit; nobiliores indicari magnitudine, minores nothos dici. *Prasii* appellantur qui maximi sunt, quales fortè jam Madagascar, teste Scaligero, producit. *Taxilas* vocant, qui secundi ab his magnitudine existimantur. Illos & in Sumatra invenies, animi robore, & virtutis indole iis, qui in continenti sunt præstantes. Ideò magnis navibus in continentem transportati, Calingarum Regi vendebantur, ut Ælianus prodidit.

Polybius
Hist. l. 5.

Scalig.
Exercit.
204.

Ælian.
H. A. l.
16. c. 15.

CAPUT VI.

De Monocerote, & Asinis
Cornutis.

Aldro-
vand.
Hist.
Quadrup.
l. 1. c. 6.

Strabo
Geogr. l.
15.

Philes in
Jambis.

Plin. H.
N. l. 8. c.
21.

M Paul-
us Vene-
tus l. 3. c.
15.

Vartom.
l. 1. c. 18.

MONOCEROTIS vocabulum, quod Latinis unius cornu animal sonat, pluribus animalibus competit: strictè tamen soli illi, quod ἀπὸ τοῦ μὲν καὶ κέρατος, à solo cornu dictum est, & ideò Unicornis, & Unicornu. Brachmanorum Dialecto καπιδζωνον, vocatur. An in rerum natura sit vel fuerit, alibi, post Baccium, & Bartholinum, magni patris magnum filium, disquiretur; nunc breviter fide authorum, qui de eo scripsere, de eodem agemus. *Descriptionem* itaque quod attinet, Strabo, ex Onesicrito equos unicornes toto fere corpore referre scribit. Philles caudà aprum, Leonem rictu præferre ait. Plinius, reliquo corpore equo similem, capiti cervo, pedibus elephantò, caudà apro, facit; & uno cornu nigro, medià fronte cubitorum duum eminente, instrui. Plinium Solinus sequitur. Isidorus cum Rhinocerote confundit, & cornu ita acutum & validum esse, ut quicquid impetierit, aut ventilet, aut perforet, addit. M. Paulus Venetus, Magno Cham Tartariæ à servitiis, in regno Lambri conspici ait, Elephantè minores, depressum caput gerentes aprino simile, spinosà linguà, quā obvia petunt, nigricantibusque oculis, Rhinocerotis formam ad unguem æmulantur. Ludovicus de Varthema Bononiensis de Monocerotibus à se visis,

ita scribit. Ex altera templi Meccani parte claustra sunt, quibus bini Monocerotes vivi includuntur, qui pro re singulari, ut sunt, monstrantur. Eorum hæc forma erat. Major equinum pullum xxx. mensium imitatur, unumque in fronte cornu præfert, trium circiter ulnarum. Alter Monoceros, unius anni similis, cornu quatuor palmarum habet. Color feræ, ut equi sagmati obscurior, capite cervino, collo brevi, rarisque circa illud pilis, & brevi juba ab altero tantum latere dependente. Crus subtile habet, gracile hinnuli instar; Pes anteriori parte parum fissus, ungula verò caprina, pedesque dextrum, latus pilosum. Enim verò feritatem præ se fert, & naturam solitudinis amantem. Quæ Garzias ab Horto habet, non appono. Reperiri dicuntur in Arabiæ solitudinibus, ibique à mercatoribus visos, Thomas Bartholinus accepit. Garzias suos inter promontorium Bonæ Spei, & illud quod vulgò de Currentes nuncupatur, inveniri scribit. Paulus Venetus suos in regno Basma & Lambri locat. Æneas Sylvius, in extremis Asiæ partibus, in quadam provincia nomine Macino, inter montes Indiæ & Catajum, ubi vulgò creditur habitasse Sericos. Aloysius Cadamustus in novo orbe. Cornu in pluribus exhibetur locis. Decantatissima sunt, S. Dionysianum in Gallia, Venetum, Hispanicum, Ultrajectense, Helvetorum, Danicum, Mercatorum Venetorum, & Gedanensis Empirici. S. Dionysianum, inter prima meliores notæ reponit Baccius; quia rudiori forma, non politum, ad nigrorem vergens instar cervini, quam proximè ad veterum unicornu accedere videtur. In assignanda longitudine variant authores. Renodæus hominis proceritatem æquare tradit, ea fide qua & nobis patuit: Baccius & Marinus ad sex cubitos extendunt: Gölntzcius ad sex & semis pedes metitur: Bello-nius semissem complens ad septimum auget. Nec de pondere consentiunt. Cardano libras decem & septem pendere visum, cum tertia parte. Gölntzcius ad vigesimum quintum pondus ascendit. Ego sublatum, ad decem & octo libras, cum Bellonio extenderem. *Veneta* unicornua inter vera censet Baccius, inter diversa ab antiquorum unicornibus Andreas Marinus, quod antiquorum unicornibus longiora sint, nec strias habeant Monocerotis Æliani, adeoque subtilia, ut pocula inde nulla conficiantur. Colore sunt cornu cervini politi, & pallidi non nigri. Feruntur occupato Byzantio in Venetorum Rempublicam transcripta, cum xii. pectoralibus satellitum Imperatorianorum. *Hispanicum*, cujus frustulum Philippus IV. Francisco Barberino Cardinali eminentissimo, & in peregrinos Heroas humanissimo, donavit, nihil singulare habet. *Ultrajectense*, lon-

Bartho-
lin. de
Unicorn-
u cap.
24.
Garzias
H. Arom.
l. 1. c. 14.

Baccius
l. 2. c.
ult.

Renod. l.
3. Pharin.
c. 21.

longitudine Parisiensi par est, sufficienti amplitudine. Gyri frequentiores ad extremum apicem circumducti, recto tractu obliterantur. Crustæ color cineritio similes, medullâ candidiore. In magno precio habetur, & pro vero venditur, ut infinitam auri vim, repetundarum damnata Colonia Aprippina, contra licitaretur. *Helvetiorum*, ad oram fluvii Arulæ propè Brugiam, anno M. D. XX. inventum est. Interiore facie est album, flavescens exteriori, sine striis, duorum cubitorum longum, sed, ut moschus, odore præstans, præsertim igni vicinum. *Danicum*, in castello Friderici Burgi asservatur, longitudine septem pedes Romanos excedens, si partem alveo excipiamus inclusam, cujus mensuram pedis unius cum mensuris duabus Bartholinus deprehendit. Ambitus septem minimum digitos complectitur, æquali gyrorum flexu in acumen desinens. Color ex candido mixtus & cinericio, quem per intervalla, nigriores striæ, lineæque obscuriores distinguunt. *Venetorum mercatorum* unicornu ex Germania allatum est, coloris splendore & varietate veri cornu speciem promittens, eoque magis, quod abrasæ particulæ, non dentium instar in ramenta, quæ fricari possunt, concidant; sed inde quisquiliarum squamæ eadem planè visciditate & lentore resultent, quo secta quævis animalium cornua. De *Gedanensi* nihil occurrit, Empiricus Constantinopoli redux, magno illud non ita pridem venditabat. De reliquis quæ huc spectant, ita *Ælianus*. Dicunt omnium maximè animalium absconam vocem & cententam emittere; & ad alias quidem bestias ad se accedentes mansuescere, cum gregalibus verò suis pugnare. Neque modo mares naturali inter se quadam contentione dissidere, sed contra etiam foeminas certare, pugnamque usque ad mortem victi ingravescere. Nam & reliqui corporis robore maximo præditus est, & cornu inprimis inexpugnabili armatur. Desertissimas regiones persequitur, simul & solitarius errat. *Coitus* tempore ad foeminam mansuetè mansuecit, & pariter pascuntur. Cum hoc tempus traferit, & ventrem ferre foemina cœperit, rursus efferatur, & solus vagatur. Præstiorum Regi illius pullos etiamnum teneros ajunt deportari, eosdemque festis & panegyricis diebus ad pugnam committi, ad robur ostendendum. Nam integræ ætatis & perfectæ, nullum unquam meminit captum fuisse. Tantum *Ælianus*. Alii addunt, adeò animal hoc puellas virgines venerari, ut si sinus venienti aperiant, in illum, ferociâ depositâ, caput ponat, sicque soporatum velut inermem capiatur. De *Uso* inter omnes notum, ad venena maximè commendari. Eo verò præsentem fudare, & in humore ebullire, sicque verum dignosci, nonnullorum est sententia. *Aloysius Mundella* ad-

versus morsum canis rabidi, aliorumque animalium maleficorum, nec non vermes eorumque symptomata commendat. Antiqui Indorum Reges, ad quorum notitiam primum hoc cornu pervenit, pocula ex eo sibi fabricabant, ut dum ex iis bibebant contra venena, ebrietatem, spasmodum, epilepsiam, & alios malignos morbos munirentur. Narrat *Jordanus* Judæum quendam Venetiis, in mensa cornu circulum delineasse, postmodum scorpionem & araneum iniecisse, qui nunquam transilire potuerunt ambitum cornu circumscriptum: deinde palmi altitudine quovis raptantes bestias, umbræ aut vi emanante, intra quadrantis horæ spacium ambas necasse. Non est ergo mirum tanti esse pretii, ut Germani mercatores teste *Baccio*, pro uno XC. M. coronatorum poscerent; & Pontifex Romanus, erectâ in Vaticano pharnacopæa, frustum XII. M. aureorum à mercatoribus Epidauriis redemerit, quo non semel *Augustinus Ricchus* Pontificius tunc temporis Archiater, felicissimè, modo scrupuli, modo decem granorum pondere, ex vino, vel aliquâ cordiali aquâ utebatur. Et hæc de Unicornu nunc sufficiant, pluribus alibi agemus. Quantum ad *Asinos Cornutos*, tribus in locis eos celebrari in venio, in India nempe, Scythia, & Africa. De *Afris* *Herodotum* authorem habemus. De *Scythis* apud *Ælianus* habetur, & addit, Cornua aquam fluminis Stygis continere, quæ transmittit vasâ omnia etiam ex ferro, missaque ab Alexandro Delphos ut Pythiæ dedicarentur. De *Indicis* ita idem *Ælianus*. Sylvestres asinos equis magnitudine non inferiores apud Indos nasci accepi, eosque reliquo corpore albos, capite verò purpureo, oculisque cyaneis esse: cornuque in fronte gerere sesqui cubiti longitudine: cujus superius pinceum, inferius autem album, medium verò planè nigrum sit: atque non omnes quidem Indos, sed potentiores, quum tanquam armillis quibusdam brachia, sic cornua auro ornarunt, ex his ipsis bibere solere. Ex hoc cornu bibentem ab insaniabilibus morbis tutum fieri, neque cum ipsum convulsionibus coripi, neque sacro morbo tentari, neque venenis ullis ferunt. Quin etiam si quid prius pestilens biberit, tum id evomere, tumque ad sanitatem redire. Quum autem cæteri asini, quibus cunque in terris sint, tam domestici, quam sylvestres, tum cætera solipeda animalia, talos non habeant, neque fel in jecore, ut fertur: asinos Indicos ronigeros, *Ctesias* inquit, talis primum iisque nigris præditos esse: eosdemque si quis confregerit, interiora quoque nigra deprehensurum esse: neque felle eos carere: neque modò corporis velocitate longè multumque cæteros asinos superare, sed & velocitate eadem multo equis & elephantis præstare. Quum autem in viam se dederunt,

Bartho-
lin. de
unicor. c.
27.

Jordan. l.
de peste.

Ælian.
H. A. l.
16. c. 20.

Herodot.
l. 4.

Ælian.
H. A. l.
10.
c. 40.
Ælian.
H. A. l.
4. c. 52.

Albert.
H. A. l.
22.

derunt, tardius primò ingrediuntur, deinde paulatim tantum confirmantur ad contendendum iter, eos quidem ut assequi nemo possit. Postea autem quàm fœminæ pepererunt, patres circa pullos à partu recentes, summâ custodiâ versantur, eorumque commorationes locis Indiæ desertissimis sunt. Quum à venatoribus Indis invaduntur, pullos suos adhuc ætate infirmos, à tergo suo pascentes habent, atque pro eis pugnant: contra equites audent venire, eosque cornibus ferire. Tanto sanè hi robore existunt, nihil eis ut obsistere queat, quin statim concedat, vel, si non cefferit, frangatur, aut aliter atteratur, & evadat inutile, & perdatur. Equorum etiam incurfu latera discerpunt ac lacerant, ut viscera effun-

dantur: ex quo fit, ut ad eos equites appropinquare valdè metuant; appropinquatio enim capitalem ipsis pariter & equis multam miserabiliter infert. Pergraviter calcibus pugnant. Eorum morsus eatenus acerbiores existunt, ut quicquid comprehendunt, funditus diripiant. Ex his qui sunt confirmata ætate, vivos non ceperis, jaculis & sagittis perimuntur. Carnes eorum, quòd amarissimæ sint, haudquaquam esculentæ. Eadem ferè Philostratus scribit. Icon quem adjicimus, feræ quidem est corpore auribusque asininis, binis armatæ cornibus, quorum alterum è narium, alterum ex oculorum regione exit: sed quia nec solipes, est, nec unicornis, Asinus Indicus cornutus esse nequit.

Philostr.
in vita A-
pollonii.
l. 9.



HISTORIÆ NATURALIS

D E

QUADRUPEDIBUS

LIBER II.

De Quadrupedibus bisculcis.

TITULUS PRIMUS

De Bisulcis terrestribus.

CAPUT I.

De Ruminantibus Cornigeris
in genere.Aldrov.
de Bisul-
cisi. I.
c. I.

Hætenus Solipedum
historiam persecuti
sumus : sequuntur
Bisulca : Græcis δι-
χῆν & διχιδῆ quæ un-
gulam dividere in
sacris legimus, quod
multifida, quamvis
pedes in digitos scis-

fos habeant, facere non dicuntur. Duo ta-
lium invenio genera, *Terrestre* nempe & *A-*
quaticum. Ex terrestribus alia *ruminant*, alia
non. Ex illis quæ ruminant, quædam sunt
Cornigera, quædam *non cornuta*. Illa in genere
& in specie considerabimus. *Ruminantia* autem
illa vocamus, quæ pabulum semel degluti-
tum, mox ad os regurgitans, revolvunt. Un-
de Ruminantia actum, Apulejus rumigare,
Quintilianus & Plinius, remandere, Græci
μυρμαζειν μυρμαζῶν παρὰ το μύρμειν quod est revolvere,
dixerunt. Latinorum quidam à loco ad quem
furfum ad os repellitur, id est, à rumine,
quod, ut ait Festus, locus est in ventre quo
cibus demittitur, & unde redditur deduxe-
runt. At Servius à ruma, quæ rumis, & fru-
men aliis, quam ait eminentiorem colli par-
tem esse, ad quam demissus cibus, à talibus
animantibus revocatur : Mercurialis verò ab
erumnis, quod Arnobius scribat, erumnas
esse prima gurgulionibus capita. *Necessa-*
riam autem hisce animantibus ruminatio-
nem esse, tum exinde colligas, quod durio-
re pabulo vescantur; tum ex eo, quod su-
perioris mandibulæ dentibus careant, & in-
feriores minimè habeant ferratos. Inde fa-
ctum, ut dentium defectum *ventrium multi-*
tudine natura pensaret. Sunt enim talibus
quatuor, κατὰ nempe, κεφάλαιον, ἔχινον ἡνυστρον,
seu venter, reticulum, omasum, aboma-
sum. Gula ab ore incipiens ad pulmonem
septemque transversum deorsum tendit:
hinc se ad *ventrem* applicat *majorem*, qui

parte inferiore asper interceptusque est, ac
propè gulæ commissuram, sinum sibi adne-
xum habet, quem ex argumento *reticulum*
appellant. Est enim ventri similis extrinse-
cus, intus reticulis mulierum implexis, ma-
gnitudine multò quam venter major. Hunc
excipit *omasum* parte inferiore asperum,
cancellatum, crustarum, magnitudine reti-
culi. *Abomasum* venter ab eo alius jungitur,
magnitudine amplior omaso, formâ oblon-
gior, cancellis intus & crustis multis, ma-
gnis, & levibus innormatus, mox intestinum
consequitur. In prima alvi cavitate rudis
adhuc esca cernitur, quin & festucæ & vix
lacerati furculi. In secundo amplius confi-
citur cibus, & magis adhuc in tertio elabo-
ratur, ut in novissimo tandem concoctio ab-
solvatur, ubi in cremorem lacteum abit.
Nec tamen sola illa quæ superiore dentium
ordine carent, ruminant. Reminat namque
inter pisces Scarus, quod obtusos dentes
habeat; inter animalia, mus vulgaris, &
Ponticus, lepus & cuniculus, ut in Levitico
habetur. Modum ad viam ruminationis si
inquiras, cibum remansum ex uno ventre in
aliu mitti, quousque à postremo in inte-
stina labatur, respondet Aristoteles. Gale-
nus ait, primò ex ventriculo revomi in os:
deinde ab ore in reticulum; inde in omasum,
tandem in abomasum mitti. Post lactatio-
nem ruminare incipiunt, & septenis mensi-
bus, cicures intellige, ruminant. Gregales
levius minusque tempus, quia foris pascun-
tur. Hyeme tamen magis, quàm cæteris an-
ni temporibus, videnturque non minus ru-
minando quàm edendo delectari. Quietem
tum poscere, vel exinde liquet, quod in
mandris plerumque id muneris obeant, ja-
centia. Lac eorum solum coire, ipsaque coa-
gulum in omaso habere, & lacte abundare,
ab Aristotele proditum. Causas omnium
alibi exponemus. *Cornua* ruminantibus
Camelum si excipias data sunt, defensio-
nis & offensionis gratiâ. Nutrimentum
quod ad superiores dentes quibus carent,
abire debebat, in cornua abit, suntque
multiplicis differentiae. Nec alibi major la-
scivia naturæ lussit animalium armis. Spar-
sit hæc, inquit Plinius, in ramos, ut cer-
vorum: aliis simplicia tribuit, in eodem
genere subulonibus ex argumento dictis;

Aristot.
H. A.
l. 9. c. ult.Galen. l.
de admin.
anatom.
c. 3.Plin. H.
N. l. 10.
c. 73.Aristot.
H. A. l. 3.
c. 21.
Item de
partib.
l. 3. c. 15.Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

D

ali-

Festus
de ver-
bor. si-
gnificat.
Varro L.
l. 1. 2.Arnob.
l. 7. con-
tragen-
tes.Aristot.
H. A.
l. 2. c. ult.

aliorum finxit in palmas, digitosque emisit ex eis, unde platycerotas appellant. Dedit ramosa capreis, sed parva, nec fecit decudua: convoluta in anfractum arietum generi, ceu castus daret, infesta tauris. In hoc quidem genere & foeminis tribuit: in multis tantum maribus. Rupicapris in dorsum adunca; Damis in adversum. Erecta autem rugarumque ambitu contorta, & in leve fastigium exacuta, ut lyras diceret, Strepficeroti, quem audacem Africa appellat. Mobilia eadem, ut aures, Prygiae armentis. Troglodytarum in terram directa, qua de causa, obliqua cervice pascuntur. Aliis singula, & haec medio capite autnaribus: Jam quod aliis ad incursum robusta, aliis ad ictum: Aliis adunca, aliis ad jactum plurimis modis, supina, conversa, convexa. Omnia in mucronem migrantia. Haec Plinius, qui differentias a colore omisit. At is quoque variat. Nonnullis est simplex, albus, nigricans, cinereus, flavescent: aliis varius, ut in singulis speciebus ostendetur. Habent & proprias quasdam corporis partes cornigera, ut talum & sebum: habent & communes sed situ differentes, ut uterus, lien, mammae. Lien plerisque rotundus: Intestina ampliora: Mammae exque binae inter femora. Uterus, acetabula habet dum partum gerunt. Talo quoque permulta instructa sunt, eundemque cruribus posterioribus continent. Sed de his in speciebus plura.

CAPUT II.

De Ruminantibus Cornigeris
in specie.

ARTICULUS I.

De Bove domestico.

Aldrovand.
Hist.
Quadrup.
l. 2. c. 1.

ET tantum de animalibus quadrupedibus bisculcis ruminantibus & cornigeris in genere. Species si attendas, sunt inter ea, Bos, tam domesticus quam sylvestris, Ovis, Capra & Hircus, tam domesticus quam sylvestris, Cervus, Tarandus, Alce, Rhinoceros. A Bove autem merito incipimus, animalis, quae sibi omnia ferè quae ad victum nos & reliqua reposcimus, vendicat. Cuncta certè legumina frumentaue, ut verbis Vegetii utar, bobus meritò aratrisque debentur. Vinearum ipsarum usus periret, nisi eorum adminiculis carpenta sudarent. Quid de diverforum munerum comparatione referamus, dum inter mobilia, & quicquid gravius est, absque vehiculis penè reddatur immobile? Reliqua omnia animalia, ipsaeque cohortales aves, ex eorum capiunt labore substantiam. Unde enim equis hordeum, unde cibum canibus, unde porcis pabulum dominorum solertia subministraret, ni pa-

Veget. in
prologo l.
2. Vete-
rinariae.

rentur boum labore frumenta? Et ne longum faciam bobus debent alimenta, quicquid alii potest. Apud alios genus mularum, apud alios camelorum, apud paucos elephantorum, etsi exiguus usus est, nulla potest ratio esse sine bobus. Non est itaque mirum tali olim boves in precio, ut Germani junctos uxori ducende dotis nomine mitterent, quo venire se laborum periculorumque sociam his incipientis matrimonii auspiciis admoneretur: Athenienses nullum longo tempore, cujus opera aratro vel currutebantur, immolarent: Pythagoras, ne quis istiusmodi operosa animalia interimeret, institueret: Phryges, qui bovem aratorem interfecisset morte multarent: Imperator Valens lege caveret, ne quis per Orientem vitulinam vesceretur: & Constantinus, ob civilia debita boves aratorios pigri capere vetaret. Quin & virtutis premium boves dati; & Decius Mus tribunus militum, cum Romanum exercitum ab hostibus Sabinis circumventum, circuitione montis conservasset, auream coronam, & centum boves accepit; Lelius post expugnatam urbem, triginta. Taceo tributum nomine à Bohemis Carolo Magno quotannis centum & triginta boves missos: furto subreptos belli causam, prodente Homero, & Pausania fuisse: & Batavos, qui ex caseo & butyro, quae in extrema loca exportantur, in singulos annos ducenties festerium, id est, decies centena Caroleorum millia, praeter ea quae in quotidianum alimentum cedunt, cogere, ut Adrianus Junius prodidit. Diversa pro aetate & sexu Nomina sortitur. Praecipua sunt, Bos, Taurus, Vacca, Juvenca, Iunx, & Vitulus. Bovis nomen propriè castrato impositum est: taurum tamen quoque & vaccam significat; ut & apud Graecos βός nomen est genericum, & teste Tzerze aliquando vitulum significat. Taurus est bos antequam castratur, dux & maritus vaccarum. Oppianus tamen hoc nomine tanquam digniore, totum bubulum pecus complectitur. Dictus est Ethymologo quasi τανύρ, à caudae extensione, ἀπὸ τοῦ τενεῖν τὴν ἄρην; vel quasi γαῦρ, id est, superbus: vel à Syriaco Tor & Taur, ut Scaligero placet. Vacca foemina tauri est, & apud Graecos à bove mare per articulum distinguitur. Florentinus βοθήλειαν αὐτὸ δάμαλιν reddit, quod nomen omni animali in juventa Phocion tribuit, juvencae alii. Juvenca & vituli nomen non distinguunt satis authores, nec Varro sibi constat; quin & Poetae juvencos & juvenecas vocant boves & vaccas, nec non vitulos, quibus nondum erupere cornua: cum tamen Isidorò juvenca dicatur, quod incipiat hominum usus in excolenda terra juvare, quod ex Varrone habet; juvenca nomen bovem nobis indicabit, qui jam non amplius vitulus. Iunx eadem videtur quae juvenca. Ideo

Tacit. de
morib.
German.
Rhodig.
Antiq.
lect. l. 19.
c. 27.

Alian.
H. A. l.
12. c. 34.

Dubrav.
in Histor.
Bohemi-
ca.
Pausan.
in Messe-
niacis.

Nomen.

Ideo Cornutus ad Persium, junices teneræ ætatis boves, quæ nondum ad summam ætatem pervenerunt, esse dixit. *Vitulus* & *vitula*, primæ ætatis nomen est. Isidorus à viridi ætate; alia à vitulando, id est, lasciviendo, alii à vita derivant. Apud Græcos varia obtinuit nomina. Dicitur namque *πίταλον*, *μίχον*, *μίσκαρι*, *πέρλις*, *πέρης*, *ερινάς*, *μογίλαϊον*, *λῆς*, *πρωῖ* & *πρωῖν*, *καρόνιον*, *ρῶς*, *πέλλης*, *κνώδαλον*, quorum tamen quinque posteriora tauro & bovi potius competunt. *πίταλοι* dicuntur vituli apud Athenæum, ἀπὸ τῶν κεράτων, ὅταν αὐτὰ ἐκπέταλα ἔχοντες, id est, à cornibus patulis seu exilibus, ut Cælius Rhodiginus interpretatur; patulis potius, planis, & in latitudinem extensis, ut alii. *Μόσχον* quod utrique sexui commune est, dicitur, vel quod μῶ vocem edat: aut *πυρὰ τὸ ὁσμῶσαι τῇ μηρῖ*, aut *πυρὰ τὸ μῶ τὸ ζῆλῶ*, καὶ διὰ τὴν σχέσιν ἃ ἔχουσιν πρὸς τὰς μητράς: id est, aut quòd matrem olfaciant; aut quòd μῶ voce quærant; aut propter affectionem, quam habent versus matrem. *Μίσκαρι* Græci nostri temporis nominant. *Πέρλις* Hesychio est νεογνὸς βῆς, à quo *πορλίχιον*. *Πέρης* apud Henricum Stephanum est vitulus & vitula, *πυρὰ τὴν πορείαν* ab itinere, ita ut sit *μίσκαρι* βῆς, ut Suidæ verbis utar; ἡ ἀρχαῖα νῦν τῆς κατὰ νομὸν πορείας. *Ερινάς* Hesychio & Varino νεὰς βῆς. *Μογίλαϊον* itidem. *Ηῖν* Græci vocant, *τὴν ἐκταυσιάν καὶ μόνον ἐνδὸς βῆς*, boven anniculam. Reliqua bovi vel tauro magis competere dixi. *Πρωῖ* namque Varino & Hesychio est taurus. *κίλλιξ* bos aut agnus qui alterum cornu perversum habet. *Καρόνιον* bos cui cornua sunt lunata, ut *κάρωνιον* taurus ὀρθόκερως iisdem. *Ρῶς* apud Tzetzen taurorum Scythicorum genus est. *Πέλλης* vocatur bos coloris nigri. *κνώδαλον* quoque Æschylus boves vocat. In *Descriptione* singularia duntaxat adscribam. Notissimum namque animal est; de cornuum verò Differentiis post agemus. *Pilum* itaque hoc animal gerit, qui quotannis, teste Aristotele decidit, tenuiorem & densiorem quàm suum: in dorso tamen & cervice densior est; & peculiari nomine *κόλλος* appellatur, quòd ex ipso *ἀναδραττομένης*, id est, fervefacto, ἡ κόλλα seu gluten fiat, seu ut Varinus, quòd ex eo *κόλλατοι* id est, claviculi, quibus remittuntur & intruduntur in cithara fides, parentur. Quæ in collo conspicitur reduplicatio, *μύκλος* appellatur, ut idem ait. *Labiorum* prominentiam habet crassam: crassam item & obtusam supernam maxillam, ideò breves herbas decerpere non potest. *Frontem* imagine V. figurari Cælius notavit: Democritus & Ælianus exēctos latiore tauris habere observarunt. Inter utrumque cornu maxima ossium est durities, injuriis valdè resistens & fractu contumax. *Linguam* avulsam per totam diem palpitare, Cardanus scripsit. *Pelles* illæ quæ ex gutture

dependent, palear seu palearia dicuntur.

Varino forte *καράλιον*, nam τῶν βῶν ὑπὸ τὴν πρῶτην χαλασμά, explicat. *Dentes* sunt continui, & bis mutantur. Mutant autem bimi, ut ait Plinius. Superiori dentium ordine carent: id est, primoribus quatuor, ideò, ut diximus, ruminant. *Penis* tentigo tanta, ut si initurus à loco aberret, vaccam vulneret.

Vaccæ *Mammæ* habent inter femora, binas, ut habet Aristoteles; quatuor, ut Plinius, singulis papillis, quas habet quatuor, teste etiam Aristotele, mammam, ut apparet, tribuens. *Podicem* hiare innuit Horatius. *Cauda* tenor longus est, pili breves. Plinius caulem vocat. *Caro* sicca est & atrabilia.

Nervi duri & robusti; tauris tamen duriores. *Sanguis*, fibris refertus, ideò omnium celerimè coit & durescit. *Articulum femoris*, laxum magis bos habet quàm alia animalia: ob id magis quàm alia pedem trahit, maximè cum macilentus est & senex. *Lapillum* feruntur in capite gestare, eumque si necem expectent, expuere. Augustinus in jecore quoque & renibus habere scribit. In corde *Os* gerere, Plinius author est, ex Aristotele sine dubio. *Lienis* figura oblonga est; ipse

nigrior quàm in sue præsertim ubi consenuerunt. *Renēs*, humanis, teste Plinio, similes, velut è multis renibus compositi. *Tali* à cameli talis differunt, quòd paulò majores sunt. In secundo juvenearum ventre, nigricantem pilæ rotunditate tophum reperire, nullo pondere. Plinius author est. Aldrovandus duas in musæo habuit; unam colore ruffo, alteram atro, quòd ille ex ruffi coloris bove, hæc ex nigro esset cruta; cum sit earum ortus ex pilis, quos in ipsa ruminatione lambendo, ut fit nonnunquam, exteriores corporis partes deglutiendo colligunt, admistaque pituita paulatim in ovalem figuram ferre cogunt. De *Loco* non est quòd multis agamus. *Cibum* si spectes, omnivori quidem sunt boves: maximè tamen gramine *Cytiso*, ervo, medicâ herbâ, loto, carice, salice, quercu, oleâ, arundine, alno nigra, vite, hordeo, olyra, arinca, milio, panico, cicera, lupino, glandibus, nucleis dactylorum olearum, & visco, delectantur. De gramine omnibus notum est, cui hyeme fœnum succedit. In Narbonensi provincia in fonte

Orge, quoddam nascitur in tantum bobus expeditum, ut id merlis totis capitibus quærant. Idem in Ligeriæ amne, quæ per velanios fluit faciunt, & in Sebusianorum piscinis. In eorundem quoque lacunis, stagnis; & pigris aquis, gramen nascitur longissimis foliis, subrubris, innatantibus aquæ, quorum etiam tam avidi sunt boves, ut dum ea persequuntur, ad ventrem usque se immergant, & toto capite sub aquam dejecto ea depascantur: quo pabulo eximiè faginantur; vaccæ autem plus lactis, quàm quæ in vicinia præbent. Ex cytiso copiosum & dulce lac

Plin. II.
N. l. 11.
c. 37.

Plin. H.
N. l. 8.
c. 45.

Aristot.
H. A. l. 2.
c. 15.

Plin. H.
N. l. 18.
c. 22.

Dalè.
champ
ad l. c.

Plin. H.
N. l. 13.
c. 24.

Descri-
ptio.

provenit: sed dum floret incommodus est, quòd tantisper urat & extinguat. Ervum commendatur, sed non mense Martio satum, quòd cerebrosos reddat. Plinius non solum mense Majo satum, noxium bobus dici asserit: sed & autumnmo gravedinosum. Madefactum, pluribus diebus mitescere. Ideo Democritus tale, ne boves fiant debiles, singulis mensibus in potu exhibet. Singulis boum jugis, quini modii sufficiunt. Ex medica omne emaciatum jumentum pinguefit, ægrotantique pecori remedio est, ut Theophrastus prodidit. Ideò sylvestris in plærisque Hispaniæ locis, præsertim Valentino, diligenter, teste Dalechampo, feritur. Parcius tamen dandum, quòd Aristotules, lactis copiam extinguere, quod universum pabulum in sanguinem, adipem & carnes, faceffat. Lotus alimentum plurimum optimumque præbet, quia subdulcis est, & semel fata herba restibili, per aliquot annos fœcunditate germinat. Ulmi Attiniæ inprimis frondes apud Romanos olim in precio. Si eâ assidue pecus alueris, & postea generis alterius frondem dare institueris, fastidium bobus asferet. Salicis fit apud Virgilium mentio; nec Lucretius ejus oblitus est. Ficulnea folia bubus probè dari posse, si sit eorum copia, scribit Columella. Idem quernam ceum meliorem & oleagineam præfert, sed ejus generis quæ spinas non habet. Alni nigræ folia lactis copiam generant. Hordeum, & reliqua ex frumentis depaleis intellige. Milium tamen in Italia boum pabulum seri, Porta scribit. Cicera ervi loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola divisa est, paulum aquâ maceratur, dum lentescat. Lupini modii singuli bovem unum satiare validumque præstare, apud Plinium legimus. Maceratus in aqua fluviali & marina triduo, dulcescit, & ita siccatus ad usum reconditur. Glandes Cato post sementem colligi præcipit, & in aquam conjici, ut inde semodius patrata sementi, verno modius bobus singulis detur. De iisdem Plinius. Bobus glandem circa brumam aspergi convenit, in singula juga modios 24. Largior valetudinem infestat: & quocunque tempore detur, si minus triginta diebus continuis data sit, narrant vernâ scabie pænitere. Nucleos dactylorum in aqua maceratos apud Babylonios bobus ovibusque in pabulum exhiberi, Strabo author est: visco ali, indeque pinguescere, Theophrastus. Aluntur & pisce, apud Pæonas, qui Prasiadem paludem accolunt. Nec *cicuta* abstinent, seu viridi, seu arida: nec à ranunculis læduntur. De Potu non est quod multa dicam. Aquâ eâque clarâ delectantur. Vegetius tamen nec sordida quidem lædi testatur. De ratione cibandi consule Aldrovandum, & agriculturæ scriptores. De ætate ita breviter Plinius. Vita fœminis

XV. annis longissima, maribus XX robur in quimatu. Cognoscitur, inquit, Crescentiensis, quando mutant dentes. Mutant enim anteriores anno evoluti, & decem vel octo mensibus: deinde post sex menses paulatim amittunt proximos, donec intra triennium omnes muta verint. Quo quidem tempore optimè habitati sunt, & in vigore ad decem usque vel quindecim annos perseverant. In statu dentes habent pulchros; longos, & æquales: qui per senectutem eis imminuuntur, nigrescunt, & corroduntur. Gesnerus ait, Helvetios ex circulis quibusdam qui circa vaccarum cornua nascuntur supernè ferè, de ætate judicare: illos autem in quimatu fermè ternos esse; postea plures. Esse etiam, qui quoties fæta fuerit, toties singulos adnasci circulos putent. Circa Generationem, libido, coitus, & partus occurrunt. Illam si spectes, coitus tantum tempore cum fœminis pascuntur: bis de die annosiores, sapius juniores & quidem eandem ineunt: & tanto motu genitalem nervum admovent, ut semen sine motu emittant. Exectum vaccam implevisse Aristoteles tradit: Columellæ verò judicio, unus mas quindecim vaccis abundè sufficit. Varro tamen multo plures tribuit, inquiens, habere se tauros totidem, quot Atticus, ad matricem septuaginta, duos, unum anniculum, alterum bimum. A gravidis abstinet, & sponte, à conceptu, divortio quasi facto secubat; ac ut in Epiro maximè videre est; trium plærumque mensium spacio non apparet, sed seorsim à vaccarum consortio convictuque pascitur. Haud minus famosa vaccarum salacitas. Testatur Aristoteles, libidine adeò accendi, ut bubulci eas tenere & capere nequeant, indiciumque suæ libidinis indicare, genitalis speciem prominentiorem. Crebrius mingere, more equarum: Tauros etiam supervenire, & sequi sedulo, & assistere. Turgere ad coitum plus minores quàm majores. Mugitum dum prurit edere, Ælianus prodidit, à tringinta etiam stadiis diffitam. Libidinem augent, falsa bovis caro juglandis magnitudine ori indita: Orobanche comesta, & alia, quæ Columella præcipit. Coitus laboriosior est quàm equis, tuncque potissimum tempus, cum fœmina à mensibus purgatur, quæ sua sponte marem patitur. Concepisse cognoscitur, si Aristoteli credimus, cum menses cessarunt, spatio temporis trimestri, bimestri, quadrimestri, semestri. Ferunt ventrem menses decem: decimo pariunt, teste Varrone: quicquid antea genitum est, vitale esse Plinius negat; suntque authores, qui ipso complente mensem decimum mense parere ajunt. Vituli in utero situs icone exprimitur: ut & secundina uteri interna qua fætus contineri solet, cum suis cotyledonibus, externaque ostenditur. Quamvis autem singulos pariant, raroque binos:

Æt. Aristot. H. A. 1. 6. c. 21. Crescent. l. 9. c. 64.

Generatio.

Aristot. H. A. 1. 5. c. 2. Varro R. l. 2. c. 5.

Aristot. H. A. 1. 6. c. 18.

Ælian. H. A. 1. 10. c. 27.

Columella R. l. 6. c. 24.

(Membrana lateri interna &c. n. 8. Membrana fætum continens. m. 7.)

Columella R. l. 5. c. 6.

Virgil. Georg. 4. Lucr. 1. 2. Columella R. l. 6. c. 3.

Columella R. l. 2. c. 11.

Theophr. l. 2. de caus. plant. c. 23. Potus.

binos: ætate tamen Ptolomæi junioris, vac-
ca quædam, teste Diogeniano, eodem par-
tu sex edidit vitulos: miraque est harum ani-
mantium in Hispaniola fecunditas. Plæ-
rumque binos pariunt, undecimo mense
taurum admittunt. Etiam si verò geminos
ferant, negant tamen boves gravidas, præ-
terquam dextro vulvæ sinu ferre. Marem
an foeminam conceperit, ex desultu post
congressum hariolantur. Si namque dextra
parte defiluit, marem seminasse dicunt, si læ-
va, foeminam. *Amicitiam* colunt cum api-
bus, inimicitias cum crabronibus, tabanis,
muscis, ricinis, urfis, sue, corvo, plantarum
aliquot, & coloribus quibusdam gerunt.
De apibus innuit Plinius dum scribit, cir-
cumliniri alveos apum fimo bubulo utilif-
simum. Cognatum hoc iis innascentes be-
stias necat, araneos, papiliones, teredines,
apesque ipsas excitat: & alibi: In totum re-
parari ventribus bubulis, recentibus cum
fimo obrutis: Virgilius juvencorum corpore
exanimato, sicut equorum vespas, papilio-
nes, teredines: apesque ipsas excitat. Cra-
brorum aculeo icti, ceu immanissimo quo-
dam dolore affecti, ad cursum incitantur.
Muscæ adeò eos vexant, ut in Leucada pa-
negyri muscis bovem immolare, consuetu-
do fuerit, quæ illius distentæ cruore con-
festim evanescere credebantur. A ricino di-
vexati minus pinguescunt, & ad labores
sunt lentiores. Ursi tauros ex ore cornibus-
que eorum pedibus omnibus suspensi, pon-
dere fatigant. Nec alteri animalium in ma-
leficio stultitia solertior. Suis fimus bobus
noxius est. Corvi advolantes oculos eorum
lacerant. Sevo, suumne an aliud ignoro, si
lingua tauri perungatur, morituros citius
quàm comesturos, nisi sale & aceto abster-
gatur, quidam venditant. Quantum ad
plantas, si nares tauri oleo rosaceo illinan-
tur, vertiginosus evadit. Lafer naribus in-
ditum eundem inflammat. Nigro hellebo-
ro necantur. Chamæleontis succo juvenecas
necari angimæ modo, Plinius scribit. Capri-
ficus carnes teneras reddit. Folia fraxini ju-
mentis mortifera, cæteris ruminantium in-
nocua, si Plinium sequimur, quod de taxo
verum est. Circa Scytharum & Medorum di-
ctam Thraciæ regionem, locum esse ajunt,
viginti ferè stadiorum spacio, qui hordeum
prodegit, quo homines quidem vescuntur,
equi verò & boves, cæteraque animalia ab-
stinent. Tragus quandam herbam inter vi-
tia frugum describit, cujus folia ab initio
planè milium referunt, longis, asperis ari-
stis, armatam, quæ lapparum instar vestibis
hæreant, in arvis milio & hordeo confitis
frequenter, bubus valdè noxiam, ab iisque
evitari. Aconiti cærulei species à bubus,
teste Gesnero, non attingitur. De bona her-
ba, Caltha Alpina, Personata, vide Gesne-
rum & Tragum. Personata, Germanicè

blaffen / cum rore madida à bobus depasci-
tur, adeò eos inflat, ut aliquando rupan-
tur, nisi cursu agitati, incalescant & per al-
vum rejiciant. Ex coloribus, rubro & qui
ad illum accedunt, irritantur. Admirandum
verò est, boves deinde non araturos, qui
aliquem ad supplicium devexerint: vel fra-
rent, terram non esse laturam fructum. Ge-
oponici verò tradunt, quod oporteat obser-
vare seminantem, ne semina boum cornibus
incidant: hæc enim *κερασόβρα* intractabilia,
nominari, & sterilia esse. Plinius ait, in in-
cendiis si fimi aliquid egeratur è stabulis,
facilius extrahi, nec recurrere boves oves-
que ferri, quod quis etiam non mirètur. De
Motu & Voce pauca sufficient. Ille lentus
est, ne dicam, piger. Unde bove leporem
venari dicimus. *Vox* pro ætate & sexu va-
riat. Vitulis graviores esse quàm adultis, bu-
bus foeminis quàm maribus Aristoteles &
Plinius asserunt; è contrario mutari, si ca-
strentur. Propriè autem horum animantium
est boare, & ut Varro bovare, ut Pacuvius
boire. Vulgaris autem boum vox *μύκημα*,
μύκησις, & *μυκηδὺς* ἀπὸ τοῦ μυκᾶσθαι dicitur. In *Ci-
bis* nobis boves multa præbant, carnes nem-
pe, cerebrum, linguam, cor, jecur, lic-
nem, renes, omasum, intestina, pedes &
medullam, præterque ista, lac, ex quo caseus
& butyram paratur. *Carnis* præcipuus usus
est: & quamvis Ægyptii vaccinâ abstine-
rent, taurinâ vescerentur: Romani tamen,
ne amplius taurina caro venderetur prohi-
buerunt, quod ex ejus esu, pestilentia in
gravidis mulieres regnante Tarquinio Su-
perbo incidisset. Apposita est apud Home-
rum Heroibus, quod Athenæus notavit.
Lyfandro in Joniam proficiscenti bos & pla-
centa dono missa sunt. In regno Senega non
aliâ carne incolæ vescuntur. Prometheus,
teste Plinio, primus bovem occidit. Veteres
in conviviis lautis integros assos apposuisse
Aristophanes testatur. Turcæ quoque in
Asia minore seu Natolla, cum puer aliquis,
cujus parentes in re mediocriter lauta sunt,
circumciditur, integrum bovem, immisso
in ejus alvum integro vervece, qui gallinam,
cui ovum insertum sit, etiam in alvo conti-
neat, crassa fude infigere solent, & luculen-
to igne assare, qui à puere sanguine junctis
absumatur. Qualitatem bubulæ si spectes
Celsus ex domesticis plurimi alimenti & sto-
macho aptissimi decit, interque ea quæ mi-
nimè corrumpuntur. Hippocrates validam
esse testatur, sistereque, sed difficulter con-
coqui. Galeno minimè quidem est humida
pituitosa ac lenta, nocet tamen admodum
ob duritiem & in alterando difficultatem: &
quamvis alimentum corpori suggerat, non
mediocre, neque dissipatu facile: sangui-
nem tamen generat crassiorem. Quod si quis
temperamento naturali melancholicus ma-
gis fuerit, affectu aliquo melancholico pre-
hende-

Sine
Ira.

Vox.

Usus in
Cibis.Athen.
Dipnos. l.Plin. H.
N. l. 7. c.
36.Bellon.
obl. l. i.
c. 60.Hippoc.
de rat.
vi. l. 2.Sympa-
thia &
Antipa-
thia.Cælius
Rhodig.
Antiq.
l. c. l. 23.
c. 30.

Bruger. l.
13. c. 8.

hendetur, si largius ea vescatur. Lien etiam à tali succo quibusdam intumuit, quam mox cachexia subsecuta est. Pejoris verò boves sunt succi vere primo & medio dum teneriores herbas pascuntur, & graciles: melioris, cum herbae densescunt, & ad feniendum producendum festinant. Sale condita, & fumo indurata, Belgæ, Scoti, Angli & alii Septentrionales vescuntur. Medio potissimum Octobri & Novembri sale maceratur: ubi suspensa est, accensis, à quibusdam, juniperi ramis mox extinctis, suffitur. Nonnulli carnis colorem commendari putant, & rubescere magis, si aridis urticae fascibus suffiatur. Parcius verò & ista attingenda est: quippe parum aut nihil alit, vivitque diutissimè in stomacho, ac difficillimè perficitur, confecta, pessimum succum præbet. Censetur mediæ ætatis; & quæ laboribus fracta non est, utilior: vetulorum tamen sanguina promptior, viditque Brujerinus, quos Averni miserant, tam insigni obesitate graves, ut non nisi plastro impositos, qui emigrant, aliò transferre possent. Morbosos mactare, lege, præcipuis in urbibus cautum est: deprehensi, multa gravi mulctantur. Scilicet; vitiata caro vitiatos humores spiritusque generat, ipsa etiam per se sat gravis. Vitulina, tanquam temperata, optimi succi, grata gustui, facilis concoctionis & bonum generans sanguinem, ab omnibus laudatur, & multi hædinâ laudabiliorem sentiunt. Sed Crescentiensis, quindecim à partu diebus elapsis, occidendos esse monet: alii vix ante trigesimum ætatis diem matribus eripiunt: in multis Gallia tractibus, teste Brujerino, mensum unum, aliquando eo minus natos, nonnunquam sesquimensum, laniis traduntur. Romæ sæpe integro anno lactare permittuntur, & ab herbis & alio pabulo depellunt, Cupediaeque exinde lautissimæ, & Francisco I. Galliarum Regi in usu. Donatus Antonius Ferrus illorum carnes maximè laudat; qui à partu tribus aut quatuor mensibus remoti sunt, atque annum unum non diu transiere. Quantum ad juvenecos, commodiores quidem sunt adultioribus, sed inferiores vitulinis. Lugdunensibus anniculæ, semestres, bimæ aut trimæ juvenecæ placent. Brujerinis quæ venerem expertæ non sunt, laudabiliores existimat. De partibus jam videbimus. Vituli caput elixari, & calidum edi, notum. Cerebrum capiti exemptum seorsim modicè in aqua coctum; mox tunicis liberatum, in vino coquitur, & aromatibus aspergitur. De Maxilla, Cratinus teste Athenæo, ubi de forocupediæ agit, mentionem facit in Plutis. Ob bovinam maxillam pugnans. Lingua in Germania & Belgio in precio habetur. Sacris non erat olim adhibita, quod sacerdotes sub specie religionis eam sibi reservarent. Quidam condimentis farctam in

veru affant. Ubers, elixari solent, & mox additâ pinguedine, aut butyro, frigi in sartagine, aromatibusque aspersa inferri, Ventres inter cibos olim ab antiquis celebratos. Omasum inter gulæ cupedias olim, saltem apud Romanos, ex his Plinii verbis innotescit: Hoc animal tantæ apud priores curæ, ut sit inter exempla damnatus à populo Romano, qui concubino procaci rure omasum se edisse negante, occiderat bovem, actusque in exilium tanquam colono suo interemto. Lactes magnatum mensas cohonestant, & ab antiquis celebrantur. Τὸν χορδῶν enim, ut Dalechampius exponit lactium, ut Natalis Comes intestinorum, meminit Epicharmus. Sed ἀρκυάλη iisdem in usu. Nec Pedes rejiciuntur. Diogenes Cynicus quod crudum devorasset, mortuus est. Usus in Medicina quod spectat, Caro bubula tumorem sanat; & calida imposita panos & apostemata discutit, si Plinio fides est. Vaccinam veretro impositam ulcera ejus & epiphoras mirè sanare, Marcellus Empiricus prodidit. Ius carnis bubulæ ventris fluxus biliosos, teste Simeone Sethi, compescit: vaccinæ ulcera oris & rimas sanat; vituli, inter coeliacorum & dysentericorum auxilia recensetur. Caro vitulina, recens cum aceto cocta, madidaque aliis imposita, foetorem hirci tererrimum tollit: si cum aristolochia inassata à mulieribus edatur, circa conceptum, ut mares pariant, facit. Sorbitionem ex pedibus Brudi Lusitani, apud Aldrovandum vide. Iecur bovisustum potumque ventris & sanguinis profluvium prohibet, ut Haly prodidit. Ex vituli masculi & tantundem foliorum salviæ minutatim pariter concisis, collectus stillatitius liquor, contra durum in transversum in imo ventre supra pudenda tumorem prodest. Splenis bovis extractum in mensium suppressione opitulatur. Superstitiosa sunt & magica quæ Plinius prodidit. Omasi quoque jure poto, venena expurgari putant: privatim verò acconita & cicutas. A recentibus adhuc & calidis vituli extis minutatim concisis, liquor cum æqualibus parbtius salviæ & melissophylli extrahitur, quo membra frigida, tabida, & resoluta, perfricantur. Genitale in aceto maceratum & illitum, splendidam, teste Sexto, reddit faciem. Tauri rubri aridum tritum & aurei pondere propinatum, fastidium coitus adfert: recentiores venerem in viris excitare, affirmant. Medulla, vituli inprimis, inter emollientia censetur. Vaccineam cum farina tenui subactum, & instar excocti panis in cibo datam, mirè dysenteriam sanare Marcellus Empiricus scribit, maxime si & caseus bubulus recens manducetur. Taurina sicciore est, & in vino trita potataque torminosos emendat. Liquata & cum quarta parte myrrhæ rubentis & olei laurini tanto

Plin. H.
N. l. 8. c.
45.

Usus in
Medicina.

Hartmann. in
Chymia-
tria.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 13.
Gefner.
in Bove.

tanto mista, nervorum contracturas solvit, si ea pedes manusque diluculò & vesperi inungantur. Plinius bubulam ex dextro crure priore tritam cum fuligine, pilis ac palpebrarum vitiis angulorumque occurrere ait. Quantum ad *sebum*, de taurini præparatione ita Plinius. Quæ ratio adipis, eadem in his quæ ruminant sevi est, aliis modis non minoris potentie. Perficitur omne, exemptis venis, aquâ marinâ vel falsâ lotum, mox in pila tustum, aspersum marinâ. Crebrò postea coquitur, donè odor omnis aboleatur. Mox ossiduo sale ad candorem reducitur. A renibus autem, omne laudatissimum est. Si verò vetus revocetur ad curam, liquefieri prius jubent, mox frigidâ aquâ lavari sæpius, dein liquefacere affuso vinò quàm odoratissimo. Eodemque modo ac sæpius coquunt, donec virus evanescat. Quomodo odoramentis imbui debeat, Dioscorides docuit. Suillo est multò calidius & siccus, leonino temperatius, ad scirrhus & phlegmonas accommodum. Cum resina & creta Cimolia omnem duritiem discutit: Æsculapius cum cera imponi jubet, & fortè melius cum ad Galeni tetrapharmacum accedat. Vincit maculas in facie, cum semine cunilæ, ac cinere è cornu cervino, si canicula exoriente comburatur: Cum arborum resinis & melle panos & similia sanat: cum adipe ursina & cera permixtum, pari pondere, parotidas miro remedio comprimit: vitiligines cum strychno & ruta, nec non verrucas, strumas, & similia emendat. *Vitulinus* adeps ex foemine sublatus, cum aquæ cotylis tribus, decoctus, & sorbitionis more sumptus, cæliaco prodest. Cum sale tritus phthiriasi, & capitis ulceribus utilissimus est. Cum nitro modico permixtus, & ceroti instar testiculis impositus, tumores omnes & dolores persanare dicitur. Eundem contra venena quæ exulceratione enecant, valere Plinius alicubi scripsit. De eodem ita Marcellus. *Sebum vituli cum adipe anserino impositum, rimas scissurasque oris optimè jungit.* Rigores cervicis bubulo sevo optimè perfricantur, nam continuo mollescent, & dolor omnis abscedit. Efficax est vitiis sedis. Clavos sanat cum thuris polline: lepras, furunculos, lichenes, & pforas sal emendat cum passa uva exempta ejus ligno, & sevo bubulo atque origano ac fermento, vel pane. In furunculis illinitur sebum bubulum, cum sale, similiter & caprinum. Sole adusta sevo bubulo cum rosaceo aptissimè curantur &c. De Felle hæc habentur. Ulcera capitis, teste Marcello, subito sanari, si cum stercore asinini succo, & scillæ contusæ paulillo, fel taurinum misceatur: vel cum nitro, vino, & oleo quantum satis mistum, adhibeatur. Cum terra Cimolia, & nitro, lepras furfuresque exterere, Dioscorides testis est. Phagedænis & fistulis immitti cum

succo porri aut lacte mulierum, Plinius. Idem cum lana umbilico illitum, lumbricos egerit: cum melle anginis inungitur: sedis vitia ad cicatricem perducit: oculos hæmorrhoides aperit: in lana collectum, & alvo suppositum ventrem solvit: cum butyro, medullâ cervinâ, & oleo laurino perfricta genua sanat: Contra genitalium & scroti dolores, cum melle utiliter inungitur: prærygia digitorum aquâ calidâ dissolutum levat. Mulierem purgationes lana succida appositum juvat. *Bubulum*, melli admixtum, teste Rhafi, ferrum infixum vel spinam extrahit. Idem ad crassitudinem mellis subactum, & illitum, permixto alumine & myrrha, ea quæ veretris serpunt, mira celeritate persanare dicitur. De eodem ita Plinius. Panos & apostemata in quacunque parte fel bubulum discutit, ut sanguis etiam & caro bovis calida imposita. Cum oleo ci cino, & rosaceo æquis portionibus, aurium dolori & vitiis medetur: tinitum eorundem, cum gossypio impositum, dispellit. Sunt qui regium morbum pelli credant fascia lintea, in bubulo felle calido tinctâ, & corpori sub costis incinctâ: quod triduo faciendum ajunt, ita ut quotidie renovetur medicamentum. Hippocrates, si mulier non concepit, mensibus apparentibus, tertiâ aut quarta die alumen tritum unguento dilutum, lanâ exceptum apponere, & per tres dies appositum haberi: Tertiâ verò die, fel bovis radi, & ramentum oleo dilutum, linteo exceptum apponi & tres dies appositum haberi, post cum viro concumbere, jubet. Mirum denique est quod Prosper Alpinus scribit, nonnullas mulieres in Ægypto, ut pinguescant, in balneis accipere novem diebus, fellis vaccini chirat, in aqua vaccina dissoluti. De *Felle vitulino* scito, lendes cum aceto calefacto tollere: cicatrices oculorum extenuare, cum melle imprimis myrrha & croco tritum, auriculæ insertum cum felle vitulino & aceto, & exuviis serpentis, maximæ utilitatis esse: Cimices fugantur, si amurcæ coctæ mixtum cum oleo, eis insperferis. *Lapis* in felle bovis, figurâ annuli, Philosophis Alcheron, tritus & naribus attractus, aciem oculorum promovet, & prohibet, ne quis humor descendens in oculis colligatur: comitialibus prodest, si magnitudine lentis inde capiatur cum succo betæ, & hauriatur naribus. Est & *Corio* & *Glutini* suus in Medicina usus. Combusto illo sanantur teste Plinio, perniones, ex veteri imprimis calceamento: cum melle phagedænas in ulcerum genere abrodit: veteris verò soleæ crematæ cinis attritus calceamentorum sanat. *Glutinum* ex coriis boum excoquitur, taurorumque præcipuum. Præstantissimum fit ex auribus taurorum, & genitalibus. Nec quicquam efficacius prodest ambustis. Sed adulteratur nihil æquè, qui-

Alpin. de
Medici-
na Æ-
gypt. l. 3.
c. 3.

quibusvis pellibus inveteratis, calceamentisque etiam decoctis. Rhodiaceum olim fidelissimum, eoque pictores & medici utebantur. Hodie præstantius, colore fere spadiceo, quàm maximè durum, & vitri instar fragile, Germanicum cognominatur, & duplo carius vulgari, quod subnigrum est, venditur. Dioscorides xylocollan, quòd in lignis ferruminandis ejus sit usus; alii taurocollan vocant. Inventionem ejus Dædalo teste Plinio debemus, quo tenaci nexu hærent simul, quæ conjungi aptius non poterant. Scabiem abolet in aceto liquefactum additâ calce, si profunda non fuerit. Aceto remissum, adjecto sulphure, leni igne decoctum, ita ut ad mellis crassitudinem perducatur, furculoque ficulneo dum coquitur agitur, ac bis per diem impositum, impetiginis agrias, id est feras, sanat. Liquefactum, & tertio die solutum, recentes plagas ferro illatas, ad cicatricem perducit. Cum aceto & melle mixtum, lentes tollit. Medetur & dentibus aquâ decoctum illitumque, & mox paulò detractum ut confestim colluantur vino, in quo decocti sunt cortices mali punici dulcis. Bibitur etiam cum tribus obolis, cum calida aqua, in vetere sanguinis excretionem. Coeliaci quoque ventris inflationi cum eadem feliciter imponitur. *Cornu* mucro exustus, duorum cochlearium pondere, addito melle, in pillulis devoratus, Phthysicis prodest, si Plinio credimus. Combustum & in pulverem tenuissimum redactum, duorum cochlearium pondere, cum aquæ calidæ cyathis tribus, & paululo aceti, speneticico jejuno per triduum, bibendum rectè datur. Habet & *Ungula* suum usum. Elixæ & cum sinapi comestæ, veneno resistunt. Ustæ & à mulieribus quibus lac defecit, in jussulo, vino, vel alio liquore potæ, idem restitunt. Carbonibus impositæ mures suffitu enecant, vel aliò abigunt. Scobs tali cum melle pota, lumbricos educit, cum aceto mulso splenam minuit: vino excepta, & dentibus mobilibus apposita, eos confirmat. Frivolum, non tamen omittendum, inquit Plinius, propter desideria mulierum, Talum candidi juveni, quadraginta diebus noctibusque, donec resolvatur in liquorem decoctum, & linteolo illitum, candorem cutisque erugationem præstare. *Coxæ* uruntur bibunturque, ut Rhasis scribit, ut sanguinem fluentem & menses cohibeant. *Membrana* è partu madida faciei ulcera sanat. *Lapis* qui in capite invenitur, ex eadem aqua quam bos bibit, potus, dolorem capitis efficaciter tollit. *Lac*, utpote crassum & pingue minus per alvum secedit: Plinius tamen eo maxime alvum solvi scribit: ideoque per ver purgandi causa bibi, quod tum omnibus herbis & multum pascantur, Dioscorides addit. Venena, illa in primis quæ rosiones & unctiones adferunt, expurgat: privatim verò

contra dorycnium, colchicum, cicutam, & leporem marinum facit. Calefactum & gargarizatum tonsillarum dolores & tumores citò sedat. Tepidum incoctum subinde sumptum exulceratum quoque stomachum sanat. Cyathi unius mensura, cum pari sevi cervini remissi dosi, & pice præcoqua, quam viscosam vocant, rubricaque Scythica, quæ pissasphaltus dicitur, periclitanti phthysico mirè subvenit. Vaccæ nigræ, ut Hippocrates prodit, cum sesamo trito ad quadraginta dies, ex partu sanguinem vomenti bibendum, donec probè habeat. Idem decoctum, secundum Marcellum & Dioscoridem, exulceratos alvi fluores & tenesmum mitigat & tollit, recens mulctum, aut ad ignem decoctum, assidueque agitur, donec ad tertias sit reductum. In dysentericis addi mellis exiguum præcipiunt, ut Plinius notavit: & si tormina sunt, cornus cervi cenerem, aut fel taurinum cum vino mixtum, & cucurbitæ carnes umbilico imponere. Nec hoc tantum Aëtii, Galeni, & Plinii præceptum. Nostri enim temporis Medici idem faciunt, & in eo stomomasi ferri aciem optimam novies candefactam extinguunt, idque calidum ægro vel per clysterem exhibent. Propinabatur olim ab Hippocrate & alii liquorii immixtum. Is namque, cum vulnerato intestino respiratio prodit infernè in conspicua juxta vulnus, & evacuantur pectora, lac & vinum pari aquæ mensurâ admixtâ, dari jubet. Sed & Gesnerus testatur, aliquos adversus quartanas remedium prædicare, si ex ulno & lacte confusis, liquor in balneo Mariæ extractus per aliquot dies bibatur. *Butyrum* etsi gentium duntaxat barbararum laudatissimum cibum, quique divites à plebe discerneret Plinius dicat, magnarum tamen & hoc apud Galenum, Dioscoridem, & alios virtutum. Vitalis de Furno Cardinalis & medicus eximius, sic de eo scripsit. *Butyrum naturaliter calidum est*, & humidum, cum dominio caliditatis, viscosum, & unctuosum. Idem sæpè comestum, stomachum humectat, ventrem solvit, pectus lenit, ulcera pectoris & intestinorum sanat: maximè valet, quando recens humanæ complexionis proximum. Valet etiam ad leniendum pectus & pulmonem, curandumque maxime si ibi fuerit apostema; quia propria ejus vis maturare, humores & superfluitates omnes pectoris dissipare & mundificare, maximè si cum melle & saccharo comedatur. Butyrum repugnat venenis, membra humectat, asperitatem oculorum ejus litura mollicat & emendat, apostema dissolvit & maturat; vulnera pectoris, pulmonis, intestinorum morsus mitigat, nervos contractos emollit & laxat. Contra venena interna singulare est remedium, si is qui venenum potavit, in lacte calido solutum bibat abunde: nam suâ pinguedine meatus obstruit, ne vene-

Galen. 1.
3. de ali-
ment. fa-
cult. c.
15.

Dioscor.
M. M. 1.
2. c. 26.
Plin. H.
N. 1. 11.
c. 38.

Plin. H.
N. 1. 20.
c. 13.
& 1. 29.
c. 13.

venenum subito ad cor surrepat. Recens autem est laudabile, vetustum minus &c. Tantum Cardinalis. *Casus* dysentericis & coeliacis prodest. Hippocrates eodem in tertia tabis specie utitur. Donatus ab Alto mari casei Siculi glandem melle illitam, pueri ascaridibus laboranti contulisse scribit. *Serum* calidum an frigidum sit, alibi disputabimus: certum est crassitiem humorum extenuare, abstergere, & alvum subducere. Ideo veteres ad alvi subductionem frequentissime usi sunt, in iis inprimis, quos sine acrimonia purgare volebant, quales sunt, atrabile laborantes, comitiales, lepræ, elephantiascs, & toto corpore papularum eruptiones. Ante omnia orthopnoicis prodesse, cum nasturtio, apud Plinium habemus. *Urina* bovis castrati, succino usto & in ea extincto castigata, impotentiam tollit. Hippocrates eadem uterum muliebrem purgat, ut conceptus sequatur. Tauri urina lepras ac furfures tollit: capitis manantia ulcera sanat: & aurium dolores cum myrrha instillata, lenit. Denique, si major sit gravitas aurium, ut Plinius inquit, urina capri vel tauri, vel fullonia (id est humana) vetus calefacta prodest, vapore per lagenæ collum subeunte: admiscet & aceti tertiam, & aliquid urinæ vituli, qui nondum herbam degustaverit. De *Sanguine bubulo* scribitur, cum aceto & modicè sumptum, contra sanguinis rejectionem facere: canum rabiem recentem sanare; & abscessus, si cum sevo ad ignem emplastrum fiat, concoquere. *Taurinus*, teste Dioscoride, duritas, cum polenta illitus mollit: apostemata, in quacunque parte, aridus discutit: serpentes necat: & illitus maculas omnes de facie tollit: Pestiferum potu esse, quod celerrimè coeat ac dure scat, Midas Phrygiæ Rex, Psammenitus Ægyptiorum, Themistocles & alii, qui hausto periëre, exemplo esse possunt. Excipitur à Plinio Ægyra: urbs sine dubio Achajæ, ab Homero Hyperesia dicta. Ibi enim sacerdos Terræ, vaticinatura, sanguinem tauri bibit; priusquam descendat in specus. Symptomata, quæ ab illius haustu afficiunt, sunt, spirandi difficultas & strangulatus, faucium tonsillarumque præclusio, linguæ rubor, dentium infectio, & alia. Occurrere ei solent, amarantho, brassica, Caprifico, Calamintho, lasere, nitro, pipere, petroleo, soncho nigro, rubo, & thymo. De *Fimo* non est quod multa adjiciam. *Taurinus*, tumores & duritias solvit. *Bubulus* & ad chiradas & ad tumores omnes scirrhosos, ex aceto in cataplasmatibus formam compositus, imponebatur. Cum melanthio carbonibus impositus, si naribus hauriatur, hemicraniam medetur. Ad colicam dolorem recens, expressum, & cum vino dilutum, vehementer laudatur. Ex eodem tuso & cribrato, sterilius purgatorium paratur. *Vitu-*

lini vires non multum à bubulo discedunt. Marcellus statim subveniri scribit, si recens articulis laborantibus illinatur. Præbent verò & ad alia, quædam partes *usum*; ne de agricultura, frumentorum excussione, vecturâ, gestatione, bello, vel spectaculis quiquam dicam. Ex cornibus, præter pocula, Gutti, Cucurbitulæ, Lucernæ, litui, buccinæ, & arcus fiebant: ex corio, scuta, lorica, galeæ, parma, tentoria, navigia, scalæ, balthæa, nummi, bursæ, utres, folles, scuticæ, calcei & cætera formantur. *Esita*ta Pyrræi in Græcia, Rupellæ in Gallia obfidiones testantur. Ex extremitatibus gluten fit. Ex *nervis*, flagella fiunt fractu contumacissima, & quàm maximè flexibilia. *Dentibus* politur charta. Cleanthes philosophus, *osibus* bubulis & testis fictilibus perscribebat, quæ à Zenone audiverat, cum pecunia non suppeteret ad chartas emendas. Ex iisdem pulvis contra catarrhum & podagram paratur. *Sanguis* malthis faciendis, quod quam cæterorum animalium crassior sit, & citò coeat, dureturque, perquam accomodatus est. Vituli verò cum carnibus valdè concisis in vase fictili per decem dies detentus, inescationis piscium aptissima materia. Ex *sevo* laudatissimæ candelæ, juvencæ inprimis & circa trimatum. *Felle* bubulo femina macerari Apulejus jubet, antequam spargantur, adversus mures agrestes. Nec accedent ad arborem formicæ, si radici, vaccinum illinatur. Eodem & amurcâ Lycium adulteratur: & aureus ducitur color. Setis bubulis veteres ad scopas vestiarias, utebantur: & pictores suos exinde habebant penicillos. Troglodytæ senio confecti, Diodoro teste, gutture bovis cauda adstricto finiebant vitam. *Fimo* Chineses pisces alunt, ut pingues evadant. In hoc vaccarum fimo casæ adversus pulices inunguntur, ut Linschotanus prodidit. *Ungulis* bestiolæ à vitibus arcentur. *Differentiæ* boum plurimæ dantur, à magnitudine, cornium varietate, variarum partium à naturali constitutione deflexu, loco, & aliis. Aden insulæ, quæ fortè Madoce & Ocellis veteribus, vaccæ camelum magnitudine æquant, nivis instar candidæ, sine cornibus, auribus proceris, ac pendulis, si Francisco Alvarezio credimus. Ægyptios boves Græcis majores Aristoteles pronunciavit. Æthiopici in Pretegani regni tantorum cornuum ut ex iis vascula quæ quinque sexve metretas singula capiunt, formentur. Africanæ sunt tam parvæ vaccæ, ut vitulorum nostratium magnitudinem vix æquent: sed multi roboris & laboris patientissimæ. Idem de Alpinis seu potius Altinis (Atinum urbs olim in littore Venetiæ florentissima juxta Aquilejam) Plinius reliquit. Anglici boves cornibus & miro carniis sapore superbiunt. Americani

Differentiæ
tæ.

Alvarez:
de Æ-
thiop. c.
119.

in partibus septentrionalibus, carent palearibus & gibbosi conspiciuntur. In Dariena, teste Lopezio, ungulis sunt minimè bifidis, mulis non absimiles, magnis auribus, promuscide elephantis, colore cinereo, carne delicatâ. Ex Hispania in Hispaniolam de vectâ vaccæ, in tantam fœcunditatem excrevere, ut una vacca proletaria, in viginti sex annis, octingentos fœtus ediderit, dum ex filiis filii rursus procreantur. Aoniorum boum variis coloribus distinctorum perpetuæ indivisæque sunt ungulæ, & unum ex ore egrediens cornu, quod Ælianus prodidit. In Arabia vidit Vartomannus Sultano donatas vaccis, quibus erant cornua cervinis similia, colore nigro: quibusdâ & unicornu in fronte. Apud Arachatas, boves sunt sylvestres, teste Aristotele, colore atro, rictu leviter adunco, cornua resimantiora gerentes. Armeniis duplex cornu, sic erratis flexionibus si Æliano fides, tanquam hedera retorqueretur, & si mucrone petitur, ob corneam duritiem, ferrum retunditur. In Bengala provincia, M. Paulo Veneto auctore, crassitudine elephantos æquant. In Hollandia vere, plæræque quæ maculosæ, plurimum lactis habent. Aliquibus partibus diebus æstivis, quatuor & quadraginta lactis hæminas singulæ in mulctralia refundunt. In Nosocomio Amstelodamensi, quod Leproforum domus dicitur, viginti duæ tenentur vaccæ, ex quibus aureos circitur quingentos in lacte & caseis, præter quod in usum quotidianum cedit, quotannis confici, à fide dignis se audivisse Pontanus prodit. Non est ergo mirum, ex caseo & butyro ibidem, quæ in exera loca exportantur, in singulas annos ducentis sestertium, id est, decies centena Caraleorum millia cogi, quod apud Hadrianum Junium legimus. In Scotia boves sunt sylvestres colore candidissimo, juba densa ac demissa, truculenti & feri, adeoque ab humano genere abhorrentes, ut ab iis quæ homines vel manibus contrectarint, vel halitu perflaverint, permultos dies abstineant, dolo capti, moriantur. Carnes cartilaginofas habent. In agro Camanduano, (verba sunt Scaligeri,) boves ajunt esse maximos, brevibus tamen cornibus & hebetibus. Nulla macula candor vitatur. Camelli gibbus eis & robur par. Onera suscepturi, camelorum more ad agasonis jussu genua flectunt. Haud scio, an eosdem intelligat Plinius dum scribit: Carici boves, in parte Asiæ fœdi visu, tubere super artus à cervicibus eminente, luxatis cornibus, excellentes in opere narrantur: cæteri nigri coloris candidive, ad laborem damnantur. Cyprii boves stercore humano pascuntur. In urbe Diu, citante Majolo, boves sunt exigui, prægrandibus & rectis cornibus, sed præter oneris ferendi industriam, & sub freno currere & equitare dociles, equorum

gradariorum more. Epiroticæ vaccæ, scribente Aristotele, amphoras singulas singulæ implent lacte. Erigitur qui mulget, aut paululum se inclinat: quoniam sedendo ubera contingere nequit. De bobus ibidem, quos incolæ Pyrrhicos vocant, ita Plinius: In nostro orbe Epiroticis laus magna, à Pyrrhi, (ut ferunt) jam inde regis cura. Id consecutus est, non ante quadrimatum ad partus vocando. Prægrandes itaque fuere: & hodieque reliquæ stirpium durant. At nunc anniculæ ad fœcunditatem poscuntur: tolerantius tamen bimæ. In Eubæa boves ferè omnes albos Odoardus Barbosa affirmat; quam & argyroboxon Eubæam Poët dixere. In *Galata* Africæ monte boves Italicis octimestribus vix pares, cum senuerint, Leonius testatur. In regione *Garamantum* aut vicinia quadam, præposterè pascuntur, si Herodoto fides. Nam si rejecta (vel potius rejecta) ad pastum ora dirigant, officiunt pronâ in humum cornua & obnixa. *Helvetii* à teneritudine carnis, cum alibi, tum maxime juxta Zofingam oppidum agri Bernensis commendantur. In *India* sunt unicornes & tricornes, solidis ungulis, nec bifides. Iisdem Plinius altitudinem camelorum tradidit, cornua in latitudinem quaternorum pedum. Allatum ab inde Ptolomæo II. cornu, quod tres amphoras capiebat. Ibidem pares equis currunt. De iis fortè Plinius dum ita scribit: Atrocissimos habet (scilicet India) tauros sylvestres, majores agrestibus, velocitate ante omnes, colore fulvos, oculis cœruleis, pilo in contrarium verso, Rictu ad aures dehiscente, juxta cornua mobilia, tergori duritia filicis omne respuens vulnus. Feras omnes venantur: ipsi non aliter quàm foveis capti feritate semper intereunt. An sint illi, quorum caudas tenues admodum & tenuis pili, tantique piretii, ut singulæ quatuor vel quinque ducatis æstimentur, Sanguiaci & Bassæ Damasci adhibent, ignoro. Legimus etiam dari in India bovem, & indigete voce Ignaragnam nuncupari, dicique habitare juxta castrum S. Spiritus, aliisque quibusdam locis ubi frigus remissius est. Animal esse immensæ molis, vescique herbis duntaxat, quæ rubri sint coloris. Corporis mole nostrates boves superare, pellem habere similem elephantis, bina juxta pectus brachia, sub quibus mammæ lateant, quibus fœtus suos enutrit. Capite atque ore boves nostrates referre. Carne esse suavissima, Indisque præcipuè expeticâ. Ex pinguedine liquamen parari butyro simile, quo in condiendis cibis utuntur. Ossa ejus duricia ebori vix cedere. *Vembri* præcipue circa Clitumnum amnem sunt quoque celeberrimi. Plinius scribit, eam oram gignere omnium Italiæ maximos, in quibus plurimi sint albi. *Sabinis* quoque spectati sunt: & legimus apud Livium, bovem olim in Sabinis cuidam patri-

Aristot.
H. A. l.
2. c. 1.

Pontanus
Amste-
lod. l. 2.
c. 23.

Scalig.
Exercit.
206. 6.

Plin. H.
N. l. 8. c.
45.

Arist. H.
A. l. 3. c.
21.

Plin. H.
N. l. 8. c.
45.

Ælian. H.
N. l. 12.
c. 36.

Herodot.
l. 4.

Ælian. H.
A. l. 3. c.
34.

Plin. H.
N. l. 8. c.
21.

Bellon.
obs. l. 2.
c. 92.

trifamilias miranda magnitudine ac specie esse natum, cui monumentum miraculo fuerint Romæ in vestibulo templi Dianæ, fixa per multas ætates cornua. *Leutricorum* boum cornua atque aures ex una stirpe cognata, atque simul contexta esse testatur Aristoteles, ut citat Ælianus. In *Cathaje* provincia quadem sunt albi & nigri, equina cauda, sed pilosiore, ad pedes usque protensa: pilos habent subtilissimos in modum plumæ volatilis, magno pretio, quos equites in cacumine lancearum suspendentes, ægregia nobilitatis insigne ducunt. Cornua ab occipite in spinam tanta longitudine extenduntur, ut elevato capite cornibus attingant caudam. Sunt autem grandi cornua, ut incolæ amphorarum loco eisutantur. Apud *Mysios* nulla boves habent cornua, teste Æliano. Apud *Nigros*, nullæ vaccæ ruffæ, omnibus color niger vel albus, vel ex utroque mixtus. In Nomadibus qui ad Mæoticas paludes hyemant, & dies æstivos in camporum æquoribus vivunt, ex bobus pars sine cornibus nascitur, pars ferrulâ abscinditur. Tauri Pæonii, ut scribit Pausanias, hirto sunt corpore; cum omni ex parte tum præcipuè pectoribus & mentis. Theopompus verò referente Mizaldo apud *Pæonas* tradit boves tam magna gestare cornua, ut tribus vel quatuor vini sextariis vix adimplerentur; ex iisque reges ac proceres poculâ conficere labris ebore aut argento obductis. *Hungaria* tam eorundem abundans, ut Sigismundus Baro Herbersteinus reliquerit, per solam viam Viennensem uno anno plusquàm octoginta millia boum in Germaniam acta esse. Regio Comandu ab ejusdem urbe appellata in Persia, boves habet maximos & in universum candidos, cornua brevia & minimè acuta in capite gestantes, camelino gibbo dorso eorum imminente, teste Paulo Veneto. Unde tam robusti, inquit, redduntur, ut ad magna onera gestanda faciliè assuefiant. Habentur tales & in Quivira. Tauri ibi (inquit Nierembergius) quoddam genus sylvestre, fulva specie, humili corpore, incurvo dorso, frequentibus jubis, & laciniis promissis, eduli carne, salubri, nec injucunda. Cauda vescuntur incolæ, epotato cruore: pellibus proteguntur. *Phenicum* vaccæ ejus sunt magnitudinis, ut *Phoenicum* libri apud Ælianium habent, ut vel procerissimi pastores cum mulgent stent, minus proceri scabellum ascendere cogantur. In *Phrygia*, prodeunte Aristotele, boves cornua ut aures movent, quod & de Erythræis Ælianus prodidit. In *Norvegia* Islandia, Gothia, Feronia, sunt quidam sylvestres, nec homini nec aliis quadrupedibus parentes, quibus cornua vulgaribus minora, sub mento barba prolixa dependet. Venatores inter arbores se abscondunt: ipsi verò ab iis vulnerati vel in-

juriam ulciscuntur, vel seipsos interimunt. Facit & Vaccæ marina Olaus Magnus mentionem, atque de ea sic scribit. Vacca marina monstrum est magnum, robustum, iracundum, & injuriosum, edens partum sibi similem, sed non supra geminum, unum tamen sapius, quem plurimum diligens, secum sollicitè ducit, quocunque tandem se per mare transmittit, aut in terra gressus dirigit; decem mensibus imprægnatur. Deum hoc animal aliquando CXXX. annis, per caudæ ipsius amputationem vixisse probatum est. In aquilonaribus quibusdam novi orbis provinciis, exertos elephantum modo dentes habent, si Carterio apud Rhamusium credendum. In *Cavista* Scotiæ provincia supra Gallovidiam boves sunt, quorum caro tenera suavisque esui est, cæterum pingue nunquam concrefcit, olei liquidi modo ferè semper fluens. Varro denique tradit, boves juxta Toronam, paucis ante partum diebus, lacte carere: reliquo tempore habere perpetuo. Ventrem ferè decem menses. De bobus Tartaricis in Ergimul, qui sunt elephantum proceritate pilo perenni, levi, ac prorsus albo aut profus nigro, qui in humeris more leonum prælongus est, non minus pedes tres, mira mollicie, perinde ac sericum, superius dictum. Ut & de gibbosis, quales Tartaricos Scaliger, Syriacos, qui palearia non habent, Plinius esse ait. Et tantum de Differentiis promiscuè. Huc pertinet animal, quod in Congo *Empalanga* vocitant, figurâ & magnitudine bovem referens, nisi quod & caput & cervicem gerat erectam cervorum more, cornua quoque habeat in capite recta & longa, nodosa in summitate, interius parum inflexa: quod quamvis etiam sit sylvestre, nemini tamen est molestum; neque adeo etiam est ferum, quia facili negotio aratro, si ad esset incolarum aliquod ingenium, accommodari posset. Quantum ad Monstra, visus est Mediolani & Saturæ vitulus biceps: visus in Thuringiæ vico Sextipes, illeque gemino capite & uno podice: visus & septipes, massam carnis è latere dependentem gestans. Visus oculis, naribus & auribus humanis: biceps duplici facie: quodammodo bicorporeus: duobus tantum posterioribus pedibus & agninâ facie. Visus Basileæ Rauracorum an. 1551. bos quinque pedibus, qualem nos olim Londini in Anglia vidimus, alibi alius cervice cornu gerens: & cruribus brevibus instar nani. Monstrum bicorporeum erectum quinque auribus, ut & caput vituli hic etiam expressum habebis.

Nierem.
H.E. l. 9.
c. 19.

Ælian.
H.A. l. 2.
c. 51.

Paulus
Vener.
l. 1. c. 22.

Nierem.
H.E. l. 9.
c. 51.

Ælian.
H.A. l.
16. c. 33.

ARTICULUS II.

De Bobus feris.

PUNCTUM I.

De Uro.

BOves feri, Græcis ἀγρῆς qui ab agresti-
bus ἀγρῆς in eo differunt, quod hi
quanquam mansueti sint & ex mansuetis or-
ti, liberi tamen solutique in montium, sylva-
rum & agrorum pascuis relinquantur; illi
verò non tam natura loci quàm naturâ pro-
priâ & genio ferè sint, sunt *Urus*, *Bison*, *Bo-
nasus*, *Bubalus Africanus*, *Buffelus*, & *Bos
Strepsiceros*. Uri nomen Gallicum Macro-
bius facit, Gesnerus & Aldrovandus Ger-
manicum potius. Uri enim vel sylvestrem,
vel magnum, vastum, & maximarum virium
Germanis antiquis significabat. Servius ta-
men Græcum esse vult, & ab ὄρεω id est,
montibus deducit. Polonis saltem in Maso-
via & Samogitia *Tur* vocatur, quem Gesne-
rus veterum Tarandum esse judicat. Li-
thuanis *Zumbronem* dici, Scaliger se inve-
nisse tradit. An Rhezes Iphicratis sit, alibi
disquiretur. D. Hieronymus. *Bubalum* ap-
pellat, quod & Martialis, & imperitum Ro-
manorum vulgus, teste Plinio, faciebat.
Cromerus *misontem* appellat. In *Descriptione*
discrepant aliquantulum authores, nisi for-
te diversa eorum sint genera. Cæsar & Pli-
nius nullam villorum mentionem faciunt:
Erasmus Stella, tempora villosa, & mentum
barbatum, ipsis adscribit; quod & apud Al-
bertum Magnum invenies, qui urum cum
bonaso confundit. De cætero magnitudine
sunt paulo infra elephantos, ut Cæsar pro-
didit, specie & colore & figura tauri. Alber-
tus longitudine aliquando quindecim cu-
bitorum facit. Magnitudinis illius hoc etiam
est argumentum, quod in capite inter cor-
nua tres homines confidere possunt. Hispi-
dum habet & villosum corium, & sub mento
palearia. *Cornua* densa, nigra, breviora; *Oculi*
versus exteriorem canthum rubicundi. *Caput*
crassum. *Facies* lata. *Color* ferè niger,
sed maximè in temporibus, mento, collo.
In facie, lateribus, cruribus, cauda, ad puni-
ceum vergit. Reperitur in sylva Hercynia,
Podolia, Samogitia, Mazovia, & Hungaria.
Adsuescere ad homines, & mansuescere, ne
parvuli quidem excepti, possunt. Excellen-
tium est virium & velocitatis. Cornibus
equum cum sessore correptum, in sublime
identidem jactat; & arbores mediocri cra-
ssitudine evertit. Caro ejus condita in deli-
ciis est magnatibus. Cornibus Barbari Sep-
tentrionales potant, unasque binas capitis
unius cornua implent. Aliis præfixa his pila
cuspidant. Apud nos addit Plinius, in lami-
nas secta translucent: atque etiam lumen la-

Hieron.
l. 3.
Com. in
Amlos.
c. 3.
Plin. H.
N. l. 8. c.
15.
Solin.
Polyhist.
c. 25.

Albert.
H. A. l. 22.

Plin. H.
N. l. c.

tius inclusum fundunt, multasque ad deli-
tias conferuntur, nunc tincta, nunc sublita,
nunc quæ cerosstrata picturæ genere dicun-
tur. Fortè & taurus ille sylvestris, qui Ma-
cedoniam vastabat, ad pedem Orbeli mon-
tis Macedoniæ à Philippo Rege confossus,
cujus pellem & cornua ὄρυσσῃ vel παραπαν-
δουδῃ id est, quatuordecim palmorum,
in vestibulo templi Herculis consecravit,
urus erat. De capiendi ratione, vide Aldro-
vandum.

Aldrov.
de Bisul-
cis l. 1. c.
2.

PUNCTUM II.

De Bisonte.

Bisontis vocabulum ab Germanico Vi-
sente dictum est. Oppiani codices βίσων
habent, à Bistonìa fortè Thraciæ sylva, sed
malè. Dion βίσωνες vocat. Plinius & ex eo
Solinus, boves feris similes esse dicit, fetos-
cos, colla jubis horridos. Oppianus, jubam
circa armos terribilem in crassâ cervice qua-
tere ait, nec non circa maxillas aut mentum.
Cornuum mucronibus esse hamatis & adun-
cis, non inter se reflexis, sed sursum versus
furgentibus, ut Gyllius vertit. Seu ut Ges-
nerus, non esse patula vel extensa, ut in cæ-
teris bubus, nec è regione in diversum ad
latera abire vel extendi, (epicarsion enim
transversum est) sed rectâ surgere, ita ta-
men ut ὀπίσθῃ sint, id est, dorsum versus in-
clinent, & circa finem hami inter tum recur-
va tum acuta sint, unde κίοντα ab acumine
vocantur. Surrio jubati sunt & villosi circa
collum, & in armos barba à mento propen-
dente, pilis moschum redolentibus, capite
brevis, oculis grandioribus, & torvis, quasi ar-
dentibus, fronte lata, cornibus plerumque
adeò diductis & porrectis, ut in iis tres benè
corpulenti homines insidere queant. Inter-
go extat gibbus elatior priore, & posteriore
corporis parte humiliore. Cornu Gesnerus
apud aurifabrum argento includendum vi-
dit, nigredine splendens, duos dodrantes
longum, aduncum instar unguium in rapa-
cium avium genere. *Linguam* Oppianus as-
peram habere ait, ut cum lingit, sanguinem
eliciat. De usu in Medicina hoc duntaxat
habet Plinius. *Uros & bisontes Græci in ex-
perimentis non habuerunt, quanquam bove fero
refertis Indiæ sylvis: portione tamen eadem
efficaciora omnia* (quam ex domesticis scili-
cet bubus) *ex his credi par est, videlicet quoad
medendi vim.* Hujus generis fuerint Tauri
Floridæ novi orbis insulæ, quos *Butrones*
barbari suâ linguâ nuncupant, prodente
Ambrosio Pareo. Cornua gerunt pedalia,
gibbum in dorsos Camelino similem. Pilo
sunt prolixo & fulvo, cauda leonina. Nun-
quam cicurantur. Ex pellibus fiunt tegmi-
na, quibus baillari adversus hyemis vehe-
mentiam utuntur. Cornibus verò quibus
alexi-

Aldrov.
Histor.
Bisulc. l.
1. c. 3.

Plin. l. c.

Oppian. l.
2. de ve-
natione.

alexiteriam vim inesse sibi persuadent, adversus venena se muniunt. Huc pertinet & *Bison Scoticus*. Candidissimum esse ajunt, in formam leonis jubam ferre, cætera mansuetis simillimum, verum adeò ferum & indomitum, humanique consortii hostem, ut quas herbas aut frutices humana contrectatas manu senserit, plurimos deinceps fugiat: captum autem arte quadam, mox præmoestitia mori. Cum verò se peti senserit, in obvium quemcunque magno impetu irruere.

P U N C T U M III.

De Bonaso.

Aldrov.
de Biful-
cis l. 1. c.
4.

Aristot.
H. A. l. 4.
c. 7. ed.
Scalig.

BOnasus, Aristoteli βόναςος, & βόλιος, Pæonibus μόνανος, sive ut alii scribunt μόνανος incerta origine dicitur. Augustinus Niphus ab Alberto Magno qui Bonasum & Urum confundit deceptus, vaccam Indicam à recentioribus vocari scribit. Ita verò eum Aristoteles describit. Bonasus nascitur in Pæoniæ monte Mestapio, qui separat Pæoniam à Media regione. Vocant eum Pæones Monapum. Tauri est magnitudine: sed bove crassior. Neque enim longus est. Ejus corium distentum capit quantum est septem convivis. Cæterum species bovis est, nisi quòd habet jubam ad summos usque armos, sicut equus, verum pilus ejus mollior quàm equinus, & demissior: color pili flavus. Longus etiam crinis ad oculos usque pertitens. Color ejus inter cinereum & rufum: non qualis equarum quas Paroas vocant: sed squallidior atque subtus lanaceus. Atri aut gilvi vehementer, nulli sunt. Vocem finilem bovi habet. Cornua autem curva & adverso inter se flexu curva, atque inutilia ad pugnam: magnitudine palmi aut non multo longiora: crassitudine singulis, quanta capi possit, non multò minus semitextario. Nigredo autem pulchra & nitida cornu est. Antiæ verò ad oculos usque pertinent, ita ut in latus potius, quàm antrorsum propendere videantur. Superioribus caret dentibus, sicut bos & alia cornigera omnia. Ciura autem hirta, & est bisulcus. Caudam habet minorem quàm pro sua magnitudine: majorem tamen bubulâ. Spargit pulverem & terram fodit, tauri more. Corium est adversus ictum validum. Carne est suavi: idcirco eum venantur. Percussus fugit: delassatus subsistit. Tuetur sese calcibus, & stercore, quod ab sese quaternis passibus (pessimè Plinius trium jugerum longitudine posuit) ejaculatur. Cujus usus perfacilis est. Sæpè verò etiam comburit, adeò ut deglabrentur canes. Perturbato verò atque perterrefacto potest hoc efficere sterco: pacato non comburit. Ferae facies ac natura talis est. Imminente autem tempore pariendi, universi

Plin. H.
N. l. 8. c.
15.

in montibus pariunt: ac priusquam sobolem edant, circum locum alvum exonerant: tanquam ponentes munimentum. Emittit hæc fera largam quandam copiam excrementi hujus. Hucusque Aristoteles, ex quo sine dubio, quæ de hoc animali, apud Plinium, Solinum & Ælianum habentur, desumpta sunt. An cornua, vertebra, omoplata, & costa, prout eas Caimus ad Gesnerum describit, hujus animalis fuerint, incertum est. Cornuum longitudo pedum duorum erat, palmorum trium & digiti semissis: in ambitu ubi capiti jungebantur, pedis unius & palmi semissis. Spacium frontis inter cornua palmorum Romanorum trium cum semisse. Vertebra erat tantæ magnitudinis, ut nisi longitudine trium pedum Romanorum, & duorum palmorum cum semisse circumdari potuerit. Costa longitudinis sex pedum erat. De omoplata taceo. Iconem Capitis & ossium, apposui.

P U N C T U M III.

De Bubalo veterum.

BVbali nomen confusum quidem non solum hodie sed & Plinii ævo fuisse videtur: nec peculiare aliquod apud Græcos nomen habet, & multi diversos sylvestres boves, præsertim in illis regionib. ad quas aliunde adducuntur, bubalos appellant: quidam bubali, inter capreas relato, commune nomen esse volunt: nos tamen ab isto distinguimus: eumque sylvestrem bovem intelligimus, quem Aristoteles timidum esse, & sanguinem fibris carentem habere scribit, & qui cum Bove Africano idem est. De eo ita Scaliger, Bubalin, cujus sanguis & instrumentum pugnae cornua ab Aristotele descripta sunt, Plinius ait esse vitulo similiorem (cervove:) Quid igitur ea sit? An Gazella? non sanè. Quare quod ex Africanis historiis percipere potui, tibi libentur impertitum curabimus. Africanorum boum parvitas tanta est, ut nostratium vitulorum vix æquent magnitudinem. Multi tamen roboris, ac doloris patientissimi sunt. Dant autem & Lant, & Elant invenio appellatum. Facie bubula est, sed ut minor, ita multò agilior & expeditior. Ejusmodi fertur esse celeritate, ut cursu feras omnes antevertat. Corium adeò firmum, ut cuivis telorum ferreo generi sit impenetrabile. Sclopi tamen globulo pervium. Pilus eis albet. Æstate capiuntur, quod araneorum fervore ungulae moveantur ac vacillent. Tantum Scaliger. Bellonius alium Bovem Africanum ita describit: Jam ætate, inquit, grandis erat, corpore minor cervo, sed habitiore & majore quàm caprea, tam quadrato & benè formato corpore, ut oculis gratus esset ejus aspectus. Nam ejus pilus flavius, adeò splendens &

Aldrov.
Hist. de
Quadrup.
l. 2. c. 5

Arist. H.
A. l. 3. c.
6.
Scalig.
Exercit.
206. f. 5.

Bellon.
observ. l.
2. c. 50.

lævis erat, ut expolitus videretur. Alvum magis rugis ruffam ad flavum colorem tendentem habet quàm dorsum, quod ad fuscum accedit. Bubuli pedes, brevique & firma illi sunt crura: Collum crassum & breve, exiguis præditum palearibus: Caput bubulo simile: cujus vertici insident cornua nigra, & admodum in curva, ut Gazellæ, lunæque crescentis in modum inflexa, quibus haud multum se tueri potest, cum in sese sint recurva. Bubulis auribus præditus est, armos sublevatos & plenos habet: caudam ut Camelopardalis usque ad poplites promissam, nigris pilis fultam, duplo quàm equini crassioribus. Bovis mugitum habet, sed non adeò sonorum. Diversus est ab hoc ille, cujus iconem Horatius Fontana ad Aldrovandum misit. Capite enimerat colloque longè procerioribus atque exilioribus: cornibus item retro inflexis, & ut in rupicapra incurvis. Aures pro capitis proportionem habebat majusculas, juxta colli initium: faciem cervinam, aut capreolum potius quàm bovem referentem. Quare à quibusdam inter Africanos capreolos referebatur. Totum animal excepto rostro & cornibus quæ nigricabant, flavescerebat. Pilo erat longiusculo.

PUNCTUM V.

De Buffelo, & Strepsicerote.

Aldrov.
Histor.
Quadrup.
l. 2. c. 6.

Buffelum seu Bubalum vulgarem diversum à Bubalo Aristotelis esse, vel ex collatione historiarum utriusque patebit. Videtur autem eum inter boves sylvestres nullo expresso nomine reposuisse, dum scribit apud Arachotos (Indiæ civitatem) boves sylvestres esse, qui differunt ab urbanis, quantum inter suos urbanos & sylvestres interest: colore atro, corpore robusto, rictu leviter adunco, cornua gerunt resupnatiora. Fuerit que fortè etiam iste noster buffelus, bos ille sylvestris niger, ex quo si sanguine ricini lumbi perungantur, mulieri tædium veneris fieri dicit Osthanes apud Plinium. *Descriptio* nostri sic habet. Animal est bovi simile, sed majus altiusque corpore valde crasso, cute durissima, membris macilentis. *Pilos* habet nigros, paucos, & parvos, in cauda ferè nullos. *Frons* est aspera, crispa, & intricata pilis. *Caput* ut plurimum pronum ad terram, parvum pro proportionem totius corporis. *Cornua* longa intorta & nigra. Albertus aliquando interius juxta collum dependere versus internam pectoris partem ait, aliquando erecta esse: *Collum* est crassum longumque. Inferior *dorsi* pars caudam versus declivis. *Cauda* ipsa brevis, parva, & nullis ferè pilis. *Crura* crassa, robusta, & reliqui corporis respectu breviora. Frequentissimè in Asia, Græcia, Ægypto, insula Borneo, Siam, Italiæ urbibus reperiuntur. Circa Fundi quam plurimos vidimus. In aquis morari gaudet. Mugitus eis terribilis. Lac buffela habet, & tempore coitus, & in

principio partus, ut Niphus annotavit. Intuitu mansuetudinem præseferunt: irritati, (irritantur rubro colore) indomiti evadunt. Persequendo recta fertur, neque declinat. Crescentiensis tradit, ubi irascitur aquam ingredi, & se mergere ad os usque ut sanguis æstuans restinguatur. In hoc genere vacca alterius generis vaccæ vitulum non admittit, sed odore agnitum rejicit: sin autem vitulus vacchino stercore illinatur, decepta odore, lactat & pro suo educat. Laboris est patiens. Ferreus aut æneus circulus per nares ei trajicitur, cui alligato fune, vel habena, ducitur ac regitur. Tradunt si nimium sit onus decumbere, nec vel verberibus posse ad surgendum cogi, nisi levato prius onere. Carnes ipsorum Romæ venales prostant, & Iudæis sapore suo blandiuntur: verum tanto lentore præditæ sunt, ut in parietem adactæ tenacissimè adhæreant. Casei, quos Pistoriensis ager copiosè subministrat, Marzolinorum nomine, figurâ ferè ovali, bubulis longè præferuntur, utpotè palato gratiores. Ex ungulis vel cornibus annuli fiunt, quæ si in digitis vel manuum vel pedum subinde gestentur, mirificè adversus spasmos laudantur. Sunt qui iisdem quaterna fila ex totidem metallis, auro, argento, ære, & ferro fabricata innectunt, sic efficaciora futura credentes. Ex corio fiunt vestes ac præcipuè thoraces. In Narfinga equorum ornamenta eo teguntur. Siamenses ex cornibus arcus conficiunt. *Bos Strepsicerotus* à turbinata cornuum constitutione ita dicitur. Facie capreolo potius quàm bovi similis est. Caudam tamen bubulam habet, quamvis breviusculam. Totum animal colore cervo ferè simile.

Aldrov.
Histor.
Quadrup.
l. 2. c. 7.

ARTICULUS III.

De Ove.

Abovis historia ad Ovis descriptionem transimus, Ægyptiis olim sacræ, & apud Athenienses tanti æstimmii, ut & actio contra eum institui juberetur, qui vivum excoriatum arietem, ut Plutarchus testatur; & antiquâ lege statutum esset, ne quis ex grege centum capita habente, pecudem intonsam aut quæ non peperisset, jugularet; quod apud Athenæum habemus; qui etiam addit, suo tempore in palladis sacrificiis, neque agnam mactatam, nec caseum gustatum fuisse. Adde, apud Romanos; olim non nisi ovium boumque impendio multam dictam, prodeinde id Agellio: ibidem homicidii noxium, pœnam arietis damno luisse, ut in legibus Regum, scribente Servio, extat; oves denique olim apud Persas, & Medos inter tributa numeratas fuisse. Cappadoces enim Persis L. M. Medi duplum pendebant. Et ne longius abeamus, scribit Ambrosius Nolanus, à Stabiis quotannis magnum & album agnum, cum cornibus auratis, Nolam ad Præfulem tributi honorisque nomine mitti. Nil interim de eo dicam, quod agnina caro

Plut. de
esu. carn.

Athen.
Dipen.
l. 9.

Agell.
l. 11. c. 1.

Nomen.

caro iis qui gryphos enodabant, nec non poëtis, præmium erat. Unde *Αριόδοτος* dicebantur, qui agni præmia canebant. Inter *Nomina* Ovis apud Latinos est, Ovis, Aries, Agnus, Adasia, Minæ, Apicæ, Lanata, Bidens, Pecus. Ovis nomen est foemellæ. Festus tamen ab antiquis masculino genere, cum de multa scilicet agebatur, usurpatum scribit. Ab isto vocabulo est *Oviaria* ovium multitudo, à qua & *oviarium* pecus dicitur. *Aries* vocabulum est maris: *Agnus* illius quæ nondum annua excessit. *Adasia* vocatur, teste Festo, vetula recentis partus: *Matrices*, quæ agnos nutriunt Palladio, quas Florentinus *τοκίδες* dixit, pascuales, quæ passim pascuntur. *Minæ* quæ ventre sunt glabro. *Apicæ* quæ non amplo sunt corpore, nec multam lanam circa totum corpus habent. *Lanata*, epithetum ovis est, sed sæpè pro ove ponitur. *Bidentes* sunt oves duos dentes longiores cæteris habentes, quales in hostia esse debebant. Dicuntur & *Ambidentes*, & *Duidentes*: quamvis & apud Festum *ambidens* & *bidens*, quæ superioribus & inferioribus est dentibus, vocetur. *Pecorum* nomen iis quidem animalibus accommodari solet, quæ sunt aut ad vescendum apta, aut usui hominum accommodata: Plinius tamen pecudem sapiissimè pro ove ponit. Apud Græcos haud pauciora & Ovis & Aries habent nomina. Dicitur namque illa, *αμνά, ἀμνός, βάρα* Laconibus; *βουκίαι* apud Hippocratem interpretatur Varinus *πρεβελίαι*. Ethymologus *βότα* exponit *πρεβελία*. γίτα Hesychio & Suidæ ovis est; *διδύς* bidens, *δίκυμα* oves quæ gemellos peperere; *ἐγγαλον* ovis lac habens, *δωρον* est ovis mollis lanæ, *ιερέον* ovis immolanda, *μείλασαι* oves agnos sub uberibus habentes, seu *τὰ ὑπὲρ τοῦ πρόσθου, μεσθίλικες* mediæ ætatis inter agnos, & jam maiores natu oves. *κόρ, κάριός, κάρος, ὄς, ὄξ, πῶν, ῥῖνες*, nomina sunt ovis simplicia. Aries vocatur *ἀριχά, κριός, ἀρρεϊός, διδύμιον, ἰθρῖς*, quod nomen exsecro sed verveci propriè competit, *κίλκω* gregis dux, *μοσχίας, οὐκρίδας*, quod tamen nonnisi de sylvestri accipitur, *παρά τὸ τὰς ἀκρίας βαίνειν*, quod per vertices montium eat. Ad vervecum differentiam, qui arietes non castrati, Ne-frendes dicuntur illi, qui castrati non sunt. *Ἄρης, ἀμνός, ἔρσας, καθελός, κίλλιξ, ὄρεος, πραλίνιον, πρὶνῆες, σακίται, τρανόν, φάγιλον*, agnorum sunt apud Græcos nomina. *Descriptioni*, non est quod immoremur. Notissimum namque animal est. Memorabilissima tamen apponemus, quorum & authores mentionem fecere. *Caput* itaque ipsi infirmissimum natura tribuit. *Cerebrum* *ἀρχιμυρόν* hoc est, ut Theodorus vertit, squalidiusculum, seu minus pingue. *Cornua* tenuiora foeminis plærumque, multis nulla, agnis aliquando ab ipso partu connata, arietum generi in anfractum, ceu castus, convoluta, aliquando plura quàm bina.

Descriptio.

Cardanus verveces quatuor cornibus insignes se vidisse scribit. Hic tricornis & sex-cornis iconem exhibemus. Evirati cornuum situm mutant, eaque è contrario gerunt. *Oculos* habent in latera despicientes, maximè inter se distantes, fuscis aut subnigris, & patulos. *Labra*, in suo genere, tenuia, contra ac in bobus. *Dentes*, continuos, quorum ovi pauciores quàm arietis. Petrus Crescentiensis scribit mutari post annum unum & dimidium, nempe duos anteriores, & postea per sex menses duos proximos, deinde cæteros, ita ut tribus annis vel ad summum quatuor ejiciantur omnes. Junioribus essedentes enæquales, in statu æquales, ætate proVectis discalceatos, hoc est, à carne denudari, minui, & corrumpi. *Ventres* ipsis, ut in ruminantibus plures. Apertos agni exhibemus, ubi, A. ventriculum, B. Reticulum, C. Omasum, D. Abomasum denotare scito. *Testes* ad crura deciduos. *Mammæ* foemine binæ, totidemque papillæ. *Fel* apud Chalcidem Euboicam parte quadam nullum; in Nexo adeò copiosum, ut exuperantia prodigii loco habeatur. *Ælianus* hic duplex esse ait, in Ponto etiam nullum. Addit, in regionibus perfrigidis, cum nive & hyeme vehementi anni tempus infestum est, fellis expertes esse, intraque ovilia compulsum, novo pabulo non uti: ineunte vere, cum ad pasciones proficiscitur, felle impleri, quod ipsum Scythicis ovibus usu maximè evenire solet. In Scepsi regione *Lienem* habent minimum; ubique rotundum. *Renes* æquabiles, & densius circa ipsos sevim, si pingui undique obducantur, intereunt, idque pubertate pabuli, ut in Sicilia, agro Leontino. Unde sero diei agere oves ad pascua, pastores loci illius solent, quo minus capiant pabuli. Bellunensis testatur in arietibus castratis, in Syria, adipem inter cutem & carnem abundare, ut in porcis. *Pedibus* anterioribus ac posterioribus, concretio quædam inhæret, parte quâ terram calcant, (verba sunt Lemnii) vermiculi subrotundâ formâ, lanuginosa intus, ac crinitâ congerie, qualis est in rosarum spongiolis, ac calicibus, quibus semen includitur, molli tenuique lanugine implicitum: Eximi autem tale quiddam sæpius ex decoctis ejus pecudis pedibus teredini, qui vermiculoso ac carioso ligno inesse solet, aut nucibus avellanis planè adsimile. Opiliones autem pastoresque ovium eâ sunt opinione imbuti, nullum hoc animante in cursu fore velocius, nisi tale quiddam articulis quibus fulciuntur, subesset. *Caulis caudæ* villosus est. *Pellum* à Borea penetrari Hesiodus negat, quod tamen pilis seu lanæ potiustribuendum est. *Locum* si

Aristot. de generat. animal. l. 5. c. 1. Arist. H. A. l. 2. c. 3.

(Ventre agni apert. T. b. n. 3.)

Aristot. de partib. l. 4. c. 2. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Ælian. H. A. l. 17. c. 26.

Lemnius de Naturæ miracul. l. 3. c. 5.

Locus.

tum

Cibus. tum ad *Cibum*, sunt animalia *πρόβατα*, seu herbivora, quamvis & frondibus pascantur. Ex herbis sunt jucundissimæ, quæ aratro proscissis arvis nascuntur; deinde quæ pratis uligine carentibus. Fastidium præbito sale occurritur, quod velut ad pabuli condimentum per æstatem canalibus ligneis impostum, cum è pastu redierint, lambunt. Hyeme frondibus ulmeis, fraxineis, & betulinis, & fœno autumnali, quod *Cordum* vocatur, commodissimè vescuntur: Cytiso quoque & sativa vicia, & si necessitas urget, ex leguminibus paleis. Vinacea & furfures alicubi modicè objiciuntur. Quæ in locis maritimis aut falsuginosis compascunt, largiore lacte, & caseo gratiore abundant, multoque fœcundiores evadunt, & teneriores ac suaviores carnes proferunt; quales oves præpingues in Ostiensi agro, eique finitimo Portuensi, decimo ab urbe lapide, qui Tiberi fluvio interfluente, multis hinc inde paludibus, atque etiam salinis sunt circumfusi, sese reperisse & gustasse tradit Gomefius. Unde & Aristoteles author est, oves quæ falsiusculam aquam bibunt, maturius coire, & à partu sale fruenter, ubera magis distenta lacte demittere. Albertus etiam scribit, in quibusdam terris marinis, in quibus sicca & falsa habentur pascua, oves per 20. annos vivere, atque etiam parere. In Scotia vescuntur per inculta loca cytiso. In India & maximè Præstiorum regione herbis liquida pluviâ rorantibus. In Ponto amarissimo absinthio pinguescunt, quod Alexander Mynidius Æliano authore prodidit. De Laserpitio ita Plinius. Laserpitio vesci solita pecora, primoque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum jucunda, & alibi. Si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc deprehenditur signo, ove, cum comederit dormiente protinus, capram sternutante. Apud Iudæos nuclei palmarum illis apponebantur, qui etiam fabris ferrariis apud Babylonios pro carbonibus erant. Delectantur etiam, coluthea, aphace, herba lanaria, gemmis vitium, adiantho, galli cristâ, thymo, ericâ, apud Brabantos inprimis, hœdera, apiastro, ut Theocritus prodidit, Eryngio denique. Apud Ichthyophagos, & circa Calamos vicum Indiæ, si Philostrato fides, in provincia Aden, si Paulo Veneto, piscibus aluntur. In Lydia & Macedonia ex iisdem pinguescunt. Quantum ad *Potum*. Albertus turbulenta & multâ aquâ pinguescere ait. Plutarchus aquam imbris ubi statim à vento immittitur, laudat. Vitalis de Furno, æstate septentrionalē frigidam, hyeme meridionalē tepidam deprædicat. Varro aquæ mutationem huic pecori nocere, saltem eo tempore, quo fit admissura, scribit. Oves aniculæ coeunt & uterum ferunt, teste Aristotele; præstantior tamen proles quam senescentes mares & fœminæ procreant.

At Columella vult fœminam bimam submitti, & usque ad quicquennium fœturæ necessariam esse, septimo deficere. Florentinus in tertio anno matrices probat. Aristot. autem ad octavum usque parere ait, imò, si benè curentur, vel in undecimum, quod & apud Palladium invenies. Notandum verò etiam, arieti naturale esse agnas fastidire, senectam ovium confectari, ut ait Plinius, additque, & ipsum senectâ meliorem esse, illisque utiliore. Coitus verò omnibus ab Arturi occasu, quod est à tertio Idus Majas, ad Aquilæ occasum, id est, ad decimum tertium Calend. Augusti, ut Plinius prodidit; idque ideo, quod quæ postea concipiunt, fiunt vægrandes & imbecillæ. Columellæ tamen primum admissuræ tempus vernum Parilibus, si sit ovis matura, si verò fœta, circa Julium mensem. Ferunt quinque mensibus, & pariunt, maximâ ex parte singulos, sed aliquando etiam binos, ternos, & quaternos. Alicubi pariunt geminos, tum pabuli beneficio, tum si pater aut mater vim eam geminandi per naturam obtineant. Sunt & loca, ubi bis terve pariunt, ut in Differentiis dicemus. Terno sæpius aut quaterno coitu implentur, & aliquando toti gregi unus aries sufficit. Pariunt nonnunquam & monstra. Albertus, Cinirum vocari scribit, qui ex ove & hirco nascitur. Apud Helvetios, teste Gesnero, nascuntur capræ posteriore parte, anteriore oves vel arietes, sed vivere non possunt, & paulò post moriuntur. Albertus *Musmonem* ex capra & ariete nasci, refert. Apud Columellam verò refertur, ex ovibus & arietum ferorum coitu fœtum conceptum paternum colorem retulisse, eumque similiter durasse per sobolem & nepotes: lanam verò, in primo quidem fœtu hirtam: sed in nepotibus & deinceps molliorum fuisse. Ejus autem coloris fœtus erit, cujus venæ linguæ in prægnante sunt. Mares aut fœminæ vitum aquarum tum admissariorum generantur. Aristot. verò docet, austrinos flatus captandos esse, si fœminæ generari debent: septentrionalis, si mares. Idem efficies, præeunte Plinio, si arieti lævum vel dextrum testem ligaveris. Quod de aqua ex Aristotele dictum, probat Pausanias, dum ait, ex Charadro fluvio hibentia pecora ut plurimum mares parere. Ut verò coitum arietum, sale, vel genitalium sale & nitro perfrictione excitant: sic & conceptio à quibusdam, pinguedine nempe nimia, impeditur. Ex congressu de anni felicitate præsagium sumitur. Nam si majores natu tempestivè libidine incitantur, annum esse felicem gregi pastores confirmant: si minores, infelicem. Post ordinarium coeundi tempus concepti, Cordi antiquis vocantur. Inter Oves & Capras occulta quædam amicitia viget, ideo simul libenter pascuntur. Ex arietinis cornibus tufis & defossis, asparagos

Plin. H. N. 1.8. c. 48.
Arist. H. A. 1.5. c. 14.

Columella R. 1.7. c. 34.

Gomef. 1. de Sale.

Plin. H. N. 1. 19. c. 3.

Strabo Geogr. 1. 15.

Plutarch. qu. 2.

Varro R. 1.2. c. 2.

Coitus & Partus.

Arist. H. A. 1.5. c. 14.

Sympathia & Antipathia.

ragos nasci; quidem scripsere, negat Dioscorides. Si eadem sepeliantur ad radicem fici arboris, fructus ejus citius maturescere, scribit Albertus Magnus. Quæ de vespertilionibus produntur, inter magicæ vanitatis specimina reponit Plinius. Inimicitias creduntur fovere, cum lupo, urso, tigri, elephanto, lupo imprimis, corvo, aquila, serpentibus, apibus, cruce. Stirpes verò iisdem noxiæ sunt, Aconitum, Nerion, Evonymus, Sabina Sanguinaria, Polygonum, Numularia, Calamogrostis, Anagallis, Ervum, Glans, Duva & Thapsia. Quæ de lupi intestinis, tympano, & aliis dicuntur, alibi examinabimus. Sanguinariam si comederint, toto ventre distrahuntur, & spumam quandam tenuem tetri odoris exspuunt. Calamogrostis comesta sitim, maciem, & tabem invehit, & sanguinem in ventriculum elicit. Duvam (herba est apud Gallos, fici iisdem vernaculè dicta) si gustaverint, innascuntur in jecore parva quædam animalia nigra, quæ similiter Duvæ vocantur. Ervum noxium est, quod mense Martio feritur. Si glandem copiosius comederint, abortum faciunt. In Attica Thapsiæ radicem non tangunt, peregrinæ depascunt, & aut alvus solvitur, aut intereunt. Tonitru consternatis, si aliqua non concurrerit, abortit. In Thracia verò, ut Bellonius prodidit, binas Turcæ putant esse stellas, Julio & Augusto noctu apparentes, sibi planè verticales, quarum splendorem si oves caput artollentes conspiciant, intereant. Ideo tum sub tectis habentur. Vitam ad denos annos, sed magnâ ex parte pauciores vivunt. Facit tamen & loci diversitas ad longævitatē. Albertus namque in quibusdam locis siccis & marinis ad viginti annos vivere scribit. Aristoteles, duces pecoris ad quindenos. Oves Æthiopicæ ad duodecem & tredecim annos vitam agunt. Vox ipsis propria balare, Græcis βληχῶσαι. Homerus tamen μήκωρος dixit agnos, & apud Claudianum, agnos grandisse, leges. Peculiarem in coitu habere, Aristoteles author est. Quantum ad Naturam, Ingenium & Mores ovium, adeò sunt stolidæ & amentes, & homo προβαλῶν & ἀμυνῶν, pro stolido & fatuo nominetur, & in proverbium abiverit, nullam ovium utilitatem esse, si pastor absit. Mansuetæ sunt eadem, & cum cætera animalia in partu vel à partu sævire soleant, hæc, teste Aristotele, non sæviunt. Quamvis autem quacunque occasione porhorrescere Quintus Calaber innuere videatur: agnos tamen audaces Horatius dixit. Præter pastorem & canem itineris ducem arietem habent, quem tamen pastor primò instituit, videreque è stabulo egressas mulitari, quasi ordine incedere, præsertim si à pastore, cujus vel sibilum intelligunt, depositæ fuerint. Arietes pugnacissimos esse, simul ac ipsi cornua

increfcere incipiunt, notum. Non modò sui generis similes, sed & alias, hominem adeò ipsum, incessunt. Sævitia repellitur, si, mensuræ pedalis, aculeis confixam tabulam, adversam fronti cornibus religaveris, vel cornua secundum aurículas quâ curvantur inflexu terebrâ perforaveris; vel etiam castraveris. Eosdem per sex menses hybernales sinistro incubare lateri, ab æquinoctio verno supra dextrum latus, quomodo scilicet sol ab eodem tempore dextrum hemisphærium, reliquo ambit sinistrum, quod Macrobius & Ælianus prodidere, experientia falsum est. De cætero, amat hoc pecus frigidos fontes: radicitus herbas carpit, & arbores destruit: lac per octo menses habet: antecedente hyeme copiosius avidiusque pabulum ventri ingerit, quasi de viatico pro futura indigentia sollicitum, frigoris est impatiens, quamvis vestitissimum: illæ tamen minus perhorrescunt, quibus cauda amplior. Eum sequi solere, qui vellere aures ipsarum obturaverit, Mizaldus prodidit. Agrestes cum consenuerunt, à propriis foetibus aluntur. Agnos odore posteriorum noscere, apud Albertum legimus. Cubant difficilior quàm capræ. Fœminæ urinam crassiorē reddunt quàm mares. Menses ipsis & capris tempore coeundi indicari, idemque post coitum etiam fieri ad tempus, mox desistere, donec parturiant: tum denudò indicari: itaque pastores proximum esse partum intelligere: à partu autem purificationem sequi abundè, primum leviter cruentam, postea valdè, Aristoteles author est. Agninam veteribus despiciatui fuisse, quidam, & inter eos Turnebus, credunt: Plautus tamen coram fuisse Romæ, tradit: & Horatius in deliciis reponit, ut exta agnina jam memoratus Comicus: Athenis quondam interdictum fuisse ne quis intonsum agnum in cibo sumeret, Athenæus author est. Modicè verò est calida, cum superflua humiditate, quæ quò agnus junior, copiosior. Ideò etsi robustis utilis, infirmis tamen ventriculo, quòd viscoso humore adhaereat noxia: quanquam Crescentiensis aniculos commendat. Columella autumnalem verno præfert. Capita inter delictiores cujusdam convivii cibos numerantur. Agnus Syringatus, Terpianus, Pasticus, diversi apparatus sunt nomina. Arietina caro minus est humida, & si benè concoquatur, sanguinem laudabilem generat, maximè castratorum. Donatus Antonius Ferrus, vervecinam omni ætati, regioni & tempori si sit juvenis, bimula, mediocriter pinguis, & in optimo aëre sicco, optimisque herbis educata, convenire ait; talesque esse asserit verveces, qui in sublimi Trivicano monte nutriuntur: secus

Usus in Cibo.

Bellon.
obser. l. 3.
c. 51.

Ætas.

Vox.

Aristot.
H. A. l. 4.
c. 4.
Natura,
Ingenium,
Mores.

Bellon.
observ. 1.
I. c. 60.

Athen.
I. 4.

Homer.
Iliade 10.

Usus in
Medicina.

autem esse, qui humidis aluntur in locis, & propterea in Campania nullo ferè precio haberi. Bellonius longè sapidiores esse iudicat, si integri, quod pastoribus in Thracia supra Nessum fluvium suetum, assentur. Testes apud Athenæum inter delicatiores cibos censentur. Medullam inter venena, cui phasiani caro obsistat, reposuit Arnol-
 dus: at Homerus, Astynacta ea vesci fuisse solitum, author est. *Ovillus* saporis est ingrati, nimis humidi, & mali succi. Quia ætate minus quam verno tempore convenit, ideo in quibusdam locis, magistratus post. Divi Jacobi festum, id est, vicessimum quintum Julii, mactari prohibet. Pedes non exempto vermiculo, ut sup. monuimus, nauseam stomacho inferunt. *Armius* elixus & refrigeratus sæpè editur. Ex *pulmone* minutal fit. Ex *jecore* apud Helvetios Tigurinos, Gesnero referente, tomi quadrati, qui omento circumvoluti, & herbis odoratis aliquando, verubus ligneis transfixi, in craticula assantur. Sunt qui integrum diligenter cum medulla panis contundunt, & per linteum vel cilicium transmittunt, deinde aromatibus ad saporem coloremque commendandum, modicè inspersis, fervefaciunt, & turdos injure carniū elixos, ac modicè butyro frixos imponunt. *Lac* est tanto melius quanto recentius, idem de Caseo sentiendum. Improbatur etiam nimis falsus. *Medicinam* quod spectat, agni morsui venenato, calentes, post cucurbitulas impositi, venenum extrahere Ætius prodidit: ius in quartanis utilissimum esse Brunus: *Cerebrum* mania conferre, ex quodam manuscripto Gesnerus. Decoctum *pedum* doloribus vesicæ. Plinius. *Testiculos* arietis tritos & cum aqua potos, comitialibus. *Pulmones* arietum excrescentes in ulceribus carnes ad æqualitatem reducant: assus præsumptus ebrietatem arcet: Livores & sugillationes minutatim concilus & impositus statim sanat, & nigras cicatrices ad candorem perducit. Est ejusdem & in purgatione uterorum usus. *Iecur*, oculis cruore suffusis, eximiè prodest, si pariens infletur, idem meracius præbendum in cibo, suadet Hippocrates. *Lien* tostus & in vino tritus potusque ileo resistit, si Plinio credimus, qui alibi hoc superstitiosum recenset. Pecudis lien recens, magicis præceptis super dolentem lienem exrenditur, dicente eo: qui medeatur, lieni se remedium facere. Postea jubent eum in parte dormitorii ejus tectove includi, & obsignari annulo, terque novies carmen dici. *Vesicam* ovillam ustam bibendam jubet præbere Galenus his, qui se in somno permingunt, idemque remedium Mizaldus repetit. *Fel* pecudis cum melle aures purgare prodidit Plinius. Eodem tolluntur porrigines, cum terra Cimolia illito capite, ut inarescat. Cum suo sevo lenit podagras. *Lac* laudatur contra omnia vene-

na, præterquam buprestin & aconitum. Contra quartanas quidam, referente Plinio, tres cyathos ante accessionem, cum fimi hirundinum drachma unâ, sumi jubent. Sextario si quis adjiciat Cnici purgati denarios quatuor, & decoctum ita bibat, molliet ventrem. Alvi exulcerati fluores & tenesmi, eodem ignitis calculis decocto fisti, Dioscorides tradit. *Serum* ventrem mover, & bilem expurgat. De *Butyro* hæc apud Plinium reperiuntur. Reduvias & quæ in digitis nascuntur pterygia, tollunt canini capitis cinis, aut vulva decocta in oleo, superillito butyro ovillo, cum melle. *Caseus* vetus dysentericos recreat, & in cibo sumptus, vel rasus & cum vino potus, cæliaco medetur. *Cornu* arietis ustum & cum oleo contritum, atque inde derafum, à quibusdam ad crispandum capillum adhibetur. *Ungula* cinis cum melle muris aranei morsum sanat. *Coagulum* contra pastinacam & omnium marinorum ictus vel morsus, drachmæ pondere ex vino sumi, scripsit Plinius. Infantibus etiam, qui lacte concreto vexantur, præsidio est, ex aqua potum: aut si vitium coagulato lacte acciderit, discotitur coagulo ex aceto dato. Silitur itidem sanguinem ex naribus subditum vel infusum, si alia non profint. De *sevo* notandum est, aliquando simpliciter, aliquando ex renibus, vel omento privatim nominari. Quidam innominatus, eo ad ignem liquato linteum intingi, & perti adustæ imponi jubet, atque ita curari asserit. Pernionibus cum alumine, teste Plinio, imponitur. Vetus cum cinere è mulierum capillis, furunculis medetur. Ex omento, præcipuè à renibus, admixto cinere pumicis, & sale cæteris verendorum vitiis medetur. *Medulla* agni ad ignem liquefacta, cum oleo nucum & saccharo albo & epota, calculum vesicæ dissolvere dicitur; si Alberto credimus. *Urinam* ovis rubræ aut nigræ, idem, hydropi perutilem esse scribit, sed præcipuè, si cum melle fuerit mixta. Quantum ad *stercus* & *finum*. Medicus quidam in Mysia, teste Galeno, ovium utebatur stercore ad acrochordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duos, quos clavos nominant, aceto videlicet diluens; quin & ulcerum abusta ad cicatricem illo ducebat nempe, stercus hoc cerato rosaceo commiscens. Fimus ex aceto illitus apud Dioscoridem, & pinictidas, clavos, pensiles verrucas, thymos & ambusta igni, rosaceo cerato exceptus Galenus ex oleo tritum, instar cataplasmatismis imponi jubet, ad vulnera recentia gladio aut ligno illata. Magna vis & in cinere fimi, inquit Plinius, ad carcinomata, addito nitro, aut cinere ex ossibus ferminum agnorum, præcipuè in his ulceribus quæ cicatricem non trahunt. Fimo quoque ipso ovium, sub testa calefacto & subacta, tumor vulnerum sedatur. Ad dolorem coli-

Plin. H.
N. l. 29. c.
2.

colicum hoc est Marcelli. Stercus ovis montanæ mense Septembri, deficiente luna pridie inclusæ, manè excipies, & sole durabis, atque in pulverem rediges, & habebis in vase vitreo sive stanneo, cum usus exegerit. Cochleare plenum, colico ex aqua calida, si febricitaverit, sin minus, cum vino per triduum dabis. *Vellera* pura aut per se imposita, cæcis doloribus, aut accepto sulfure mederi, testatur Plinius, tantumque pollere, ut medicamentis quoque superponantur. Pugnacis arietis è medio cornuum lanas suffitas, Nicolaus Mirepsus imponi jubet, loco dolenti in hemicrania, doloremque sedari promittit. Cinis crematarum ex Dioscoridis sententia, crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more uruntur. Quidam detonsam eam, alii evulsam decisis summis partibus siccant, carpuntque, & in fictili crudo componunt, ac melle perfundunt utrumque. Alii hastulis tædo subjectis & subinde interstratis, oleo aspersam accendunt, cineremque in labellis aquâ additâ, confricant manibus, & considerare patiuntur, idque sæpius mutant aquam donec linguam adstringat leviter, nec mordeat, tum cinerem reponunt. Vis ejus septica est, efficacissimeque genas purgat. Lana succida, quæ colligitur ex ovibus tonsis inter æquinoctium vernum & solstitium, quo tempore sudare cœperunt, laudatissima quæ de collo demitur. Subveniunt tales lanæ teste Dioscoride, inter initia vulneribus percussis, desquamatis, lividis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbutæ: siquidem facile succos combibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic Oesypum vocant) emolliunt. Canis rabiosi morsibus incultata post diem septimum solvitur, teste Plinio, reduviasque sanat ex aqua frigida, ex oleo calido humidis apposita medetur, ut ait Marcellus. Refert Herodotus, Pænos pastores in filiis quadrimis, venas verticis lana succida inurere, nonnullos venas temporum, ne unquam scilicet pituita è capita defluens, officiat. Quod si pueris inurendis spasmus contingat, urina hirci aspersa eos liberari. Si talum aut ungulam bovis vomer læserit, picem duram & axungiam cum sulfure & lana succida involutam, candente ferro super vulnus inuri jubet Columella. Plinius sanguinem è naribus lanâ succidâ, ait sisti, cum oleo rosaceo, & alio modo auribus sæpius obturatis indita: sed & alibi sistit, si articulos extremitatum præligaveris. *Oesypo* seu sordibus lanis inhærentibus, Galenus concoquendi vim tribuit, cum aliqua digerente facultate. Dioscorides cum Ætio, excalescere, ulcera explere, & emollire ait. Apud Plinium, vulvæ inflammationibus &

fedis rhagadiis, & condylomatis, cum butyro & meliloto, medetur. Secundum eundem vulneribus medetur cum hordei cinere & ærugine æquis partibus, ad carcinomata quoque ac serpentina valet. Erodit & ulcerum margines carnesque excrescentes, ad æqualitatem redigit. Igni sacro medetur cum pompholyge & rosaceo. Somnos allicit cum myrrhæ momento, in vini cyathis duobus dilutum. Maculas in facie cum melle Corsico, quod asperrimum habetur, extenuat. Quomodo & colligatur & paretur, vide apud Aldrovandum. Sylvius denique, nescio quo authore, cutim pedum & rostrorum bovis & ovis lento igne diu coqui tradit, donec veluti coagulum remittat, idque exemptum, siccatumque, in aëre perflatili ad hernias commendari. Et tantum quidem de usu in Medicina. Dantur & in externis quidam. Lana enim vestitus est materia: sed & pelles humani corporis sunt operimentum. Bedevini ex Arabum genere Vitriaco teste, plerumque iis vestiuntur. Zeno etiam Citicus apud Laërtium, Cratem Thebanum ovis pellem pallio suo insuisse scribit. Vulstanus quoque Vigarniensis in Anglia Episcopus vestitu ex pellibus ovinis usus est, quod non lynces Dei, sed agnus in templis cantaretur. In tragædiis etiam earum usus, unde qui gestabant *δισπρία* dicebantur. Cavendum tamen est, ne ovium quæ peste periere pelles adhibeantur. Pauci enim ex talibus, non phthiria in modò, sed & sacrum ignem gignunt. Mirum verò quod scribit Ælianus; ex ovis à lupo demorsæ lana vestis, pruritus in corpore ejus excitat qui ea vestietur. Ex eadem lana cingula fiebant, quibus novæ nuptæ apud Romanos præcingebantur. Pescia, in Saliari carmine capucia ex pellibus agninis fuere. Mollostans vocat Festus pelles ovillas quibus galeæ tegebantur. Earundem pellium usus loco chartæ fuit. Ventre Diophanes ad necanda animalcula noxia utitur. Ex testiculis arietinis crumenas olim factas, Cicero ad Herennium innuere videtur. Suffiscus etiam folliculus est testium arietinorum Festo, quo pro marsupio utebantur. Intestina minora ad fides & arcuum nervos adhibentur. Mense Majo caseum coagulabimus syncero lacte, coagulis agni vel hædi. Urina nitri factitii materia est. Ossâ manubriis cultellorum inserviunt. Stercus agris utile. Candelam ex syncero arietis sevo, scriniis tenui linteolo insertam, vestiariam supellectilem à tineis inoffensam custodire, Mizaldus tradit. *Differentias* à pilo seu lana, & loco sumemus, easque promiscuè trademus. Aristoteles Scythicas pilo molli esse ait, Sauromaticas duro. Horatius Tarentinas pellitas cognominat, quod molliores sint velleris. Colonicæ dicebantur, hirsutæ, quod quæ agris colebantur. Cujus iconem hic damus. Eadem &

Usus in
externis.

Laërt. l. 6.

Ælian.
H. A. l.
I. c. 8.

Differentia.

Montanæ dicuntur, unde *ὄρεων ἰματίον* ex squallida & non pectinata lana. Sunt & *feræ oves*, non quidem multò nostris domesticis, ut Gillius ex Oppiano tradit, majores, sed certè ad currendum velociores, & ad pugnandum fortiores, tum retortis cornibus, tum infestis, & robustis frontibus armatæ. Sæpè in sylvis apros impetuosos ad terram abjiciunt, interdum impetu factò inter se pugnant. Julius Capitolinus testatur, suo tempore extitisse Gordiani sylvam memorabilem, in quâ picta tum continerentur, tum alia diversa animalia, tum oves *feræ* centum. In Adimain Lybiæ solitudinibus, animal est formâ arietinâ, a felli magnitudine, aurium oblongarum & pendularum, lanam curtam gerens; & fessoris patiens, tametsi non ad eum usum, sed ad lac habeatur. Contra quam nostratibus fœminis cornua, maribus nulla. In desertis Lybiæ frequenter reperiuntur, alioquin rari, licet plærumque in agris Numidiæ videantur, quod prodigii loco habent. In Ægypto lana ovium, pilo propior quam lanæ, teste Plinio, ex qua vestis detrita usu tingitur, rursusque ævo durat. Ibidem oves majores quàm in Græcia; Circa Damiatem, verveces rotundis & tam amplis caudis spectantur, ut vix eas sustineant. Leo Africanus se, quæ pondere libras quinquaginta, aliquando centum viginti æquarent, vidisse scribit. In Æthiopia non habent lanam, sed camelorum pilis hirsutæ sunt, quod Diodorus Siculus, Ælianus & Strabo prodidere. Johannes Bohemus verò parvas esse addit, & incolas caudâ hujus pecudis pedenda sua obtegere. In Nubiâ arietes cornuti nascuntur, nec modò mares, sed & fœminæ cornua gerunt, cui miraculo æquandum est, quod ibidem oves, teste Plinio, quarto nonnisi die bibant. Tunc etiam prouit in Ægypto reperiuntur, adeò crassas caudas habentes, ut se loco dimovere non possent: verum qui eorum curam gerunt, caudam exiguis vehiculis alligantes, gradum promovere faciunt. In Angelia præter rorem cœlestem nullum bibunt potum, & de industria à fontibus arcentur, quod experientia docuerit, bibere ipsis exitiale. In Arabia quædam tricubitales trahunt caudas prodente Herodoto, quædam cubitum latas ut apud Ælianium legimus. Tales vel his similes in Arabia Petræa & Felice inveniuntur. Cauda aliquando viginti sex, aliquando quadraginta quatuor libras pendit. Ibidem arietes sunt usque in terram criniti. Hic, qui sub nomine Indici datur, sed revera Arabs, cornibus omninò caret, lanam habet promissam, cauda terram contigit. Arietis species est aries Moromorus, ut eum Nierembergicus vocat, Rasus est, & stupiditatis quodam gestu solet consistere, & serene attendere obvios, aliquando territus aufugit cum sarcinâ. Arius verò Gui-

neensis seu Angolenis ita à Marcgravio describitur. Magnitudine arietis nostratis. Caput habet crassum arietinum, occipitio tamen magis prominente quam in nostratibus: aures pendulas: caudam usque ad suffragines pendulam: scrotum magnum, & penem in medio ventre: cornua parva deorsum usque ad oculos incurvata & quasi torta: ad collum inferius, jubam habent pendulam longis pilis constantem, in reliquo corpore breves pilos hircinos. Nullam lanam. Caput & aures sunt nigrae; caudæ quoque dimidia pars ab exortu, reliqua pars alba: ed occipitium pili sunt albi; crura anteriora usque ad genua alba, inferior medietas nigra; posteriora crura tota nigra & circa anum corpus & dorsum album; in lateribus autem nigras habet maculas. Crura & pedes habet, altos hircinos, duabus ungulis nigris. Variant tamen hæ oves colore uti nostrates; & quædam species caudam habet tibiam humanam crassam ad suffraginem usque pendulam & pinguem; caret illa species juba illa ad inferius collum. Lanam quoque non habet, sed pilos caprinos. Grandiores sunt nostratibus & ingluvie pendula instar bovis. In Asia rubram quædam habent lanam. Regio Camandû, sit M. Paulo Veneto credimus, non minores asinis alit, illasque pulcherrimas & pingues, quarum cauda octoginta libras aliquando pendat. Canusinis lana est ruffa, seu fulva. In Chio sunt parvæ staturæ inopiâ pabuli, sed caseum ex iis laudatissimum fieri, Ælianus author est. In Clazomeniorum agris, teste Hermolao, pecora procreari ajunt, aliis locis leucophæa, aliis pulla, aliis coracino colore. Coraxinorum lanitium omnium pulcherrimum, teste Strabone; Ideò admissarii arietes talento emuntur. Apud Cretensis in Ida monte, sunt, oves pastoribus Striphoceri dictæ, cornibus erectis, ut unicornu, in ambitu canaliculatis, & cochleæ in modum contortis. Arietem nostratem magnitudine non superant. In Erythræa insula, quæ fortè Gades, ovium lac, serum propter pinguedinem non habet; quin & intra triginta dies suffocantur, nisi aliquid sanguinis detractum fuerit. In quadam Scotiæ regione, si Hæctori Boëtio fides, flavæ habentur oves, dentium aurei planè coloris, carnes habentes croceas, & lanas. In Gortynide, Oppianus, referente Æliano, tradit oves esse ruffas & quadricornes. In Gothlandia, si nos Olaus M. non fallit, arietes sunt, quibus quaterna vel octona cornua crescunt, à quibus tantum ferociæ mutantur, ut sibi & aliis animalibus nisi ferrâ demantur, incommodent. Lanam habent mollem & longam. Hirta ex Hebridibus una, fert oves vel maximos hircos altitudine superantes, cornua bubulis crassitudine æquâ, sed longitudine aliquantum etiam

Scalig.
Ex. 217.
n. 8.
Johan.
Leo A-
fricæ 1.7.

Diodor.
Sicul.
Biblio-
thec. 1.4.
Ælian.
H. A. 1.
17. c. 10.
Strabo
1.7.

Bellon.
obs. 1.2.
c. 60.
Herodot.
1.2.
Ælian.
H. A.
1.10. c. 4.

Nierem.
H. E. 1.9.
c. 52.
Marcgr.
Histor.
Brasil.
1.4. c. 10.

Strabo.
1.3.

Oppian.
de venat.
1.2.

Olaus
1.17. c. 1.

Boët. in
descript.
Scotiæ.

Aristot.
in 1. Mi-
rabiliū.

etiam superantia, præter caudas in terram usque prominentes. In Hispania, tempore Marinei, tanta erat ovium copia, ut multos se ibi nosse scribat pastores, quorum unusquisque ovium XXX.M. possedisset. In eadem agnos melius quam alibi nutrire Julius Alexandrinus author est. Apud Illyrios ferunt pecora bis anno parere, & quidem plærumque geminos, multa verò etiam ternos, & quaternos, quandoque quinos. Lactis quoque sesquicongium ab eis emulgeri. Indorum oves, apud Ælium, ad maximorum asinorum magnitudinem accedunt, quatuor fætus cum plærumque pariunt, tres cum minimum. Caudæ longitudo ad pedes usque pertingit, quæ etiam matricibus, tum ut facilius incantur, tum ut ex adipe earum oleum exprimatur, abscinduntur. Arietum quòque dissecantur, & adipe exento, iterum consuuntur, & quidem tam exactè, ut ne vestigium quidem cicatricis appareat. Quorum icones arietum hic damus, unus erat sine cornibus & cauda, loco ejus nescio quid habens extuberans, & sub mento veluti palaria, totus candicabat, præter caput & extremas ungulas, quæ erant nigra. Alter erat insigniter mutonatus, reflexis & convolutis cornibus, quæ, ut & totum caput, coloris erat cornei: rorstrum autem pedes, & testes caudæque pars inferior candicabant, cætera rufus. Istriæ seu potius Liburniæ ovium lana, pilo propior quam lanæ, ut ait Plinius. In Italia genus quoddam ovium esse, Gesnerus ex amici relatione scribit, quod naturâ, quaterna aut sena cornua aliquando gerat, sed imbecilles easdem, & lanâ inutili. Laodiceæ in Asia breves oves, villo summam nobilitatem habent, teste Plinio. Inter Lusitaniæ fertilitatem, quam Athenæus ex Polybio, describit, agnis trium vel quatuor obulorum precium esse consuevisse ait; suem, quæ ad centum librarum pondus accedat, quinque drachmis in coenam emi, ovem duabus. In Lybia citò apparent cornua in capitibus arietum. In Macedonia qui candida sibi nasci pecora volunt, ad Aliacmonem ducere: qui nigra aut fusca ad Axium, Theophrastus tradit. In Madagascar reperiuntur oves caudis maximi ponderis. In Magnesia & Mesopotamia bis pariunt. Milesiæ tertium bonitatis locum obtinent. Apud Moscos, in desertis campis circa Borysthenem Tanain & Rha, ovis est sylvestris, quam ipsi Seigios vocant, narrante Barone Herbersteinio magnitudine capreolæ, brevioribus tamen pedibus, cornibus in altum porrectis, & quibusdam circulis notatis (ex quibus Mosci manubria cultellorum transparentia faciunt) velocissimi cursus, & altissimorum saltuum. Nabathæi, referente Strabone oves habent albas. In Naxo duplici sunt felle. Apud Panchæam plurimum ab alijs molli-

tie differunt. In Peru oves ad asellorum magnitudinem crescunt, longis cruribus, crasso corpore, capite longo, collo & effigie quasi cameli, carne optimâ, agnorum maximè. Castratos aratum duci, & dorso ferre ligna: non clamare, colore esse albo, nigro, & cinereo. Quinquaginta onerum pondo sustinent, & tergo sublatum, ad aliquot passuum millia vehunt: vesci tamen si urgeantur, sedentes, ore converso ringentes, foedo odore conspurcant, si onustæ sint, tum humi se acclinant, nec inde ullâ verberum vehementia, nisi penitus clitellis exonerentur, propelli possunt. Lanæ tenuitate, longitudine & copiâ nostras superant. Frumento vescuntur, sed adeò pauci sunt & cibi & potus, ut triduo imò quatruiduo abstineant. Mathiolus nobis ejus exactam descriptionem dedit, dum ait: Refert hoc animal partim camelum, partim cervum, adeò ut rectè quidem Græco idiomate *ελαφοκαμηλός* appellari posse crediderim. Longitudo totius corporis à cervice ad caudam sex pedum est: altitudo verò à dorso ad pedis plantam, quatuor tantum, & colli longitudo à scapulis ad cervicem, duum. *Capite*, *collo*, *ore*, superioris præsertim labii scissurâ, ac genitali Camelum ferè refert. At *caput* oblongius est: aures habet cervinas, oculos bubulos. Anterioribus *dentibus* in superiori mandibulâ caret, sed molares utrimque habet, ut bisulca ferè omnia, & ut illa etiam ruminat. *Dorso* est sensim prominente, quod per injuriam à pictore neglectum est. *Scapulis* propè collum depressis, *lateribus* tumidis, *ventre* lato, *clunibus* altioribus: & *caudâ* brevi spithamæ ferè longitudine: quibus omnibus cervum ferè refert, quemadmodum etiam *cruribus*, præsertim posterioribus. *Pedes* illi bisulci sunt, diducta anteriori parte divisurâ. *Ungues* habet acuminatos, qui circa pedis ambitum in cutem crassam abeunt. Nam pedis planta non ungue, sed cute ut in multifidis & in ipso Camelo contegitur. *Retromingit* ut camelus, & *testes* substrictos habet. *Pectore* est amplo, sub quo ubi thorax ventri connectitur, extuberat globus, ut in Camelo, vomicae similis; è quo nescio quid excrementi sensim manare videtur. *Color* colli, cervicis, pectoris & anteriorum crurum est illi albus, reliqui vero corporis subrubër, vel ex nigro rufescens. *Rostro* tamen est nigro & anterioribus cruribus à genu albicantibus. Cicur ac mansuetum est animal, sed frigoris impatiens; ut alia quæ ad nos è calidis regionibus afferuntur. Neminem offendit: sed miro admodum ingenio ab illata se vindicat injuria. Nam ubi aliquis illud vexet, vel circa clunes opprimat, non calcibus aut moribus se defendit, sed vomitu vel cibi vel humoris in vexantem retrosum cum impetu ejaculato, ad protensam colli longitudinem. Salacissi-

Athen.
l. 8.

mum hoc esse animal, id mihi conjecturam facit, quod cum sui generis fœmellis sit destitutum, magnâ cum prurigne capris se commisceat, non tamen erectis, ut aliâs capræ hirco ascendente solent, sed humi ventre accubantibus, ita cogente animali anterioribus cruribus. Itaque superascendens coit, non autem, ut falso de retromingentibus animalibus affirmat Aristoteles, averfis clunibus. Adeo venere vernali autumnalique tempore stimulat hoc animal, ut illud viderim humile quoddam præsepium avenâ refertum conscendisse, genitalique illi magno cum murmure tamdiu confricasse, quousque semen redderet, plurimis una hora replicatis vicibus. Non tamen concipere capræ hujusce animalis femine referat, tum, quod, ut puto, vi coactæ illi prostituerint continuo balantes; tum quod cum hoc animali earum non conveniat species. Indicam ovem appellabat hoc animal, qui illud ad nos advexit, atqui à nostris ovibus quantum distet, tu ipse judicare poteris. Haftenus Mathiolus. Ab his plurimum differunt, oves illæ Chilenses, quarum iconem istam Belgæ attulerunt. Satis omnia quadrant, inquit *de Laëtius*, quoad corporis compositionem; præterquam quod postici pedes nugulas bifulcas habeant, priores autem in quatuor divisos ungues, & quod prolixis admodum villis lanæ vestiatur, quam imprimis commendant. Cæterum natura bene convenit cum præcedentibus, ita ut haud dubium sit unius generis animal esse, tantum ratione cœli sub quo degit variare: nisi forte inter utrumque sit distinctio illa, quam observavimus in descriptione Ind. Occidentalis; ut omnino existimo. Sputum ejaculatur in vexantes; & scribit P. Alonso d'Ovaglie in Historica Relatione Regni Chill, vulgo credi in parte corporis humani quam sputum illud contigerit, scabiem generari. Pollentia juxta Alpes, oves habet cani velleris, apud Martialem extat. Apud Rhætos, arietes sex vel septem annorum ad priora cornua alia veluti adnata, parva, bina, vel terna producant, illaque non ante quintum aut sextum annum adnascuntur, primis robore & crassitie proficientibus. Sauromaticæ duro sunt pilo. Syriæ cubitales ovium caudæ, plurimumque in ea parte lanitii. Circa Tarnasari urbem Indiæ, oves conspici, cornua damis haud ab similia habentes, nostris longè majores, Aristoteles author est. Visi & Monstrofi agni, quorum etiam hic Icones damus. Unus erat capite fuillo; alter duobus capitibus & quinque pedibus. Tertius pedibus equinis & capite simiæ. Quartus triceps. Quintus, dorso duplici conjuncto, pedibus octo.

Martial.
l. 14.
Epigr.
157.

ARTICULUS IV.

De Capra & Hirco domesticis.

IN historia hac, de Capræ primo, mox Aldrovand. de Bifulcis c. 9.
Hirci, tandem Hædi nomine, in principio agendum est. Capras à carpendis virgultis dictose esse scribit, Varro, Cicero, & Nonnius. Festus tanquam crepas vult dici, quod cruribus crepent. Martinius à καπρω voro, quod sit animal ποικιλόφαρον, deducit. Pro ætate & sexu variant nomina. Græcis dicitur αἴξ ab αἰσίν ruere, & cum impetu ferri. Licuntur verò αἴγες tam ἐρίφους recens natæ capræ, quàm χίμαρος, quæ sunt anniculæ, vel mediæ ætatis, & adultæ quæ τράγος, licet hoc nomen maribus duntaxat competere videatur. Synonyma occurrunt plurima. Modernis Græcis vocatur γίδα, Tyrreniis κάπρα, Cretensibus καρανώ. Hesychius μήλας, & αἰγίρας vertit capras; κεράδες sunt capre fœmellæ quæ cornua ut plurimum habent. κεκιδες capræ in fronte signum habentes instar calli. μυκάδες, quæ mulgentur: ὄντας agrestis: χίμαρα hyeme nata. Grammatici tamen χίμαρον, pro omni caprario genere, omni ætate & utroque sexu inter pretantur. Sed & μύρα & μυκάδες capræ sunt. Hircus, qui Sabinis fircus, vel ab hirsuto, quod ab Ebræo חיר addurere, quod animal sit libidinosum, dicitur. Græcis est τράγος, vel à τράγην & τραγῆν edere, quod vorax sit: vel παρὰ τὸ τραχὺ δέρμα ἔχειν, à pellis asperitate: vel ὑπὸ τοῦ τρέχειν, currendo. Capri nomen obtinuit, qui castratus est: Ægyptiis Mendes. Hædus est id quod ex capra & hirco nascitur. Ab Ebracio potius חיד quam quasi fœdus dicitur. Martialis fœtum quærulæ rudem capellæ appellat. Hesychio & Ethymologo dicitur ἐρίφος, Varino ad tres vel quatuor menses, postea χίμαρον dici, donec pariat & mulgeatur. Rhodiis audit κάρων, aliàs etiam κεκρύφαλος, aut κρίδενος. διακαλαμάσαρκες in quadam lege dicuntur, quod frugum calamos depascerent. Bifulcas esse capras, & cornigeras, haud uno loco Aristoteli proditum. Colorem mutant, & interdum variè generantur. Pilus differt sexu. Crassus est hircis, mollis & tenuior capris. Et quia hoc genus apprimè hirsutum est, ideò Festus, densorum pilorum homines hircipilos vocavit. Cornua omnibus esse negat Plinius; verum in his quibus sunt, in dicia annorum per incrementa esse affirmat. Sunt autem ea longa & acuta. In Delo insula, prodente Varino, visum est hirci bicubitale cum dodrante, ponderis librarum viginti sex. Oculos, quos in angulorum angustias contrudit, habet aliquando dissimiles; In tenebris splendere lucemque jaculari Plinius prodidit. Naso sunt simæ. Dentes capræ superiores non sunt præter primos geminos, ut idem ait; & pauciores alii quàm hircis, quod prodidit Aristoteles.

De-

Plin. H.
N. l. 28.
c. 11.

Dependet mento omnium *villus*, qui aruncus, spirillus, Græcis *ἄντρον*, secundem quosdam *κρίνον* dicitur. Noneolas vocari tradit Festus papillas quæ ex faucibus caprarum dependet. Varro mammillas nuncupat, lacinias Plinius, verruculas alii. Binas in feminibus mammas habent: pedes macilentos. Per aures & nares spirare, præter Alcmaëonem vel potius Archelaum, Ægypti sapientes quoque credidere. Philes signum addit, quod naso obstructo nihil offendantur. Oppianus id de sylvestribus credidisse videtur, dum eis meatum quendam à medo inter cornua loco ad pulmones pervenire, cui cerâ infusâ suffocentur, scribit. Bartholomæus quoque Eustathius, huic sententiæ accedere videtur, dum se aliquid simile in homine invenisse prodit. Aristoteles tamen in contrarium nititur. *Iecur* extractum diu moveri ajunt. *Ventres* sunt plures. *Lien* rotundus. *Aspera alteria* talis qualis in homine. Quantum ad *Locum*, in aquilonaribus terris abundant. In Creta magna ipsarum copia, quod lupis careat. Ithacem Telemachus apud Homerum *ἀγρίβοτον* vocat. In Rhetia Helvetica præstantes caseoli caprini sunt, præcipuè iis in locis, qui circa thermas Fabarianas montani sunt. Reperiuntur quoque in Achaja, Africa, Nubia, Sardinia, Cephalonia, Mileto, Damasco, India, novo orbe, Hispania, Corsica & cæteris locis, de quibus in Differentiis agemus. Terram pascendis aptam, Græci *ἀγρίβοτον*, *ἀγρίνον* & *ἀγρίβοτον* vocant. *Cibum* & *potum* si attendas, *παιδο φάγει* sunt. Inprimis verò frutetis, arbuto, alaterno, cytiso agresti, iligneis & quernis frondibus, maximè gaudent. Ex glande, si circâ satietatem data est, abortum facere, Columella author est. In deliciis quoque habent oleam, ideò Minervæ inimicæ; vitistenellos palmites, ideò Libero patri immolabantur; ficus & farinam, teste Æliano, fraxinum, tamariscum, barbam hircinam, & rosam caninam. Fabæ largius datæ, copiam lactis efficiunt: ut & pentaphyllon, si prius quam bibant, quinque dierum spacio ipsis vorandum detur. Ejusdem rei gratia, & dictamnium ventribus alligatur. Vorant alicubi scamnoneam, veratrum, clematidem, & teste Lucretio, cicutam. De Ladano libet Plinii verbis uti. Arabia, inquit, Ladano gloriatur, fortè casuque hoc, & injuria fieri odoris, plures tradidere. Capras maleficum alias frondibus animal, odoratorum verò fruticum appetentius, tanquam intelligant pretia, carpere germinum caules prædulci liquore turgentes, destillantemque ab his (casus mistura) succum, improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari pulvere, incoqui sole. Et ideò in ladano caprarum pilos esse. Recentiores tradunt sylvas Arabum pastu caprarum refringi, atque ita succum

villis inhærescere. Verum autem laudanum Cypri insulæ esse, similiterque & ibi fieri tradunt, & cæsyum hircorum barbis genibusque inhærens, sed ederæ flore derosso, pastibus matutinis cum est rorulenta Cyprus. Deinde nebula sole discussa, pulverem madentibus villis adhærescere, atque ita ladanum depecti, &c. Vulgatissimum porro pabulum gramen est, aculeatis inprimis foliis, capriola Ruellio, quod præ cæteris grata sit. Salsedine delectari, nec tortoribus ignotum. Dracula Transalpinæ Hungariæ præfectus, sæpenumero captivis Turcis pedes excoriatos confuso sale perfricuit, mox capras adhibuit, quæ linctu cruciatum augerent. In *potu*, aquæ stagnantes & mortuæ, quæque diu in vasis steteret, improbantur. Albertus, cum movetur, post meridiem, plus aquæ potaturas dicit. Prodigiosum, quod in Zacintho Antigonius notat, nempe, quo tempore spirant Etesiae, caprashiantes stare versus boream, eoque contentos, aquam non requirere, neque bibere. *Caprae* sunt admodum veneræ, teste Plinio. Ideo mense septimo & adhuc lactantes incipiunt coire: idemque tradit, animam ipsis quàm ovibus ardentior, calidioresque concubitus. Anniculæ etiam coeunt, & terno aut quaterno concubitu implentur: quod si à coitu imber accesserit, abortum infert. Quinque mensibus uterum ferunt. Pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquando & binos, & ternos, & quaternos. Si clementia aëris & pabuli accesserit bis pariunt. Fertilitas ad octo annos durat. Aristoteles tamen tota vita coire asserit, & gemellos parere, si pater aut mater vim eam geminandi à natura obtineat. In trimatu sunt inutiles. Pinguedine sterilesunt; Commodissimum tempus coeundi hybernium solstitium. Vnde Plinius. Concipiunt Novembri mense, ut Martio pariant turgescuntibus virgultis. Quidam ad denas capras singulos adhibent hircos, alii ad quindecim: nonnulli ad viginti. Quomodo educari debeant, ad Oeconomicam pertinet. Vehementiorem coitum si excitare volueris, genitalia, delibutis multo sale & nitro manibus perfrica: vel eadem pipere, aut utricæ fructu perunge. Seminalem humorem capris ante coitum & partum destillare, Aristoteles author est. Idem, ubera illarum quæ coitum non patiuntur, à parstoribus montis Oetæ urtica vehementer perfricari, ut dolorem infligant, prodidit. Inde primò cruentes humor elicitur, mox purulentus, postremò lac non minus quàm ex iis quæ venerem passæ sunt. Idem de mulieribus tam viduis quàm virginibus Albertus scripsit. *Amicitiam* colunt, cum ovibus, tigris, fargo, pulegio, & eryngio. De ovibus non est quòd quicquam dicatur. Tigri, si hædus porrigatur, abstinet cibo par biduum:

Aristot.
H. A. 1.
c. 11.

Locus.

Fido. l.
11. c. 6.

Cibus &
potus.

Plin. H.
N. l. 12.
c. 17.

Genera-
tio
Plin. H.
N. l. 8. c.
5
Varro R.
R. l. 2. c.
3
Arist. H.
A. l. 5 c.
14. & l.
6. c. 19.

Aristot.
H. A. 1.
6. c. 18.
Aristot.
H. A. 1.
3. c. 20.

Sympa-
thia &
Antipa-
thia.

Plin. H.
N. l. 20.
c. 14.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 3.

Theoph.
de ani-
malib.
quæ in-
vident.

Plin. H.
N. l. 10.
c. 40.
Ælian.
H. A.
l. 7. c. 26.

Aldrov.
de Bisul-
cis pag.
270.

Natura,
mores, in-
genium.

Varro
R. R.
l. 2. c. 3.
Columel-
la R. R.
l. 7. c. 6.

Ufus in
Cibis.

Galen. de
alim. fa-
cult. l. 3.
c. 1.
Athen.
Dignof.
l. 9.

duum: tertio die esuriens aliud poscit, nisi porrigatur, caveam convellit, hædo verò, tanquam contubernali suo parcit, quod Plutarchus prodidit. Sargus piscis umbra quoque ipsarum delectatur, & stantes in littore, attingere gestit, ad saliendum per naturam inhabilis. Pulegium à capris gustatum, si Plinio fides, balatum concitat, indeque Græci quidam literas mutantes blechon vocavere. Si verò eryngii caulem capella morfu defectum ore sustulerit; totus statim subsistit grex, relictoque pascendi studio, novo veluti spectaculo attonitus, non prius mirari rem desinit, quam pastor caulem illum abstulerit. *Inimicitia* ipsis cum lupo, pardali, elephanto, caprimulgo ave, saliva humana, melle, evonymo, vite, & conyza. Lupus capras devorat. Pardalis easdem invadit. Elephas exhorret. Caprimulgus avis ubera fugit. Unde uber emoritur, caprisque cæcitas, quas ira mulsere, oboritur. Humanam salivam vitare, Ælianus reliquit. Hausto melle debilitantur, si Alberto fides. Evonymi folium & fructus capras interimit gustatus, nisi purgentur: purgantur autem anocho, quod quid sit, vide Aldrovandum: Aquam si biberint in qua folia rhododendri maduere, pereunt. Iisdem & Sabina venenum. Oleam si lambendo linguâ contigerit, primo germinata sterilefcit. Pulmo assus ebrietatem prohibet. Conyzam edentes moriuntur siti enectæ. *Ægolethrum* herbain Lycia, eisdem exitium. Inde nomen sortita. *Vox* ipsis est apud Græcos *μικαδση*, id est mutire, ut Hospinianus vertit. Unde Homero *μικαδες* vocantur. Apud Latinos, & balare, quod commune cum ovibus & fremere. Inde *φριμωσειν* de hirco. Varinus *ἐνὰ* hircinæ vocis imitationem esse asserit. Mobiles sunt & celeres. Unde Varro in Soracti Fiscelio capras feras, è saxo, pedes plusquam sexagenas salire scribit. Frigores potius quam æstus sunt impatientes: fætæ inprimis, quæ gelicidio hyemis conceptum fecere. Amant potius dumeta quàm prata, & campestem situm: asperisque etiam montosis ac sylvestribus optimè pascuntur. Ita autem inhaerent rupibus, ut infra eas intuentibus videantur pendere. Unde caprarum & hircorum grex, *αἰπόλειον*, quasi *αἰποτόλειον*, sublimium conversatio dicitur: ipsæ verò *petræ αἰγίλιπες*. Proximè etiam ripas vago passu lasciviunt, comam fluvii tondentes. De *Carnium* caprinarum qualitate non convenit inter authores. Hippocrati sunt cruditis, flatulentis & ructuum generatrices. Minus tamen æstivo tempore, quo melius pabulum habent noxie. Autumno deterrimas Galenus fecit; hyeme, meliorem sanguinis consequi habitum, & naturalem intemperiem à temperatura temporis contractum corrigere. At Athenæus, si conficiatur, etsi olida sit, plu-

rimum alere, plurimumque corpori robur addere, reliquit: Clitomachumque Carthaginensem novæ Academiæ sectatorem solitum ferri dicere, quendam athletam Thebanum, omnes suæ ætatis viros superasse, quod caprinis carnibus vesceretur, tenacibus illis, & concoctu difficillimis, quarum esu olidus è corpore sudor, manaret. Militarem cibum esse, Homerus in Achille legatos Agamemnonis excipiente, ostendit. *Lac*, inter cætera lactis genera moderatè se habet; etsi minus quàm humanum temperatum. Est tamen & in eo, si ætatem, passionem, anni tempus, & spacium quo à partu edito distant, discrimen. Sine melle periculosè sumi, author Galenus, quòd in ventriculo coaguletur. Minus idem alvum tentat, nisi scammonio & aliis vescantur. In quibusdam Orientis locis, tertio mense ablactati infensos, eodem ali solent. Lactis naturam *Cafeus* sequitur. At *hircorum* caro, tum ad coquendum, tum ad bonum succum generandum, deterrima est: libidinisque inprimis tempore vitatur & fætet. Apud Antiphanem tamen *πράγμα ὑπελάτας* in convivio apponitur. Testes quoque & jecora damnantur. De *Hædina* non est una authorum sententia. Sanctis in V. T. olim in deliciis: Ascræus Poëta *δρυμὸν καὶ δρυπερίον* vocat. Platina post Galenum, domesticorum animalium laudabilissimam esse, quòd parum recrementi haberet, facilè concoqueretur, benè aleret, sanguinem calido & frigido temperatum generaret, scripsit. At Brujerinus eas vituperat, quòd capræ febre nunquam carerant: nec possit sanum temperamentum à matre morbida fætus fortiri. Julius Alexandrinus verò calidas quidem esse asserit; sed naturalem quæ in adultis est siccitatem, teneritudinem ætatis emendare, & ad temperamentum quoddam ducere: simul lactentes, minimè quidem ætatis ratione, verum alimenti beneficio, de nativa caliditate aliquid remittere, & humectiores tenerioresque fieri. Olim etiam apud Ethnicos, in conviviis circumferebantur, lascere & aliis conditæ. Sanguis in cibum formatus, sanguiculus, teste Plinio, dicitur. Formabatur & in cibum: Unde *μέλας ξαρμὴς* apud Lacones: & Pollux *αἰμαλίαν*, obsonii genus exponit. Jecinora & pulmones quomodo coqui debeant, vide apud Apicium. Magni & in Medicina usus. Ideo Plinius, millia remediorum ex capra demonstrari dixit. Democritus etiam effectus ejus auget, qui singularis natus sit. Carnes caprinæ comitialibus in rogo hominis tostæ exhibentur, ut volunt apud Plinium Magi. Hircorum in aqua decoctis panos & apostemata discutunt. Jure caprino cantharides expugnantur. Drusus Tribunis plebis *caprinum sanguinem* bibisse dicitur, cum pallore & invidiâ veneni sibi dati insimulare Q. Cepionem

Galen. de
boni &
mali suc-
ci civis
c. 6.

Ludovic.
Roman.
l. 5. c. 20.

Brujer.
de re ci-
baria l.
14. c. 17.
Jul. Alex.
Salubr.
l. 11. c. 7.

Ufus in
Medicina.
Plin. H.
N. l. 28.
c. 10.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 9.

nen inimicum vellet. Eodem maculas contractas ablui Marcellus scribit. Tormina intestinorum & alvi fluores sistere in fartagine frixum, apud Galenum, & Dioscoridem habemus. *Hircinus* abscessus calidos citò maturat: in cerato quodam podagrico apud Ætium admiscetur: lusciosos fanat: herbis diureticis nutriti, aridus & tritus inque vino cum petroselino sumptus, calculosis vehementer prodest. Quomodo & quando colligi debeat, apud Aldrovandum vide. Medicamentum hoc manus Dei vocatur. Paria ibidem ex Marcello, Fuchsio, & aliis invenies. Adamantem eo solvi & emolliri magni auctores, inter quos Scaliger & Joubertus prodidere. Si in sanguine eodem & succo secretionis vitrum efferbuerit, aut maceratum fuerit, reddetur tam molle, quàm est cera vel argilla, ut quidvis ex eo fingi possit: pristinae naturae restitues, si aquae immerferis. Hoc est Geberi, Alberti, & ingeniosi cujusdam Bituricensis vitrarii secretum, quod ille moriturus Antonio Mizaldo, ut ipse memorat, ultrò donavit. Idem cum aceto mistus sanguinis vomitui & excreationi prodest. *Serum* commodè illis, qui mordicatione patiuntur, aut in recto intestino, aut in colo, injicitur, quod ob crassitiem citius concreascit, ut Galenus docuit. Secundum Avicennam magis resolvit quàm cætera, cum melanthio, sulfure, & iride, lentiginesque & maculas tollit. Cum adipe anserino, Plinio teste, ac medulla cervina, resinaque & calce, labiorum fissuris efficax est. Cervix boum si intumuit, comperimus, inquit Columella, aureum esse medicamentum, ex pice liquida, & bubula medulla, & hircino sevo, & veteretoleo, æquis ponderibus compositum atque incoctum. Cum calce strumas discutit, teste Plinio & Marcello; cum cera, ulcera serpentina sistit; additâ pice & sulfure percurat; manantia item verendorum cum melle rubique succo. Per se datus adeps, teste Dioscoride, cantharidum venenum obtundit. Magi ut citat Plinius, commendant comitialibus cum felle taurino pari pondere decoctum, & in folliculos fellis reconditum, ita ne terram attingat bibendum sub limine ex aqua. Marcellus ptisanam cum eodem coctam torminosi in declinatione convenire vult; & apud Dioscoridem habemus, caprinum adipem decoctum cum polenta, rhoë, & caseo, dysentericis dari, & cum succo ptisanæ infundi. Plinius denique in forbitione aliquâ intestinorum vitiis magnoperè prodesse asserit, ita uti protinus frigida aqua hauriatur. Idem remedium hydropicis. Sextus Empiricus commendat. Canarii, ut refert Cadamustus, sævo hircino conjuncto quorundam herbarum succo carnem in-

ungunt, ut cutis facta inde densior algorem ferat facilius. Nudi enim incedunt. Adhibetur & podagricis cum fimo caprae & croco, sinapive, cum caulibus hederæ tritis, vel flore cucumeris sylvestris. Idem, pomatum ingreditur, ad fissuras labiorum commodissimum. *Medulla* post cervinam & vitulinam laudatur. *Iecur* assum celiacis convenit, magisque quam hirci, cum vino austero decoctum potumque, vel ex oleo myrrheo umbilico impositum. Idem ad nyctalopias facit, & illos qui comitiali morbo sunt obnoxii deprehendit, convulsionemque iisdem infert. Quin & ad canis rabidi morsum laudatur, quo imposito, ne tentari quidem aquae metu affirmant. Hippocrates, si pariens inflata fuerit, hepaticum ovillum aut caprinum calido cinere obrutum, edendum præcipit meracius ad dies quatuor, & vinum bibi vetus. Ex *felle* multa quoque apud Plinium inprimis sunt remedia. Veneficiis ex mustela rusticâ factis, contrarium est: cum cinere aluminis, scabiem abolet: ad porriginem cum cretâ cimoliâ & aceto facit, ita uti capilli paululum inarescant. Idem lentigines tollit admixto caseo & vivo sulfure, spongiæque cinere, ut mellis sit crassitudo: Strumas etiam discutit, si sæpius incipientes ea tangantur. Superciliis impositum pilos abolet, nihil de angina & aurium vitiis dicam. Invenitur denique apud Dydimum, non fore in lecto cimices, si fel hirci aut tauri, aceto acri diluatur, indeque lectus aut parietes illinantur. De *Liene* hoc habemus. Calidum, id est, ut è pecude exemptus est, & super lienem hominis impositum, mirè intra paucos dies dolorem auferre, si postea ad fumum suspendatur, ut illic arescat. *Caput* cum pilis suis decoctum, & contritum incisa intestina solidat. *Cerebrum* Magi per annulum trajectum aureum, priusquam lac detur infantibus instillant contra comitiales, cæterosque infantium morbos. Æsculapius cum melle carbunculos sanare vult. Sextui verò aquam, quæ è caprae palato effunditur, & quicquid comedit, si misceatur cum melle & sale: ex eo caput & corpus si ferò fricetur, pediculos extinguere promittit, aitque idem remedium esse ad ventris dolorem. *Corii* cinis ex oleo illitus pernionis mirè abolet: ramenta cum pumice trita, acetoque permista, exanthematis profunt. Sistitur nimia in fœmina ex naribus hæmorrhagia, si mammillæ ejus corrigio caprino vinciantur. *Pili* usti fluxus omnes sanant: combusti adjecta pice & aceto, naribusque inserti, sanguinem subito reprimunt. Accensi serpentes fugant. *Cornu* combustum & mixta farinâ impositum, furfures scabiemque in capite emendat. In flamma usulati, crustæ cum aceto scillitico tritæ, com-

Hippocr.
crat. de
natura
mulie-
bri.

Mizald.
Memo-
rab.
cent. 8.
aphorif.
18.

Columella R.
R. l. 6c.
14.

Dioscorid. M.
M. l. 2.
cap. 94.

Cadamustus
Navig.
cap. 8.

Plin. H.
N 1. 24.
c. 7.

Hippo-
crat. de
morbis
muliebr.

modè igni sacro adhibentur. Capiti infirmi suppositum, vigilias in somnum convertit. Alarum fætozem, rasum vel exustum, & cum felle hirci, myrrhaque mistum, tollit, si eo perfricentur. Comitiale morbum deprehendit. Nidore suo lethargicos excitat, & ustum ad albedinem dentes detergit. *Ungulas* ad serpentes prohibendos Palladius uri jubet: si cinis earundem ex aceto illinatur, alopecias sanat. Est & *Lac Caprinum* in multis contra morbos remediis. Scio, inquit Plinius, Damocratem in valetudine Confidiæ M. Servilii consularis filia, omnem curationem austeram recusantis, diu efficaciter usum lacte caprarum, quæ lentisco pascebat. Vis ei inprimis alexiteria. Haustus cum uva taminia, contra ictus serpentum juvat. Quod primum mulgetur, leviores facere in quartanis accessiones, sive esum sive potum, Sextus Empiricus author est. Magorum verò quidam fimi hirundinum drachmam unam lactis caprini vel ovilli vel passi, cyathis tribus adversus quartanas ante accessiones dare solent. Eodem perunctæ gingivæ faciles dentitiones faciunt. Potum cum sale & melle alvum solvit. Schistum, datur comitia libus, paralyticis, melancholicis, leprosis, elephantiacis, &c. Fervens adjecto polentæ quantum satis, ut puliculæ instar fiat, dysenterico bibendum datur. Sanantur eodem & *Lienes*, post bidui inedia, tertiâ die hederâ pastis capris, per triduum potio sine alio cibo. *Caseus* recens morsibus animalium imponitur: siccus ex aceto & melle purgat ulcera: mollis cum melle subactus & impositus, pannoque aut linteo desuper reclusus, sugillationis livoresque celeriter abstergit. Recens coagulatus super oculos positus, dolores citò lenit, si mulier cibos adversans utero doleat, & febris ipsam ac rigor corripiat, Hippocrates pepli albi quintam, dimidiæ chœnicis partem, & feminis urticæ tantundem, & casei caprini rasi dimidiam chœnicem, simul cum vino vetere miscet, & sorbenda propinat. Et alibi, si quid in utero computruerit, vel si sanguis aut pus exeant, caseum caprinum affatum vel rasum, vel simpliciter cum æquali parte polentæ miscet, & in vino jejuno propinat. Quantum ad *Coagulum*, Hædi contra pastinacam & marinorum morsus, drachmæ pondere ex vino fumebatur. In profluvio sanguinis bibebatur, & contra concretum lac assumebatur. Idem tertia parte ex aceto potum, sanguinis excretionem reficit: magnitudine fabæ, in vino myrtheo remissum, & jejuno cæliaco datum, efficaciter prodest. Hippocrates quoque hædi coagulum adversus alvi profluvium laudat. *Urinam* quod concernit, ea cum aceto scyllitico hausta, contra ictus serpentum valet: apostemata, in quacun-

que parte discutit: opisthotonon, auribus infusa levat. Pæni pastorales in filiis quadrimis, ut refert Herodotus, venas verticis lanâ succida inurunt; nonnulli venas temporum, ne, scilicet, unquam pituita defluens ex capite officiat. Quod si pueris inurendis spasmus contingat, urinâ hirci aspersâ eos liberant. Dioscorides, eandem ad aquam quæ cutim subiit, cum nardi spica, quotidie, binis cyathis, cum aqua bibi scribit, urinamque per alvum extrahi. Sextus, mulieri menstrua provocare, si bibatur, credit. Omnium creberrimus usus *Fimi*, Græci *σύνουρος* propriè nominant, digerentis & arcis facultatis adeò, ut induratis scirrhorum in modum tumoribus, congruat, non tantum lienis, sed & aliarum partium. Ustusque tenuioris quidem substantiæ, verum haud manifestè redditur acrior. Datus aliquando ex aceto ad viperarum morsus, ex vino ad auruginem, cum thure ad profluvium muliebre. Inquietos infantes, fimo isto alligato panno, cohiberi tradit Plinius, maximè puellas. Luxatis cum melle illinitur. Ex aceto decoctus, strumas discutit. Ex eodem subservefactus, & illitus, ulcera, quæ serpunt, sanat. Cum melle paratus & appositus cancrasos, & carbunculo ventris laborantes, sanat, & eosdem discutit. Ambusta sine cicatrice sanat. Tritus & cum aceto scyllitio mistus, frontique applicitus, hemicraniam tollit. Cum eodem subactus ad crassitudinem mellis articulo- rum contractiones relaxat, & tremulis prodest. Cum farina hordei & aceto impositus, maximè in duris & rusticorum corporibus, remedium est ischiadicis. Pillulæ inter remedia mensium & secundinarum pellendarum apud Hippocratem. Hisce adjicere libet, quod ipsemet hircus pestilentia tempore domialatur, quasi ædium vastitas, viroso vapore, quem hircus exspirat repleta, aditu auram venenatam repellat. Præter hæc, fiunt ex caprellis villis cilicia: ex pellibus indumenta, calcei, stragulae, utres, lagenæ, rates, folles, vela, charta denique & scuticæ: cornua hircina Pyrrhus cristæ loco capiti imposuit. Locrenses, quos Ozolos vocant, *καυρία* & *καΐδια* id est, ovium & hircorum pelles gestabant, & plerumque inter caprarum greges versabantur. Sardos quoque & Getulos caprarum pellibus amiciri consuevisse, author est Varro. In Cypri etiam Zambellotumè pilis caprarum conficitur, & Josephus Barbarus testatur, in Armenia minore propè Betolin & Issan fluvios, vel ideò magnam caprarum copiam ali, & quotannis tonderi. Afferit & Bellonius, selectiores Turcarum pannos, undulatos, ex pilis caprarum Ancyra Cappadocia metropoli confici: sed & tapetes, exiisdem constare. De chartis quod dixi, illæ, Pergami Troadis primum inventæ fuere,

Herodot.
1. 4.

Galen.
simpl. 1.
10. c. 22.

Usus va-
rii.

Varro R.
R. 1. 2.
c. 3.

Bellon.
observ. 1.
3. c. 13.

Differen-
tia.

Ælian.
H. A. 1.
17. c. 34.

Aristot.
in Mira-
bilib.
Ælian.
H. A. 1.
3. c. 32.

Xaverius
Epist. 23.

fuere, & exinde nomen sortitæ sunt. De *Differentiis* pauca occurrunt. Ægyptiæ fæ-
tus quinos pariunt, quod fæcundissimas
Nili aquas bibant. In Phrygia hirci sunt
quadricornes, referente Scaligero, pilo
admodum prolixo, æquante candorem
nivis, quem vellunt ad textrinam, non
autem tondent. Ægyptii apud Plutarchum,
affirmant, capras suas, quoties cum sole,
eodem planè loco Syrius oritur, in ortum
omnes conversas, eò respicere, atque hoc
syderis hujus revolutionum argumentum
certissimum esse. In *Aquinolaribus* terris,
si Olao Magno credimus, hirci sunt ma-
gno corpore, crassius cruribus, plenâ & brevi
cervice, auribus flexis, & depressis, capi-
te parvo, spisso, longo, ac nitido collo;
cornibus altis & latis. Ferè omnes colore
sunt albo. Hyeme pascuntur pinorum cor-
ticibus, musco, & populeis virgis. Pelles
maximis navigiis, quæstus & lucri causa,
in Germaniam exportantur. *Caspia* capræ,
ut Ælianus exponit, & albissimæ sunt &
cornibus mutilæ, & ad maximorum equo-
rum magnitudinem accedunt. Eorum villi
adeò molles, ut cum Milesiis lanis compa-
rentur, ex iisque Caspiorum sacerdotes,
& ditissimi, vestes confectas gerant. In *Ce-
phalenia* capræ non bibunt quotidie, sed
adversum sibi ventum ore hiantes excipiunt.
Ideò Theophrastus sex mensibus non bibere
dixit. In Cilicia, referente Plinio, circa-
que Syrtes, villo tonsili reperiuntur. *Damasceno*,
supra palmum longas habent au-
riculas, ubera multiplicia, suntque admo-
dum fœcunda: Circumducuntur quadra-
ginta vel quinquaginta ab eis quibus lac est
venale, & ubi lac emere volueris, in supe-
rius devehuntur cænaculum, etiamsi tri-
plex foret contignatio, ubi coram in vasa
stannea, lac emulgent. *Narbonenses* auri-
culas latiores suis habere, Gesnerus audi-
vit, ut quæ ad dodrantem longitudinis ac-
cedant. *Illyricæ*, si Alexandro Myndio cre-
dimus, ungulas quidem habent, sed non bi-
fidas. Aliquando ternos, quaternos aut qui-
nos fætus edunt, & lactis sesquicongium.
Idem *Indicis* propè urbem Tarnassuri, &
Africanis ad promontorium capitis viridis
contingit. Hircum ad Amboinam lacte suo
parvos alentem hædos, se vidisse, Francis-
cus Xaverius Jesuita, corruptæ illius de
Christo & Petro historiæ, quam Persicè
conscripsit author, testatur. Ubere enim
quod propè genitalia unicum habebat, tan-
tum lactis reddebat quotidie, quantum
scutella capere potest. *Mambrina* capra in
regione Damiatæ, fertequitantem, sellam,
frenum, & cætera quibus equi instrui so-
lent: auriculas usque ad terram demissas
habet, cornua deorsum revoluta sub ore.
Pharos insula Ægæi maris, gignit capras
cervis colore fumiles, magnitudine majores.

Est autem eis cornu longum ad duodecem
palmos, rectum, & quod unum solum ha-
bet porrectum stipitem, si Surio credimus.
In Sardinia scribit Nymphodorus, pelles
caprarum tam mirificâ vi esse, ut hyberno
tempore calefaciant, æstivo refrigerent.
Eadem fortè sunt, quæ Musmones. In ea-
dem hirci quidam celeritate omnes bestias
superant. Ex Monstris, tricornis capræ ima-
ginem hic exhibemus.

ARTICULUS V.

De Capris sylvestribus in genere.

DE Capris sylvestribus in genere &
in specie agendum est. Illarum
plurima apud Græcos occurrunt nomina.
Αἰζ ἄγριος, nempe *αἰζόκερος*, *δὲρξ*, *δορκας*, *δορκαλς*, *δορκά-
λις*, *δορκαδίων*, *πρόξ*, *πλάξ*, *βέβαλος*, *ἰξάλος*, *νιθρός*, *κημάς*,
κόλος, *τραγέκαφος*. *Αἰζ ἄγριος*, capra fera Latinis est.
Solinus tamen sagittas dictamno herbâ ex-
trahendi morem, qui ab Aristotele, Theo-
phrasto, Cicerone, Virgilio, *αἰζὶ ἀγρίῳ* sim-
pliciter ita dictis tribuitur, ad illas adstrin-
gere videtur, quæ Cretam & Idam mon-
tempotissimum incolunt. Et, si Virgilio es-
set, fera capra quæ Aristoteli *αἰζ ἄγριος*, ma-
nifestissima inter utrumque contradictio es-
set. Cum hic feras capras in Africa esse ne-
get, ille haberi ostendat. Ideò per capras
feras Virgilii, capreas exponit Servius, &
Aldrovando videtur, ubi pro specie su-
menda est, illam intelligi debere, quæ do-
mesticæ est similior. Sanè Varro, capras
quas alimus, à capris feris ortas dicit, ip-
soque capræ feræ nomine, privatim uti vi-
detur. Varino *αἰζ ἄγριος*, & Hesyschio
dicitur: quam tamen vocem Oppianus
peculiari speciei, illi scilicet, quæ Tri-
dentinis & circumvisinis populis Camoz-
za vocatur, tribuit. *Αἰζόκερος*, capricornus
est Latinis, quam vocem barbari, teste
Scaligero, capræ silvestri imposuere, &
soli Suidæ, genus est animalis. *Δὲρξ* & *δορκας* so-
lo nomine differunt, etsi quidam apud
Hermolaum animal diversum esse opinen-
tur. Alibi pro eo *ζόρξ* legitur, interpre-
Strabonis Damam, Nicandri, Capream ver-
tit. Damas etiam traducunt apud Oppia-
num Gillius & Bodinus *δορκας*, qui *ἰορκας*, He-
sychio. Dioscorides tamen à Dorcade ma-
nifestè distinguit. Cornarius rupicapram
intelligit, quæ cornua in dorsum adunca
habet. *Dorcadis* nomine Plinius ita utitur,
tanquam ei nullum apud Latinos vocabu-
lum respondeat, sentitque capream, capre-
olum & dorcadem, tria animalia, unem
duntaxat animal denotare. Aldrovando
ea vox nomine generis usurpari posse vi-
detur. Aliis, ut Ethymologo & Varino,

Aldro-
vand.
Hist. bi-
sulc. c.
10.

Oppian.
Cyneg. 1.
2. v. 343.

cervinus pullus esse creditur, sed malè. Cordus à dorco sexu differre existimat. Scaliger per dorcadem capreolum, per dorcum capream intelligit. Ut ut sit, *παρὰ τὸ ὄξυς δόρκειν*, venit, quod acutiùs videat. Afferunt namque hi, (Origenis apud Aldrovandum verba sunt) quibus medicinæ peritia est, inesse huic animali intra viscera humorem quendam, qui caliginem oculorum depellat, & obtusiores quoque visus exacuat. Ideò Ethymologo *ζῷον ὀξυδερκὲς ἢ δόρκειον* dicitur. Invenitur & *δόρκειον* in Canticis Canticorum; quæ tamen vox, auctore Myrtilo apud Athenæum, parum usitata est. Videtur omnem capram sylvestrem significare. *Δορκαλίδες* apud Oppianum brevem habent caudam. Gillius cervos transtulit, sed perperam. Ab istis namque apud eundem distinguitur. *Πρόκις* Varino sunt *ἔκτρονα*, *ἐλάφων*, ἢ *δορκαλίδων* *ἑίδω*. At Aristoteles, dum dicit, fel nec cervum, nec *πρόκις* habere; & sanguinem ubi effluerit concreescere omnium, præterquam *ἐλάφης* & *πρόκις*; ab invicem distinguit. Gaza Damam vertit. Nomen à celeritate, *ἀπὸ τοῦ πορεύεσθαι*, Grammatici sumunt. *Πτῶξ* à quibusdam & lepus & dorcas exponitur, cervus item & *νεβρός* quæ omnia animalia sunt timidissima. Sed & *πτῶξ* idem est quod *πτῶξ* timidus, seu pavidus, quo sensu Homerus *πτῶκα λαγῶν*, dixit. *Κεμάς* apud Hesychium exponitur, vel hinnulus, vel cervus, vel dorcas. Ex caprearum genere esse, negat Scaliger. Sunt, inquit, in cervis, ut in bobus junix & juvencus. Æliano specie à cervo differunt. Turbinis, inquit, *instar celerrimè fertur, flavis pilis spectatur. Cauda est albiſſimâ, tum ex albenſi ejus oculi cyaneo colore tincti videntur, aures per altis pilis referta, neque modò in terra pedum celeritatem ostendit, sed etiam cum in fluvii confluentem inciderit, Ungulis pedum remigans, fluctus perrumpit, & verò in lacubus natare gaudet, unde sibi pastum comparat. Virides juncos & Cyperum depascitur.* *Νεβρόν* hinnulum interpretantur, Cordus, Marcellus, & alii. Aldrovandus peculiarem quandam capræ speciem hoc nomine indigitari, apud Dioscoridem, scribit. Nam Varinus & Ethymologus *πρόκις* quoque dici produnt. Marius Grapaldus damam reddidit: Solinus etiam Damam esse ostendit, dum scribit. *Nebrodi damarum copia nomen dedit, quem dama & hinnuli gregatim pervagantur, inde Nebrodes dicti.* *Κάλα* ex Scythicæ & Sarmaticæ gentis capris sylvestribus censeatur. Magnitudine est inter cervum & arietem, albicante corpore, eximie super hos levitatis ad cursum: naribus potans trahit ad caput. Hinc postmodum complures dies servans adeò, ut per carentes aquis agros facile pabulum carpat. *Caprea* vox apud Latinos, sæpè pro omni capra sumi videtur. *Rupic apra*, etsi in sylvestribus species est Plinio,

ratio tamen nominis postulat, ut generis etiam vicem subeat, quando quidem per summas versari rupes, non illi tantum cui cornua in dorsum adunca, convenit. Delectantur in universum excelsis montibus, & tam in sublimi habitant, ut vix humanis obtutibus pateant. Quod si aliquando ferarum vel hominum adversitatem persensere, de altissimis faxorum cacuminibus sese præcipitantes, in suis se cornibus illæsas suscipiunt. Plurima inter mares discordia propter fœminas, tempore libidinis. Domesticis, omnium censensu, saporis alimentique bonitate, constitutionis tenuitate, concoctionis facilitate, excrementorumque paucitate præferuntur. Sicciores tamen paulò carnes habent. Ideò inventum Arabum oleo eas incoquere, ut inde humescant. Diocles tamen, Archidamus & Galenus, quod in oleo coquitur siccum evadere, & glutinis vinculo amisso, solutile fieri censent, *ἡδύρην* nempe & *καύρον*. *Usus in Medicina* quod spectat, *Capræ* in cibo sumptæ dysentericis profunt. *Iecur* seu inassatum, seu tritum celiacis opitulatur: Vapor in aqua calidâ falsa cocti, oculis exceptus, nyctalopas juvat. Combustum & aspersum sanguinem sistit, maximè si contritum naribus indatur. Sanguis cum palma marina teste Plinio pilos detrahit: secundum Marcellum, abscessus maturat. *Fel* theriaca est morsibus venenosus. Idem contra suffusiones incipientes, oculorum caligines, genarum & palpebrarum scabticias, facit. Cum rosaceo aut succo porri tritum, & tepidum naribus instillatum, tinnitum tollit. Cum melle Attico faucium dolores levat, & veretri exulcerationem sanat. *Fimus* aridus, tritus & cribratus, ex vino odorifero cyathi mensurâ sumptus, auruginem tollit, si Galeno credimus.

ARTICULUS VI.

De Capris sylvestribus in specie.

PUNCTUM I.

De Rupic apra & Dama.

CAprarum sylvestrium species sunt, *Rupicapra*, *Dama*, *Ibex*, *Bubalis*, *Pygargus*, *Capra strepsiceros*, *Dama vulgaris*, *Capra Moschi*, *Capra Bezoardica*, *Suhak Scytharum*, *Oryx*, & *Capra auribus demissis*. *Rupicapra* Dioscoridi Dorcos, Oppiano *ἄγαστρον* seu *ἄγαστρον* Varroni Caprea, nisi fallor, dicitur. Magnitudo ei quæ capræ villaticæ, paulò tantum altior, & corporis forma feris altis similior. Bellonius minorem damâ facit. *Colore* est inter fuscum & ruffum, qui æstate magis ad ruffum, hyeme magis ad fuscum vergit. At Scaliger æstate pilo fulvo, hyeme cinereo

Ælian.
H. A. l.
14. c. 14.

Strabo.
Geogr.
l. 7.

Aldro-
vand.
Hist.
Bifulc. c.
11.

Scalig.
Exercit.
207.

Bellon.
obf. l. I.
c. 54.

nereo esse dixit. Gesnerus partim albam partim nigram, distinctis coloribus vidit, sed & albæ totæ interdum, quamvis rarissimè, conspiciuntur. *Oculos* habet rubros, *aures* arietinis longiores, colore gilvo, atramque lineam utrinque recta à cornuum radice supra oculos ad extremum os ductam, & in labra superiora desinentem. *Frontem* veluti stella insignit. *Caudæ* superior pars pilosa, nigra, & rotunda; ut dorcadis longa. *Cornua* ei nigricant, novem aut decem digitos longa, multis nodosis circulis exasperata, minoribus paulatim, in unco nullis, quin levis & acutus est hami instar. Paralella ferè, id est, æquis undique intervallis surgunt; solida, ab initio tantum pollicis circiter mensurâ cava, & teretia magis quàm domesticis. Ajunt, inquit loco citato Scaliger, mucronibus cornuum, id quod capras quoque facere videmus, tergum scabere. Ex ea scalpturitione; quæ perniciēs evenerit, operæ pretium est cognoscere. Creditum est tanta illas illo in pruritu perfundi voluptate, ut extremum cornus fastigium, in corium eo usque adigatur, unde retrahi nequeat. Quo circa ex altissimis ruere locis, atque afflicti, aut à venatoribus fortè deprehensas, proculve observatas capi, aut fame interire. Rupes montium colunt, non summas tamen, ut ibex; neque tam altè & longè saliunt: descendunt aliquando ad inferiora Alpium juga. Conveniunt sæpe circa petras quasdam arenosas, & inde arenam, ut capræ sal, lingunt, quo linguæ inertem pituitam defricent, & appetitum excitent. Cum in venatione urgentur, altius semper ascendunt, donec nullus ad eas canibus pateat accessus: deinde cum venatores per saxa manibus pedibusque sequi vident, de saxo in saxum transiliunt, ac montium cacumina petunt, donec nulla schandendi reliqua sit facultas. Illic se cornibus retinent, & quasi suspendunt. Sic vel bombardis feriuntur, vel in præceps pelluntur, vel fame pereunt. Mox à Divi Jacobi die frigidiores montium clivos petunt, ut paulatim frigori assuescant. Capræ, aliquando cicurantur. Ex pellibus fiunt chirotece equitantibus. Ubi errabundæ quærunt novos sedes, aut pascua perspectâ proximâ rupe, projecto pede, sæpe periclitantur ejus fidem, nempe, mobilis ne sit, an lubrica. Illud festivum, addit Scaliger, In aula patruī, Bonifacii, vidimus cicures assilire ad aulae pendentia, in quibus similis essent intextæ feræ. Quantum ad *Usam*, caro est siccior, & melancholici humoris parens, odoris sylvatici. Venatores ex recenti sanguine scaturientem, tanquam insigne vertiginis remedium sorbent. Apud Plinium legimus, sevi cyatho, & lactis pari mensurâ deploratum phthisicum convaluisse. Iconem duplicem hic exhibemus; Rupicapræ nempe, & Caprimontani. *Dama* du-

plex est, Una veterum, de qua hic; altera vulgaris sive recentiorum. Græcis *πλατύκροα* dicta, quam Gaza fortè intelligit, cum *πρόκροα* apud Aristotelem damum vertit. Plinius caprarum sylvestrium generibus, quæ transmarini situs mittunt, annuërat. For- te Dioscoridi & Nicandro, de coagulo agentibus *νεβρός* appellatur: Grapaldus etiam *νεβρόν* damam reddidit. Animal est capræ magnitudine & colore dorcadis. Ovidius fulvo tergore damas virtut. Famosa est imprimis earum timiditas. Ideò rarò mansuescere Plinius tradit. Cornibus tanquam unco prominentes rupes apprehendunt, neque aliter inaccessas montium verrucas superant.

P U N C T U M II.

De Ibice.

DIoscorides in capite de coagulo, hujus capræ non meminit, & vix fortè aliquis est ex veteribus, qui meminerit, Homero excepto, qui *ἰξάλον ἄγχα* vocat. Esse verò eam quam Germani *Steinbock* vocant, omnes docti uno ore testantur. Plinius totam historiam brevissimè complexus est, dum inquit. Ex caprarum sylvestrium genere sunt etiam ibices in Alpibus, pernicitatis mirandæ, quanquam onerato capite vastis cornibus, gladiatorumque vaginis, in hæc se librant, ut tormento aliquo rotati in petras, potissimumque è monte aliquo in alium transilire quærentes, atque recessu pernicius quò libuerint, exultant. Egregium est animal & corpulentum, specie ferè cervinâ, minus tamen: cruribus quidem gracilibus, & capite parvo cervum exprimit. Color *pellis* fuscus est. Senectute canescunt, & secundum dorso longitudinem nigram lineam excurrentem habent. *Oculi* splendidi & pulchri. *Ungula* bisulcæ & acutæ. Fœmina in hoc genere mare minor est minusque fusca, major caprâ villatica, rupicapræ non adeò dissimilis. Mares prolixam nigricantem barbam gestant, quod nulli, ut Bellonius tradit, alteri animali cervinis pilis prædito accidit, præterquam fortè hippelapho. Magni ponderis cornua ei reclinantur ad dorsum, aspera & nodosa, eoque magis quo grandior ætas processerit. Augentur enim quotannis, donec jam vetulistandem, nodi circiter viginti increverint. Bina cornua ultimi incrementi ad pondus sexdecem aut octodecem librarum accedunt. Bellonius quaternos cubitos longa vidit. Tot autem transversos nodos seu radios habent, quot annis animal natum est. De pernicitate aliquid ex Plinio diximus. Nulla certe montium rupes tam alta, edita aut præceps est, quam non saltibus aliquot superet, si modò aspera sit, & spacia tanta promineant, quanta salientis ungulas excipere possit. Bello-

Aldrovand.
Hist.
Bifolc. c.
13.

Plin. H.
N. l. 8. c.
53.

Bellon.
obf. l. I.
c. 13.

nus ex scopulo uno in alium sex etiam passuum intervallo distantem, desilire solere scripsit. Dum cadit ex alto, totum corpus inter cornua à collisione protegit, & ictus lapidum magnorum, cornibus excipit. De Venatione Aldrovandum consule. Duo earum genera Bellonius dari prodit, in Creta: id se ex earum cornibus inde & Cypro delatis didicisse, addens. Deprensæ libero capacisque cursus loco, in venatorem irruunt, eosque de rupe dejiciunt. Cum impetendi locus non est, despondent animum & facile cedunt. Ejusdem generis est illa fera Lybica, quam Ælianus ita describit. Capræ feræ ad summos Lybicornum montium vertex commorantur: ad boum magnitudinem accedunt: ipsarum armi & crura luxuriosius pilis fluunt: tibiis parvis, frontibus rotundis, oculis raris & concavis, non valde projectis sunt: Cornibus post primum exortum utriusque ab alteris longè diversis, & aberrantibus & incurvis. Non enim simpliciter ac aliarum caprarum recta existunt, sed eatenus retorquentur, ut ad armos pertingant. Ex capris longè maximè ad saliendum habilitate sunt. Nam ex cacumine, in aliud longè distans cacumen transfiliunt: & tametsi sæpe earum quæpiam, dum ex uno vertice in alterum saltatare contendit, ob nimiam intervallorum distantiam, per prærupta saxa præceps agitur, nihil tamen læditur. Sic est adversus saxorum duritiem, membrorum resistente firmitate, ut nec cornua frangat, nec caput diminuat. In summis montibus plurimas solertia quadam captandi caprarii generis, nimirum, vel jaculis, vel retibus, vel laqueis, à doctrina arti venaticæ instructu comprehendunt. Jam in patentium camporum æquoribus, quilibet vel tardus pedibus eas quod ibidem non valeant capere possit. Earum pellis & cornua aliquot commoditates habent. Nam in frigidis tempestatibus ad frigorum vim, atque hyemen excipiendam, pastoribus & fabris materiariis pelles mirificè profunt. Cornua ad hauriendum de præterfluentium rivorum confluentibus, autè fontibus potionem, ad depellendam sitim, non minori usui habentur, quàm vel calices ipsi. Tanta enim capacitate sunt, ut in bibendo respirare sit necesse. Ab homine expoliendi benè perito cornu politum, tres mensuras capere potest. Habet in *Medicina usum*. Coagulum easdem cum leporino vires habet, ut tradit Serapio. Sanguis, ad calculum in vino apiato apud Gesnerum commendatur. Ischiadicis & arthriticis unicem remedium, sic Marcellus Empiricus componit. Fimum ibi cum lunâ decimâ septimâ colliges quanquam & alia vetere lunâ collectum, fires urgebit, simili efficaciam proficit, dummodo medicamentum decimâ septimâ lunâ componatur. Ex eo ergo fimo

Ælian.
H. A. 1.
14. c. 16.

quantum unius manus pugno plenopotueris comprehendere, dummodò impar sit numerus pillularum, in mortarium mittes, atque adjicies piperis grana viginti quinque diligentissimè trita: tunc addes mellis optimi heminam, & vini veterissimi optimi sextarios duos, & contritis prius pillulis universa miscebis, & repones in vasculo vitreo. Sed ut major sit medicaminis efficacia, luna decima septima id facere debebis, & cum daturus fueris remedium, à die Jovis incipe, & per dies septem continuos dato, ita ut qui remediandus est, stans, in scabello contra Orientem bibat. Hæc Marcellus, quæ merè sunt nugatia.

PUNCTUM III.

De Bubalo sive Bubalide, & Pygargo.

DE Bubalide hæc Aldrovandus habet. Arbitrabar, inquit, aliàs, bubalum specie differre à Bubalide, deceptus nimirum &c. Vide Aldrov. pag. 303. usque ad finem, quam bobus esse ibi etiam judicabam. Quantum ad *Naturam*, domesticam sedem mirificè amplectitur. In alienum deductus locum, & ad pascua demissus, veterem repetit. In metu, occulto capite, latere se putat, ut struthiocamelus. Belluas feroces pugnaresque fugit. Sanguis aliquantulo magis spissatur quàm leporis & cervi: quippe, qui proximè ovillo, aut paulò minus consistat. Placet & de *Pygargo* Aldrovandi verbis agere. Pygargon, (verba ejus sunt) Plinius, in præcitatis verbis &c. p. 304. a usque ad finem frequenter sylvosa & deserta.

Aldrovand.
Hist. Bif.
fulc. c.
14.

Aldrovand.
Hist. Bif.
fulc. c.
15.

PUNCTUM IV.

De Caprea Plinii, Capra Strepsicerote, & Dama Vulgari.

Caprea Plinii, Capreolus noster est, quem Germani *Ilex* vocant. Cervis est colore non dissimilis, sed molè corporis longè inferior, qui vix capram æquat. Mas cornua in capite gerit senis plerumque ramis distincta. Fuit qui decem & septem haberet cornua, cujus icon Aldrovando à Duce Bavarie missus erat. Plinius de iis ita: Dedit ramosa capreis, sed parva, & fecit decidua. Visu est acuto, voce exili, dentes non mutat. Virgilius maculis distinctum ostendit. Servius sparsos albo exponit, qui habent adhuc maculas à prima ætate venientes. Accessu enim temporis, inquit, mutant colorem, & eorum macula gratiæ minoris esse incipiunt. Multæ in regionibus Helvetiorum Alpibus capiuntur. Humiliora tamen loca amant quàm Ilex vel rupicapra. Fœmina si maritus capiatur, alium

Adro. H.
Bif. fulc. c.
16.

Virgil.
Eclog. 2.

alium quærit, eumque secum ad pristinæ habitationes locum adducit. Fœminaverò captâ, maritus aliò discedit, & aliam sequitur conjugem. Cornibus vel uti nesciunt, vel non audent. Cum perdicibus amicitiam colunt, & in iisdem locis pascuntur. Flantem ventum petere currendo Bellisarius ait, ut refrigerari spiritus cursu laborantes possint. Parem illis & apris alimenti bonitatem Julius Alexandrinus posuit, nisi quod illius caro sit concoqui facilior, & citius fugiens. Huc pertinent Capræ Brasilienses, quæ duplices *Cagua cuete* nempe, & *Cagua-cua-para*. Illæ sunt nostris capreis ferè similes. Caput septem digitos circiter longum, oculis magnis, & nigris: *naribus* longis & patentibus; *ore* nigro, *cute* splendente, *auribus* quatuor digitos longis, duos & semislatis, *venis* conspicuis; *collo* rotundo & magis glabro pilis, quam in reliquo corpore: estque longitudo colli circiter quinque digitorum & semis. Corporis longitudo à colli exortu ad initium caudæ duorum pedum. *Cauda* brevis ut capreis esse solet. *Crura* quatuor, priora pedem, posteriora sesquipedem longa: *pes* quilibet duas habet ungulas nigras; & supra has duas minores supra se invicem positas. Pilis vestitur glabris, qui in toto corpore, cruribus & pedibus refuscunt, in collo & capite fusci, sub gutture & inferiori collo albi. *Cauda* quoque inferius est alba. *Aures* interius albescunt, exterius sunt fusci & ferè carent pilis. *Os* inferius longius paulò quam superius? Ruminat cibum. Mansuescit facilè. Quando unius aut duorum mensium ætatem habet totum corpus maculis albis elegantur est variegatumquæ successu temporis evanescunt. *Cugvacu-apara* Brasiliensibus, caprea est cum cornibus, paulò major superiore, at ejusdem coloris. Cornua tria brachia seu digitos habent, nimirum infernum brachium quod longum, & apicem bifidum. Thyrsus seu scapus pollicem humanum est crassus, & octo vel novem digitos Rhynlandicos longus. De *Capra Strepsicerote* ita Aldrovandus. Plinius inter sylvestres capreas, quas transmarini situs mittunt, Strepsicerotes &c. pag. 305. usque ad finem. Cretenfis imaginem ex Bellonio. *Dama vulgaris*, describente Bellonio, corpore quidem cervum refert, & capreolo major est, sed colore differt. Dama minus caput habet cervo. Cornua etiam illi omni anno decidua ut cervo, quæ antrosum protensa habet præter aliorum consuetudinem. Gilvam habet dorsi spinam, atramque lineam, secundum dorsi longitudinem excurrentem, Cauda longa est ad proplites usque dependens, uti vitulo. Sæpè accidit ut ejus latera candidis maculis aspersa sint, quæ vetustate pereunt. Accidit etiam sæpe numero, ut fœminæ omninò albæ sint, sic ut capræ existimari possint, nisi pilum ad-

modum brevem haberent. Ostenduntur ejus cornua ingentis magnitudinis variis in locis, qualia sunt, ea quæ in gradibus & ascensu Ambrosianæ arcis conspiciuntur Caro cum capreolis ferè in qualitatibus convenit, sanguinem tamen ad atram bilem tendentem aliquo modo efficit. Aliquando vervecis in morem pinguis est. Fimus cum oleo myrtino præparatus, capillos augere dicitur.

P U N C T U M V.

De Capra Moschi.

DE Capra Moschi ex veteribus soli Arabes scripsere. Recentiores Græci, ut Aëtius & Paulus Ægineta, si quid habent, ex iisdem sumserunt. Sive autem hanc feram, dorcadem capreamve, aut gazellam Indicam, peregrinam aut orientalem appelles, aut dorcadem moschi, vel simpliciter, animam moschi, parum, inquit Gesnerus, interst. Aldrovandus Capram moschi vocat. Isidorus & Albertus, forte à moscho, qui vulgo muscus, musquelibet. Volaterrano est mus muscus, quem ex Arabia & Æthiopia venire tradit. A Divo Hieronymo ad Demetriadem, peregrini muris pellicula inter odora quibus delicatiores diffuunt, numeratur. Alii moschum significari arbitrantur: Hermolaus animal ex quo Zibethum: Gesnerus folliculum animalis moschi, in quo hoc odoramentum colligitur. In descriptione variant authores, etsi non desint, qui ex authopsia delineent. Conveniunt tamen quòd ex caprarum sive gazellarum genere esse statuant &c. Vide p. 307. a. usque, alioqui recta sunt. Ferunt odoratis pasci, ac potissimum nardo; unde etiam moscho, id est, sanguini circa umbilicum collecto, odor concilietur. Propter insignium velocitatem rarò vivæ capiuntur. Morsu in persequentes sævire, Alexander Benedictus prodidit; qui etiam mansuescere exemptis dentibus longioribus, addit. In provincia Thebet eas canibus venantur. In China, etiam Persia, Africa, & Ægypto reperiri, quidam prodidere. Cæterum odoramentum illud quod hæc gazella fert, barbaris *muscus* Latinis *moschus* dicitur. Appellationis inde fortè sumpta ratio, quòd plantarum musci, quarundam præcipuè arborum, ut cederi & populi albæ, ad varia odora & conspicienda unguenta, apud antiquos usus esset. Alcitatus muscum Arabem vocavit. Græcis dicitur *μόχθ*, vel quod illi, *μόχθς*, *μοχθία* & *μοσχοδύματα*, novostenerioresque in plantis stolones vocent; quorum similitudine in animalibus, quæ moschum ferunt, novi, odoramento illo pleni nascuntur folliculi: vel quòd animalia illa, mediâ inter capream & vitulam naturâ & magnitudine, fulvoque vitularum colore

Bellon.
obser. l. x.
c. 54

Aldrov.
Hist. Bi-
sulc. c.
19.

Mareg.
Hist.
Bras. l. 6.
c. 10.

Aldro. H.
Bif. c. 17.

lore videntur, quas Græci etiam *μόσχος* & *μοσχάριον* appellant: vel quòdmofchi folliculus, à vasculis caparum semen in summo caule servantibus, quæ Græcis *μόσχιον*, figurà non longè absit: vel denique, ut Ethymologo placet, quòd è medio, umbilico scilicet animalis, fundatur, quod Græcis est, *ἐν μέσῳ χέειν*. Taceo posse derivari, vel à verbo *μῶ*, quòd ab omnibus requiratur: vel ab *ὄζω* oleo, præposita *μ* litera; vel à privatione fœtoris *καὶ σέπτον τῆς δυσωδίας. ὄζειν* enim & benè & malè olere significat. De ortu ipsius non omnes eodem modo referunt. Simeon Sethi, (utor Aldrovandi verbis) moschum omnem fundi asserit, &c. Vide pag. 307. b. usque, sic Fuchsius. In *Electione* haud etiam consona scribunt authores. Plateario omnino niger non probatur; laudatur, qui ad spicæ nardi colorem accedit. Brasavolo odoratissimus est subniger, ex Cathaja allatus. Sunt qui Tumbascinum propter pabuli copiam anteponunt, qui in folliculo maturefcit, præstantior eo; qui in aëre suspenditur. Testis enim Brasavolus, immaturum, etsi animali adhærentem, grave olere. Abensinne, moschus melior Antebius vel Asciltios, deinde Jurgius, postea Indus marinus. Elluchasim in Tacuinis folliculos contidentes moschum Cubit esse scribit, subtili ex vesicula & moscho: Gergeri esse folliculos his contrarios, qui moschus minus est subtilis, & minus aromaticus: Moschus Charum medio inter hos loco: Salmindi verò deterior. De probatione ità Aldrovandus. An moschus legitimus &c. Vide p. 308. b. usque, adulterati notam esse. Adulteratur multis modis; præcipuè niger, & ad subrufum colorem tendens, admixto paucosanguine hircino modicè affo, ita ut tres vel quatuor partes, ex istis contritis, ad unam moschi admisceantur. Sed panis assus friabilem reddit; sanguis hircinus cum frangitur, lucidus est & clarus interius. Saraceni sæpi cum folliculis vendunt, quos adulterato inferfere. Alexander Benedictus jecore hœdino arefacta, & avis cujusdam fimo vitiari scribit. Radice Angelicæ à quibusdam, prodente Gesnero augetur; qui etiam factitium describit. Odorem, si aliquid aromaticum addideris, amittet. At si in vase vitreo denso & cerâ oblito asserves, retinebit. Recuperabit amissum, si in olla aperta in cloaca suspenderis. Quantum ad *Usum*, in assignatione temperamenti, authores variant. A-verroës calefacere & siccare in fine secundi scribit, Sethi in tertio. Tenuissimarum esse partium apud omnes in confesso. Mercurialis naribus appositum sanguinem prolicere tradit; & ne idem assumptus faciat, metuit, quod vasa aperire videatur. De cætero, in restauratione virium, tremore, syncope, flatibus, caputpurgiis, pilis odoriferis, suffumiigiis, smegmate, tragematis oris, & unguen-

tis moscatis, vehementer adhibetur. Quibusdam tamen mulieribus uteri suffocatio-nem adfert; quod Venetis & Septentrionalioribus si Olao Magno credimus, contin-gere solet.

Olaus Magnus
l. 16. c.
13. 14.

PUNCTUM VI.

De Capra sive Hirco Bezoartico, vel potius Pazahartico, & aliis.

DIversi diversa circa descriptionem Capræ Bezoarticæ proferunt. Bellunen-sis negare illam videtur, dum lapidem Bezoar nuncupatum, in sui erui venis, ex Thiphasi Arabe prodit. Arabes in cervis eum nasci credidere. Monardus testimonio eorum, qui ex illa regione, ubi Bezoarticum animal reperitur, rediere, constare ait, cervi esse magnitudine, ejusdemque quodammodo forma &c. Vide Aldrovand. pag. 311. b. usque. in Arabia ex capris quibusdam hunc lapidem extraxisse. At Bontio capræ istæ non valdè ab similes sunt capris Europæis, nisi quod habeant erecta ac longiora cornua, ac quædam ex iis versicolore sint pelle, ut tygrides, pulchro aspectu, quales duas, inquit, hic in arce Batavia quotidie videmus. Prout magnum aut parvum lapidem gerunt, eò molestius vel citius incedunt, quòd astutissimis Armeniis & Persis benè notum est. Idem addit, herba quædam croco ac hermodactylis persimili vesci, ex ejusque esu lapides in ventriculis concre-scere. Inde factum, Teixera prodente, ut cum insula quædam, inter continentem Chormandel & Ceylon insulam, à Lusitanis Isle de vacas vocata, horribili inundatione submersa esset, ut capræ servatæ necessariò aliò transferri debuerint; herbâ illa destitutæ, nullos protulerint lapides; insula verò falsugine liberata, reductæ, eosdem produxerint iterum. Tam verò capris his molesti sunt, quàm hominibus calculi vesicæ & renum. Unde colligere licet, vana illa esse, quæ seu Monardes, qui in intestinis, seu Fragosus, qui in renibus, seu Moses Ægyptius, qui in vesicula fellea nasci produnt, scripsere, de quibus Aldrovandum si placet, consule. Nam istius lapidis quidam Pasan esse volunt; alii Balsaar: at Bontius Pazaher, id est, contra venena, quasi Antidotum, vocari tradit. Nascitur præcipuè in Persia, in loco quodam Stabanon dicto, trium dierum itinere supra Lar-am, ubi Reges Persarum vigiles locare solent, ut omnes lapides qui certum pondus excedunt, sibi vindicent. De *formarum diversitate*, ita Aldrovandus. Observandum itidem magnam esse horum nativorum lapidum diversitatem, &c. Vide Aldrovand. pag. 312. b. usque. alii tamen pretiosiores

Aldro-van. Hist.
Bisulc. c.
21.

Bontius
Med. In-dor. p.
46.

Aldro-van. Hist.
Bisulc. c.
20.

Ufus.

atque

atque efficaciores habentur Confici ex maffa quadam adulterinos, Monardes ex relatione Guidonis de Lavaretis prodit: genuinos, qui ex laminis feu corticibus fe invicem amplectentibus constant, illisque adeò splendentibus, ut politæ videantur; intus pulverem habere. Garcias paleam vocat. At Bontius genuinum effe credit, qui, fi pauca calce fricetur, colorem puniceum ostendit; fi in pelvim aquâ repletam conjectus, & ibidem per duas autres horas relictus, idem prout antehac pondus retinet; adulterinum, qui calce fricatus rimam ducit, aut aquâ exemptus, pondus vel remittit, vel auget. De *Viribus*, plurima à Serapione, Monarde, & Garzia ab Horto scribuntur; nempe, nudæ parti corporis applicatum, facere, ne à veneno offendaris: pulverem morfibus animantium infperfum, eosdem fanare; ipsis feris injectum, torpidas reddere: viperas, injectum cum aliquo liquore, enecare. Omnem denique in venenis sopiendis & febribus malignis expugnandus inanem curam, nisi & hunc adhibueris: recitatque Monardes aliquot eorum exempla, qui ipsius beneficio ex faucibus Orci erepti sunt. Iuvat & melancholicos, quartanarios, syncopticos, epilepticos, vertiginosos, calculosos, lumbricis laborantes, & alios. Sed magis mulieribus quàm viris prodesse observatum. Sunt in India, qui se ejus usu rejuvenescere posse, somniant. De quibus Monardem in peculiari tractatu consule. At Bontius, non tantas in eo vires, se mille experimentis invenisse scribit. Corollarii loco ex eodem addo, lapide Pa-zahar in ventriculis simior natos, qui teretes sunt, & longitudinem digiti aliquando excedunt, inter præstantissimos haberi. Ad Hircum Pazaricum referri potest *Vicuna*, & *Taruga*, de quibus ita Nierem bergius. Sunt apud Peruanos quædam perniciosissima animalia quæ *Vicunas* vocant. Quidam putavere, ab Aristotele & Plinio capras dici, sed ignotas priscis Vicunas censeo cum Acoftâ. Cornutum illi animal sic vocarunt, vicuna cornu exermis, cætera licet similis silvestri capræ, cujus & fortasse genus est. Nec obest inopia cornuum; namque & canes cornuti alicubi feruntur, cum communes excornes sint. Gaudet montanis & rupibus, frigus & deserta amat, gelu & nive videtur recreari, societate & grege delectatur. Ad obvios quoque fugax. In fuga præmittit sobolem, cujus parca est. Capitur celebri venatione. Coeunt usque ad tria millia barbarorum, circumdant montem, sic paulatim cogunt in unam sedem feras, aliquando plusquam trecentas: demittunt ad prolem feminas. Aliter capiuntur cum ad conveniens intervallum accedunt, conjectis ad pedem funibus plumbo innexo extremitari quibus impeditur cursus. Tondent illas ad stragula.

Lana earum subtilis & delicata instar sericorum. Pertinacis coloris est, quippe nativi, nulla tincturâ opus habet; In æstu recreat, juvat renum inflammationes: quamobrem culcitræ ex eâ inferciunt. Dicitur mitigare etiam podagra. Caro haud jucunda, nihilominus Indis edulis. De salubritate Josephus Acofta narrat, acerrimum dolorem oculorum pænè subito placasse sibi imposito frustulo carnis recentis occisæ Vicunæ. Generant in viscere bezoar, secundum post Orientalem. Proximum Vicunæ genus *Taruga*, perniciosior, grandior, torridior colore, mollib. & deciditibus auribus: non gaudet societate & grege, rupes sola peragrat. Repertus in his Bezaar major virtute & mole.

Nieremb. H. E. l. 19. c. 64.

P U N C T U M VII.

De *Suhak Scytharum*, & *Capra auribus demissis*.

DE *Suhak Scytharum* ita Aldrovandus. In Scythia latissimis &c. Vide pag. 313. usque ad finem. *Capras auribus demissis*, Aristoteli debemus. Mensurâ hæ palmari, & dodrantali, & nonnullæ ita demissæ, ut spectent ad terram. Fortè ex his ista, cujus Icon hic ponitur, & quam *Capram Indicam*, & *Mambrinam Syriacam* vocant. Lanâ pilis facièque & cornibus ovem potius quàm capram referre videtur. Color albus est.

Aldrovand. H. Biful. c. 23.

Aristot. H. A. l. 8. c. 28.

P U N C T U M VIII.

De *Oryge*.

TRIA animantium genera Orygis nomine apud Græcos celebrantur Vnum aquaticum, duo terrestria. Illius apud Strabonem mentio, ubi de Turdetania agit, quod, teste Hermolao, quidam, Orcas marinas esse opinantur. Horum, duo esse genera, ex Plinio & Oppiano colligere licet. De Oppiani Oryge in sequentibus agemus. Hic Græcis *πράσιον ὄριον*, seu *ὄριον*, fodere dicitur; quod ad ortum, ut posthac dicemus, accedente lunâ, prioribus pedibus terram effodere dicatur. Plinius, si *Formam* spectes unicornem & bisulcum facit, & quidem ex Aristotele. Ex caprarum sylvestrium eodem genere. Contrario pilo vestiri, & ad caput verso; quod & tauro Æthiopico, competit. Eundem perpetuò sitientia Africæ generare, & natura loci potu carentem, & mirabili modo ad remedia sitientium, apud eundem legimus. Namque Getuli latrones, eo durant auxilio, repertis in corpore ipsorum saluberrimi liquoris haustu vesicis. Albertus magnitudine hirci esse, barbatum sub mento, in eremo versari, & facile laqueo decipi scribit. Herodotus magnitudine bovi comparat. Nec nos quicquam certi de ipsius forma habemus. Cornua in omnium ferè museis ostenduntur atra, in extremo mucro-

Strabo. Geogr. l. 3.

Aldrov. Hist. Biful. c. 24.

Forma. Plin. H. N. l. 11. c. 46. Arist. H. A. l. 2. c. 1. Plin. H. N. l. 10. c. 73.

H nata,

Monard. de lapide Bezoar.

Nieremb. H. E. l. 9. c. 59.

nata, pro ætate animantium, longitudine, crassitie, & numero nodorum variantia. Icones duorum hic damus. An ejus sint, an Asini Indici, ne Aldrovandus quidem definire audeat. At quia Æthiopes qui Sili vocantur, iis tanquam armis contra Struthiophagos utuntur; & hæc durissima sint, mucronata, longa & cava, videntur ejusdem esse. Ægyptii multa de eo commentum sunt. Syrii nempe ortum sentire, atque etiam clamore edito significare: contueri stellam, ac veluti numen adesse sentiat, procumbere adorandum: seu singulari quadam sympathiâ, seu, quod apud Albertum legitur, imbrem & frigus præteriisse, frigoris nimium impatiens, percipiat. Quomodo se erga Lunam & Solem gerat, Aldrovandi verbis exponam. Idem, inquit, Ægyptii impurum, ut inquit Orus &c. Aldrov. p. 315. b. D. usque. ingratus & impius in eam Oryx videri debeat. Addunt, adortum solis conversum alvum dejicere; & perpetuam sitim perferre. Meminit Orygis Columella & Martialis: sed vix ejusdem credo. Hic eum sævum vocat: Iste inter ea quæ ad cultum in lepore reponuntur, enumerat. *Oppiani Orygem* ita Aldrovandus, interprete Gyllio, describit. Oryx, inquit, in sylvis versatur feris infestissimus: colore est lacteo &c. Aldrov. p. 316. a. D. usque. Hactenus Oppianus. Diversum à superiori esse, vel exinde non malè colligas, quod ille inter capras, quæ timidæ referatur: hic verò ferox sit. De cornu quidem nihil adjecit; at adjecisset, si unum habuisse scivisset. Ælianus quadricornes in India reperiri scribit. Ambrosius Paræus, cujusdam feræ, in quadam maris rubri insulâ Cademotha Arabibus dicta, incolis Pyrrasoupi dictæ, ex Cosmographia Theveti meminit. Magnitudine est mulo par, capite non absimili, urfinis veluti pilis vestita, sed haud adeò obscuris, verum ad flavum inclinantibus, bisulcis, ut cervus, pedibus. Duo procera sed minimè arborea capite gestat cornua, unicornium cornibus affinia. Indigenæ, bestia aut piscis venenati morsulæsi, aquâ, in qua aliquot dies ejusmodi cornua infusa fuere, haustâ, statim convalescunt.

ARTICULUS VII.

De Cervo.

Cervi nomen, à cornibus quæ gerit, (ea Græcis κέρτα) apud Latinos sumtum est. Apud Græcos plurima obtinuit hoc animal nomina. Dicitur namque ἐλαφός, vel quasi ἐλαφρός, id est, levis; vel quasi ἑλαφός, διὰ τὸ ἑλλην εἰς ἀνέριον διὰ τῶν μυκτῆρων τῶν ὄφεις; ἢ ἀπὸ τῆς ἐκλύειν τῶν ὄφεις ἢ ἀπὸ τῆς ἐλθῆναι, nimirum quod circa lacus & aquas libenter versetur; aut quod cornu ejus suffitum serpentes fuget; aut quod ipse cervus cornu ad saxum attrito nidorem excitet, quo serpentes cavernis pellit.

Dicitur & λαφός, αἰράκος, βερίξ, βερικός, βερίδος, Laconibus imprimis, κνήκας, Nicandro, νεβροτόκος, πύχαρις, σιγρός, ταχίνος. Varinus τὰς ἐλάφους τὰς πρῶτον τίκεν, cervas primum parientes, *Procas* vocat, θυμάκας, πλώκας. Hinnulus cervi, dicitur, ἑλλός, λάδας, γαιθρός, νεβρός, κριάς, quasi κούμας, quod in spelunca adhuc jacent, κημμάς, & κελμάς. Animal est bisulcum, forcipem pro ungue habens; pilo molli, & si Junio credendum, intus cavo, ideò commodè natat. *Colorem* ipsi Pollux tribuit, ἐπίξανθον, qui sit ἐπισκίλον λευκοῖς χερμασι. foemina præcipuè, & hinnulus. Euripides βαλίαν vocat, seu spadice coloris, Euripidi σπαθίνας, à colore τῆς σπαθῆς, seu phæniceo dicuntur. Dantur tamen & albi: qualis erat Sertorii cerva, quam esse fatidicam Hispaniæ gentibus persuasit. Cornua ipsi inter reliqua animalia maxima: Cervæ nulla; repertæ tamen cornigeræ, quos Maximilianus Cæsar observavit, & Scaliger vidit. Anniculis nondum cornua nascuntur, nisi quoad indicium, sit initium quoddam protuberans, quod breve hirtumque est. Bimis primum cornua oriuntur simplicia, & recta ad subulorum similitudinem, quamobrem πατταλίας, subulones, eos per id temporis vocant. Trimis bifida exeunt, quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum procedit numerus, usque ad annum sextum. Constat tamen in multo plures ramos illud distribui. Habuit Guilhelmus Baveriæ Dux bina, quorum utrumque, unum & viginti ramos fundebat. Albertus testatur eadem in Germania ad undecimum dividi. Vidit Æmilianus in penu Ferrariæ Ducis, cervum interfectum, magnitudine equo paulo inferiorem; cujus cornua adeò erant ramis referta, ut ne illis Germanicis cederent. Sed & Antverpiæ in pharmacopolio visa, quorum singula ramos circiter quindecim ostentabant, Gesnerus prodidit. Differunt verò hæc cervorum cornua ab aliis, quod cum omnibus sint cava & in mucrone demum concreta, cervis tantum solida sint; & cum cæterorum ossibus adhæreant; cervorum tantum cutibus enascuntur. Nec ullum animal præter cervum eadem mutat. Fiunt adeò solida & dura, ut soliditate ad lapidum naturam accedant. Inveteratum perquam leve redolitur, præsertim si sub dio fuerit, ita ut nunc humeat, nunc siccescat. Gesnerus observavit in consummati cornibus mucrones, sive ramulos supremos, qui bini alioqui aut terni subinde spectantur, septenos, & in eodem loco stipitis latitudinem sex digitorum; inferius autem fuisse alios binos ramos & adminicula. Observavit item inter cranium cervi & cornua, ossicula sive tubera gemina ossea protuberantia, lævia, duos circiter digitos longa, cō breviora quod cervus nata major est.

Descriptio.

Plini. H. N. l. 8. c. 32.

Æmiliana Ruminantibus.

Aristot. H. A. l. 2. c. 1. & l. 3. c. 9. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Aldrov. Hist. Bisulc. c. 25.

Ælian. H. A. l. 1. c. 14. Paræus Tomo 1. l. 5. c. 5.

Aldrov. Hist. Bisulc. c. 27. Nomen.

est. Horum singulis singula, ait, adnasci cornua, per symphyfin quandam & quasi coarticulationem. Addit denique, subulonis cervi cornua se vidisse, dodrantis circiter longitudine: *furcarii* verò vulgo dicti, qui trimus est, duorum & amplius dodrantum. Quæ hic expressimus, lævia erant, albicantia, & minimè rugosa. Singulis annis stato veris tempore ea amittere, Aristoteles prodidit; qui etiam tradit, captum fuisse, cujus cornibus viridis hederæ innata fuisset; quod & apud Plinium habetur. Castratis defluere Oppianus auctor est. Et hæc de Cornibus. Quantum ad alias partes, *Facies* ipsis est carnosa, *nasus* simus, *collum* oblongum, *nares* apud Oppianum quaternæ, totidemque meatus. Musculi temporales & exiles & debiles; *ures* scissæ ac velut divisæ, sed præcipitanter, quales peculiariter iis Aristoteles adscripsit, qui circa Arginusam in Elapso monte versantur. *Dentes* habent quatuor utrinque, tum infra, ut annotat Albertus, quibus molit cibum, & insuper duos alios magnos, qui mari quam fœminæ majores sunt; vergunt autem omnes deorsum, ut repandi videantur. Vermes continent omnes suo in capite vivos, qui nasci solent, prodente Aristotele sub lingua, in concavo, circiter vertebam quæ cervici caput innectitur, vermibus qui in carnibus enasci solent, haud minores, continuos, numero viginti. At fuere qui plures videre, & quidem discretos: fuere & alii, qui nullos. Dicunt itidem intra oculos vespas enasci & provolare. *Sanguis*, aquæ similis est, & nullas continet fibras, si Aristoteli & Plutarcho credimus: Baldus Angelus Abbatius, coagulatum se observasse scribit, idemque aliorum observatione constare. *Oculos* habet magnos. *Cor* item proportionem magnum, quantum omnibus timidis esse solet. De *lapide* in oculi cantho varii varia. Agricola lapidem Belzarth: Bellunensis Bezaar. Scaliger lapidem esse negat. Ante centesimum, inquit, annum in cervo nulla est. Post eam ætatem accrescit ad oculi canthum; ipsis ossibus atque in os protuberans concrevit, eâ duritie quâ cornu superet. Quâ parte prominet, rotunda est, insigni nitore, coloris fulvi, non sine vestigiis atriorum venularum. Tanta levitate ut penè tactum effugiat. Ita enim sese subtrahit, ut seipsam prope modum movere videatur, &c. Scribonius, oculi fordes vocat. *Ossa* in corde omnibus propè cervis reperiuntur: annosioribus tamen majora, minora junioribus, crucis interdum formâ, decussatim mutuò intersecta, inquit Iordanus. Vidi, inquit idem, exectos propè columbini ovi magnitudine, laminis conflatos, & quod jucundum fuit aspectu, postquam comminutus fuit, reperiuntur os in medulla, simile cæteris ossibus corde prognatis, circa, quod putami-

na hæc sese aggregando amplificaverant, & in hanc molem atque duritiem calore cordis extorrente lapillum produxerant. Gesnerus à medio Augusti duntaxat ad idus usque Septembris inveniri scribit. Renodæus in junioribus, non os, sed cartilaginem esse. Nervum seu cartilaginem nerveam Brasavolus vocat. Andernacus, sinistro detecto sinu, maximeque arteriæ totâ basi apertâ, si radices illius & membranarum sequaris, inveniri tradit. Nam arteriæ aortæ, venæque arteriosæ & membranarum earundem radix, ex ossea illa cartilagine cordis procedit. *Cauda* ipsi exigua est, vituli marini modo. *Crura* perquam gracilia. *Ventre* plures. *Genitale* nervosum more Cameli. *Intestinum* tam tenue imbecilleque, ut etiam leviter percusseris, possit rumpi cute adhuc integrâ. *Felle* vacare ajunt, sed intestinum adeo amarum, ut ne à canibus quidam attingatur, nisi cervus præpinguis sit. Achæini in cauda id gerere creduntur; esseque quod ibi contineri ajunt, colore quidem simile felli, sed non ita ut fel humidum, sed lieni parte anteriore simile. *Cerva* cervo minor est: animal aliàs aspectu egregium, mutilum cornibus, visu acuto, miræ velocitatis. *Quæ* terna habet ubera, ut vacca. Galenus de fætus tunicus agens, ac de venis & arteriis, quæ ex utero in ipsum inferuntur, asserit, quod in omnibus animalibus, quæ suapte natura ad saliendum sunt proclivia, ut cervis & capris, vasorum productiones matricibus sunt connexæ, non per tenues modò membranas, sed cum eis etiam per carnes viscosas, velut pinguedinem quandam, specimen esse mirabilis providentiæ. *Dorsum* dum pingue esse Oppianus dicit, de utroque sine dubio sexu intelligit. In Africanon reperiri Aristoteles & Plinius prodidit, contradicente Virgilio & recentioribus. In Apulia sæpè exercitus speciem præbent, & Ferdinandum Regem Neapolitanum eo deceptum, nec non Jacobum Caldoræ solertissimum suæ ætatis Imperatorem, prodidere scriptores. In Cathariæ provincia Bargu & copiosi sunt, & sæpè tam cicures, ut eis insideant. In Batavia, referente Hadriano Junio, toto illo collum arenariorum tractu, cum interjectis convallibus, qui Egimondam usque ab Hagienfi nemore in longum porrigitur, magnæ eorundem copia. In Britannia palmatorum Capitolinus meminit: albos & nigros dari quidam affirmant. In regione Chicorariorum in orbe novo, teste Petro Hispalensi, adeo cicures sunt, ut perinde ac apud nos capræ, alantur. Cretensem agrum cervo egere Solinus scribit, Cydoniatarum regionem si exceperis. At Varinus Achæinarum cervarum meminit, quæ & *ααδινάσαι* dicuntur, ab Achæa insulæ illius civitate. Bellonius quoque non paucos ibi reperiri reliquit, quod insula noxiis animalibus careat. In Cyprum

Aristot.
H. A. 1.
2. c. 1.
Plin. H.
N. 1. 11.
c. 37.

Aristot.
H. A. 1.
6. c. 29.

Locus.
Plin. H.
N. 1. 8.
c. 33.

Pontan.
l. 2. de bello
Neapolitano.
Junius
Batav. l.
1. c. 61.

Ælian.
H. A. 1.
5. c. 56.
Arist. H.
A. 1. 6. c.
29.

Martyr.
Decad.
Ocean. 7.
c. 2.

Generatio.

Aristot.
H. A. 1. 6.
c. 29.

è Syria ideò transnare, quòd passionum quæ illic amplissimæ dicuntur, desiderio teneantur, apud Ælianum habemus. In monte Asia Elapho apud Arginussum scissis sunt auribus, quod & Hellesponti cervis, modò citatus author adscribit. M. Aurelius Imperator, cicures ibi nasci, addidit. Apud Scotos grandes sunt, & tam frequentes, ut solemnè plærumque venatione, nunc quingenti, nunc octingenti, nunc mille prosternantur. Sunt ex his nonnunquam qui adipem decem pollices latam habent. Dantur & numerosi, in Hebridum insularum monte, cui à Cervo nomen est. Xapita novi orbis regio, referente Petro Martyre, cervorum armenta habet, ut nos boum. Domi pariunt, domi nutriunt, soluti per nemora pastum quærendo, luce durante vagantur, ad vesperam pullos domi relictos revisunt, & intra cortès claudise, ac natis suis depastis mulgeri sinunt. In Gallia quoque circa Fontem bellaqueum sunt numerosi: In Florida sunt partim domestici, quales fortè in Xapato; partim sylvestres, quorum quidam bovem adæquant, quidam minores sunt. In multis Germaniæ locis cicures in fossis circa mœnia aluntur. In Helvetia minus hodie abundant, quòd sylvæ propter frequentiam incolarum, indies minuantur. In Hercynia, colore nigricantes reperiri, à quibusdam accepit Gesnerus. In Dikilapporum denique regione, sunt eorundam greges, & Norvegis Rhendicuntur, nostratibus cervis aliquantò majores. Lappi vice jumentorum utuntur. Vehiculo, inquit Sigismundus Herbersteinus, in scaphæ piscatoriæ formam factò, cervos jungunt, in quo homo, ne cervorum citato cursu excidat, pedibus alligatur; lorum, quo cervorum cursum moderatur sinistra, dexterâ vero manu baculum tenet, quo vehiculi, si fortè in aliquam partem plus æquo vergeret, casum sustineat. Atque eo vehendi genere viginti milliaria se unâ die confecisse, cervumque tandè dimisisse, eumque ad Dominum suum stabulaque consueta rediisse, dicebat. Tanta amoris libidine flagrant, ut totâ die ad venerem ferantur. Ad mensem ita agitari, mox desævientes alterum paulò minus mensem absumere, Budæus prodidit. Certant tum pro fœminis, & victori, ut domino, obedit victus, sequiturque ut herum, si Alberto fides. Impletis fœminis, separari per seipsos mares, & propter libidinis graveolentiam, quemque solitarium scrobes fodere, more hircorum foetere, facies quoque nigrescere aspergine, & ita degere, quo usque imber accedat, tum pascua repetere, Aristoteles author est. Coire incipit mense Augusto & Septembris ab Arcturo, implenturque paucis diebus & multæ. Cerva plærumque subfidens coit, quòd marem ob contentissimum

impetum sustinere nequeat: aliquando tamen more ovium sustinet, & socias declinat, cum turgente jam venere, coitum appetit. Oppianus magnâ celeritate currentes fœminas iniri reliquit: mares verò duobus pedibus quantum possunt, cursimque sequentes coitum absolvere. Transeunt in coitu ad alias iidem, redeuntque ad priores. Plinius, cicures non concipere, nisi ab infantia fuerint educatæ ait. Ferunt uterum octo menses: pariunt magnâ ex parte unum. Incrementum hinnulorum velox. Cerva cum parit, pituitoso humore purgatur, aliàs nunquam. Dum lactat, sese dimittere Polux prodidit, Gesnerus refellit. De longævitate cervorum quædam apud authores

occurrunt. Hesiodus in versibus qui tamen in operibus non exant, cornici novem nostras ætates tribuit, quadruplum ejus cervis. Sic ferè 3600. annos viveret. Plinius, post centum annos aliquos captos cum torquibus aureis quos Alexander Magnus addiderat, adopertis jam cute, in magnâ obesitate. Tempore Caroli Gallorum Regis, qui tempore schismatis inter Clementem & Urbanum VI. vixit, captus est ad Sylvaneum cervus, in cuius torque latinis literis scriptum erat, Hoc me Cæsar donavit. De Cajo Julio Cæsare etsi id capi vix possit: potest tamen ad Carolo vingorum aliquem referri. Theophrastus etsi octogenario major obiverit, conquestus nihilominus est de naturâ, quòd cervis longiorem quàm homini vitam dederit. Taceo sacram Dominæ cervam apud Pausaniam, quæ tempore Agapenonis hinnulus erat: nec non Diomedis cervum, qui tempore Agathoclis, post aliquot nempe secula, captus est. Cæsaris Augusti cerva, cum inscriptione torquis, *Noli me tangere, quia Cæsaris sum*, innumeris propemodum lustris ab ipsius imperio, deprehensa fuisse dicitur. Quidam atatem ex ramorum multitudine colligunt, quod Aristoteli non placet. Author Philomelæ eos glocitare scripsit, Virgilius graviter rudere. Mutant vocem pro sexu. Brevis fœminis, maribus productior. *Amicitia* ipsis cum attagene: at cum aquilâ, vulture, serpente, canibus, tigride, belluis, ariete, vulpium gannitu, cacto, aspalatho, rubris pennis, hostilitatem gerunt. Attagenes sapissimè dorso ipsorum insident, & pilos vellicant. Aquila insidens cornibus multum pulverem volutatu collectum excutit in cervi oculos, pennis ora verberans, donec præcipitet in rupes. Cum serpente ipsis pugna. Investigant cavernas, nariumque spiritu extrahunt renitentes. Ideò singulare abigendis serpentibus; odor adusto cornu cervino. In Libycis sinibus ab iisdem jacentes impeti, apud Oppianum legimus. Cactum si cervus calcet & saucietur, ossa ejus nullum sonum edere possunt. Aspalatho tactus emoritur. Ingenium

Plin. H.
N. 1. 10.
c. 63.

Arist. l. c.

Ætas.

Vox.

Sympathia
& Amipathia.

Plin. H.
N. 1. 10.
c. 3.
Plin. H.
N. 1. 8.
c. 32.

Ingenium genium sequentia ostendunt. Gaudent ^{ταῖς} ^{ἐν} ^{τοῖς} seu locis incultis, sylvolis, & nemorosis, ubi solum bonum & pingue est. Sylvas quoque, vinea & loca aprica amant. Mas relictis pascuis ad sylvam se celeriter recipit, sed eandem non ingreditur: foemina densiora ejus loca sequitur. Meliora quandoque pascua nacti, semper tamen ad pristina ubi educati sunt, redire solent. Eminens, uno minore cervo comitatus incedit, quem *armigerum* venatores vocant. Pascuntur tota penè die: & sub meridiem ubi sol maximè fervet, in umbra delitescunt. Adeò sunt timidi, ut in proverbium abiverint: & Cantharion Arcos ab oraculo cervus sit dictus. Saltu valere, vel locus non procul Francofurto, à cervino saltu nomen mutuatus ostendit. Duo ibi lapides erecti, prodente Gesnero, cernuntur, interstitio pedum hominis mediocris quasi sexaginta. Tanto enim spacio saluisse illic cervum, idque etiam supra plaustrum oneratum, cum venatores instarent. Requiescunt in fuga, dum qui insequitur, appropinquet, & tum iterum fugiunt. Ubi animum despondere, relictis sylvarum opacis, in campestria se conjiciunt, & interdum ad vicos & villas propius accedunt. Secundo vento plærumque fueruntur. De *solertia* elundendis canibus, ita Budæus: Solere cervos ajunt, simul ut senserint rem sibi esse cum affeclis infectis, simul & sagacibus, primum alios aliosque fugæ lapsos, & gyros conglomerare; deinde si porrò urgeantur, stabula cervarum popularium, cervorumque diversoria petere, ibique inter turbam promiscuam, quasi intra nebulas erroris canini sese condere, interdum gregarios aliquot inde abigere, atque ad aliquantum spaci permixtim vestigia facere, ad negocium canibus exhibendum. Cum autem aliquantisper hac ratione contechnati sunt, ab illorum comitatu subitò se subducentes, per tramitem devium longiusculè abscedunt, deinde intersistunt, ut interim canes vestigia cervulorum aut cervarum excipientes, diversi ab eis auferantur. Cumque hæc stropharum commenta canum experientissimorum odorandi vis vicerit, ad alia denuo se vertunt subsidia; cujusmodi sunt, per sua quadantenus vestigia recurrere: deinde spiras fugæ intorquere multipliciter & variè, & quàm fieri potest perplexissimè, tum raptim longius procurrare. &c. Visus quidam in armentum bubulum irrupere, in bovemque primoribus cruribus insiliens armisque complexus ad longiusculum spaciū velut equo vectus, postremis pedibus terram stringere, ut odorem sui, quoad fieri posset incertum, canibus relinqueret. Visus, referentè eodem Budæo, qui in arborem in denso & opaco sitam insiliverit, in eademque sublimis, ramis fruticis ipso saltu diva-

ricatis steterit, sic interceptus, ut inde desilire non posset. Contra noxia gramina cinaram edunt: contra phalangiorum morsum, cancos. Sollicitè etiam cavent; ne quando in vulnera recentia solis radius incumbens, carnem priusquam cicatrice obducatur, putrefaciat. Dictamnium herbam extrahendis sagittis monstravere percussì eo telo, pastuque ejus herbæ ejecto; quod Dioscorides & Tullius capris adscribunt. Maria tranant, gregatim nantes, porecto ordine, & capita imponentes, præcedentium clunibus, vicibusque ad terga redeunt. Hoc maximè notatur à Cilicia Cyprum trajicientibus, nec vident terras, sed in odore earum natant. Infirmos ponunt in ultimo; nec citius solvunt, quàm secundos ventos senserint. Pinguescunt æstate, & ideò latent, quòd se suæ corpulentiae pondere facilius capi posse sentiant. Sed & cum cornua deposuere occultantur interdiu, idque in opacis locis, ut muscarum tædio vacent; pascunturque per id tempus noctu, donec recipiant cornua; quæ ubi concreverint, soli exponunt, ut excoquantur & siccescant. Ubi verò attritu arborum, cum ea scalpunt, nihil indolere sentiunt, in patentia prorumpunt. Defodere, postquam deposuere eadem, fama est. Verum alii, alterutrum duntaxat defodere, scribunt. Dextrum cornu negant inveniri, inquit Plinius, ceu medicamento aliquo præditum, idque mirabilius fatendum est, cum & in vivariis mutant omnibus annis: defodique ab iis putan. Aristoteles id de sinistro prodidit, quamvis in Epiro dextrum obrui scribat. Abjecta in vivariis negligi, nec humo obrui, observatum est: quin & in sylvis in aperto jacentia sæpè reperiuntur. Serpentibus abundè saturati, ne veneni virus noceat, ad flumen contendunt, & ore summè tenus corpora demergunt, nec citius bibunt, quàm vi frigoris cogente haustum venenum per oculos desudando elachrymaverint. Vincentius Belluacensis esu serpentum caligini oculorum mederi scribit. Capti, non solum cicurantur, sed etiam vocati ad hominem accedunt. Frena & juga ferre, apud Calpurnium legimus. Certè septem cervorum bigas in pompa Ptolomæi fuisse, author est Athenæus: Heliogabalus verò junctis quaternis, in publicum processit. Taceo Mithridate Regi Ponti pro corporis custode fuisse; & Sertorio Romano Hispanor. Duci cervam albam in comitatu, quam ille Dianæ numen fingeat. Assuefactum à Ptolomæo quendam ut sermonem Græcum intelligeret, Ælianus refert. In pariendo semitas minus cavent, humanis vestigiis tritas, quàm quæ secretæ & feris opportunæ. Sefeli ante partum purgantur, ut faciliōri utantur utero: postquam peperere, involucrum primū exedunt, mox herbam quandam degustant, sic ad prolem redeunt. Non

Æl. H. A.
l. i. c. 8.

Plin. H.
N. l. 8:
c. 32.

Ælian.
H. A. l.
5. c. 56.

Arist. H.
A. l. 9. c.
5.

Aristot.
l. c. & l.
10.

Ælian.
H. A. l.
7. c. 46.

Æl. H. A.
l. ii. c.
25.

qualibat autem partus suos educare, Solinus author est; teneros studiosè occultare, & absconditos inter profunda fruticum, vel herbarum, pedum verberare castigare ad latendum; cum maturuerit ad fugam robur, exercitio docere cursus, & assuefacere salire per abrupta. Mulcentur fistulâ pastoralis & cantu, interdum ita, ut interim pascua negligant. Quantum ad sensum, si erectas auriculas teneant, acerrimè sentiunt; sin demissas, facilè opprimunt. Visu valere vel id argumento est, quòd *μυρολαπὴς* Opiarius vocat. De *Uso in Cibus* in diversa abeunt authores. Isidorus tradit, carnes habere teneras, & faciles concoctu propter motus frequentiam: si verò castrentur, antequam cornua crescant, magis temperatas fieri. Galenus duras facit, difficiles concoctu & melancholicas; alibi, asinorum carni similes. Simeon Sethi, bilem atram gignere profitetur, cavendasque æstate, quòd tum propter serpentum esum venenatæ sint: si frequentius fumantur, corpus tremulum facere: per hyemem tutius simi. Julio Alexandrino præstat caro hinnuli, quanquam & vetustioribus laus, neque tamen vetulis; ætatis longitudo in causa, ut vel in trimatu commendari possint. Consistendi ætas, ut longissima, sic deterior eadem, crescente semper siccitate & carnis duritia. Tempore libidinis eam vitare, & hircorum instar foetere, apud Aristotelem legimus. Avicenna quarranas ejus esu induci putat. At Plinius, quasdam se foeminas principes scire testatur, omnibus matutinis carnem eam degustare solitas, & longo ævo caruisse febribus, quod ita demum existimant ratum, si vulnere uno interierint. Alii, diuturnitatem cervinæ esu sibi pollicebantur, quòd vivacissimum animi esset. *Hepar* pravum esse Vincentius Bellunensis scribit. *Cornua* recenter enata, in delicatiorum etiam unum venere. Bruyerinus, elixari & postea in fistula frigi scribit. In *Medicina*, *pili*, *pellis*, *medulla*, *sebum*, *cerebrum*, *pulmo*, *genitale*, *cor*, *ossa*, *coagulum*, *urina*, *lachryma*, *cornu inprimis*, locum habent. *Pilis* vulvæ suffiuntur; suffitus contra abortum facit. *Pellis* ramenta defecta pumice, & ex aceto trita, igni sacro illinuntur. Si eadem cum pedibus dextris portæ infigatur, ingressum animalis venenosi prohibet. Eadem ad involuntarium urinæ exitum, in stratis remedium. *Medulla*, leniendo dolori est præstantissima: serpentes inuncta fugat: perfusis aquâ aliove liquore fervido, peculiare est remedium: in aqua, potui data, intestinorum tormina sedat: dyntericos dolores per clysterem injecta, sopit: uterorum duritiem in pessis intrusa emollit. De ejusdem in menstruis aperiendis usu, ita post Agricola Mizaldus. Si medullæ cervinæ drachmas duas vel tres pro corporis & ætatis mo-

dulo, includantur in linteolo mundo & raro, postea pudendo muliebri inferantur, filo extra pendente ut retrahi possint, modò tunc se offerat opportunum ac statum purgationis tempus, & præparatum fuerit corpus, præscriptaque vitæ ratio. *Sebum*, podagricos dolores lenit: ad lentigines faciei adhibetur: combustum & cum ostrea tosta commixtum, perniones sanat: uteris exulceratis, recens ac viridis subditur. *Cerebrum*, in coxarum & laterum dolore, restituendisque fracturis laudat Rhasis. *Pulmo*, clavos, rimas, & calli vitia tollit, si Plinio credimus: impositus & sæpè renovatus, ex calceamento læsos pedes, affirmante Marcello, persanat. Sunt qui phthisico profuisse scripserunt, siccatum in fumo, tritumque in vino. Cinis in olla fictili exusti, multis ad suspirium & dyspnæam profuit. *Genitale* siccatum & tritum cum vino contra viperarum morsus exhibetur: tauro cum vino illitum, ad coitum eundem excitat; aridum, contra cifficultatem mingendi aut colicam valet, si aqua in qua ablutum fuerit bibatur. Magi, ut author est Plinius, partum contineri promittunt, si mulieri candida à pectore hyænæ caro, & pili septem, & genitale cervi, iligentur dorcadis pelli, & collo suspendantur. *Ossa* ad ventris profluvium Galenus inungijubet. Sextus verò, patellam cervinam, si tecum habeas, negat surgere inguina, & quæ antè surrexerunt, eadem tacta redire. *Cor* cum pelle & cornu combustum, vulnera, iisdem cum oleo inunctum, sanat. Os de corde, inter antidota habetur. Lapis qui in corde aut vulva reperitur, contra abortum facit. *Coagulum* hinnuli in utero occisi, præcipuum est contra serpentium morsus remedium. Utiliter quoque bibendum, morso à cane rabido datur. Quin contra cicutæ & fungorum esum facit. *Urina*, splenis dolorem sanat, ventriculoque & intestinis inflatis prodest. *Lachryma*, inter sudorifera censetur, tantosque ciet, ut pænè totum corpus solvi credas, in vini momento exhibitum. Quâ parte prominet, rotunda est, insigni, nitore coloris fulvi, non sine vestigiis atriorum venarum, tantâ levitate, ut penè tactum effugiat: ita enim sese subtrahit, ut propemodum seipsam movere videatur. *Cornu* maximus usus est. Ex typhis sanguine adhuc madentibus, aqua rhizotica, contra malignas febres destillatur. Uritur aperto igne & philosophicè, & non tantum ad sudores & adversus venena commendatur; sed & contra varios morbos. Floridæ insulæ incolæ infantium labiis perforatis ea imponunt, sic à veneno illæfos fore sibi persuadent. Andernacus collyrium ex eodem, cum thure, plumbo usto, opio &c. & aqua pluviali, conficit. Idem, aceto incoctum vel tritum, porri-

Ælian. H.
A. l. 12.
c. 46.

Ufus. in
Cibus.

Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.
c. 6. & 8

Jul. Alex.
l. 11. c.
11.

Arist. H.
A. .6. c.
29.

Ufus in
Medecina.

Galen. in
Eupori-
stis.

Galen.
simpl. 11.
l. 5.

Mizald.
cent. 6. a-
phor. 96.

Hippo-
crates de
morb.
mulier.

Galen.
Eupor. l.
2. c. 42.

Hurn.
Method.
ad praxim.
l. 2. p.
245.

Nie-
remb. H.
E. l. 9. c.
59.

porrigini & impetiginibus inungitur : cum lenticula & sevo cervino, lentigines de facie tollit : accensum, nidore suo morbum comitalem prodit : adversus scrophulas tritum cum spongiis, in quibus lopides reperiuntur, æquali mensura ex vino aut aqua quotidie bibitur : ad polypum cum sandaracha naribus inflatur : ad dentium albedinem in cinerem in olla nova redactum, cum mastiche, & sale ammoniaco miscetur : crudum inque aceto fervefactum, maxillarum, à dentitione dolorem adimit : adustum & cum vino tritum, deinde circumlitum, vacillantes dentes confirmat. Hæmoptoicis cum tragacantho medetur : dysenteriam seu ustum, seu in galredam redactum, sanat : ad vomitum, cum sulphuris vivi pusillo, in ovo forbili exhibetur. Sextus combustum ex oxymelle splenem siccare affirmat. Ad colicam ex iisdem teneris remedium Marcellus habet, cujus descriptionem apud Aldrovandum vide. Contra lumbricos Galenus cum ebore propinat. Sunt qui cretam, semen sanctum, vitellum assum, admiscunt, & cum melle placentam parant. Ad profluvium denique muliebre, & præfociones uterinas adhibetur. In *Differentiis* nihil ferè occurrit, præter ea quæ apud Nieremburgium leguntur. Cervinum, inquit iste, non simplex, Novæ Hispaniæ genus. *Maccama* vocant. Quidam rubei, quidam albi toti. Hos cervorum Reges dicunt Indi, & *yztac maccame* appellant. Alii nostratibus aut iisdem, aut valde similes forma, magnitudine, ingenio : *Aculhuame* nuncupant. His minores *Quauthlamacame* in magnam generositatem degenerant à cervinâ timiditate : efferociunt vulnerati, adoriuntur venatores, sæpè occidunt. Ejusdem molis & moris sunt *Thalhuicamacame*, sed impares animo. Minimi sunt *tamamacame*, fortasse potius caprarum genus. In Duarhe, Xapidâ, & aliis novi orbis plagis, cervorum erant armenta, quemadmodum nobis boum, (prout superius diximus.) domi pariunt, nutriunt. Soluti, per nemora pastum quærendo luce durante vagantur, ad vesperam pullos domi retentos revifunt, intra cortes claudi se ac nati depastis mulgeri patiuntur, nullum aliud lac, aut ex alio lacte caseus. In aliquibus Occidentis regionibus vexati cæsi que à venatoribus, quærunt herbam *Atochielt*, (sic vocant Barbari, & species pulegii est) hac recreantur restauratione virium, novam pernecitatem acquirunt : majoris illis usus est, quam dictamni virtus. In Virginiâ cervi longiore caudâ sunt præditi quam nostrates, & cornuum extrema in dorsum recurva habent. Cervorum Americanorum quoddam genus Lerus vocat *Seonaf*, seu, qui differunt à nostris, quod multò sint humiliores, minora gestent cornua, & æquè pilos demittant atque nostrates capræ. In

plagis novi Mexici caudam habent valde pilosam, alii prolixam, non aliter ac mulæ, cujus æquant aut superant molem. Maximi roboris sunt. Dux quidam Hispanus duos injunxit mansuetos rhedæ suæ vehendæ. De *Cervopalmato*, ita *Aldrovandus*. Diximus ex Julio Capitolino, Gordiani sylvam memorabilem pictam in domo rostrata Cn. Pompeii, inter alias picturas, cervos continuissè CC. palmatos : hosque Gesnero primum visos, eosdem cum dorcadibus platycerotis. Cæterum cum postmodum Joannes Cajus medicus Britannus hæc illi cornua ex Britannia misisset, mutatâ sententiâ, doctissimo illi medico, qui cervum palmatum revera esse judicabat, quod & mihi vedetur, assensit. Nam cum cornua hæc aut æquent, aut etiam superent, & longitudine & crassitudine cervinum, consonum est, corpus animalis, cervi potius quàm platycerotis simile esse. In Persia circa Schamachiam, Karabach, & Moragè, specie Damæ, subvulvos, cornua retrorsum incurva, absque nodis habentes, quos Turcæ Tzeiran, Persæ, Ahu in veniri, Olearius auctor est.

Aldrov.
Hist. Bi-
sulc. c.
28.

Olaer.
Itiner.
Orient.
P. 312.

ARTICULUS VIII.

De Tragelapho, & Tarando.

Tragelaphus inde nomen sortitus esse videtur, quod hirco & cervo sit similis. Volaterranus & Gesnerus Hippelaphum Aristoteli dici volunt, seu à similitudine ita dicatur, jubam enim habet, seu à magnitudine ut hipposelinum, major enim & crassior cervo est. Germani *Bzanthirsch* vocant, seu, quod sit nigrioris coloris quàm cervus, ut Agricola placet, seu quod loca in quibus carbones fiant frequentet, & herbis ibidem nascentibus pascatur, ut Fabricio visum. Major est & robustior cervo. Villos nigros in gutture, longos in armis gerit. Ideò à cervo, barbâ tantum & armor. Villos distare scripsit Plinius. Suprema pars dorsu cinerea est, ventris subnigra, villi circa genitalia nigerrimi. Cæteris à cervo non differt. Non alibi quàm juxta Phasin amnem nasci podidit Plinius, sed falsò. Nam & apud Arachosios inveniuntur Tragelaphi : & in Torantinis Koningsteinianisque Misniæ saltibus Bohemiæ vicinis capiuntur. In Anglia quoque cervi nigricantes reperiuntur, ab his fortè non diversi. *Tarandus* Barbaris Pyrandrus & Pyradus, Hesycho fortè *ἑρδρα*. Septentrionalibus *Rehenschier*, dicitur. Magnitudo ei quæ bovi, caput majus cervino nec absimile, villus albus magnitudine Ursorum. Tergori tanta duritia, ut thoraces ex eo faciant. Pectus habet torosum, ungulas bifidas, concavas, & mobiles. In cursu enim eas explicat. Ipse ad celeritatem expeditissimus, ita ut & summas nives calceet

Aldr. H.
Biful. c.
29.

Plin. H.
N. l. 8.
c. 32.

Aldrov.
van. H.
Bifulc. c.
30.

calcet non impressis altè vestigiis, & pernicitate insidiantia in vallibus animalia effugiat. Cornua gestat præalta, quæ statim à fronte ramis duobus latis mucronantur quasi in digitos. In medio ramulus veluti internodium interjectus, inde rursus in ramos latos, digitorum expansorum specie mucronatos exeunt. Cornua sunt alba, venulisque longis distincta. Differunt ab alces cornibus altitudine, à cervi latitudine, ab utrisque colore, & ramorum multitudine. Currando ea in tergum demittit: nam stanti, frontem penè rami inferiores tegunt. His inferioribus, concreta frigoribus flumina ad potum capiendum rumpere fertur. Sylvarum fructibus & arborum musco vescitur. Latibula struit in montibus Septentrionalibus, & in Mosibergum, aliosque Norvegiæ montes intensioribus frigoribus procedit. Capitur ab hominibus ad usus domesticos. Nam ad conficienda itinera domatur à cursoribus, ad opera rustica ab Agriculis. Caro ejus è ferinis illorum locorum optima & delicatissima. Natura animal esse gregale; & mille tarandorum armenta, in vastis septentrionis sylvis aliquando conspici ferunt. Fœmellæ ramis carent. Reperiuntur in Norvegia Suecia, Laponia, & Polonia. Augustam Vindelicorum bini cum sellis, phaleris, & phrenis, erant aliquando adducti. De coloris in ipso mutatione, ita *Solinus*. Hunc tarandum, affirmant, habitum metu vertere, & cum delitescat, fieri similem cuicunque rei proximaverit, sive illa saxo alba sit, seu fruteto virens, sive quam aliam præferat qualitatem. Faciunt hoc idem in mari polypi, in terra Chamæleontes. Sed & Polypus, & Chamæleon glabra sunt, & pronius est cutis lævitate speculi modo proximantia æmulari. In hoc novum est, ac singulare, hirsutiam pili, colorum vices facere. Cæterum quis ille Plinii & Solinii Tarandus sit, nec Gesnerus quidem rectè nosse visus est. Nam modò cum Turone, modò cum Rangifero, de quo in sequentibus eundem facit. Icon quam hic damus, verissima esse creditur.

Solin.
Polyhist.
c. 33.

ARTICULUS IX.

De Rangifero.

IN Descriptione Rangiferi, quem *Reen* vocant, non conviniunt authores. Albertus speciem cervi repræsentare dicit, sed majorem esse corpore, colore insignem, & ad fugam celeberrimum. Tres, secundum eundem, cornuum ordines in capite gerit, ita ut in singulis bina sint cornua, & caput ejus virgulis compositum videatur. Ex his duo cæteris majora, in loco cornuum cervi, quæ ad perfectam magnitudinem augentur, ad eò ut quinque cubitorum mensuram ali-

Aldro-
van. Hist.
Bisulc. c.
31.

quando attingant, & ramis viginti quinque conspiciantur. Duo etiam in medio capitis, ut damarum habentur, mutilis & brevibus ramis mucronata. Denique alia in fronte antrorsum versa, ossibus similia, quibus in pugna potissimum utitur. Olaus Magnus tricornem esse scribit, de genere cervorum, sed longè proceriorem, velociorem, longiorem. Rangiferum duplici ratione dici, tum quòd in capite alta cornua, velut quercinarum arborum ramos ferat: tum quòd instrumenta cornibus pectorique, quibus hyemalia plaustra trahit, imposita, ranga & loga patrio sermone vocentur. Cornuum verò duo cæteris majora, eo loco habere quo cervus: aliud in medio capitis, ramusculis circumstantibus cæteris brevioribus situm, quo contra infestas bestias pugnat. Jubatum gerere collum, & ungulas rotundas. Johannes Argicola tridentem duntaxat in fastigio cornuum habere, & in saltibus Poloniæ reperiri, prodidit. Julius Cæsar bovem cervi figuram facit, cujus à media fronte inter aures, unum cornu existat excelsius, magisque directum his, quæ nobis nota sunt cornibus. Ab ejus summo, addit, sicut palmæ ramique late diffunduntur. Descriptio Damiani à Goës, alci potius quàm Rangifero competit. Apollonium Menabenum Medicum si sequimur, sunt ex genere cervorum, altitudine & cassitudine a fello pares, tibiæ gracilitate superant. Caput habent instar vituli, collum jubatum velut equus: Cornua frondosa, lævia, gracilia, oblonga, ad tergum porrecta. Cætera, habita ratione & servata magnitudinis proportionem, cervos communes imitantur. Taceo Iulium Cæsarem Scaligerum, qui rangifero ab Olao Magno tributa alci adscribit. Ut verò sit, distinctum ab Alce, vel inde colligere licet, quòd Olaus Magnus rerum septentrionalium peritissimus, diversis locis de iisdem agat. Inveniuntur in Laponia, Suecia, Norvegia, & vicinis Arctico locis. *Cibus* ei muscus montanus, candidus, præsertim hyeme nivibus in suâ superficie soli coopertus: quas licet densas naturæ instinctu perforat, cibum quæsiturus. Æstate verò foliis ac frondibus arborum, stando eundoque melius quàm se inclinande floribus ac herbis, propter cornua nimis antrorsum incurvata vescitur; idque laterali & obliqua capitis inclinatione. Educti in transmarinas terras non diu supersunt, ut in Holatia & Prussia compertum. Huc à Gustavo Rege Ann. 1533. missi, & sylvestri libertate donati, an sobolem reliquerint, nunquam comperiri potuit. Quia verò & sylvestres sunt & domestici; horum lac, pelles, nervi, ossa, caro, ungulæ, pili, usibus humanis inserviunt. *Lac* nutrimentum est domesticum; serum, potus. *Pellis* tegendis & corporibus & lectis, & equorum sellis inservit. Quia
valida

Cæsar. l.
6. de bello
Galli-
co.

valida & tenax, ad culeos & diversorum opificum folles adhibetur. *Nervi* loco lini consuendis vestibis deputantur. *Ossa* & cornua ad arcus parandos sumuntur. *Carnes* vento & fumo siccatae ad plures annos durant. *Ungulae* spasmaticis prosunt. *Pilis* pro farciendis sellis & pulvinaribus utuntur.

ARTICULUS. X.

De Alce.

Sed & de fera *Alce* mirè authores discerpant. Pausanias specie inter cervum & camelum facit; nasci apud Celtas, explorari, investigarique ab hominibus non posse, hominum odore à longe percepto, in foveas & profundissimos specus sese abdere. Secundum Cæsarem, sunt in Hercynia sylva, earumque consimilis capris figura & varietas pellium, sed magnitudine paulò antecedunt, mutilaeque sunt cornibus, & crura sine nodis articulisque habent, neque quietis causâ procumbunt: neque si quo afflicta casu conciderunt, erigere sese aut sublevare possunt, &c. Plinius jumento similem facit, ni proceritas aurium & cervicis distinguat. Haud illi disimilem, notam in Scandinavia insula, nec unquam visam in hoc orbe, multis tamen narratam Machlin, sed nullo suffraginum flexu: ideoque non cubantem, sed acclivem arbori in somno, eaque incisâ ad insidias capi, aliàs velocitatis memoratae. Labrum ei superius prægrande, ob id retrogredi in pascendo, ne in priora tendens involveretur. Idem apud Solinum legimus. Dodoneus huc Strabonis verba trahit, qui dicit, Alpes, peculiaris formæ belluam, ut memoriae prodidit Polybius, gignere, habitu quidem ad cervi staturam, collo duntaxat excepto & villis, in quibus capro per quam similis est; gerereque sub mento carnis globum ad palmæ magnitudinem, capillosum, crassitudinem pro equini pulli cauda habentem. Cardanus alcem à Julio Cæsare descriptam putat: aliis creditam, magnum animal appellat. Scaliger licet duas alces esse dicat; hoc tamen animal bisontem nuncupat. Olaus hanc feram alcem ubique vocat, & onagrum. Erasmus Stella medium quasi genus inter equos & cervos alcem ponit, easdemque cornua quotannis amittere. Levinus Lemnius caprarum esse generis credit. Michovius crura absque articulis prælonga habere, ut bisontes, ait. Germanis dicitur *Elend* seu miseria; tum quòd singulis diebus morbo comitali laboret, nec citius ab eo levetur, quàm dextri posterioris pedis ungulam auriculæ sinistrae immiserit; tum quòd levissimo etiam vulnere accepto, expiret. Cæterum magnum animal ita describit Cardanus. *Sub boreali polo animal nascitur cervo simile, cruribus anterioribus*

longioribus, carneam habens promuscidem, brevem tamen. Habet cornua peculiare quadam forma prædita, & nulli ferè animali similia. Nam crassa ab imo, ubi ascundunt, latiora palmo sunt. Menabenus verò hanc partium exteriorum descriptionem dedit. *Habet hoc animal crassitiem, altitudinem & proceritatem mediocris & pinguis equi. Humeri depressiores & humiliores sunt partibus posterioribus. Capite aliquantulum pronum incedit. A summo capite usque ad humeros, & maximè in cervice est huic magna pilorum prolixitas & sylva, ita ut collum & barbam hirci repræsentet. In aliis corporis partibus pilorum longitudine non differt ab equo, sed densitate superatur, crassitie verò superat. Color plerumque vergit ad cinericiam albedinem; pro vicissitudine tamen anni temporum, pili varias habent in colore mutationes. Caput est oblongum & gracile, si conferatur cum toto corpore. Labra magna, prominentia & crassa, & maximè superius, quod *promuscidem* Cardanus vocavit. Os longum. Dentes non admodum magni, nec longi. Aures longæ latæque. Foemineus sexus cornibus caret, ac masculinum genus multifida, & ramosa cornua producit, sed non tam longa & frondosa ut cervi vulgaris. Latiuscula sunt crassitie ferè duorum digitorum transversorum. Si unius cornu figuram spectas, triangularem ferè formam deprehendes, & magnæ avis alam extensam dices: si pondus, duodecim ferè librarum majorum erit. Cornua, addit idem, mutat hoc animal statutis quibusdam temporibus, ut cervi solent. Unum aliquamdiu fuit apud me, quod ut matura poma solent, spontè deciderat. Id stirpe manifestè dignoscitur; duo alia parva habeo, duorum aut trium fortè ab ortu mensium, paulò ante animalis mortem abscissa, quæ molli quadam lanugine, sanguine etiam imbuta erant. Est præterea obeso & grandi ventre ut vaccæ sunt. Cauda mirum in modum brevis, ungulæ bifidæ, ut bobus. Et hæc omnia Dodoneus ad alcem refert, quæ alibi, Deo volente, examinabimus. De Pelle scribit Gesnerus, densam & solidam esse, ut validos etiam ictus punctim cæsimque factos avertat, & ferrei thoracis instar hodiè expetatur. Ad thoraces ab alutariis, piscium adipe præparatur, ut imbrem arceat. A cervina cui similis est, inspirata discernitur. Transmittit enim spiritum ut ab opposita manu percipiatur, quod sit meatibus plena, & concavos pilos habeat. Gesnerus tamen in ungula integra, quam cum ima parte tibiæ pilosa se vidisse affirmat, nullam in pilis cavitatem reperit. Possunt tamen meatus qui in viviserant, in mortuis collabi, præsertim longo post tempore.*

Gesnerus
in Alce.

Cornua, idem, libras circiter duodecem appendere tradit, esseque longitudine ferè duorum pedum, non ramosa ut cervorum, mucronibus tamen aliquot divisa, dodrantem lata, armi potius quam cornu figurâ, & advehi ex Lithuania. Cornu verò Magnæ feræ nomine ad Aldrovandum missum, septem tantum libras duodecim unciarum appendit, ea juxta caput crassitudine ut vix manu comprehendi possit, quinque ornatum mucronibus hinc inde binis, mox ab uno latere, alio, & ab altero, etiam alterius ostendens rudimentum, latitudo inter primos ramos trium ferè dodrantum. Tota ferè tibia simul cum unguibus libras pendebat tres cum dimidia. Icon quæ hic exhibetur Aldrovandi est. Ad *Naturam* ipsius spectat, quod animal hoc à venatoribus agitatam ad aquas confugiat, & aquam ore haustam, fervidam in canes evomat: quod rarò solum conspiciatur, sed terrâ nivibus oblecta multa progrediantur simul: Unum procedit properando, ut occasio postulat: alia singula sequuntur eundem tenorem & modum servando, & primi vestigia calcando, ita ut si quis rei inscius ipsa insequatur unius tantum vestigia se cernere existimet: quod sitis laborisque adeò sit patientissimum, ut diem noctemque immensa spacia privatum cibo, conficere possit: quod pulli captu adeò successivè mansuescant, ut naturali urgente siti maxima cerevisiæ vasa à discumbentibus propinata ebibant: quod tantam vim in ungulâ gerant, ut tactum ictu lupum illicò interimat, & elabente cane, opposita arbor elidatur, quasi fungus adefset. De *Ufu* in cibus, hoc dixisse sufficiat, carnibus ubique vesci regionis incolas, & recentibus, & sale conditis: crassi tamen & melancholici succi apparere. In *Medico usu*, *cornua*, *nervi*, & *ungula*, laudantur. *Cornua* olim inter adstringentia duntaxat habebantur: post inter antipileptica relata sunt, modò inter festum assumptionis B. Mariæ virginis & nativitatis ejusdem abscinderentur. Alii, die Ægidii festo demi debere opinantur. *Nervi* ad spasmus in Suecia adhibentur. Modus adhibendi, zonam ex eo facere, & membro læso circumligare. *Unguis* seu ungula, Epilepsiæ & hysteriæ affectioni convenit. Conditiones ad efficaciam reque sitæ, ab Olao Magno ponuntur. Ungula exterior, inquit ille, dextri lateris posterioris pedisonagri, (sic alcem vocat) masculi, qui non genuit, abscissâ à vivo pede securi, vel alio instrumento avulsa, post medium mensis Augusti spasmus aut morbum caducum patienti adhibita, continuo sanatur. Applicatur rectè, si vel sinistræ manus annulari, adponatur: vel annulus ex eodem factus, eidem indatur: vel pars unguis sinistræ palmæ imponatur, manusque in pugnum complicitur: vel ejusdem por-

tiuncula in aurem sinistram missa, & aliquandiu veluti scalpendo moveatur. Suffocata mulieri, rasura cum zedoaria, anaticis partibus felicissimè exhibetur. Formulas ex ea antepilepticas in authoribus vide.

ARTICULUS XI.

De Rhinocerote.

Rhinoceroti nomen à cornu, quod in nare pullulat, nomen datum est. Quidam apud Diaconum, *bovem Ægyptium* appellant: alii ex Pausania, *Athiopicum quadrupedem* seu taurum, sed falsò. In Ægyptum non potuit nisi fortuito casu inferri. Pausanias verò in Æthiopia taurum esse dicit, qui ob similitudinem cornu ab ignaris Rhinoceros appelletur. Nullum animal est, cujus *descriptio*, inquit Aldrovandi continuator, magis sit in lubrico. Et certè Plinius breviter se expedit. *Unum ei in nare cornu, longitudinem cum elephante parem, crura multò breviora, colorem buxum.* Tantundem & Agatharcides apud Photium protulit. Nicolaus de Comitibus Venetus, Rhinocerotem suillo capite, bovinâ caudâ, elephantino colore, cornu bipedalis longitudinis gerentem, nobis fingit, in provincia Mangi. Ælianus, qui Græcorum permultis & Romanorum visum & benè notum describere frigidum esse putat, in summa nare cornu gerere ait, mucronis acuti, robore nec ferro quidem concedens: pellem tantæ firmitatis, ut ægrè jaculo penetrari queat. De *Cornu* maxima est discrepantia. Tertullianus unum tantum adsignat: Martialis verò duobus depræliari scribit. Utrumque hoc, secundum eundem in capite; secundum alios in humero dextro alterum & brevius esse. Nummus Domitiani utrumque in naribus ponit. Alii majus cornu in naso, minus in fronte, aliquo supra spacio, collocant. Sed nec de *forma* ejusdem conveniunt. Alii rectum instar tubæ, lineâ nigrâ trascurrente ponunt: alii sine lineâ. Artemidorus apud Strabonem, qui Rhinocerotes longitudine parum ab elephantis excedere, magnitudine tauri, formâ apro proximâ esse ait, recurvum & omni ossè durius facit. Diodorus simum, Agatharchidas & Solinus repandum vocant. Addit Artemidorus, belluam duo cingula tanquam Draconum volumina dorso usque ad uterum circumeuntia habere, alterum jubam versum, alterum ad lumbum, hæcque de ea se dici, quod sibi visa esset. At Bontius, quem in Capra Pazaartica citavimus, quique Rhinocerotem vel centies non tantum cavæ inclusum, sed & in sylvis vagantem vidit, ita nobis eum describit. Cute è nigra est cinericia, instar Elephantinæ, rugosa admodum, cum profundis plicaturis circa latera ac in dorso: crassam admodum habet pellem,

ut

Natura.

Ufus.

Diacon.
l. 16.
Pausan. in
Bœotici-Plin. H.
N. l. 7. c.
20.Photius
Biblioth.
Cod. 250.Ælian.
H. A. l.
17. c. 44.Tertull. l.
3. contra
Praxeam.
Rer. Indi-
car. relat.
l. 3. c. 7.Strabo
Geogr. l.
16.Diodor.
Sicul. Bi-
bliothec.
l. 4. So-
lin. Poly-
hist. c.
63.Bontius
Medic.
Indor. p.
16.

C A P U T III.

De Ruminantibus non Cornigeris.

A R T I C U L U S I.

De Camelo.

HActenus de ruminantibus Cornigeris actum est, sequuntur, non ruminantia, *Camelus* nempe, & *Camelopardalis*. *Camelus* vel ab Ebraico Gamal, quod Camolum significat; vel à καμω laboro, quod sit animal ad labores dossuarios aptissimum: vel ab καμω humile & breve, quod quando onerantur, ut humiliores fiant, accumbant: vel quasi καμωσ curvus, quod media femora curvet, utpote juxta crurum altitudinem concisum ac decurtatum, ut Artemidorus ex Eveni sententia derivat, dicitur. Bisulcum est animal, sed ita, ut à posteriore parte ad secundam usque digitorum flexionem pes bipartiat: at anterior leviter bipartitus sit, ad primos usque eorundem nodos: fissurarum verò intervalla expleat quid, quale & anseribus. Peculiaris ipsis in dorso gibber, quo cætera animalia carent. Habent & infernè alterum superiori simile: quo reliquum fulcitur corpus, ubi genua summittet. Papillæ ei quaternæ, quot & vaccis. Cauda, asininæ similis. Genitale, ponè idque tam nervosum, ut ex eo confici possit, quo arcus fidissimè intenduntur. In unoquoque crure genu unum: neque plures plicaturæ, ut Herodotus innuit: verum tot videntur, quod alvo subducta sunt. Similis bubulo talus. Clunes pro corporis ratione exiguæ. Fel non discretum, sed venulis quibusdam confusum. Nulli in superiore maxilla priores dentes. Soli ex non cornigeris duo ventriculi, quod spinosum ligneumque alimentum depascatur. Ideò & membrana oris interior, ex toto aspera est, & ea quæ ventribus obducitur, similiter. Medullæ & sevi apud authores quoque mentio. Reperiuntur in Africa & Asia, Bactrianos in primis & Arabas. Anaxagoras etiam in Jonia ad urbem Clazomeniam, agros suos gregibus & Camelis depascendos reliquit, ut ex Suida vertit Hieronymus Wolfius. Romæ superato ad Rhyndacum amnem Mithridate, primum visos putavit Sallustius: at poterant bello Achaico & Asiatico videri. Ptolomæus Lagi Bactrianam totam nigram inter alia spectacula exhibuit. Delectantur spinoso ligneoque alimento; junco præferim, cujus summitatem sæpenumero abrodunt. Sed nec hordeum purum vel cum fæno, vel gramen tenue & humile negligunt; sæpe & carduis contenti. Hodie Arabiæ deserta transmittentibus, hordeacea liba quinque quæ malum Cydonium magnitudine non superent, quotidie dantur.

Aldrovand. Hist. Bifulc. c. 34.

Descriptio. Aristot. H. A. l. c. 1. Scalig. c. 6.

Aristot. H. A. l. 5. c. 2.

Herodot. in Thalia.

Aristot. de partib. animal. l. 3. c. 14. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Locus.

Plutarch. in Lucullo.

Lucian. in Pro-metheo. Cibus Galen. Antid. l. 1. c. 14.

Varrom. l. 1. c. 7.

ut quæ ictui Japonicæ machæræ facilè resistat. Neque enim hæc bestia, (ut apud nos pingitur) scutis munita est; sed hæplicituræ hos clypeos mentiuntur; neque una pars durior est alterâ. Rostro est porcino; sed ante acutiore, neque tam obtuso, in cujus extremitate cornu istud extat, unde nomen fortita est bellua, aliud altero majus pro ætate Rhinocerotis. Colore etiam cornu variat, modò nigrum, modò cinericeum, modò album est. Magnitudine autem corporis mediocris staturæ, Elephantem proximè accedit mediocrem, nisi quòd pedibus sit longè humilioribus, & propterea etiam tam conspicuum non est animal. *Locus* si quæras, invenitur in Africæ desertis, Abassia, multis Asiæ locis, regno Bengalæ, & Jacatru. Nec ævo Aristotelis Græcis notus erat, nec Romanis ante annum urbis conditæ DCLXVI. Quis primus monstraverit, inter antiquarios non convenit. Dio ab Augusto primum in triumphali pompa traductum, ait: At Plinius, Cn. Pompejum ludis primum exhibuisse, tradidit. Ideò Solinus: Ante ludos Cn. Pompeii Romana spectacula, Rhinocerotem nescivisse, reliquit. Herbis & virgultis perquam spinosis vescitur, nam linguam habet asperrimam. De *Natura* hoc duntaxat constat, cum Elephantem inimicitias gerere, nec sævire in hominem nisi laceffitum. Dimicaturus, cornu ad saxa limato præparat se pugna: in dimicatione alvum maximè petens, quam scit esse molliorem, perruptoque carniū ambitu exanguem facit: quòd si alvum contingendi copia non datur, contra ipse à proboscide & dentibus ictus, deficit, & opprimitur. Irritatus, inquit Bontius, hominem simul & equum, tanquam pulicem prostermit, quem deinde lambendo necat, dum asperitate linguæ, cute ac carne usque ad ossa hominem denudat. Sclopeto læsus, dum per sylvas fugit, quicquid obvium est, cum summo frogore ac horrore audientium prostermit, etiam satis crassas arbores. Historiam insignis ejus ferocitatis, vide apud eundem. Huc pertinet ex eodem & illud, quòd cœno mirificè gaudeat, nec prius etiam irritatus vindictam exerceat, quam catulo suo provide-rit. *Voce* suæ imitatur. Grunnit enim. *Carnibus* vescuntur Mauri: quæ tam nervosa, ut dentes ferratos exigat. Cutis in vino macerata, à Zacuto; in malignis propinatur. Cornu veneno extinguendo quidam propinant: lautioribus apud Romanos pro gutto in balneis erat. In eo oleum asservabatur loturis idoneum. In *Genera* quædam distinguui, affirmare non ausim. Dicitur tamen in Africa deprehensus, magnitudine asini sylvestris, cornu bicubitali, pedibus cervinis, auribus equinis, caudâ bovinâ.

Locus.

Dio Hist. l. 51.

Plin. H. N. l. 8. c. 20. Solin. Polyhist. c. 30. Bontius l. c.

Solin.
Polyhist.
c. 62.

De *Potu* ita Solinus. Sicim etiam in quadri-
duum tolerant: verum cum occasio bibendi
data est, tantum implentur, quantum & fa-
tiet præterita desideria, & in futurum diem
prosit. Lutulentas aquas captant, puras
refugiunt, denique nili cænosior liquor fue-
rit, ipsi assidua proculcatione limum exci-
tant, ut turbetur. At recentiores, etiam in
duodecem imò in quindecim dies totos, si
fors ferat, abstinere potu solere scribunt:
imò oculatorum fide constat, in hara &
Biled Elgerid, nunquam bibere, quam diu
viride gramen, quod depascant, invenire
possint. De *Generatione* hoc habemus, à C.
Plinio prodi, aversum coire; ab Aristotele
non item. Hujus enim verba. Cameli seden-
te foeminâ coeunt, nec averfi, sed comple-
ctente mare ut cæteræ quadrupedes agunt,
& coitum toto die exercent. Petunt reces-
suum solitudines, cum libet coire, nec ali-
quis eò tuto accedere potest, præterquam
pastor armenti. De gestatione & partu, non
conveniunt authores. Suidas, decem men-
ses gestare, undecimo parere, & anno inter-
misso rursus prurire scribit. Secundum Pli-
nium, duodecem mensibus ferunt, à trima-
tu pariunt vere, iterumque implentur à par-
tu Aristoteles verò, gestationi duodecem
duntaxat menses assignat, & semper unum
tantum modo parere, & quidem (κατὰ τὸν
μαμαχλυστῶνα μῆνα) scribit. Alibi tamen de-
cem duntaxat mensium meminit, & ver-
nalis temporis. Tres in primis hostes habent,
Equum, *Leonem* & *Tabanum*. De equo Cyri
historia testatur, qui immixtis contra Croesi
equitatum camelis, eundem dissipavit,
quod equi ne olfactum quidem camelorum
paterentur. A leonibus infestari, Ælianus
author est. A Tabanis ne infestentur, om-
nium piscium adipe Arabes eosdem inun-
gunt. Inter *Morbos* quibus vexantur, poda-
gra est & calvities. Illâ faciliè moriuntur:
hanc cum hominibus communem habere,
proditum authoribus. Rabie corripiuntur
genituræ cupidi, adeò ut injuriæ aliquando
illatæ memores, in obvios & ductores ad
internecionem usque desæviant. Quadra-
ginta diebus totis id fieri, quidam prodi-
dere. Affectionem describit Hieronymus.
In quibus, inquit, Camelum Bactrum enor-
mis magnitudinis, qui multos jam obtrive-
rat, triginta & eo amplius viri, distentum
solidissimis funibus, cum clamore adduxe-
runt. Sanguinei erant oculi, spumabatos,
volubilis lingua turgebat, & super omnem
terrorem, rugitus personabat immanis. De
Ætate non convenit inter scriptores. Ari-
stoteles plusquam quinquaginta annis vive-
re scripsit. Solinus in centum durare, nisi
fortè translatis in peregrina, insolentia mu-
tati aëris morbos trahant. Plinius quinqu-
agenis annis, quosdam & centenis vivere pro-
didit; quod de Bactrianis ab Æliano su-

Genera-
tio. Plin.
H. N. 1.
10. c. 63.

Aristot.
H. A. 1.
5. c. 2.

Arist. H.
A. 1. 5. c.
15.

Arist. H.
A. 1. 6. c.
26. Ini-
micitiæ.

Ælian. H.
A. 1. 17.
c. 36.

Morbi.
Aristot.
H. A. 1.
8. c. 22.

Hiero-
nym. in
vita Hila-
rionis.

Ætas.
Aristot.
H. A. 1.
6. c. 16.
Solin.
Polyhist.
c. 62.
Plin. H.
N. 1. 8. c.
18. Æ-
lian. H.
A. 1. 4. c.
55. Inge-
nium.

mitur. Ad *Ingenium* & *Mores* spectant, *vin-
dicta*, *Docilitas*, & *musices amor*, *verecundia*,
pietas & *philosophia*. Percussus aliquando,
iram reponit longo tempore, & ubi occasio-
nem nactus fuerit, malum retribuit. Ad
tympani sonitum choreas ducere edocetur.
Includitur, inquit *Leo Africanus*, junior ca-
melus, ubi pavementum præcalidum sit, ut
alternatim pedes attollat, dum calor urget,
idque frequentissimâ alternatione facit,
dum hunc dum illum pedem attollit pun-
gente calore, atque interim semper ad fores
tympanum percutitur. In schola hujusmo-
di scholasticus hic exercetur ad annum in-
tegrum, aut circiter. Usu igitur confirmato
hâc diuturnitate, quotiescunque tympani
sonitum audierit, eâdem pedum alterna-
tione, eodemque loco persistens, dum inso-
net tympanum, choreæ ductum spectatori-
bus præ se fert. Musicâ delectari vel exinde
colligas, quod fessus non verberibus sed
cantu ad progrediendum invitetur. In ma-
trem tantâ est reverentiâ, ut eam nunquam
ineat; nec se, ut faciat, cogi patiatur. Oper-
tam cum aliquando violasset, admissorem
paulò post necavit. *Verecundiam* de genera-
tione exposuimus. *Pietatem* compassio ex-
primit. Totâ nocte manducant, quod si
aliquis in stabulo ægroret, cibo abstinent.
Philosophiam Indi detexere. Cum celeritate
maximâ uti cupiunt, fætus Cameli per ali-
quot milliaria cum matre abducunt; illâ
abactâ, pullos relinquunt. Dum redeunt,
mater passus duplicat, quo citius pullis re-
stituatur. *Usus* in pluribus præstat. In *Me-
dicina*, caro provocat urinam. *Adeps* gibbi,
suffumigatus confert hæmorrhoidibus. *Ce-
rebrum* exsiccatum cum aceto epilepsiæ. *Fel*
cum melle potum anginæ. *Sanguis* conce-
ptioni & præfocationi matricis, si post pur-
gationem menstruorum adhibeatur. *Lac*
ventrem lenit, valdè subtile & aquosum,
asthmatis confert, & desiderium cibi excitat.
Urina quæ fullonibus utilissima, quod apud
Plinium legimus, ad dentes quoque deal-
bandos & purgandos, vim habere credebatur.
Cauda arefacta, solvit anum. *Fimi* ci-
nere cum oleo misto crispatur capillus. I-
dem albus cum melle tritus tumores repri-
mit, & vulnera mundat. *Seta* è cauda con-
tortæ & alligatæ sinistro brachio quartanis
medentur, si credere fas est. Invenit & in *cibis*
locum. Arabas novimus camelorum lacte
vesci. Carnes, teste Galeno, Alexandrinis in
usu. Heliogabalus aliquoties in cœnis exhi-
buit: & calcanea, quia maximè tenera. Api-
cii exemplo, comedit. Apud Judæos inter
vetitos cibos habebatur. Carnem & lac qui-
dam inter suavissima censent. Hoc, partui
vicinarum caseosæ & butyrosæ substantiæ
minus habet. In *bellis* adhibitos passim apud
Historicos habetur. Hinc armaturæ, qua
in expeditionibus muniuntur, nomina, de
qui-

Basil. He-
xam. ho-
mil. 8.

Leo Afri-
canus in
Africa.

Aristot.
in Mira-
bil.

Tzetzes
Chiliad.
12. c.
404.

Plin. H.
N. 1. 28.
c. 8.

Apul. l. 1.
Apol.

Galen. l.
1. de A.
lim. fa-
cult. c. 2.
Lamprid.
in Heliogab.

quibus si DEUS voluerit in Philologicis. Itinera in Arabia, Ægypto, &c. vel hodiè absque camelis confici non possunt. Sunt & oneri ferendo accommodati, sed nec ultra justum pondera recipiunt. Sexcenta pondo communiter gestant, licet, si necessitas urgeat, mille ferre possint. Dum onerantur, aut onere levantur, in ventrem procumbunt, & ut sentiunt se æquale viribus suis imposi- tum, exsurgunt, nec plus recipiunt. African- cani molestias itineris non intermissi quin- quaginta diebus totis haud ægrè sustinent. Species Camelorum apud veteres sunt varia- rum. Sunt pingues, macri, rusci, albi. Dedit & cursus differentiam: *Dromedarii* enim & *Tromades* dicuntur, qui minoris quidem sunt staturæ, sed cursus perniciosissimi. Cen- tum & amplius milliaria uno die peragere solere, Isidorus Hispalensis habet. Aristote- les equis Nisanis vel potius Nisæis præ- ponit. Fœminas esse velociores ab Achmete Seirimio & aliis observatum est. Præcipua differentia à regionibus sumitur. Sunt *Ara- bici*, *Bactriani* & *Caspii*. Illi, bina tubera in dorso habent. Unde *στρυχοι* & *διρυχοι*, di- cuntur. Isti fortissimi habentur, & singula in tergo tubera, alterum verò in pectore, cui incumbant, gerunt. Hos, ad equorum maximorum magnitudinem accedere, Æli- anus ait. Moderni de Differentiis Africano- rum ita agunt, & in his *Samuel Purchasius*. Camelorum tres species habent. Prima vo- catur *Hugium*, ingentis staturæ & roboris, pendo mille librarum ferens. Secunda mi- nor, duplici in tergo tubere, oneribus fe- rendis & equitationi apta, *Becheti*, dicta, quam solam Asiatici agnoscunt. Tertiam vocant *Ragvabil*, macilentam & gracilem, ad sola itinera non accommodatam. Eam quippe inequant, conficitque uno die am- plius quam centum passuum millia. Atque iis Rex Tombuti solet mittere Nuncios Segel- messem aut Darham, nongentis millibus pas- suum distantem, septem aut ad summum octo diebus, sine ulla in itinere morâ aut requie.

A R T I C U L U S II.

De Camelopardale.

CAmelo pardalis, seu ut aliis placet pau- lo barbarè, Camelopardalus, à Camelo & Pardale nomen fortitusest. Corporis va- stitæ Camelum, macularum varietate Par- dum imitatur. De cætero si Varroni atten- dimus, nomen hoc Alexandria, unde istud animal Romam erat adductum, venit. Mul- tas autem fortitum est appellationes. Dici- tur enim *Ovis fera*, quod in aviis regionibus degat, & ovi mansuetudine respondeat; *Nab- bis* apud Solinum; *Nabuna* Æthiopibus ut apud Plinium legitur; *Anabula* & *Saffarat*, Alberto M. quæ nomina ex aliis detorta es- se judico; *Orasius* Majolo, sed falsò, cum

Vincentius Bellovacensis pulcherrimum animal esse scribat, Camelopardus verò sit deformis; modernis denique *Giraffa*, ex quo Saffarat corruptum est. Nec Aristoteles ejus meminit, nec Ælianus; Strabo verò & Aga- tharchides ex veteribus in diversa, in eo de- scribendo abeunt. Hunc si sequimur, varie- tatem à Pardale habet, magnitudinem à Ca- melo, monstrosam crassitiem, collum adeò longum ut summis arboribus pabulum car- pat. Apud illum legimus, nullâ re pardali similem, cutis varietate hinnulo simillimum. Addit, virgatis pilis distingui, posteriora humiliora esse anterioribus, ut à cauda se- dere videatur ad bovis altitudinem: verti- cem sublimiorem Camelo habere: ne feram quidem esse, sed pecus. Plinius collo simi- lem facit equo, collo & cruribus bovi, ca- pite camelo, albis maculis rutilum colorem distinguuntibus. Dio partes posteriores hu- miliores habere scribit. Heliodorus tenuem cervicem, de reliqua corporis mole in olo- rinum collum se tendere, ait. Inter recen- tiores exquisitissimè Bellonius & quidem oculatus testis descripsit. Giraffam, inquit, Græci & Latini vocant Camelopardalem. Vidi in urbe Cairo tres, duo cornicula ex fronte eminebant circiter sex digitos, in fronte media tuberculum existerat, velut tertium cornu, altum circiter duas digitos, collum longum septem pedes; cum caput ex- tollit, sedecem pedes à terra effert. Illius longitudo à cauda ad capitis verticem est duodeviginti pedum: tibiæ tam altæ poste- riores, quàm priores at femora anteriora lon- gè altiora posterioribus. Nimirum, dorsum à cauda ad summum verticem capitis, velut scala, velutque tectum carinatum attollitur. Totum corpus grandibus maculis distingui- tur coloris cervini, obquadratis, sed in col- lo, magisque in corpore quoquo versus latis circiter dodrantem, at clausula macularum alba digito latior. Itaque totum corpus reti- culatum est: neque tamen ut Pardalis ma- culas habet rotundas, sed aut obquadratas, aut rotundas. Pes est bifidus ut bubulus, la- brum superum longè eminet infra inferum, Cauda tenuis & exigua, acumine pilosa. Jubam habet ut equus, à dorso ad capitis verticem. In gradiendo claudicare videtur, nunc dextris nunc sinistris, non modo cru- ribus sed etiam lateribus; cum ex terra aut potum aut cibum necesse haberet, crura la- tissimè distendebat priora. Nonnisi enim latè diductis, longeque diu arcuatis tibiis, cibum ex terra capere potest. Addendum ex Josaphati Barbari Veneti itinerario, Lin- guam duos pedes longam, suboscure quasi violacei coloris, teretem sicut anguillis, ha- bere: hâc ramos, frondes, herbasque cape- re, mira celeritate in os trahendo, ut vix ab attento spectatore videatur. Purchasius ex Fernando Jesuita, tam vastum animale esse

Strabo
Geogr.
l. 16.
Aga-
tharch.
apud Phot.
in Biblio-
theca.
Descri-
ptio.

Plin. H.
N. l. 8. c.
18.

Dio Hist.
l. 43.

Bellon.
observ. c.
9.

Locus. scribit, ut eques rectus sub ejus dorso transire possit. *Reperitur* in Africa, apud Trogodytas, ut ex Strabone habemus, & Æthiopia. Romanis omnium primus ludis suis exhibuit Cæsar Dictator: postea Gordianus decem exhibuit, Aurelianus aliquot in triumpho duxit. Leoni Imperatori oblatus est ab Æthiopibus; Frederico à Sultano Babylonio; Laurentio Mediceo ab alio Sultano. Tractu motuque tam facilem hanc feram Heliodorus prodat, ut eam quo velit, tenui capistro vertici devincto, veluti fortissimo vinculo, magister perducatur. Judæis prohibita est in cibis. Vnde fortè frequentiore olim in Judæa fuisse colligas.

CAPUT IV.

De Quadrupedibus non ruminantibus.

ARTICULUS I.

De Sue.

Nomen. **Q**Vinque in descriptione Suis occurrunt nomina, videlicet, *Sus*, *Porcus*, *Scrophæ*, *Verres*, & *Majalis*. *Sus* Græcis est *ὄνος*, nomen & Apro commune, unde Latinum fluxisse videtur. Olim, ut verbis Varronis utar, dicebatur *Thysus* dicta, ab illo verbo quod dicunt *θύειν*, quod est immolare. Ab suillo enim genere pecoris immolandi initium primum sumptum videtur; cujus vestigia, quod initiis Cereris porci immolantur, & quod initiis pacis foedus cum feritur, porcus occiditur; & quod nuptiarum initio, antiqui Reges ac sublimes viri in Hetruria in conjunctione nuptiali, novus maritus & nova nupta primum porcum immolant. Prisci quoque Latini & etiam Græci in Italia idem fecisse videntur. Nam & nostræ mulieres, addit idem, maximè nutrices, naturam quâ foeminæ sunt, appellant porcum, & Græcè *χοῖρον*, significantes esse dignum insigni nuptiarum. *Porcus* Isidoro quasi spurcus dicitur, quod se ceno & limo illinat, immergat & ingurgitet. Varronis locus, in quo dicitur, Porcus quod Sabini dicunt de Aprino Porco Poridus; inde Porcus nisi à Græcis, quod Athenis in libris sacrorum scriptum est, *καπρὸς ὁ πύρκος*, difficilis nimis est. Videtur tamen esse Græcum antiquum, sed obscuratum, quod nunc eum vocant *χοῖρον*. *Scrophæ* originis est incertæ. Quidam ex sono fictum nomen ajunt. Græcis est *χοιμῶν* & *σχορῶν*. Significat suem quæ sæpius peperit, & aliquando pro ipsa porca peculiariter sumitur. *Verres*, dicitur porcos non castratus & mansuetus. Marcellus sylvaticum pro apro dixit *Majalis* est verres seu porcus castratus, ut inter equos canterius, inter gallos gallinaeos, capus. *Hybrydas* antiqui vocabant sues semiferos, id est, ex domestico & fero pro-

genitos. *Descriptione* notissimi animalis et si opus non videatur, paucis tamen singularia quæque attingemus, (& quidem per saturationem.) *Ossibus* itaque parum medullæ inest. *Pili*, qui quod rigidiores & erecti, *setæ* dicuntur, crassiores sunt quàm in bubus & elephantis: apud nos ferè ruffi, in Gallia & Italia nigri; in Provincia, quod si benè à nobis observatum plærumque versicolores, qui in cervice rigent, *λοφίαν* vocamus. *Pinguedo* inter cutem & musculos collecta, *Lardum* dicitur: axungia verò, adeps suillus inveteratus, aut cum sale, aut syncerus. *Cerebrum* pinguiusculum est, & magis minuitur lunâ decrescente quàm ulli animali. *Oculi* cavi profundique, ut sine vitæ periculo eximi non possint; quare vel altero tantum privati extinguuntur. *Supercilia* nasum versus deorsum nutant, ad tempora verò retrahuntur. *Nasi* pars extrema crassa est, *frons* angusta, *labra* lata. *Os* totum valdè porrigitur, & ut facilius infodiat, latum est. *Rostrum* dicitur, & cutem in eo, callum Grammatici vocant. *Dentes* foeminis pauciores sunt quàm maribus, nec unquam decidunt. *Corium* circa cervicem durius, *κολοσπα* vocant. *Corda* in articulatione habent sues. In *auriculis* invenitur humor quidam felli similis, minus tamen liquidus, sed densitate sua humori splenis similis. *Ventriculus* amplius est flexuosusque, ut diutius concoquat, cum levibus & paucioribus crustis. In *jecinore* lapilli candidi inveniuntur. Caro exos infra umbilicum *spectile* dicitur. Plures habent foeminæ *Mammæ* toto ventre duplici ordine, quod numeroso foecunda sint partu generosæ duodenas, vulgares binis minus. Eadem *genitale* eâ continent parte, quâ pecoris ubera habentur: & cum per libidinem turgent ac pruriunt ad coitum, sursum tantisper hoc retrahunt, vertuntque foras, ut inde mari coitus sit facilius. Rescissum id longè productius, & dehiscens amplius est. *Apria* vulvæ inter femina adhæret, quâ maribus testes maximè continentur. *Caudam* intorquent, & talo probiore carent, inter solipedes & bifulcos ambigui. Sine *Liene* putantur inveniri, qui vel ex tamariscinis alveis bibere, vel radicem splenii comedere. *Costas* iisdem denas apud Plinium legimus. Sed de interioribus suis ita Severinus. In sue asperæ arteriæ circuli cartilaginei obliquè descendentes. Verùm cum primus circulus, qui latissimus est omnium, sit paulò minor, quam transversus, cæteri verò inferiores sint obliqui; necessario inter hos, & primum erat intercapedo, quæ ut compleretur, posuit natura quartam circuli partem, quâ respicit posteriora latiore, quâ vero in anteriora desinit, auctam. Aliud est notandum ab his non dissimile: In circulis paulo inferioribus, quàm sint medii, fecit natura duos semisectos, qui sibi parte acutiore invicem occurrunt, cujus varietatis usus adhuc ignotus.

In

Descriptio.

Plin. H. N. l. II. c. 37. Arist. H. A. l. 2. c. 1. Arist. l. 3. de partib. c. 4.

Aristot. H. A. l. 6. c. 18.

Zootom. Democrit. p. 299.

In intestinis tenuibus ileo quippe, parte externâ tubercula quædam visa duriuscula seminis lentis magnitudine & figurâ, quæ, me trahente, secuti sunt ab interna parte lumbrici duo; alter longitudine palmi; alter longitudine digiti. Uterque cavus, & plenus succo albo veluti chylo aut colostro: formam autem referebant ambo veri lumbrici terrestres. Disce igitur sic hæere lumbricos humanis intestinis. Illa autem durities nodosa, in quam insertum erat os lumbrici, facta est, puto, ab ulcere & morfu lumbrici. Cuticula in sue concolor est pilis albis nigris, &c. Deutero verò suis à se secto, ita scribit. Præterea quæ scribit Sylvius, in extremis cornubus appendices quædam membranæ exungues, in quibus, ut apparet, reservantur fecum & urinæ recrementa. Venâ umbilicalis bifida, cum appropinquat utero; umbilicalia vasa primo sub alam sinistram tendentia, mox cervicem transversim amplectentia, revolvuntur extrinsecus ad brachium dextrum. In fætu verò ipso circiter menstruo omnia ferè viscera interna conspiciuntur. *Hepar*, ventriculus, intestina, lien, renes, diaphragma, cor, pulmo. Cor albidum, pulmo concolor hepatis, hepar rubrum opacum, renes magni, pro ratione venæ apparentis per rectos pedes anteriores; posteriores, sed magis per posteriores. Item jugulares etiam illæ, quæ ad caput ascendant, labdæ quasi figuram facientes. In porcello vero perfectò detecto thorace per transversas duas sectiones, primum intueris nervulos duos, qui jugulum perforantes & pericardio adhærescentes recta per cordis latera descendunt ad diaphragma, cujus circulo nerveo inferuntur per duos ramulos aut tres, hinc transit alius ramus ad ventriculos superius. Vides hic conspiciue divaricationem venæ axillaristhymicæ. *Auricula cordis* intus cavæ, divulsæ à corde parte anteriore, conjunctæ posteriore. Processus *urachi* à fundo vesicæ post latos digitos duos inferitur in arterias. In fine *penis* glandula rotunda: In cervice *vesicæ*, glandulæ duæ, ad hanc committuntur vasa ejaculatoria, quæ, ut apparet, ad prostates, alias glandulas, mediis venis deferuntur, & hinc ad exortum penis. In *ventriculo* & intestinis succus viscidus colore in ventriculo, ut ovi album, in intestinis vero, ut mel dilutius. Vena sine pari in medio spinæ ad costas singulas utrinque mittens ramusculos. Ubique ferè in nostris regionibus invenitur. Strabo Galliam togatam suis ita abundare suo tempore scripsit, ut & porcorum gregibus qui ibi alebantur, Roma aleretur; ex Lugdunensi verò Gallia, optima salsamenta eò apportarentur. Sed & Syracusæ proverbium ob bonitatem meruere. *Cæsus Siculus*, à *Syracusi* suis. Solinus nullos in Arabia haberi prodidit, nullos in India Ælianus, ita

ut ne nasci quidem, illatos exspirare putent. At in terra Australi, nihil esse quadrupedum, quæ in nostro orbe inveniuntur, præter bubalos, vaccas, capros, & porcos. Hesselius Gerardus in descriptione terræ Australis reliquit. Quantum ad *Cibum*, videntur suæ esse quasi *παμφαγοι*. Vescuntur ex plantis & earum fructibus, radicibus, glandibus, castaneis, dactylis, vinaceis, cytiso, bulbis, rapunculi sylvatici radice, cicuta, cicere, hordeo, tritico, furfure, & aliis. Glans fagea suam hilarem facit, carnem coctibilem ac levem & utilem stomacho: iligna suam angustam, nitidam, strigosam, ponderosam: querna, diffusam, & gravissimam. Proximam huic cerream Nigidius facit, nec ex alia solidiorem carnem, sed duram. Iligna tentantur, nisi paulatim detur. Fungosa caro fit, esculo, robore, subere. Haliphlaei glandem attingunt, quidem, sed non nisi, cum aliud pabulum non suppetit. De Castaneis, postquam præstantiora genera recensisset, ita subdit Plinius: Cætera suum pabulo gignuntur, scrupulosæ corticis intra nucleos quoque ruminatione. Dactylis in Ægypto, Cypro, Syria, & Seleucia Assyriæ faginantur. Fraxini quoque fructu pinguescunt. Cytisus aridus ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus deprædicatur. Bulbi illud genus in Bavaria ideò suillum dicitur. Rapunculus verò ille sylvaticus, violarum folia habet, acutiora, radicem candidam, dulcem, non sine lacte. Hyosciamo sumpto insaniunt. Ad viridia pabula haud sine noxa deducuntur. Nec carnibus abstinent. Occisorum à latronibus corpora in sylvis devorasse, exemplis probari posset. Propriis fætibz non parcere, nec à gallinis aut anseribus hyeme imprimis, abstinere, experientia me docuit. Effodiunt & lumbricos; limacibus quoque & testudinibus nemoralibus pascuntur. Pinguescunt sexaginta diebus, sed magis tridui inediâ faginatione orsa. Fico, caricâ faginare, & à satietate necare, inventum Apicii fuit. Angli per integrum annum faginant, cujus pingue solidius & lautius fieri voluerint. Cæterum usque adeò sus pinguescere solet, ut se ipsa stans sustinere non possit, neque progredi usquam. Itaque eas si quis quo trajicere velit in plaustrum imponit. In Hispania ulteriore in Lusitania cum sus esset occisus, Attilius Hispaniensis minimè mendax, & multarum rerum peritus, in doctrina dicebat, Lucio Volumnio Senatori missam offulam cum duabus costis, quæ penderet III. & XX. pondo, ejusque suis à cute ad os, pedem & III. digitos fuisse. In Arcadia spectavit Varro suam, quæ pro pinguitudine carnis, non modò surgere non posset, sed etiam, ut in ejus corpore forex exesa carne nidum fecisset, & peperisset mures. Idem Basileæ accidisse, Gesnerus, prout accepit, prodidit.

Sitis

Cibus.

Plin. H.
N. l. 16.
c. 6.Columella R.
R. l. 7. c.
9. & 10.Plin. H.
N. l. 8. c.
51.Varro R.
R. l.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

Locus.

Strabo
Geogr. l.
5.

Generatio.
Plin. H.
N. l. 8. c.
51. Ari-
stot. H.
A. l. 2. c.
1. & l. 5.
c. 14. 1.
6. c. 18.

Sitis ipsi per æstatem infesta, sed turbidâ aquâ pinguescit; vinaceis verò colluviei immistis, inebriatur. De *Generatione* ita breviter Plinius, Suilli pecoris admissurâ, à Favonio ad æquinoctium vernum, ætatis octavo mense, quibusdam in locis etiam quarto, usque ad septimum annum, in aliis erat ad octavum annum. Partus bis in anno. Tempus utero quatuor mensium: numerus fecunditati ad vicanos, sed educare tam multos nequeunt. Diebus decem circa brumam, statim dentatos nasci, Nigidius tradit. Implentur uno coitu, qui & geminatur propter facilitatem abortiendi. Remedium, ne primâ subactione, neque ante flaccidas aures coitus fiat. Mares non ultra trimatum generant. Fœminæ senectute fessæ, cubantes coeunt. His adde Luna decrescente coire, ut Plutarchus prodidit. Verrem unicum vel decem suis implendis sufficere: subantis verò voce auditâ, nisi admittatur, cibum non capere: propter copiosum humorem multum ac diu coire: initum maturinum appetere, fœminas, post meridiem blandiri: & si pinguet, omnibus anni temporibus, interdiu & noctu, inire posse. Idem antequam sit anniculus prolem vitiosam generat: at fœmina annicula quidem parit, sed mense Februario iniri debet: ubi decimum quintum annum nata est efferatur, nisi fortè benè nutriatur. Subans verò in tantum etiam efferatur, ut hominem laceret, candidâ inprimis veste indutum. Rabies ea mitigatur aceto naturæ asperso: nec, prægnans venerem arcet. Eandem tantum coitu spumam fundere diligentiores observarunt. Quantum ad *Partum*, apud nos sedecem parere audio, inquit Gesnerus, sed rarò: sæpe octonos vel denos. Paucissima, prima partione edere, vigere secunda, nec senescentem copiâ factus defici, quanquam lentius coeat, Aristoteles auctor est. Aliis placet, tot parere debere porcos; quot mammas habet. Fœcundior tamen putatur alba. Fætus qui in utero læsus minutusque fuerit, *Metacharum* dicitur, quasi Posthumum voces. Pollux cordos & parvos porcos *μυτὰ χοίρα* appellat. Hyeme editi, fiunt exiles, & infelicissimè nutriuntur. Helvetii Martio natos præferunt. In calidioribus regionibus melior est hyemalis quàm æstivus. Cum scrofa peperit, primas mammas, primo qui editus fuit porco præbet. Ex sunt faucibus proximæ, & plurimum lactis habent. Suam quoque quisque novit in fœtu quo genitus est ordine, eaque alitur, nec alia. Detracto illa alumno suo, sterilefcit illico ac resilit. Uno vero ex omni turba relicto, sola munifex, quæ genito erat attributa, descendit. Si gravidæ glandem copiosius ederint, abortum faciunt. *Antipathiam* gerunt suæ cum *Elephantis*, *Lupis*, *Salamandris*, *Un-*

Plutarch.
de Mide
& Ophi-
de. Plin.
l. c.

Cola-
mella R.
R. l. 7. c.
9.

Plin. H.
N. l. 8. c.
51.

Aristot.
H. A. l.
5. c. 14.

Plin. H.
N. l. c.

Antipa-
thia.

guento amaracino, mustela, hyoscyamo, scorpionibus, equis, & novellis segetibus. Elephas grunnitum eorum ferre non potest. *Lupus* seu compascuos aggredi non audet ob vocem. Salamandras absque periculo devorant. Amaracinum unguentum ipsis venenum est. De Mustelæ discordia apud Plinium legimus. Hyoscyamo enecantur. In Scythia & Scorpionibus unico ictu exanimantur. Equo, teter odor, turpis grunnitus, foedus halitus, infensa. Cum dentes nunquam amittat, debiles tamen & totâ vitâ infirmi redduntur, post gustatas segetes novellas; naturâ penè indomitam obscæni pecoris ingluviem sic plectente, quando aliter reprimi non potest. De *Ætate* hoc habet Plinius, oculo amisso putari cibo extingui, alioquin vita ad quindecim annos, quibusdam ad vicenos. Inter *Morbos*, quibus suæ laborant, est præcipuè *χαλαρα*, seu grando, quæ in viventibus latet, in dissectis apparet: nec ulla ferè est, quæ non grandinis tria ad minimum grana habeat. Subjectæ inprimis huic, quibus crura, collum & armi carne humidiora constant. Cognoscuntur, quod in inferiore linguæ parte hæreant, & si setam dorso evelas, cruorem pili inversi radices exhibeant. Cum à magno fervore in frigidam incumbunt, præsertim si non statim pergere cogantur, membris omnibus convelluntur. Infestantur & à pediculis; & æstate, nisi frequenter excitentur, lethargo captæ dormiunt. Corripiuntur & raucedine, anginâ, strumis, & alvi profluvio. Nisi affatim biberint, pulmonariæ evadunt. Ad *Ingenium* pertinet, quod de *brutalitate*, *spurcitie*, *immensa libidine*, & *voracitate* dicitur. Maxime certè brutum est, animamque ei pro sale datam, haud illepidè existimabatur. Volutari in luto est eorum requies, ut lavatio hominis. Loca in quibus se volvunt, volutabra dicuntur. De *Ardore in venerem*, superius diximus. Gryllus tamen, apud Plutarchum singularem in eadem modestiam & continentiam probat. Non hic, inquit, ut inter homines, fœminæ simulatione ludunt, aut libidini, fraudes, præstigias, denegationesque prætexere solent: neque mares, stimulo & luxuria agitati, mercede, labore, aut obsequiis coitum redimunt, sed doli expertem & tempestivam sectantur venerem, quæ statò anni tempore, cupiditatem animalium, velut germen quoddam excitans, illicò restinguit. De *voracitate* etiam superius aliquid attactum. Ne cadaveribus quidem sui generis abstinet. Inextinguibilis hæc vorandi aviditas, Laphygemus dicitur, ut Cælius Rhodiginus observavit. Huc *vocum humanarum* intellectus pertinet. Compertum agnitam Suarii, furto abactis, mersoque navigio, reclamatione unius lateris, remeasse. *Vox* ipsis est Grun-

Phile in
Carm.

Ælian. H.
A. l. 9. c.
28. Plin.
H. N. l.
10. c. 74
Aristot.
H. A. l.
8. c. 29.

Ætas.
Plin. H.
N. l. 8. c.
51.

Plin. H.
N. l. 8. c.
51.

Rhodig.
Lect. l. 25
c. 26.

Plin. l. 6. Grunnitus. De *Ufu in Cibo*, verum fateamur necesse, quod Plinius dicit, neque alio ex animali numerosiore materiam ganeæ, quinquaginta propè sapes cum cæteris singulos. Nota apud Livium de Chalcidensi hospite historia, qui varietatem exquisitam ciborum, & speciem ferinæ carnis, ex mansueto sue produxerat. Heroico ævo in precio fuisse apud Homerum invenies; vescabanturque macilentâ servi, pinguior Dominorum usibus cedebat. Solennitas quoque Saturnalium, non alio pœnè cibo, certe non lautiore, transigebatur, ut observavit Lipsius eoque itum luxuriæ, ut & integri, iique facti, unde Porcorum hortulanorum & Trojanorum nomina, apponerentur. Taceo, ita artificiosè apparasse, aut ab altera parte esset *οπιλαιο* *εραμβαιο*, assatus & probè tostus; ex altera verò jurulentus, utpote ex aqua coctus; ita etiam jugulatus, ut *ασφαλι* videretur, quod apud Athenæum viderè est. Porcelli tamen maximè in deliciis, quos *δελφικας* & *δελφικας* Græci vocabant. Reperiuntur verò etiam, qui suilla in totum abstinent, Judæi nempe, quibus lege prohibita est; Arabes, quod apud Solinum legimus; Muhamedani, qui ex porci naribus murem natam fabulantur; Mauri, Tartari, ut & olim, prodente Pausania, Pessinuntii. Cæterum si de temperamento & quomodo se ad sanitatem humanam caro suis habeat quæras, Delphacum qui & *λεπιδόπικος* dicuntur, humida est, & superfluitatum abundans, nec boni succi. Suilla Simeoni Sethi boni succi & facilis concoctionis, propter similitudinem quam cum humano corpore habet, magisque quam alia cibaria alit. Hoc postremum & Galenus quidem concedit, athletarum exemplo fretus: sed addit, bubulas in tantum lentore antecedere, in quantum bubulæ suillas crassitie vincunt. Alibi tamen expeditibus probatissimum cibum suppeditare ait; quod & apud Hippocratem invenies. Idem porcinas pravas esse ait. Suavissima suis mediæ ætatis; juniorum, si diu in ventriculo retineatur, corrumpi solet. Athenæus ex Sicilia tanquam præcipuas laudat. Apicius variè porcellos præparabat. Unde farfiliis, liquaminati, assi, Vitelliani, Flacciani, laureati, Frontoniani, Oenogerati, Celsiniâni, tragani, & cæterorum nomina. *Iecur* omnibus præfertur, si quis animal aridâ sicu paverit, ut apud Aëtium extat. Habitæ tamen & aliæ partes in pretio apud veteres, collum nempe, glandium, vulva ejeciticia inprimis post porcaria, lardum, perna, petaso, testiculi, sinicipita, Omasum, & cæteræ. Inter pernas laudabantur, Asiaticæ, Lyciæ, Cerretanæ, Italianæ, nunc Britannicæ, Westphalicæ, Moguntinæ, Ruthenicæ. Ex carne & aliis fiunt, Isicia, prosecta, lucanicæ, falisci, fandali, farcimina, hotelli, apexabones, tomacula, ossa,

hira seu hila, afratum, ruceta, fartutilli & alia, quæ alibi Deo volente explicabimus. *Usum medicum* quod spectat, accuratissimè iste à Gesnero describitur, *Carnium* decoctum opitulatur contra Buprestim. *Sanguine* porci calido benè verrucæ inunguntur: ubera verò suis sanguine circumlita, minus crescere, Plinius author est. *Axungia* porcelli masculi lactentis castrati, illa maxime quæ in ventre intra carnem circa peritonæum, ad unguenta paranda à pharmacopæis adhibetur, à Medicis ad emolliendum, discutendum &c. Fracta ossa lardum elixum atque circumligatum mira celeritate solidat. Panis illinitur cum calce. Cum genista tusa genua dolentia sanat. Cum vino falso contra hyosciamum bibitur, pecoribus quoque optimè auxiliatur. *Iecur*, cum vino sumptum venenatorum moribus medetur, assum alvum sistit. *Vesica* urinam ciet, si terram non attigerit, pubi imposita. Verrina usta in potu feliciter contra miestionem involuntariam exhibetur. *Testiculi* inveterati, & in suis lacte triti contra comitalem morbum dantur. *Perna* scrofinae os amplissimum combustum, gingivas siccatur & adstringit. *Talus* combustus, donec è nigro albescat, & potus doloribus coli succurrit. *Lac* temporibus inunctum vigilias compefcit. *Succerda* in farinam redacta, ruptis, ex aceto salutaris est. Plura vide in Gesnero. De *Differentiis*, hoc duntaxat occurrit, alium esse *sylvestrem*, de quo nunc agemus, alium *Domesticum*, de quo jam dicta accipi debent. Moderni scriptores *Guineensium* & *fluviatilium* mentionem faciunt, quibus adjungi potest *Tapierete* congener sui animal. *Guineensis*, & è Guinea in Brasiliam translatus, figuratur ut nostrates & ruffi coloris: in hoc autem differt à nostratibus, quod caput habeat non ita elatum: aures autem longas, & acutas planè & prolongatis acuminibus, caudam longam usque ad talos propendentem, pilorum expertem. Totum corpus tegitur pilis brevibus ruffis splendentibus, non fetis, quibus & in dorso caret, sed tantum versus caudam in dorso & circa collum paulo longiores habet pilos. Planè cicur. *Porcus fluviatilis*, Brasiliensibus Capy-bara, figuram penè porcorum habet, magnitudine exæquat porcum annum vel bimum nostratem. Longitudo corporis à capite ad anum circiter duorum pedum, crassities ventris sesquipedis. Caret cauda. *Pedes* quatuor porcini: anteriores quatuor ungulis, posteriores tribus præditos. Estque in anterioribus *ungula* media longissima, duæ breviores, quarta minima: in posterioribus media longior & duæ minores: habet & callum ad suffraginem usque. *Capitis* longitudo decem digitorum, & crassities totidem ferè: habetque crassum & improporionatum caput, & os longissimum ac crassum: oculos magnos, nigros, aures parvas, subrotundas.

Ufus in
Medicina.
Galen de
Antidor.
l. 2.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 9.

Differens
tia.

Marc-
grav.
Hist. Bra-
siliens. l.
6. c. 7.

Inferior *maxilla* brevior superiori; continetque in utraque antèrius duos *dentes* incurvatos, qui ad sesquidigitum prominent extra alveolos suos, & ad duos ferè digitos sunt inserti; sed non eminent extra os, sed ut in leporibus intus continentur. *Dentes* reliqui mirandi sunt: constat totus ordo in qualibet maxilla octo ossibus, in quolibet nimirum latere quatuor: & quodlibet os tres dentes inseparabiles repræsentat: ut ita sint in qualibet maxilla dentes viginti & quatuor, & in totum quadraginta octo: sunt autem omnes in extremitatibus plani. Comedunt gramen & fructus varios Caro comeditur, licet non bene sapiat, melior ossa, caput inprimis. *Tapiere* Brasiliensibus, Lusitanis *Anta*, animal quadrupes, magnitudine juveni semestris: figura corporis quodammodo ad porcum accedens, capite etiam tali, verum crassiori, oblongo, superius in acumem desinente, promuscide super os præeminente, quam validissimo nervo contrahere & extendere potest: in promuscide autem sunt fissuræ oblongæ. Inferior *oris* pars brevior est superiore, maxillæ ambæ antèrius fastigiatae, & in qualibet decem *dentes* incisorii superne & inferne; hinc per certum spacium, utraque maxilla caret dentibus, sequuntur deinde molares, grandes omnes in quolibet latere quinque, ita ut habeat viginti molares & viginti incisores. *Oculos* habet parvos porcinos: *ures* obrotundas majusculas, quas versus anteriora surrigit: *crura* vix longiora porcinis, at crassiuscula: in anterioribus pedibus quatuor *ungulas*, in posterioribus tres; media inter eas major est in omnibus pedibus; in prioribus pedibus, tribus quarta parvula exterius est adjuncta: sunt autem ungulæ nigricantes non solidæ sed cavæ, & quæ detrahi possunt. caret *cauda*. & ejus loco processum habet nudum pilis, conicum, parvum, more Cutian. Mas *membrum genitale* longe exserere potest instar Cercopitheci. Incedit dorso incurvato ut Capybara. *Cutem* solidam habet instar Alcis; pilos breves. Color *pilorum* in junioribus est umbræ lucidæ, maculis variegatus albicantibus ut capreolus: in adultis fulcus sive nigricans sine maculis. Animal interdiu *dormit* in opacis sylvis latitans; noctu aut mane egreditur pabuli causa. Optime potest natàre. Vescitur gramine, arundine Saccharifera, brassica, &c. Caro ejus comeditur, sed ingrati saporis est.

ARTICULUS II.

De Apro.

Aldrovand.
Hist. B.
falc. c. 37.
Nomen.

APri nomen feris suis duntaxat competit, cum sus tam de feris quàm de domesticis dicatur. Sextus tamen, aprum a-

grestem nominat, quasi verres etiam, id est, sus cicur mas, eodem nomine nuncupari possit. Græci vocant *καπρὸν*, Poëtæ inprimis, quod vocabulum rei rusticæ scriptores de verre intelligunt, & *σάκρον*, *χλένης* verò quibusdam est *ἐπὶ μίαις*, id est, exsectus eunuchusque aper: (atterunt arbori aut saxo testiculos). Homero *μύροχος*; aliis sus in agris libere pascens, quasi *χλοδών* ut Varius habet, id est, in herbis fœnove dormiens; quibusdam, magnitudine viscenda aper. Aristophanes *μύροι* cum chlune eundem facit; alii & verius epitheton feri scribunt, quod cum aliis minimè aggregetur. Colore sunt ferè nigro, vel spadiceo nigricante. Plinius, pilum æreo similem agris dixit. Albos tamen se vidisse, scribit Pausanias. *Oculos* gerunt iracundis similes, & apertis palpebris patulos. *Dentes* habent magnos & recurvos, ad incidendum aptos, albos, hinc *ἀργυροδόντις* Homero, acutos valdè, hinc Sidonio *ficæ*, quod ficarum more res quas libet violent. In his hoc est mirabile, quod vivente bestia possunt idem quod ferrum; mortuæ vero detracti, vim incisionis amisisse credantur, ut liber de natura rerum prodit. Audio exeros aliquando ita excrecere, ut circulum ferè absolvant toti in se reflexi. In India cubitales dentium flexus gemini ex rostro. Cum ad terram canibus & hastis debellatus procubuit, dentem inflammato anhelitu ita ignescere ajunt, inquit Gyllius, ut si quis de cervice setam detractam, ad ejusdem etiamnum, spirantis dentem admoverit, candens in orbem contrahatur ac aduratur: ac si eo dente canes insectantes attigerit, statim ignita vestigia peli ipsorum imprimat. Hinc dentes aprorum *αἰθρας* cognominavit Oppianus. Os habent ad modum scuti, quod venabulis & macharæ opponunt. *Fel* nullum. *Sanguinem* qui fibris refertus non est. Nulli sunt in Creta, si Plinio credimus: nulli in Africa, si huic & aliis: idem de India Creteas prodit. At apud Theophrastum legimus, in Ægypto (in Nilo) insulas magnas coagmentari, fuesque permultos in eis nasci. In Macedonia mutos esse Ælianus prodidit. Hispani in quadam novi orbis parte invenerunt nostris minores, caudis brevissimis, adeo ut abscissas fuisse arbitrarentur; pedibus etiam dissimiles, posteriores quippe ajunt pedes in his apris uno digito non ungulato constare, carnibus multo quàm nostrorum tum suavioribus tum salubrioribus. Scilicet, palmeta ibi propè littus multa erant, inter quæ & palustres ulvas, magna aprorum multitudo libera vagabatur. Lycotas rusticus in Bucolicis Calphurnii, refert se vidisse. Romæ in spectaculus, niveos lepores, & non sine cornibus apros. *Cibus* apris non alius quàm cicurati porci, glandes, poma, hordeum, herbæ, radices, & alia.

Plutarch.
de causis
natur.
quæst. 12.

Descriptio.

Pausanias
in Arcadicis.

Oppian.
de venat.

Locus.

Theophr.
H. P. l. 4.
c. 13.

Ælian.
H. A. l.
17. c. 10.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 51.

Petrus
Martyr.
Decade
Oceani. l.
2.

Cibus.

alia. Lumbricos etiam rostro effossos comedit. Ficus aridas supra modum appetere, ex *Æliano* discimus, Minus tamen immoratur foetidis quàm domesticus. Inveniuntur aliquando inter filicum folia, quæ ipsi sibi collegerunt aut substraverunt. Genus verò quoddam farris, quo Germani circa *Alfatiam* vescuntur, acutis armatum aristis, non attingunt, propter aristarum acutiem, ut *Tragus* prodidit. De *Generatione* hoc habemus, in venerem dum inflamman-
 tur, cervicis fetis sic inhorrescere, ut cristæ galearum esse videantur. Spumas fundunt ab ore, magno dentium stridore concrepant, & effervescentem spiritum anhelant. Admissi mares, bilem deponunt; rejecti, vel vi subigunt, vel opprimunt. Principio hyemis coeunt, vere pariunt, petentes maximè invia, prærupta, angusta & opaca. Mas cum foeminis conversari dies triginta solet. Numerus partus, & tempus ferendi idem atque in urbanis suis. Semel anno gignunt, & apris maribus nonnisi anniculis generatio. *Vox* etiam similes, sed foemina vocalior est, mas rarò vocem emittit. Quantum ad reliqua, quæ ad hujus quadrupedis naturam spectant, solent in remotis & profundis præcipitum locorum recessibus versari. Auditum nos vincunt: gregatim incedunt, nec alios quàm de sua progenie secum vesci patiuntur, lachryman dulcem habent, spumant, dum exagitantur tenacem. Tam gravis iisdem sua urina est, ut nisi egesta, fugæ non sufficiat; ac velut devincti opprimantur. Exuri illà eos tradunt. Mitigari tardè concipiunt, nec nisi ab infantia educati. Ab aconito & fyan-
 chi radice occiduntur. Cum per imprudentiam hyoscyamum comederunt, statim attrahunt posteriora, ita demisse sese gerentes; hinc, contracti quamvis, ad aquas perveniunt, & collectis cancris vescuntur. Ederà in morbis sibi medentur. Ad quadrimum capiunt incrementa. Muscicà illecti capiuntur: ideò in leporario quodam *Varronis*, in *Thusculano*, ad buccinam inflatam, certo tempore conveniebant ad pabulum. Sapiunt vestigia palude confundere. Foeminæ, si multæ simul sunt, fugiunt, ubi vident venatorem, cum natis: sed ubi quis aliquem ex natis venatur, non amplius fugiunt, ne si una quidem sit, sed ruunt adversus capere molientem. Dentes acuunt ad luctam. Inter se concertantes, cum viderint lupos, quasi confederati, se juvant mutuò, & ad vocem clamantis quotquot audierint concurrunt. Cæterum, vivaria aprorum cæterorumque sylvestrium, primus togati generis invenit *Fulvius Hirpinus*, qui in *Tarquiniensi* feras pascere instituit: nec diu imitatores defuere, *L. Lucullus*, & *Q. Hortensius*. In *Cibis* adhibitos & adhuc adhiberi, nemini ignotum.

Primus Romanorum *P. Servilius Rullus*, pater ejus *Rulli*, qui consulatu *Ciceronis* legem agrariam promulgavit, solidum aprum epulis apposuit. *Apri* vero *milliarii* dicebantur mille librarum, quos solebant in coenis apponere Romani. De Condimentis consule *Apicium*. Caro ipsa, melior domesticæ suis carne, citò descendit, multum nutrit, & succum gignit crassum ac viscosum. *Heliogabalus* exhibuit sumina aprugna per dies decem, tricena quotidie, cum suis bulbis. Quo die *Lentulus* flamen *Martialis* inauguratus est, in coena fuerunt, lumbi aprugni, sumina, & syn-
 ciput aprugnum. Invenere & in *Medicina* locum. *Cerebrum* contra serpentes cum sanguine laudatur, verendorumque carbunculis succurrit. *Lardum* elixum atque circumligatum mirà celeritate solidat fracta. *Epinyctides* adipe cum rosaceo inunguntur. *Cinis maxillarum* ulcera sanat quæ serpunt. *Dentis* scobes pluritida solvunt. *Pulmo* cum melle commixtus, pedibus à calceamentis læsis, supponitur. *Iecur* lethargicos excitat; & auribus purulentis instillatum proficit: ex vino potum, citra salem, recensque alvum sistit. Calculi in eo inventi, & triti, calculos pellunt. *Fel* tepidum illitum strumas discutit, & coitum stimulat. *Ungularum* exustarum cinis, potioni inspersus, plurimum urinæ difficultates juvat. *Ungues* exusti & triti submejlis in potione profunt. *Fimus* aridus, in aqua aut vino potus, rejectiones sanguinis sistit, vetustum lateris dolorem mulcet, ad rupta & convulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo medetur. Recens & calidus præcipuum est contra fluxum narium remedium. Ex vino subactus, & emplastri more impositus, quicquid corpori inhæserit, celeriter extrahit. Tusus cribratusque, & cum melle deteriore subactus, articulis impositus medetur. *Urina* purulentis auribus infunditur. *Vesica* elixa & manducata submejlis prodest. Plura in *Gesnero* vide. Ad *Differentias* refero *Zainum*, de quo *Nierembergius* ita: Montanam mire ingenii feram vocant *Indi coya metl*, alii *quauhcoya metl*, alii *quauhtlo coyametl*, alii *quapicotl*, alii *fajassou*, alii *saynum*, sive *Zahinum*. Similis est nostrati apro, nisi quod minor sit & deformior, umbilico ejus existente supra dorsum & circa renes. Mirum aspectu: ibi humor aqueus receptus digitis expressus effluit; nec tamen inquit *Franciscus Hernandus*, verus est umbilicus, aut subest quidquam ab eo quod in aliis animalibus reperiri solet diversum, (quod eo dissecto cognovimus) aliudve quàm glandulosa quædam & mollis pinguedo. *Antonius Herrera* putat respirare per su-
 pinum

Plin. H. N. l. 8. c. 51.

Lamprid. in Heliogabalo.

Gesnerus p. 1047. de quadruped.

Differentie. Nieremb. Histor. Natur. Exotic l. 9. c. 27.

pinum hunc umbilicum. Fætidus est. Lærius omnino favet. Scribit aprum Americanum habere foramen in dorso, quemadmodum in capite suæ marini, quo spiritum emittit admittitque: addit frendere terribiliter, & macilentiorē esse nostratibus. Attentior est censura Francisci Hernandi de tumulto dorsi. Iracundi sunt. Venatores conscendunt arbores: accūrit grex zainorum, mordent & lacerant truncum, cum hominem non possint, quos ille supernè tutus venabulo cædit. Gregatim discurrent; eligunt ducem, & ut fertur, minorem aut viliorē omnium. Antonius Herrera scribit esse senem & flaccidum, neque nisi duce occiso societatem & cohortem dissolvere: prius enim occiderentur, quam regem defererent, auctor est Petrus Simon. Aliqui Bachiris hoc imputant. Mirum odium in tigridem. Dux Zainorum convocat quoscunque potest sui generis, usque ad trecentos aut plures, quemadmodum Imperator, conducit militem. His copiis invadit tigridem: quæ licet ferocissima præ omnibus Americanis feris, vincitur multitudine, non sine magnâ zainorum strage. Inventi innumeri occisi simul cum tigride, ut paucissimi possint epiniciū canere. De ingenio hujus feræ sic narrat *Franciscus Hernandus*. Ferus est ac truculento morfu, cum primum est captus. Sed cum cicuratur, placidus est domesticis, & habetur in deliciis. Caro est similis suillæ aprugnæve, sed durior atque infuavior. Setæ sunt asperæ, albo ac nigro promiscuè variatæ colore. Vescitur glandibus, radicibus & aliis montanis fructibus, nec non vermiculis, lumbricus, atque aliis hujusmodi animalibus quæ lacustribus, humidis & uliginosis locis nascuntur. Devastant etiam sacra, cum ab eis non arcentur. Gregatim ambulant; & redditi mites aluntur quibuscunque esculentis. *Digitum* pedum variant. Siquidam alii productiores sunt, alii breviores. Scribunt aliqui apros Indicos brevissimis esse caudis, ut abscissas esse putes. *Pedibus* etiam esse nostratibus dissimiles, & posteriores uno digito non ungulato constare. Carnes multò nostrorum carnibus saporosiores salubrioresque; sed saynis opus est præcidi umbilicem, alio qui uno die corrumpuntur. Idem est cum Tajacu Caaigora Marcgravii: Icon tamen variat, & descriptione plenior est. Ideò & hanc & illam addimus. Habuit eum & quidem familiarissimum Amplissimus de Laet, quem cum per semestre & amplius, humidis cibis aluisset, mortuus est ex ileo, ut videbatur. Valckenburgius umbilicum illum mammam esse putabat, quòd vasa mammaria haberet. Verum qui animal penitus norunt, catulos suos illâ parte alere negant.

TITULUS II.

De Bifulcis aquaticis.

CAPUT UNICUM.

De Hippopotamo.

AD Bifulca Hippopotamum retuli, Aristotelem secutus. Ad digitata tamen recentiores referunt, & fortè, ut ex icone & descriptione apparebit, melius. Dicitur verò Hippopotamus, id est, fluviatilis equus, non quòd equum similitudine referat, sed quòd magnus sit, ut *ἵππος* vim augendi significatum habeat. Fluvius ille Nilus est. Dicitur & *equus Niloticus*, *Bos marinus* teste Bellonio, *porcus marinus*, quòd parte anteriore bubulam figuram, reliquo corpore suillam repræsentet; *Elephus marinus*, tam ob magnitudinem, quàm ob dentium candorem & duritiem. Sed & *Elephantus Egypti*, *Rosmarus*, *Rohart*, *Gomarus*, in regionibus inprimis Prete Gani, si Alvaresio credendum. Circa *Descriptionem* dissentiunt à veteribus recentiores. *Ælianus* ad quinque cubitorum altitudinem excrecere, ungulas bubulas habere, tres utrinque dentes maxime omnium animalium circa os eminentes; auribus, cauda, voce, equum præ se ferre, reliquo corpore elephanto similem esse, scribit. Aristoteles, jubam equinam habere; ungulam bubulam, rostrum refimum, talum bifulcorum, dentes exertos, caudam apri, vocem equi, magnitudinem asini, internas partes interaneisequorum & asinorum non dissimiles, reliquit. Leoni Africano, formâ equum, magnitudinem asinum refert, depilis est, & cymbis insidiatur. Bellonius, qui parvum Byzantii vidit, capite eum vaccino, auribus urfinis, brevibus & subrotundis, oris rictu adeò vasto ut leoninum superaret, patulis naribus, labiis repandis, dentibus equinis obtusis, oculis & lingua prægrandibus collo nullo aut admodum brevi, caudâ porci, corpore obeso ad instar suis, pedibus tam brevibus, ut vix quatuor digitos à terra attolleretur, ungulis, ut in sue divisis, descripsit. Accuratissimè verò eum nobis exhibuit Fabricius Columna, ex cadavere sale asservato, & in Italiam Damiatâ, à Nicolao Zerenghi, Chirurgo Narnensi, allatam. Nullam habebat cum equo similitudinem, ad bovem potius, si magnitudinem attendas, & ursum, si crurum figuram, accedebat. A capite ad caudam pedes erat tredecem; corporis latitudo pedes quatuor cum dimidio; alitudo pedes tres cum dimidio; *venter* potius planus quàm carinosus; *crura* à terra ad ventrem pedes tres cum dimidio; ambitus crurum pedes tres. *Pes* latus pedem, *ungula* singulæ uncias tres. *Caput* vastum in comparatione ad totum animal, duos pedes cum dimidio latum, pedes tres longum, ambitu

Aldrov.
Digit. 1.
1. c. 12.Bellon.
de aqua-
til. l. 1.Descri-
ptio. *Æ-*
lian. H.
A. l. 11.
c. 44.Aristot.
H. A. l.
2. c. 7.Leò de
script.
Africæ.
l. 9.Columna
in l. ob-
serv. a-
quat. &
terrestr.
c. 15.

bitu pedes septem crassum. *Oris* rictus pedem unum, rostrum carnosum, & repandum; *Oculi* exigui, lati unciam, longi uncias duas; *aures* parvæ, breves, neque uncias tres excedentes; totum corpus obesum; *pes* latus in quatuor ungulas divisus; Ungulæ quales in bubus, & quidem quadrifidæ; *talus* callosus; *cauda* aprina, vel potius testudineæ aut ursinæ non dissimilis. *Cujus* admodum crassa, dura, colore pullo. *Nares* imaginem S. repræsentant, fissura longa unciarum duarum cum dimidio. *Rostrum* habet instar leonis vel felis, pilis ex poris quibusdam prodeuntibus asperum, nec in toto corpore alii conspiciuntur. *Dentes* singulariter idem Columna descripsit. Habebat, inquit, in inferiore maxilla sex, quorum bini exteriores, è regione, longi semipedem, lati, & trigoni uncias duas cum dimidio, per ambitum semipedem, aporum modo, parum retrorsum declives, non adunci, nec exerti, sed admodum conspicui, aperto ore. Intermedii verò parum à gingiva exerti, trigonâ acie, digitali longitudine, medium locum occupantes, veluti jacentes, crassi, orbiculati, elephantini, semipedem superant longitudine atque aciem in externis partibus planam. Maxillares vero habebat utrinque septem crassos, latos, breves admodum. In superna vero mandibula, quam Crocodili more mobilem habet, quâ mandit & terit, anteriores sex sunt, sex imis respondentes, acie contrario modo adaptata levissimâ & splendidâ, clausoque ore conjunguntur, & aptantur imis, veluti exillis recisi, ut planum plano insideat. Verum omnium acies pyramidalis, veluti obliquè recisi calami modo. Sed medii superiores non aciem inferiorum, & medium illorum, in quo retractio rotunditatis conspicitur, petunt. Molares totidem quot inferni, sed bini priores parvi, exigui, atque rotundi, & ab aliis distant, ut medium palatum, inter dentes anteriores, occupare videantur. Inter maxillares, dentes locus linguæ semipedalis remanebat, durities dentium silicea, adeo ut percussione cultelli costæ, cum circumstantium admiratione, ignis favillæ excitarentur. Qua propter verisimile foret, nocturno tempore, hoc animal; dentes atterendo, ignem ex ore ovomuisse, quam proprietatem prisca huic feræ attribuerunt. Propria ipsis patria Saitica Ægypti præfectura, si Plinio credimus. Unde fortè Herodotus in ea parte sacros scripsit. At Leo Africanus, & qui navigationes describere in Nigro quoque fluvio reperiri ait. Sed & in mari versari dictum, Plinio & illis, qui in Oceano regiones

Locus.
Herodot.
H. N. 1.
2. Leo
Afri. l. 9.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 11.

Petzoræ alluente, reperiri scripsere. Barbosa multos in Gofala observavit, à mari ad prata exire, denuoque reverti. Maturis segetibus & flamentibus spicis vesci, Ælianus prodidit. Cum ad confirmatam pervenit ætatem, periclitari incipit in patre suo vires. Si pater cedit, cum matre congreditur, ipsum verò dimittit: si pater resistit, interimitur, ut apud Ælianium legimus. In sicco parere & educare solet, si Odone credimus, eaque est fecunditate, ut singulis annis enitatur. Ad *Naturam* & *Mores* spectat, quòd ex Nilo in campos egressus, & segetibus satiatus, averso vestigio, ad flumen rursus properet, seu ut agricolas corpore adverso excipiat; seu ne venatores exitum deprehendere possint: quòd hominibus non minus quàm Crocodilus infensus sit: & quòd nimia corporis obesitate pressus, caudici arundinis tam diu se affricat, donec venam aperuerit, sanguine ad sufficientiam emissò, eandem cæno obturat. Columna tamen primum illud negat, & recto incedere tramite tradit. An hinniatur, in dubio est. Veteres affirmant, recentiores negant. In *Cibus* ab Æthiopibus usurpatur. Narrat enim Clusius, in Guinea circa promontorium Cabo Lopez Gonsalvez, Navarchum *vander Hagen* / cum sociis id observasse, visaque in oppido Ulibetto plurima hippopotamorum capita, ex quibus dentes mirandæ magnitudinis, comites ejus retulerint. Non est ergo mirum, à Firmio Seleucio, quod Capitolinus prodit, hippopotamum devoratum fuisse. Habere & in *Medicina* locum, à veteribus & recentioribus proditum est. Ægyptii, prodente Columna, ad hæmorrhoidas cœcas & apertas, dentem alligant, vel annulum ex eo fabricatum gestant. Nigritæ eodem à quodam morbo præservantur. Plinius eosdem dentes, in odontalgia sedanda insignem habere prærogativam scribit. Idem adipem febrientibus contra rigores commendat: corii cinis cum aquâ illitus ad panos dissolvendos. Pellis frontis inguinibus alligata, eodem auctore, venerem inhibet. Testiculos exiccatos contra morsum serpentum exhibet Dioscorides. Sed & ad alia partes ipsius adhibentur. Nam Pausanias refert, Dindymenæ matris faciem ex dentibus ipsius factam: sanguine cum aqua gummosa dissoluto pictores loco cinnabaris uti possunt, apud Plinium. Pinguedine delibuti impunè inter Crocodilos versari, apud Julium Capitolinum legimus. Pelle tecta, fulmine non tangi, prodidere quidam. Corii tantam crassitudinem Plinius facit, præsertim circa tergus, ut inde validæ hastæ torquentur.

Cibus.

Ælian.

H. A. l.

11. c. 43.

Generatio.

Plin. H.

A. l. 11.

c. 44.

Ælian. H.

A. l. c.

Mores.

Ælian.

H. A. l.

11. c. 43.

Usus.

Clusius

in Curis

posterio-

ribus:

Dioscor.

M. M. l.

2. c. 22.

HISTORIÆ NATURALIS

QUADRUPEDIBUS

D E

LIBER III.

De Quadrupedibus bifulcis.

TITULUS PRIMUS

De Digitatis viviparis Feris.

CAPUT. I.

De Leone.



ACTENUS de Bifulcis actum est, sequuntur τετραπύδα digitata, Græcis πολυχιδῆ & πολυχίλυα, quæ vel sunt ζώοντα, seu vivipara, vel ὀτόκα seu ovipara. Illa, iterum vel sunt Fera, que aut

sunt feris moribus imbuta, aut difficulter curantur, aut si aliquando mitiora redduntur, nunquam tamen ferociam penitus depouunt; vel *Semifera*, vel *Domestica*, quibus Appendicis loco *Dubia* addi possunt. Ex illis sunt *Leo*, *Pardus*, *Lynx*, *Tigris*, *Ursus*, & *Lupus*. *Leo*, Græcis λέων παρὰ τὸ λάω, video, quod perspicaci præ cæteris oculorum acie polleat, & διὲρ fera per antonomasiam dicitur. Catulos Æschylus ὀβρίκαλα, vulgus σκύμους ab obmurmurando Poëtæ λεοντίδες & λεοντίσκους, appellant. Plin. ursum Numidicum, dum scribit, Domitium Rhenobarbum Ædilem curulem, ursos Numidicos centum, & totidem Æthiopas venatores in circo dedisse, Lipsio appellare videtur. Sed perperam nisi fortè pro Ursos, Leones substituendum sit. Parum enim credibile est, si Romani pro leone dixissent ursum Numidicum, ignoraturum id fuisse Plinium: qui meminerat & apud Maronem Acestem vestitum induci --- pelle Libyftidos ursæ. Dio quoque seu Xiphilinus ab urfis feras Libycas distinguit; ut taceam, neminè veterum tam insolentis locutionis meminisse. Aristoteles eum capite mediocri, fronte quadrata in medio cava posuit, supercilio eminenti, & nasum versus cujusdā nubis instar porrecto, oculis charopis, non valdè volubilibus, neque valdè prominentibus. Recentiores medios inter cavos, & extantes oculos notavere, *nasum*, crassiorē potius quàm tenuiorem, superiorem maxillam inferiori æqualem, ritum instar ovis amplum, labia tenuia, ita ut partes superiores superjectæ sint inferioribū, *collum* rigens & magnum, mediocriter crassum, *pectus* robustum, metaphrenum latum, medium *ventrem* gracilem, *crura* valida &

nervosa, *pilos* flavos, neque rectos, neque valdè crispōs. *Pedes* anteriores quinis digitis, posteriores quaternis distinguuntur. Leænam à mare juba quā caret, & binæ in medio ventre mammæ distinguunt, ex quibus numerum catulorum arguere non licet. Lactis inde inopia, adsumpto in sui nutrimentum cibo, quem rarius assumit. *Interiora* si spectes, Musculos temporales. Galen. de Usu part. l. 9. cap. 19. fortissimos habet, ut mordendo valeat, *Linguam* asperitate imbricata horrentē; *Viscera*, canum interioribus penitus, Arist. A. l. 5. c. 80. similia, *lienem* nigrum quod observavit Galenus. *Cervicem* unico osse constare ab Aristotele & Cardano proditum, ex vertebra componi à Scaligero. *Ossa*, medulla carere apud Ælianum legimus, paucissimam habere, quod perpetuò resolvatur, Fallopio, qui ea se fregisse dicit, credendum. Michael Ephesius angustissimos habere meatus, ita ut iis penitus carere videantur, reliquit. In Europa inter Acheloum & Nessum fluvios in primis crescere, Aristoteles prodidit: nusquam in ea nasci, nisi id ex hominis industria fiat, certum. Natale ipsis, Mauritania, Parthia, Massylia, Marmarica, Caspia, Libya, Getulia solum. Habentur & in Syria nigri, si Plinio fides est. Nasci & in Tartaria Paulus Venetus passim prodidit. In Caragol rustici metu eorum, armati terræ cultui operam navant, ut Balbus in itinerario suo prodidit. In deserto Angad juxta Telesinum, teste Johanne Leone, non solum in armenta, sed & in homines indiscriminatim sævire solent, ab iisdem silvarum Fetz carbonarii sæpè numero devorantur. Taceo regnum Senegæ, montem juxta Adenam editissimum, terram sanctam, & alia loca. In Cuba degunt innoxii, si Martyri credimus. Aglam & regiones circumjacentes tam meticulosos alere, ut in proverbium abiverint, Ælianus author est. Temperamenti est calidissimi & siccissimi, quod ab acri cordis æstuatione promanat. Non omnes tales pariter esse, vel exinde colligas, quod qui montes incolunt, minus ferociæ habeant; & Gesnerus, partes in iis anteriores calidas esse, posteriores ad oppositam naturam degenerare, scribat. *Cibus* ipsis carnes bubulæ, & Ælian H. A. 2. l. c. 10. Camelinarum in primis, fame urgente humanæ & avicularum. Ideò multi in Africa crucifixi à Polybio Æmiliano Comite visi, ut reliqui hoc

Galen. de Anatom. adm. l. 6. c. 10. Scalig. Exer. 208. Ælian. H. A. l. 2. c. 2.

Locus.

Arist. H. A. l. 8. c. 28.

Leo Africæ l. 4.

Temperamentum.

Cibus.

Nomen.

Plin. H. N. l. 8. c. 36.

Lipsius E. lect. l. 2. c. 4.

Virgil. Æneid. 5.

Descriptio. Aristot. H. A. l. 6 c. 31.

hoc spectaculo, à cæde hominum deterrentur. Multa solida & fini ullo defectu una vice devorare, inde bidui vel tridui spacio, perfectè celebratam coctionem expectare, Aristoteles docuit. Cadavera an degustent, non constat inter Authores. Non attingere seu ob foetorem, seu ob superbiam quod Tzetæ placet, quidam volunt, vorare, ideò reliquias condere, & supra illas teterimum flatum exhalare, ne inventæ ab aliis feris vorentur, apud Ælianum legitur. Elephantorum quoque pullos aggredi, succurrentibus matribus fugere, Strabo prodidit. Catules ubere relicto, imbellium ferarum carnes depascitur, sed & palmulis victitat. *Potum* si spectes, parcus is secundum Aristotelem, & Ælianum, triduo non bibit, æstate inprimis, hyeme indulget. Aversæ *coeunt*, quod omnibus animantibus quæ retrò urinam mittunt commune. Tempus veneris continuum, sed ver, Ælian. H. A. l. 2. c. 2. inprimis, tunc cruentam inter se exercent pugnam, & octo aut duodecem unam leonam sequuntur. Elapso primo anni tempore, maribus ob nimium calorem coire non valentibus, leonæ cum pardis, unde Leopardi, pantheris, unde foetus non jubatus, Hyenis, unde Crocuta, miscntur. Est ipsis & cum cane commercium. Solæ inter quadrupeda aduncis unguibus prædita catulos videntes eniuntur. Unda animalis solaris nomine donatam Plutarchus opinatus est. Imperfecti & quidem post sex mensium spaciū, exeunt, non quòd unguibus uterum, Ælian. H. A. l. 2. c. 2. vellicent, sed quod ob numer. inopia alimenti, Aristot. de gener. Animal. l. 4. c. 6. laborent. Magnitudinem mustelorum non excedere apud Wottonum habemus, novissimo pariendi actu, uterum excernere, fabulosum est. De numero catulorum non convenit inter Authores. Non plures quam sex edere, aliquando unum Wottonus prodidit. In capta & interfecta octo inventos Philostratus. Ætate gravem præter omnium spem sex Florentiæ peperisse, Vilanus. Quod verò Phile quinquies eniti, quinos primum, quatuor deinde, ternos posthac, inde binos, quintum unicum scribit, id ex Aristotele, de leonibus Syriæ incolis accipiendum est. Huc *Sympathia* & *Antipathia* spectat, quæ leonibus cum plurimis rebus intercedit. Favet Delphino, seu quia ambo senectute & morbo gravati simia vorata sanitati propriæ consulunt, ut Æliano placet, seu aliam ob causam. Abhorret à muliebribus verendis. Horum, Leo Africæ l. 9. ostensu in Africa fugatur, à sue, Aristot. H. A. l. 9. c. 1. asperimis fetis horrente, lupo cervario, onagro, Tauro, simia, Plin. H. N. l. 8. c. 38. Leonophono, quo gustato, tanta illa vis & cæteris imperitans, illicò expirat. Animal à plurimis scriptoribus nominatur, à nullo de-

scribitur. Galli cantum extimescere tam certum olim Græcis, ut animam Cecropis, quam in leonem migrasse credebant, immolatis gallis gallinaceis evocare sibimet ipsis persuaderent: alii id de cristis rubentibus & igneis accipiunt: nos falsum esse ex Camerario didicimus, qui in aula Bavariæ Principis, unum ex leonibus miris saltibus in vicinam domui aream sese demisisse, & gallos cum gallinis devorasse prodidit. Idem à culicibus in Africa pellitur. Homines succo alii perlinitos, vel aqua, in qua illud maderat perfusos, non attingit. Scillæ &, Ælian. H. A. l. 1. c. 36. ilicis folia si incautè conculcaverit, illico à torpore corripitur. Ad rotarum strepites exhorrescit. Mappam albam refugit, &, Æl. H. A. l. 6. c. 22. l. 7. c. 6. ignem, quia igneæ naturæ est, abominatur. Creduntur *Vitæ* diuturnæ esse. Dentibus enim defectos captos fuisse affirmavere quidam, effractis alii. Cum procis foeta dimicat, oculorum aciem traditur defigere in terram, ne venabulla expavescat. *Dormiunt* & in aperto, & apertis oculis, quod oculum magnum incumbens oculo longe minor pellis obrepere non possit, caudam quoque sopore detenti motitant, ut se omnino non dormire ostendant. De *Voce* non convenit inter authores. Alii mugiere dicunt, quod apud Virgilium invenies; quod junioribus prædam nactis forte competit: alii fremere, quod Mancino & Volaterrano placet, ut de Seneca Tragædo taceam: nonnulli frendere, quod tum accidit, cum præ iracundia dentes concutit: plerique rugire affirmant. Quantum ad *Ingenium*, ducen-
 tos aliquando equites, Leo Africæ l. 9. Africanus adoritur, etiam lethali vulnere percussus, à catulorum tutela non recedit. Ægritudinem fastidii tantum, Plin. H. N. l. 8. c. 16. sentiunt, in qua medetur eis contumelia in rabiem agente, annexarum lascivia simiarum, solus, Ælian. H. A. l. 2. c. 17. venatum egreditur, foetorum oris patitur, quod à Plinio proditum est. Neminem, Plin. H. N. l. 8. c. 16. limis oculis intuetur. Generositas in periculis maximæ deprehenditur, non in illo tantummodo quod spernens tela diu se terrore solo tuetur, ac velut cogi testatur, cooriturque non tanquam periculo coactus, sed tanquam amentie iratus; illa nobilior animi significatio, quamlibet magna canum & venantium urgente vi, contemtim restitansque cedit in campis, & ubi spectari potest: idem ubi virgulta sylvasque penetravit, accerrimo cursu fertur, velut abscondente turpitudinem loco. Dum sequitur, insilit saltu, quo in fuga non utitur. Vulneratus observatione mira percussorem novit, & in quantalibet multitudine appetit. Eum verò qui telum quidem miserit, sed tamen non vulneraverit, correptum, raptatumque sternit nec vulnerat. Il-
 lud

Vita.

Somnus.

Vox.

Mores.

Plin. H. N. l. 8. c. 16.

Ælian.
H. A. l.
2. c. 5.

Martial.
Epigr. l.
9. c. 73.
Plin. H.
N. l. 8.
c. 16.

Gellius
Noct. At-
tic. l. 5.

lud adolescentis ex Jubæ exercitu exem-
plum apud Ælianum docuit. Læsus sagit-
tâ ab eunte, anno interposito vertente, re-
deuntem, in media turba dilaceravit. Hoc
illius apud Albertum, qui lancea confode-
re voluit, sed fallente ictu non fecit, col-
lapsi ad terram caput leo in galea compres-
sit, sed non vulneravit. Dum incedunt, un-
gues retrahunt veluti in vaginas, ne hebe-
tentur: nec rectum iter peragunt, sed obli-
quum; variis vestigiis impressis ut melius
lateant. *Circurari* posse non est quod dubi-
res. Onomarchus Catanæ Tyrannus con-
victores habuit. Jahanni II. Lusitaniæ Re-
gi, tanquam canis adsidebat: in templo
Adonidis regionis Elimeæ, adeo erant mi-
tes ut ingredientibus aduarentur. Bereni-
ces leo linguâ faciei adulabatur. Cujus Mar-
tialis mentionem facit, tam unamiter cum
ariete commorabatur, ut alter terroris, al-
ter imanitatis videretur oblitus. Jugo sub-
didit eos, primusque Romæ ad currum jun-
xit. M. Antonius, & quidem civili bello,
cum dimicatum esset in Pharsalicis campis,
non sine quodam ostento temporum, gene-
rosos spiritus jugum subire illo prodigio si-
gnificante: nam quod ita vectus est cum mi-
ma Cytheride, supra monstra etiam illarum
calamitatum fuit. Primus autem hominum
leonem manu tractare ausus, & ostendere
mansuesactum, Hanno, è clarissimis Poe-
norum traditur: damnatusque illo argu-
mento, quoniam nil non persuasurus vir tam
artificis ingenii videbatur; & male credi li-
bertatem ei, cui in tantum cessisset etiam
feritas. Sunt quoque & fortuita clementæ
iporum exempla. Mentor Syracusanus in
Syria leone obvio, simplicitur volutato, at-
tonitus pavore, cum refugienti undique fe-
ra opponeret sese, & vestigia lamberet adu-
lanti similis, animadvertit in pede ejus tumo-
rem vulnusque, & extracto furculo libera-
vit cruciatu. Pictura casum hunc testatur
Syraculis. Simili modo Elpis Samius natio-
ne in Africam delatus nave, juxta littus
conspecto leone hiato minaci, arborum fu-
gâ petit, Libero patre invocato: quoniam
tum præcipuus votorum locus est, cum spei
nullus est. Neque profugienti cum potuisset
fera insisterat: & procumbens ad arbo-
rem hiato quo terruerat, miserationem quæ-
rebat. Os morsu avidiore inhæserat denti-
bus, cruciabatque inedia, tum poenæ vim
immanis ejulatibus testantem, ac velut mu-
tis precibus orantem, contuitus, fidentior it
contra feram, multo diutius miraculo quam
metu cessatum est. Degressus tandem, evel-
lit præbenti, & quàm maxime opus esset ac-
commodanti. Traduntque, quandiu navis
ea littore steterit, retulisse gratiam venarus
aggerendo. Nihil de Androdo apud Gel-
lium dicam; nec de illo, qui Seneca spectan-
te, unum è bestiariis in Ampitheatro agni-

tum, ab aliarum ferarum impetu protexit.
Ideo *Plinius*. Leoni tantum ex feris clemen-
tia in supplices: prostratis parcat: & ubi sæ-
vit, in viros prius quàm in foeminas fremit,
in infantes non nisi magna fame. Credit Ly-
bia intellectum pervenire ad eos precum.
Captivam certè Getuliæ reducem audivi,
inquit idem, multorum in sylvis impetum à
se mitigatum alloquio, ausam dicere, se
foeminam, profugam, infirmam, supplicem
animalis omnium generosissimi, cæterisque
imperantis, indignam ejus gloria prædam.
Capere eos ardua quondam erat operis, fo-
veisque maximè. Principatu Claudii casus
rationem docuit, pudendam panè talis fe-
ræ nomine, pastoris Getuli sago contra in-
gruentis impetum objecto: quod spectacu-
lum in harenam protinus trallatum est, vix
credibili modo torpesciente tanta illa ferita-
te, quamvis levi injectu operta capite, ita
ut devinciatur non repugnans: videlicet,
omnis vis constat in oculis. Habuisse olim in-
mensis apud quosdam populos, Agriopha-
gos, inprimis, locum, Solinus author est,
ab esu tamen lienis in totum abstinuisse, Bru-
jerinus prodidit. In *Medicina* eximii est usus.
Dens caninus pueris collo alligatus in ortu
secundorum dentium à dolore dentitionis
eos præservat. *Cor* in pulverum redactum
Epilepticis & quartanariis prodest. *Adeps*
ductu Dioscoridis lotus, aurium dolores
immissus sistit, & membris à frigore adustis
feliciter illinitur. Eodem quidam in scir-
rhis & pernionibus utuntur. Ea peruncti ab
aliis feris tuti esse prædicantur, & si fas est
credere, gratiam apud principes inveniunt.
Caro juxta mentem Sexti ad pavores & ar-
cendâ phantasmata laudatur. *Sanguis* con-
tra carcinomata valet. *Ostium* pulvis febres
simplices cum aqua. Eupatorii expugnat.
Pellis, si ei insideatur, hæmorrhoidum do-
lores efficaciter lenit. Calcei ex eo gestati
podagricos demulcent. *Stercus* cum un-
guento rosaceo permixtum, mendas faciei
emendat. De Usu in deliciis, ludis, trium-
phis, & suppliciis non est quod multa dica-
mus. Heliogabalus exarmatos in deliciis ha-
bebat, & ita edoctos, ut ad secundas men-
sas accumberent. Augustus ita cicuratos, ut
cum leporibus innocuè colluderent. Idem
se Constantinopoli vidisse Bellonius reli-
puit. Simul plurimum pugnans Romæ prin-
ceps dedit Q. Scævola P. filius, in curuli
ædilitate. Centum autem jubatorum pri-
mus omnium L. Sylla, qui postea Dictator
fuit, in prætura. Post eum Pompejus M. in
circo DC. in iis jubatorum CCCXV. Cæsar
Dictator CCCC. Varias apud Authores for-
tiuntur *Differentias*. Leoni, inquit Plinius,
præcipua generositas tum cum colla armos-
que vestiunt jubæ. Id enim ætate contingit è
leone conceptis. Quos verò pardi generave-
re, semper insigni hoc carent. Sed & juba,
alii

Plin. H.
N. l. 8. c.
16.

Plin. l. c.

Usus.

Solin. in
Polyhist.
Brujerin.
de reci-
ber. l. 12.
c. 17.
Porta
Phytogn.
l. 3. c. 41.
Plin. H.
N. l. 29.
c. 8.

Scolia R.
Sexti
Philoso-
phi apud
Aldro-
vand.

Bellon.
observ. l.
1. cap. ult.
Plin. H.
N. l. 8. c.
16.

Differen-
tia.
Plin. H.
N. l. 8. c.
16.

aliis est brevior & minus crispa, crispa & prolixior aliis. *Ferociam* si attendas, sunt quidam timidi, alii ferocissimi: & Archoleontes, si *colorem*, sunt aurei, flavi, albi, & nigri, quales intima Africa & Abyssina gignit. Sunt in Lybia Discolores, qui ore sunt rubro, nigris floribus cyaneo colore distinctis ornantur, neque multum pilum gerunt. Vergunt & ad cinericium colorem in occidentali India. Ignavior apud Indos novi orbis, inquit Nierembergius, natio leonum. *Puma* Peruanj vacant. Minores quam Africani sunt, fugaces, aut innocentes, nisi invadantur; degeneres omnino animo; mole, jubâ colore fusci sunt potius, quam fulvi. Ad eos venandos conveniunt Indi. Lapidibus ac fustibus occidunt. Conscendunt ferè aliquando in arbores, eò usque hastis & sagittis illos infestant barbari. Vescuntur festive eorum carne (alba est & crassa) adipem medicamentis reservant, ossa saltationibus & choreis. Quidam Hispanus deturbavit arbore leonem ingentem, quatuor transverberatam sagittis. In ventre duo tigris catuli inventi, quos per adulterium sui generis conceperat. Paternæ maculæ indicia criminis fuerunt. Leones marinos comederunt Hollandi. Sunt præterea aliæ feræ leoni vicinæ. *Mitzli*, quemadmodum à Barbaris appellatur, leoni nostro non jubato aut idem est, aut congener, in infantia fuscus, & fulvus in juventâ, interdumque rubeus aut subalbidus, in majorem tamen corporis asurgens molem (quod ob regiones diversam naturam potest evenire) ac longè minus ferrox. Est quoque *Quamitzli* affinis leoni, unde nomen mutuatum, sed mitior, agiliorque: quo fit, ut quidam Hispanorum pantheram esse putaverint. Ad ejusdem pertinet differentias *Macamitzli*, qui à cervo & leone sumpsit nomen, quos quibusdam corporis partibus imitatur: nec non & *cuilamitzli*, à leone & lupo indigenâ nomen clatione mutuata. Hac bestia est leone crassior, mitior tamen minorque. Vivit cervorum, ovium & crotalium venatione, interimit etiam satur quæcunque offenderit animalia. Cum famem semel explevit, binos, ternosque dies dormit, abstinens à prædâ, donec rursus esuriat. Est & *Tlalmitzli* fele minor sed facie leoninâ. Mirabilis est in parvo corpusculo animalis vultus & ferocitas. *Cacamitzli* vocatur aliud animal, quod ad leonum parvorum feliumve genus pertineat, & in juncetis versari soleat. Quadrupes est, quaternas spithamas longus, sed corpore non admodum amplo, fulvo pilo, & aliquantisper prolixo, auriculus brevib. ac pænè nullis, olorino capite, caudâ prolixâ hispidioreque. Adeo est ferrox, ut cervos plerumque aggrediatur, etiam accidat. Unde fortassis ei nomen, nisi à fele potius profectum sit. *Mixtli* enim apud Mexicanos interdum ælurum, interdum significat leonem. Vivit apud Panucenses. Quid

si quædam harum specierum ad Cercopithecus reducantur. Vide Caput de iis.

C A P U T II.

De Pardo.

Fera, quam descripturi sumus Pardus, seu ab *ἄρδω* irrigo, quod ejus pellis nigris maculis quasi irrigata sit: seu ab *ἄρδω* inquinò, quod iis quasi inquinata videatur, dicitur. Vocatur & Leopardus, cujus vocis nemo ante Julium Capitolinum & Ælium Spartianum meminit: & Pardalis, quamvis nonnulli marem Pordalim, Pardalim fœminam vocitent, alii illud comune, hoc Atticum vocabulum esse putent; alii Pardi nomine marem indigent. Appellatur denique & Panthera, quod vocabulum distinguendum est à Panthere lupi maculosi specie, seu quod omne ferarum genus in venatione capiat; sed quod omnifaria feritate sit prædita, nec crudelitatis unquam etiam mansuefacta obliviscatur, seu quod omnium ferarum coloribus ornata spectetur; & *ἄρδω* quod sit variegata, & varia. *Facies* ipsi est parva; *os* magnum; *oculi* parvi albicantes & vagi, *frons* longa; *aures* rotundæ, magis quam planæ; *collum* valdè longum & tenue; *pectus* parvis costis præditum; *dorsum* longum; *clunes* carnosæ & fœmora. Partes circa ilia & ventrem habet magis planas, id est, nec protuberantes nec cavas; *colorem* varium; corpus totum inarticulatum & asymmetrum. Wottonus quatuor mammas in medio ventre habere, quinque digitos in pedibus anterioribus, quatuor in posterioribus Gylius. Addit ille, *oculos* in umbra longius quàm aliorum hujus generis animalium refulgere, hebetari in sole. Pellis aureo in fusco, & nigro in candido conspicitur, ut Oppianus, descripsit. Ideò Solinus narrabat, in Hircania numerosas esse pantheras, minutis orbiculis superpietas, ita ut oculatis ex fulvo circulis, vel cœruleo, vel albo, tergi suppellex distinguatur. Plinius, in candido breves macularum oculos appellavit. An similem Lunæ in orbem crescentem & pari modo cornua curvantem maculam, in armo habeat, quod Plinius affirmat, difficile est dictu. Quantū ad *internas partes*, habet *linguam* imbricatam, *dentes* acutissimos *ungues* acutos, *cor* in comparatione ad animalia ejusdem magnitudinis magnum; *pinguedinem* paucam, quod ea à nimio calore absumatur, *ossa* denique densiora. In Europa nulli habetur. In Africa haud pauci, inopiâ aquarum ad paucos amnes congregantibus se feris. Ideò multiformes ibi animalium partus: variè fœminis cujusque generis mares, aut vi aut voluptate miscente. Unde etiam vulgare Græciæ dictum. Semper aliquid novi Africam afferre. In Asia etiam degunt. Nam & Pamphylia illis abundat, ut Philostratus prodidit, & provincia Comeri, & in regno Bengalæ, ut Ferdinandus Lopezius reliquit. In Caucaso monte, odorato

Nomen.

Descriptio.

Wotton. de Differ. Animal. l. 5. c. 82. Ælian. H. A. l. 2. c. 20.

Plin. H. N. l. 8. c. 17.

Plin. H. N. l. 8. c. 17. Plin. H. N. l. 8. c. 37.

Locus.

Arist. A. l. 8. c. 26. Lopez. Navig. l. 4. c. 27.

Cibus.
Leo A-
fricæ l. 9.

Ælian.
H.A. l. 2.
c. 23.

Generatio.

Isidor. O-
rig. l. 12.
c. 2.
*Sympathia
& Anti-
pathia.*

Plin. H.
N. l. 29.
c. 4.

Plin. H.
N. l. 28.
c. 8. Por-
ta Magia
Natur.
l. 1. c. 14.

Philostr.
Apollon.
vitæ l. 2.
c. 2.

Vox.
Wotton.
de differ.
animal. l.
5. c. 82.

Plin. H.
N. l. 8. c.
15.

Aristot.
probl. 1.
13. qu. 4.

Theophr.
de causis
plant. l. 6.
c. 5. & 26.

Odor.
Mores.
Plin. H.
N. l. 8. c.
27.

Gesner.
in Hist.
Quadrup.

multos vagari, quod odoriferis herbis delectentur quidam venditant. In monte Hermon, qui ab Amorrhæis Sanir appellatur, haud paucos, ex Canticis Salomonis colligi potest. Vescitur Pardus carnibus, canum imprimis, & agnorum si fames urget, nec à simiarum abhorret, quas simulata morte decipit, si Æliano credimus, odore ille etas sponte accedere Plutarchus prodidit. Homines invadere author quidam historiarum Indiarum Orientalis reliquit, quem pantheram cum tigride confundere Ambrosinus arbitratur. *Congreditur* sæpe cum leone, ut superius diximus; aliquando cum cane, nonnunquam cum lupo, plures uno partu producere catulos, mammarum multitudo argumento est. tempus partus eisdem antevertere, & præimpotentia uterum matris lacerare, Isidori fabula. De *Sympathia & Antipathia* hoc habet, ita infensam secundum quosdam homines, ut vel in charta expressum laceret; secundum alios, ita hominis cranio, ut eo conspecto fugiat. Secundum nonnullos faciem duntaxat acri odio infestat; quod exemplo Regis Galliarum bestiarum, qui ad venationem emissam, nonnisi averfus reducere potuit, Gesnerus confirmat. Par cum gallo serpentibus & allio dissidium. Ideo jure galli perunctos à pantheris non attingi Plinius prodidit, pantherina pelle indutum angues non infestare, alii, parietes litu alii infestos, pantheras non attingere Cælius. Cum hyæna tam malè ipsi convenit, si Plinio credimus, ut si utriusque pelles è regione suspendantur, pantheræ depilentur. In Armenia per montana vagantes, ad thoracis lachrymas ferri, quoties ab ea parte ubi arbores gummi stillant odorem ventus pertulerit, fide Philostrati habemus. *Vox* pantheræ rugitus est, quod Græcis *ῥοῦχάδου*. Spartianus rictare dixit. Condito mucrone unguium in vaginis incedit, averlisque falcibus currit, nec nisi appetendo protendit, quod & de leone superius diximus. Odore quo cæteris quadrupedibus prævalet, (selem zibetti, & capreolum moschi excipe) cunctas sollicitat, seu semper, seu destituta per senium viribus. Eo invitata reliqua animalia, postquam accessere, præda fiunt. Nec est quod odore invitari cum Alberto dubites: nam & Cattaria sua Catti delectantur, & canes sæpe à persequendâ fera odoribus averti videmus. Quod aliquo affectu correptæ, (solent autem rabie agitari) aut à pardaliance herba læsæ, ad sanguinem capræ sylvestris, vel stercus humanum confugiunt, quod catulos semper præcedunt, & ad mortem usque tuentur; quod fœminæ post partum cryptæ præsident, mares de victu prospiciunt; quod cicurati nunquam ferè feritatem deponunt; *natura & ingenio* debetur. Miserandum illud quod à Gesnero refertur, post mortem Francisci Galliar. Regis Leopoldos marem & fœ-

minam caveis elapso, plurimos circa Aureliam laniasse, & inventa mulierum cadavera quibus mammillas tantum devorassent. Sed memorandum quod de Panthera tradit Demetrius Physicus, jacentem media via hominis desiderio, repentè apparuisse patri cuiusdam Philini, affectatoris sapientiæ: illum pavore cœpisse regredi, feram verò circumvolutari non dubiè blandientem, seseque conflictantem mœrore, qui etiam in panthera intelligi posset. Foeta erat catulis in foveam delapsis. Primum ergo miserationis erat non expavescere, proximum ei curam intendere: sequutusque, quâ trahebat vestem unguium levi injectu, ut causam doloris intellexit, simulque salutis suæ mercedem; catulos exemit: eaque cum iis prosequente; usque extra solitudines deductus; læta atque gestiente: ut faciliè appareret, gratiam referre, & nihil invicem imputare: quod etiam in homine rarum est. Quæ de hædo apud Ælian. habentur, quem post mortem objectum attingere tanquam contubernalem recusabat, ex eodem petantur. Locum in cibis apud agrestivoros, & qui inter caucasm & flumen Cophenâ, ut Philostratus prodidit, habuere. Majoris speciei etiam in India adhuc sunt edules, bis olim elixabantur, facilius à stomacho concoquendæ. Habet & in *Medicina* aliquem. Nam cerebrum cum succo crucæ genitalibus illitum, sopitam venærem excitat. Testiculus dexter in provocandis mensibus remedium est singulare, quod Cardanus prodidit. Sanguis varicibus benè applicatur. Pinguedo inter præstantissima Cosmetica censetur, ut de aliis taceam. Pellis vetustissimis Græcorum pro indumento erat: hodiè Mauri iisdem se amictiunt; & Æthiopes hisce cooperti præliantur. Olim ipsæ bestię Circensium gratia Romam importabantur. Primus Scaurus edilitate sua varias, centum quinquaginta universas misit: dein Pompejus M. quadring. decem, D. Augustus quadringentas viginti. De generibus nihil ferè occurrit. Quidam tres Pardos. differentias constituunt, Pantheram nempe, Pardum, Leopardum: alii quatuor, Pantheram, Pardum, Leopardum non jubatum, qui ex Pardo & læna nascitur, & maculosum Leopardum, qui ex Pantheræ & Leonis coitu prodiit. Apud Plinium ista leguntur. Nunc Varias & Pardos, qui mares sunt, appellant in eo omni genere, creberrimo in Africa Syriaque. Quidam ab iis pantheras candore solo discernunt: nec adhuc aliam differentiam inveni. Senatusconsultum fuit vetus, ne liceret Africanas in Italiam advehere. Contra hoc tulit ad populum Cn. Aufidius Tribunus plebis, permisitque Circensium gratia importare. Huc forte pertinet animal, quod *Dasyipoden pinuum*, vocant Hispani, *Theotochtli* Indi. Vertagi est magnitudine, tereti, humilli, & crasso corpore, auriculis parvis, facie leo-

Plin. H.
N. l. 8. c.
17.

Ælian.
H. A. l.
2. c. 24.
Ufus.

Plin. H.
N. l. 6. c.
30.

Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.
c. 1. & 2.

Porta
Phytogn.
3. c. 46.
Alex. ab
Alex. l. 5.
geniald.

Plin. H.
N. l. 8. c.
17.

Plin. H.
N. l. 8. c.
17.

Nie-
remb. H.
E. l. 9. c.
1.

leoninâ five felinâ, vividis oculis & rubrâ iride, crassîs cruribus, aduncis unguibus, fusco circa dorsum pilo, circa ventrem candido, reliquum corpus cinereo, nigris ubique conspersum maculis; rostro ac caudâ brevibus, asperâ linguâ, ululatu exili, & incredibili pernecitate. Vivit Tetrococamis montib. venatur cervos, & alia ejusdem molis animalia, interdum etiam homines. Linguae ejus tanta inest vis veneni, ut si prædæ oculos vel alambuerit vel attigerit, eam confestim excæcet, imo interimat. Occisorum cadavera herbis, fœno, cespitibus tegit; deinde conscendens propinquas arbores, ululat. Tunc feræ circumjacentes arcano naturæ documento consciae invitationis, ad epulum ocyus advolant, prædâ ex signo inventâ fatiantur: postremus ipse ocotochtus descendit, ut innocuè pascantur convivæ: nam si ille prior vesceretur, corruptis veneno suo reliquiis, ceteræ perirent feræ, quotquot deinde gustarent. Tantâ urbanitate charitati favit, tam comi providentia salutis alienæ. Scilicet nemo est qui prodesse nequeat, si velit. Non ita viribus & opibus beneficentia quam voluntate & studio constat. Plurimi opulenti inutiles sunt, utinam non etiam noxii; at nemo benevolus non beneficus.

C A P U T III.

De Lynce.

Nomen.

Feram, quæ Græcis λυγξ dicitur, Latini non Lynceum ut Cardanus voluit, à Scaligero ideò reprehensus, sed Lyncem ἀπὸ τῆς λύκους, à luce, quod omnium animantium acutissimè videat, vocant. Appellatur & *Lupus cervarius*, non quòd lupo sit similis, sed quòd pari cum eodem aviditate feratur, & in cervos hostiliter eat. Thoën non esse in sequentibus videbimus. Chaos an sit quem Galli Raphium dicunt, Pompeii M. ludi ostendere, quemque facie lupi & maculis pardorum Plinius facit, in medio relinquerem, nisi alibi quoque in luporum genere cervarium reponeret, qualem ex Gallia in arena Pompeii M. spectatum diximus. *Capite* est parvo, oculis, fulgentibus, facie alacri, *Mammæ* habet in pectore. Maculæ magis mari distinctæ & orbiculares. Pellem ita descripsit Gesnerus. *Pellis* extensa lyncis à summo naso ad caudam usque, est longitudinis trium pedum, & unciar. quatuor, *cauda* longitudinem unciar. septem non excedit, latitudo circa collum (non ambitus dicimus, sed dorso tantum) est dimidiati pedis, & in imo dorso unciar. quindecim, crura anteriora longitudinem unciar. quatuordecim, & posteriora duodecim æquant. *Pilus* undique mollissimus, & densâ lanugine confertus, extremæ pilorum dorso partes albicant, & venter medius est candidus, in quo puncta quædam passim nigricant, crebra verò sunt juxta imum ventrem ad latera, *auriculæ* parvæ sunt, quasi triangu-

lum referentes, ambitu nigro, & supra eas villus niger, cum paucis pilis albis eminet; *barba* ad instar felium ex setis albis constat. *Pedes* admodum villosi sunt, & anteriores quinque digitis, posteriores verò quatuor tantum integrantur, & tantum cauda in extremitate nigricans per totum æqualis crassitudinis conspicitur. Musculorum tempora habet debilia. *Cranium* tribus futuris insignitur. Sed & viginti *dentibus* armatur, quorum incisores sunt duodecim (verba sunt Ambrosini) sed primus & sextus tam inferioris quàm superiores mandibulæ, quatuor mediis paulò minores sunt, quales in mustellis observantur. Canini quatuor cæteris longiores sequuntur. Molares sunt decem, quatuor superiorem maxillam utrinque muniunt, primi propè caninos trigonæ sunt figuræ duplici quadam appendice insigniti, ultimus in utraque superiori parte bifidus est utrisque, & altero valdè latior. Inferior maxilla sex molaribus decoratur, primus propè caninos, trigonam refert figuram, secundus floris lilii rudimentum repræsentat, tertius utroque latior & major est, fissus in medio, summitatibus acutis. Maxilla inferior illi est parva, quòd prona cibum non sumat. Pes acutissimis, crystallinis, tunica atque membrana inclusis armatur unguiculis, qui figuram, unguium aquilæ & vulturis æmulantur, pars inferior callosa est. Lynces in Orientali plaga vagari Vitriacus scribit, inde in Europam delatos Ovidius, reperiri & in Americæ montibus Thevetus author est. Elegantioribus nigri per dorsum maculis insigniti in Lithuania, Polonia, Moscovia, & Suecia circa Helsingiam, ubi lynx *Kattluchs* nominatur, capiuntur: inventos & in Ducatu Wirtembergico, in rusticumque prætereuntem aliquando insiliisse, & ab eodem securi prostratum, Gesn. author est. *Cibus* lyncib. caro animalium, catorum sylvestrium imprimis, quorum caro suavior, si Olao M. credimus. Habent & cerebella quadrupedum in deliciis, hinc Gesn. se à quodam intellexisse scribit, lynces in arboribus aliquando latitare, & in majores quadrupes prætereuntes insilire, & unguibus cervici infixis non dimittere, donec animalis prostrati laniato capite, cerebrum devoraverint, sunt qui affirmant, corpore intacto sanguinem tantum fugere. Scaliger pauciora in Scandinavia animalia reperiri scribit, quòd lyncib. in alimentum cedant. More canum aversi congregiuntur, ut canes implentur, & ritu leporum superfoetant. Catulum ipsis adscribit Isidorus. duos, tres, aut quatuor Odonus. Clarissimè omnium quadrupedum cernunt, ideò quidam corpora solida visu penetrare fabulati sunt. Velocis sunt cursus, adeò, ut eum saltu præcipitent. De urina ita Plinius. Lyncū humor ita redditus, ubi gignuntur, glaciatur arescitve in gemmas carbunculis similes, & igneo colore fulgentes, lyn-

Ambrosi.
de Digi-
tat. l. 3.
c. 3.Galen. de
usu part.
l. 11. c. 2.

Locus.

Ovid.
Metam.
l. 15.Gesner.
in Hist.
Quadrup.

Cibus.

Gesn. l. c.

Genera-
tio.Scaliger.
Ex 210.
Aristot.
H.A. l. 5.
cap. 1.
Isidor.
Orig. l.
12. c. 2.
Plin. H.
N. l. 28.
c. 8.
Visus.Plin. H.
N. l. 8.
c. 19.Descri-
ptio.
Scaliger.
Ex. 210.

curium vocatas, atque ob id succino à ple-
risque ita generari prodito. Novere hoc
sciuntque lynces, & invidentes urinam ter-
ra operiunt, eoque celerius solidatur illa.
Hoc postremum apud Ælium & Isido-
rum invenies, prius Dioscorides vanum ef-
se, quod lyncurium sit succinum pterigo-
phoron, & pennas ad se alliciat, fatetur, &
Brafavolus inane esse experiētiā ipsā com-
perit. Tanta quoque oblivione, si prædam
ferens retrospexerit, occupari quidam af-
firmare audent, ut prædæ ipsius oblita a-
liam quærat. ego si id verum est, nimis avi-
ditati illud adscripserim. Æstate depilari,
hyeme valdè hirsutum reddi, Odonus tra-
didit, quod villosis animantibus commu-
ne. An viscera virulenta & spumæ rabido-
rum canum comparandi habeat, quod apud
Lucanum legimus, in medio relinquo. Haud
contemnendas habet in medicando vires.
Evonymus saxifrages herbas cum sanguine
ad minuendos calculos miscet; Wekerus ex
pinguedine ungentum ad eosdem pellendos
componit. Crollius sal ex lapide & oculis
canceri conficit. Unguis qui est in dextro
pede pro pollice, contra convulsiones ar-
gento inclusus & appensus valet. Eos-
dem omnes cum corio exuri efficacissimè in
Carpatho insula tradunt. Hoc cinere po-
tu proluvia virorum, ejusdemque aspersu
fœminarum libidines inhiberi, item pruri-
tus corporum, urinâ, stillicidia vesicæ. Ea-
dem & jugulorum dolori monstratur in re-
medio. Pellis Bononiæ centum viginti li-
bris venditur. Oppianus à magnitudine &
parvitate eas distinguit, sibi undiquaque si-
miles. In Italia duplex pellis ostenditur.
Ampla, ad albedinem magis tendens, quæ
lupi Cervarii esse creditur, & Ruffa, paulò
minor, quam Cati pardi autumant.

CAPUT IV.

De Tigride.

NOmen huic belluæ à velocitate datum
à Medis, qui tigrim sagittam vocant,
putatur. Genere masculino Varro extulit, fe-
minino Plinius, invenies & Tigrides in plu-
rali apud Philomelæ authorem. Ad magni-
tudinem canis leporarii & ultra excrefcere,
quidam putant, ad equi Nearchus. Vifa pel-
lis, cujus longitudo quinque pedum mensu-
ram superabat. Oculos habet splendore igneo
micantes, collum breve, quale illis quæ pa-
scendi gratiâ cervicem in terram non deji-
ciunt, ungues aduncos, dentes acutos, pedes
multifidos. Magna ipsorum in Oriente & ver-
sus Austrum, in India nempe, intra Gangem
& Hyphasin fluvios, in monte Caucaſo, apud
Besingos Peninuleis vicinos, copia, ut ma-
lè, in Hyrcania duntaxat haberi, Poætæ pro-
diderint. Inveniuntur & in Java, ubi pro-
pter ipsorum metum minus gummi benjuini

colligitur, Bengala, & montibus Peruanis.
In Taprobana diuturna lucis usura frui,
nonnullis proditum. Omne animantium ge-
nus devorant. Elephantēs sæpè superant, mu-
los pede apprehensos trahunt, oves, boves,
canes, &c. laniant, nec ab hominibus tempe-
rant: hœdorum tamen præcipuè carnibus
delectantur: tanta verò aviditate feruntur,
ut viso animantis unius sanguine, per totum
cupiant ire pecus, ut apud Statium habe-
tur. Omne genus fœmininum esse, quod
nulli mares capiantur, Tzetis memoriæ
lapsi cum aliis opinio. ideo ex vento concipi-
pere prodiderunt. Fabulæ à velocitate ani-
malis apud veteres decantata origo, aver-
sos congregi, & multos uno partu catulos
edere, certum, nec inter se duntaxat miscen-
tur, sed & in canes exardescunt. Modum
porcreandi apud Aristotelem habes. Alligan-
tur, inquit, canes locis desertis, per quæ ti-
gres versantur, & nisi tigris in luxuriam sol-
vatur, lacerantur, sed cum desiderio vene-
ris premitur, mitescit, quod Plinius, ut
apud Ælium est, ita protulit. E tigribus
eos (canes) Indi volunt concipi: & ob id in
sylvis coitus tempore alligant fœminas. Pri-
mo & secundo fœtu nimis feroces putant
gigni: tertio demum educant. In India Oc-
cidentalī nullam Hispanis vim facere, in-
festare Indos, in provincia Bambæ albos ho-
mines non attingere, nigros adoriri, imò
homine albo & nigro simul dormientibus al-
bo intacto, nigrum corripere, Linschotta-
nus prodidit, an ad Sympathiam referre de-
beat, dubito: sed quod Elephantō viso ve-
hementer excandescant, quod bubalorum
fimo pellantur, quod denique ad sonum
tympani ferè insaniant, & seipsos faucient;
inter antipathiæ exempla refero. Vox ipsius
propriè per rancatum exprimitur. Mutare
& frendere, ira correptum scilicet, Oppia-
nus dixit. Velocitati tremendæ & maximæ
dum capitur esse, constanter à veteribus
creditum. Totus n. fœtus, inquit Plinius, qui
semper numerosus est, ab insidiante rapitur
equo quàm maximè pernici, atque in recen-
tem subinde transfertur. At ubi vacuum cu-
bile reperit fœta (maribus n. non est cura so-
bolis) fertur præceps odore vestigans. Rap-
tor appropinquante fremitu, abjicit unum è
catulis. Tollit illa morsu, & pondere etiam o-
cyor acta remeat, iterumque consequitur, ac
subinde, donec in navem regresso inanis feri-
tas sævit in littore. Et hæc veterum senten-
tia. Recentiores & ex his Bontius, inter er-
rores ponunt, quæ de velocitate dicuntur.
Quia hæc fera tardigrada est, ac hominem,
(multò minus aliam feram) vix cursu asse-
queretur, hinc est, quod apri, tauri sylve-
stres, cervi, sagacius hoc animal odorantes,
ejus ungues cursu facilè eludant: ideoque in
carrectis, ac inter virgulta latens circa flu-
mina, quo prædiæ feræ ad potum, ve-
niunt,

Cibus.

Stat. l. 8.

Tzetes
Chil. 12.
c. 339.
Genera-
tio.Ælian.
H. N. l.
8. c. 1.Aristot.
H. A. l. 8.
c. 74.Plin. H.
N. l. 8. c.
40.Sympathia
& Anti-
pathia.
Balb. in
Hodepor.
c. 34.
Pierius l.
2. Hiero-
glyph.
Vox.
Oppian.
Cyneg.
Cursus.
Plin. H.
N. l. 8.
c. 18.Bontius
de Med.
Ind. p.
13.

niunt, saltu obliquo in aliquam earum fertur, non secus ac feles in mures ac glires impetum faciunt: sic etiam ex insidiis hominem aggreditur, ac si, (quod sæpe fit) nimia cupidine prædæ aberraverit in saltando, lentè ac rugiens recedit: si quoque ab homine detectam se sentiat, abibit, &c. hæc Bontius, quo mortuo, multa quoque Exotica de plantis & animalibus interiisse doleo. De cætero, sobolis est amantissimi hæc fera, ideo viso homine protinus catulos transfert, ablatis, in obvium quodcumque crudeliter sævit, & rabie correpta, perit. Etsi autem idomitæ ferè sit crudelitatis, indulget tamen aliquando patientiam flagello; & Ovidius, obsequium Tigres domare dixit, & apud Senecam, osculatur Tigrim suus custos. Nec desunt mansuefactorum exempla. D. Augustus Q. Tuberone, Fabio Max. Coss. I V. Nonas Majas, theatri Marcelli dedicatione, tigrin primus omnium Romæ ostendit in cavea mansuefactum: Divus verò Claudius simul quatuor. Sub Gordiano decem Romæ visæ, in triumpho Aureliani quatuor. Heliogabalus tigrides currui junxit. Nunquam tamen feritatem exuunt, aliquando submittunt, sed cum minimè expectaverimus, torvitas mitigata exasperatur. Id Abdias Babylonius prodidit; nec ignotum, dum per urbem ad spectaculum ducuntur, campanulis cingi, ut spectatores ab improvise impetu sibi caveant. Sæpè nec catenis benè vinciuntur. Succo Mandragoræ vel opio in stuporem conjiciantur necesse est, ne per urbem deductæ, lædant. Posterioribus hujus feræ partibus in cibus Indos usos, prioribus tanquam Phœbo sacratis, quas versus orientem solem attollere, ut ajunt solent, abstinuisse, Philostratus author est. Tota carne Congitanos vesci, ab alis seu mustacibus quod eorum esu morte furiosâ corripiantur, ideò edictis Principum cautum est, ne quis pellem illis carentem venum deferat, abstinere, apud Linschottanum legimus. Ledesma Hispanus bubula carne nihilo deteriore invenit. Ungues incolæ Cerebari in corollis texunt, his redimiti, animosiores se existimant. De *Generibus* Tigridum, nihil ferè apud veteres Authores occurrit. Equidem refert ex Ctesia Pausanias, esse apud Indos Manticora dictum animal, cui triplex dentium sit in utraque maxilla ordo, missiles in cauda aculei, idque Tigrim esse quidam opinantur. Strabo quoque ex Megasthene reliquit, Tigrides apud Prasios dupla fere ad Leonem magnitudine esse; quis tamen quæso id de Tigride sumendum probaverit. Apud recentiores tamen aliquot illarum *Differentiæ* occurrunt, quoad molem, furorem, & speciem. Vulgaris, inquit Nieremberg. nostris est major: huic alia similis, quæ, quia minor, ab Indis *tlaco ocelotl*, id est, parva tigris nuncu-

patur, maculis nigris & fuscis conscripta, non pallidis & candentibus ut aliis communes sunt. Peruani, ut Garcilassus putat, tigridem vocant Uturuncu: nam, quod Joseph Acosta dixit, ursos dici aboronocos, corruptâ nonnihil ab Hispanis voce, non ita exploratum censet; veumari n. ursus dicitur. Ferociores sunt leonibus: avide Indos quarunt, etiam in domibus & casis; & nisi constanter fores sint clausæ, clanculum ingrediuntur, & correptum aliquem barbarum mordicus deferunt, non secus ac felis murem: nec adversus illas arbores asyla, quas ascendunt ut illinc dejiciant fugientem & lacerent. In expeditione Fedremani quædam tigris cohortem militum aggressa, in medio omnium dilaceravit Hispanum unum, tres Idos, tutaque & impunis evasit. Nihil ominis tanta feritas elumbatur: si vel baculo circa renes cædatur, languet & vincitur; non alia via patet victoriæ. Nulla alia fera magis timetur Indis Occidentibus imo in veneratione est. Dæmon illis sæpiissimè specie tigridis loquebatur. Ungues venenati creduntur, nunquam reparatur plaga ex illis. Jam post introductum Evangelium reverentiam imo timorem hujus feræ amisit Barbaries. Capitur laqueis, alicubi muscipulis. In Bengala ferocissima invenitur, & contumacis odii: usque ad triginta milliaria insequitur per littora navim quâ aufugit læsor. Obviis præterea quibuscunque hominibus & feris atrox. Prævenit natura tantam pestem. Comitatur tigrim aliud animalculum, quod assiduo latratu illam indicat, quo audito feræ aliæ recedunt, aut conduntur, homines fugiunt. Sunt illæ tigrides humanæ carnis avidissimæ, avidiores Nigritarum quos internoscunt navium, si quam in ora perspexerint, per viginti leucas cursitando prosequi solent, ut si quis in terram exscenderit, devorent. De nocte in naves insiliunt, ut incautos navicularios opprimant. Referam hujus exemplum memoratu dignum, quod accidit interim dum nostri in Bengala agerent. Æthiops quidam servus cum somniasset à tigride se abreptum, sequenti nocte sub navis, qua vehebatur, prorâ se abscondit. Rogatus à Domino causam, somnium nocturnum enarrat, cujus veritatem illâ ipsa nocte eventus probavit: omnibus n. dormientibus, tigris in navim insiliens, cæteris qui plus quam triginta in navi jacebant, intactis, de sub prorâ miseri Æthiopis apprehendit latus, & abripuit. Felicius alterius fors fuit, sed divina protecti providentiâ. Hic cum haud procul in navi ageret à littore, à tergo hinc eum tigris, ab aquâ è flumine illinc crocodilus invadit: sed audi casum. Tigris, ut adversarium præverteret, prædamque extorqueret, nimia velocitate ultra hominem delata, & in navis latus impacta, in crocodili fauces in-

cidit; hoc modo evasit. Dici nequit, quantopere Bengalani tigris rabiem metuant: hinc variis è nominibus nuncupant, veriti ne si proprio dicerent nomine, continuo dilacerentur. In Brasilia magna trigidum vis, quæ famelicæ horribili possent velocitate, tremendis viribus. Eadem pastæ tantâ dicuntur esse ignavia, ut à gregariis etiam canibus confestim in fugam agantur. Non homines tantum perdit gula. In novâ Hispania speculatur ex arboribus ad ripas fluminum crocodilos: inde defiliit, & incautos occidit. Aliquando non minore jactura à tigride Indicâ infesta Darien fuit, quam olim à fero leone Nemea, & à rapido apro Calydonia, ut Petrus Martyr narrat. Integro namque semestri nocturnum ajunt exactam fuisse, nullam indemnem, quin vel juveneam aut equum, canem aut porcum, intra vici ipsius vias interfecerit. Armenta gregeſque jam minuebantur: imo & minime tuto referunt domo exisse quenquam, eo tempore præcipue quando catulos alebat, tunc namque adoriebatur & homines, fame urgente catulorum, si homines prius occurrebant quam brutum animal. Necessitate cogente tandem ars inventa est, quâ tanti sanguinis poenas lueret. Exploratis quippe angustis semitarum, quibus è cavernarum latebris ad prædam noctu prodire solebat: excavatâ ibi scrobe aliquâ, cratibus & aggesta terra levi superstratis, fallaciam occultarunt Indi. Veniens incautus (mas quidem erat) tigris decidit in foveam, & sudibus acutis in scrobis fundo defixis inhæsit. Saxistum ingentibus ex fossæ margine in eum sudibus infixum dejectis, peremptus est. In mille affulas, & mille frustula fixa dextra directas hastas, & ab alto jaculatas, dirumpebat. Semianimis & exanguis formidine replebat intuentes; quid solutus & incolumis fecisset? Joannes quidam Ledesma Hispalensis, Vaschi Nunes amicus, & laborum focius, de tigride illo se comedisse fassus est, bovinaque carne nihilo deteriorem esse retulit. Unde tigridem esse dicant, interrogati qui nunquam tigridem viderant, respondent, à maculis, à feritate, à dexteritate, signisque aliis ab Auditoribus datis tigrim arbitrari, cum & pardos pantheras maculatos ex ipsis plerique se vidisse prædicent. Tigride mare perempto montes versus vestigia ipsius secuti, antrum, conjugale ipsius domicilium, adeunt, duos absente genitrice catulos uberibus adhuc matris indigos auferunt. Mutato consilio, quo grandiusculos effectos in Hispaniam post hæc mitterent, ferreis catenis diligenter in colla compositis, ad maternum antrum parvulos reportant à matre lactandos. Post paucos inde dies regressi ad speluncam, nec catulos reperientes, credebant eos à matre in frustra præ rabie dilaceratos, ablatoſque, ne quispiam eis frueretur. Asseverant nam-

que, solviè catenis nullo pacto potuisse vivos. Pellis peremptæ tigridis ad Hispaniolam, siccis herbis & culmo farta missa est ad Admirantum & Primores. Plura de his vide apud eundem Nieremberg. & Marcgr. H.B. l. 6. c. 10.

CAPUT V.

De Urſo.

URſus, vel ab urgendo; quod impellendo tum homines tum cæteros animantes proſternat; vel quasi orſus, quod ore suo formet foetus; seu quod in ventre orſus, extrâ ventrem linctû compleatur, vel quasi ſurſus, quia horret pilis, & *δασύτριχος* est, Latinis dictus est. Græci *ἀρκίον*, vel ab *ἀρκῶ* propulso, quod ad injurias propulsandas anterioribus pedibus valeat; vel ab *ἀρκέομαι*, quod sine externo alimento hyemem tranſigat, vocaverunt. Quantum ad Rationem externarum partium: *Corpus* ei crassum, & vix mobile, semper crescere quidam affirmant, inventosque longitudine quinque cubitorum, latitudinis tantæ, ut quodlibet vel bovis tergus vinceret, talemque Maximiliano Imperatori in Thermis Badensibus oblatum. *Pellis* ei spissa & villosa, *dentes* ferrati, & penitus reconditi. *os* longum, *celeres oculi*, *pedes* manibus similes, in brachiisque & lumbis maxima vis, interdum posticis pedibus insistant, *cauda* diminuta, *genitale* simul ut exspiraverit cornescens. Adde his, *mammæ* quatuor, *ventriculum* amplum, & *intestinum*, cum hyeme in antris dormientes capti exenterantur, vacuum, & adeo adductum, ut simul coherere videatur. Galenus nervos recurrentes, qui in aliis animalibus difficulter observantur, in hoc evidentissimè conspici posse scribit. *Caput* ipsis invalidum est, vel præsertim synciput, quod leoni fortissimum: ideò urgente vi, præcipitaturi se ex aliqua rupe, manibus ex operto, jaciuntur. Eo tempore quo latitant, *sanguinis* exiguas circa cor tantum habere guttas, reliquo corpori nihil inesse, Theophrastus credidit. Nulla denique eis secundum Plinium medulla: axungiam & lardum habere, Monachis in Mesuen visum. In plærisque terrarum partibus degunt, sed in Germania, Polonia, Lithuania, Norvegia, &c. & aliis Septentrionalibus, in Nova Zemla imprimis, maximè. In Anglia nunc non reperiri, Gesnerus prodidit nec in Creta insula, Plinius. In Africa quoque non haberi olim creditum, sed falsò. Esse, præter Herodotum & Solinum, Strabo testis est, dum Mauros, leonum, pardalium, & urſorum pellibus indui scribit. Magis autem montanis quàm planis delectantur. Unde Alpina rupes apud Stumpfium animosis abundant: in montibus Peru, multi nigri stabulantur; & Pernes mons Atticus apud Pausaniam, venatione urſorum clarus est, *ὑρσοειδὲς* animal. Plantis victitare apud Mathiolum, Al-

Nomen.

Descriptio.

Vadian. in Melam.

Solinus Polyhist. Plin. H. N.

Aristot. H. A. l. 8. cap. 27. Scalig. ed. l. 8. cap. 21.

Plin. H. N. l. 8. c. 36.

Theophr. de animal. latitantib.

Locus.

Plin. H. N. l. 8. c. 58. & l. c. Herod. in Melpom. Solin. c. 29. Strabo Geogr. l. ult. Viſus.

Albertum, & Gesnerum invenies. Ille specie rubi qui mora rubicunda & odorata producit, delectari scribit. Iste, herbam cuculi, quam Botanici trifolium acetosum vocant. Hic, radices quasdam quibus cupiditas cibi expletur, & somnus conciliatur. Nam in Alpibus Helveticis ajunt, vaccarum pastorem, postquam ursum, radicem è terra avulsam comedis, eminus vidisset, radice eadem, post ursi discessum degustata, tanto somni desiderio captum, ut in via se prosternere necessum habuerit. Herbarum comedere, quamprimum è latibulis egrediuntur, Aristoteles author est. Sed & arbutum quoddam spinosum, foliis ferè ut apii divis, flore albo, baccis rubentibus, in montibus circa Tridentum panis ursi appellatur. Vescuntur & fructibus arborum, quas descendunt, leguminibus, melle, cancris, formicis, & carnibus, seu præmaceratis & propemodum putridis, seu recentibus. Maxime tamen favos appetunt, habeturque apud Jovium faceta de quodam rustico in Moscovia historia, qui in cava arbore, profundo mellis gurgite collo tenus immersus, & biduo vitam solo melle sustentans, urso in arboris ejusdem cavitatem, more humano se dimittentis, beneficio, cujus pellem tergoris manibus comprehenderat, extractus fuit. Piscibus in Islandia & glaciali Oceano vesci, Gabottus Venetus, prodidit. Bibunt quidem aquam, sed nec lambendo, quod carcherodontum, nec sorbendo, quod continuis dentibus munitorum proprium, sed aquam mordendo, ut apud Aristot. habetur. Ursæ veneris sunt appetentissimæ: Ideo, quoniam feræ gravidæ maribus non miscentscentur, præter lyncem & leporem, ne diutius maritis careant, & maturius ad Venerem redire possint, ventrem ante certum tempus elidere creduntur. Mares, in puellas quoque libidine ferri, proditum. Raptam ab uno in montibus Allobrogum quandam, quam venereo complexu profecutus est, & pomis agrestibus pavit, Philippus Cossæus, Constantiensium sacris præfectus, Gesnero retulit: Danorum verò Regum stemmata, à quodam dicto urso, qui ex puella ab urso compressa natus esse dicitur, deduci, & Saxo refert; & duo Magni Upsalenses Episcopos, Gothicos Reges ex urso & virgini nobili originem ducere produnt. *Coëunt* mense Februario, seu hyemis initio, non eodem modo quo quadrupedes, sed intra mutuos amplexus, velut humanas conjugationes, seu ut Plinius, ambo cubantes complexique id est humanitus strati. Gravidæ latent, secretique honore reverentur maras gravidas. Uterum triginta dies ferunt. Pariunt tum unum, tum etiam duos, sed complurimum quinque. De *partus forma* variatur. Lucinæ illis properantius tempus est, inquiunt Plinius & Solinus, quippe uterum trigesimus

dies liberat: unde evenit, ut præcipitata foecunditas, informes creet partus. Carnes paucillulas edunt, quibus color candidus, oculi nulli, nulli pili, & de festinâ immaturitate tantum rudis sanies, exceptis unguium lineamentis. Has lambendo sensim figurant, & interdum ad pectora foveant, ut assiduo incubatu calefacta, animalem trahant spiritum. Idem Aristoteles, Oppianus, Ovidius, & alii dixerunt. Inde quibusdam Ursus quasi Orsus dicitur. At recentiores contrarium experientia docuit. Capta in valle Anania supra Tridentum gravis ursa, quam exenteratam, catulos omnibus membris distinctos gestasse, animadvertum est. In senatus verò Bononiensis Musæo, ursulus à caeso matris utero extractus, omnibus suis partibus formatus, in vitreo vase servatur. Nec malè Camerarius opinatur, secundinarum quibus foetus ursæ obvolutus est, tantam crassitiem, ut non nisi diuturno linctu à matre avelli possit, errori occasionem dedisse. Capitale *odium* gerit cum *Phoca*, *equo*, *apro*, *mortuis*, & *mappa*. *Phocam* summopere abominari Oppianus reliquit. Agnoscit *equus* hostem nunquam visum, ac protinus se parat ad pugnam: in qua arte potius quàm viribus utitur. Transilit enim ursum, & ipso saltu posteriores pedes impingit in caput. A mortuis abhorre dicuntur, quod homines prostratos, ore ad terram verso, retentoque spiritu, illæfos relinquant. Visa mappa, teste Seneca, ad iram concitantur. Aconito quoque pereunt, nec non faba lupina, seu marcilio, quam consiliginem esse putat Gesnerus. Pisces etiam quidam nigri venenati in Armenia reperiuntur, quorum farina asperfas ficus si comederint, intercunt. Musca delectari, experientia docuit. *Vocem* si attendas, favire dixit Spartianus, rugire alii. *Naturam* & *Ingenium*, sequentia testantur. Cum degustavere mandragoræ mala, formicas lambunt. Cum nausea laborant, myrmeciam adeunt, assidentesque linguam flure dulci fluentem exertam, leviter tam diu tenent, donec formicis scatere viderint. Vulnerati, siccis herbis sibi medentur. Ursæ à latitatione egressæ in liberam diem, tantam patiuntur lucis insolentiam, ut cœcitate obfitas putes. Oculi quia hebetantur crebrò, maximè favos expetunt, ut convulneratum ab apibus os, levet sanguine gravedinem illam. In antrum, non recto sui corporis motu sed supina ingreditur ursa, & dorsi sui tractu repit, ut vestigia oblitteret. Ibique postquam est egressa, se quieti dans, habitum corporis extenuat per quadraginta dies: è quibus quatuordecim immobilis manet, reliquis aliis movetur: tantum solo lingendo dextro pede se sustentat, eique intestinum eatenus adducitur, ut propemodum cohæreat. Mares, inquit Plinius, quadragenis diebus latent, foeminæ quaternis mensibus.

Specus

Ambros. Hist. quadrup. dig. l. 1. c. 5.

Antipathia.

Ælian. H. A. l. 5. c. 15.

Vox.

Solin. Polyhist. c. 39.

Plutarch. l. lectum animal.

Solin. l. c.

Plin. H. N. l. 8. c. 33. Ælian. H. A. l. 6. c. 3.

Plin. H. N. l. 8. c. 36.

Arist. Hist. A. nim. l. 8. c. 17. Plin. H. N. l. 10. c. 73. Aristot. H. A. l. 8. c. 5.

Martyr. Decade. 3. l. 6.

Arist. H. A. l. 8. c. 6. Generatio.

Oppian. Cyneg. l. 3. v. 146.

Saxo Gramm. Hist. Dan. l. 10. Magnus l. 8. c. 2.

Plin. H. N. l. 8. c. 36.

Arist. H. A. l. 5. c. 1. Solin. Polyhist. c. 39. Aristot. H. A. l. 6. c. 30.

Solin. d. l.

Specus si non habuere ramorum fruticum-
que congerie ædificant, impenetrabiles im-
bribus, mollique fronde constratos Primis
diebus bis septenis tam gravi somno pre-
muntur, ut ne vulneribus quidem excitari
queant. Tunc mirum in modum pingues-
cunt. Ab iis diebus residunt, ac priorum pe-
dum suctu vivunt. Mirum dictu, credit
Theophrastus per id tempus, coctas quo-
que urforum carnes, si asserventur, incre-
scere; cibi tunc nulla argumenta, nec nisi
humoris minimum in alvo inveniri: sangui-
nis exiguas circa corda tantum guttas, reli-
quo corpori nihil inesse. Procedunt vere, sed
mares præpingues, ut movere sese facile ne-
queant. Foeminae non ita pinguescunt, quod
eo tempore pepererint. In iisdem licet fo-
veis, partitis tamen per scrobes secubationi-
bus dividuntur. Exeuntes herbam arum di-
ctam, laxandis intestinis alioquin concretis
devorant, circa furculos cum dentiunt præ-
domantes ora. Si quando tauros adoriuntur,
sciunt quibus potissimum partibus immo-
rentur, nec aliud quàm cornua aut nares
petunt: Cornua, ut pondere defatigent, na-
res, ut acrior dolor sit in loco teneriore. Ani-
mæ virus pistilens. Contracta halitu ejus at-
tingit nulla fera, citiusque putrescunt affla-
ta reliquis. In Mysia ajunt esse genus albo-
rum, qui cum à venatoribus urgentur, ta-
lem halitum edunt, qui canum carnes pu-
trefaciat. Quantum ad *Usum* in *Cibis*, etsi ca-
ro urforum sit frigida, mucosa, difficilis
concoctu, spleni & hepati in commoda: Al-
pinis tamen & Helvetiis, Brujerino teste, in
deliciis habetur, ipseque se eas in coena apud
Symphorianum Campegium comedisse,
culinæ artificio conditam asseverat. Sed ju-
venculis ille ursus erat, qualem, & quidem
hyeme captum, in cibis adhibere debere,
Bartholomæus Scappius scripsit. Licet n.
Quintili mense ob pabulum pinguiore sint:
tamen, quod caro tum malum odorem spi-
rare soleat, à mensis excluduntur. Cæterum
anteriores duntaxat pedes inter cibos sua-
viores ab Æliano reponuntur, quos & prin-
cipes viros appetere Michael Herus prodi-
dit, forte quòd plurimum exerceantur. Sal-
fos & in camino ficcatos qui ederunt, opti-
mum & suavissimum esse cibum Gesnero
retulerunt, nec amplius se mirari, quod eos
per hyemem inter latendum fugant. Cere-
brum venenatum esse Sava norola scripsit. In
Medicina magni sunt partes usus. *Oculus* ex-
ficcatus & puerorum collo appensus, adver-
sus pavores nocturnos amuletum esse dici-
tur: supra sinistrum hominis brachium alli-
gatum, quartanam febrem mitigat. *Sanguis*
panos & apostemata, in quacunque parte
discutit, & pilis qui in oculis nascuntur pro-
dest, & pulices enecat. *Adeps* livores & ma-
culas eximit: ambustis, cum lilii radicibus
prodest: igni sacro illinitur: ulcera in tibiis

& cruribus admixtâ rubricâ sanat: rimas pe-
dum, alumine addito, farcit: raptos alope-
ciæ vitio capillos restituit, & unguento sym-
pathetico seu armario admiscetur. *Pellis* de-
morsis à cane rabido substernitur. *Pulmo*
attritus à calceamentis contractos ab infla-
matione tuetur. *Fel* articularum doloribus u-
tilissimum tradunt: ab Arnolfo Villanova-
no ad epilepsiam commendatur: tussim ad-
mixto melle sanat: in pessum ad conceptum
promovendum adhibetur. *Pili* cum adian-
tho & arundinum radicibus adusti, magnæ
sunt in generandis pilis efficaciam. Difficiles
partus solvi, cum qui sectum in quo gravi-
da sit, lapide quo ursus interfectus est, trans-
miserit, Plinius fabulatur. Adhibetur ursus
& ad alia. *Pelles* Samojedis & Lapponibus
ad vestimenta inserviunt: aliis ad stragula.
Olim equites, loricas & galeas iisdem tege-
bant, ut truculentiores apparerent. Palla-
dius ferramenta quorum in agris colendis
usus, sebo, adversus grandinem & gelu in-
ungit: Mizaldus, cortices vitium adver-
sus erucas & glaciem. Fuit eorum & in spe-
ctaculis ac suppliciis fumendis usus. Anna-
libus notatum est. M. Pisone & M. Pisone &
M. Messala Coss. ad XIV. Calend. Octo-
bris, Domitium Ænobarbum ædilem curu-
lem urfos Numidicos centum, & totidem
venatores Æthiopas in Circo dedisse. *Diffe-*
rentias quod spectat, sunt Magni, Parvi,
Nigri, Albi. Tales infestare Hollandos,
cum per glaciale Oceanum transitum in
Catajam quærent. Stupendæ erant ma-
gnitudinis. Nam occisor. pelles ad trede-
cem pedes ascendebant. Sunt & in Mysia al-
bi, quorum superius facta mentio. Strabo
fulvum, in illa Arabiæ regione ultimo pro-
montorio contermina notarit: Agricola in
fuscis & nigris dividit. Helvetii parvos;
saxatiles, magnos *capitales* vocant. Sunt &
in novo orbe ignavi, qui solis formicis victi-
tant, canibus cedunt, & bacillo percussi
fugiant, nec ullum caudæ vestigium habent:
Myrmeciphagos appellare possis. Inveniun-
tur in provincia Veræ pacis maximi, lani-
geri satis, nigris pilorum sive lanæ grumis.
Cauda illis palmaris duntaxat: manus velut
humanæ. Simi sunt velut nigræ, rotundo
rostro, depili & rugoso: In Virginia edun-
tur. Meticulosi sunt, fugiunt hominis, au-
fugiant ad arbores, inde deturbantur, fan-
ciati jaculis. Provincia Beach, si Paulo Ve-
neto credimus, domesticos & innoxios pro-
ducit. Hoc unicum addere placet, habuisse
Suidrigellum Lithuanie Principem ursum
matutinis horis à nemore discedentem, qui
palatio appropinquans anterioribus pedi-
bus fores percutiebat, & cibo sumpto, reme-
abat in sylvam. Solent & sectæ cujusdam
apud Turcas religiosi, ex eremo egressi, cer-
vum vel ursum tintinnabulum colla feren-
tem per urbes & pagos circumducere.

Solin. l. c.

Ufus.
Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.
c. 2.
Brujer. l.
13. de ci-
bis. c. 41.

Plin. H.
N. l. 8. c.
36.
Differen-
tiæ.

Purchas.
Navig.
T. 3. l. 4.
c. 5.
Strabo
Geogr.
l. 16.

Majol.
Colloqu.
7. de qua-
drup.

Nie-
remb. H.
E. l. 9.
c. 28.

Textor
Tomo. 2.
Off.

De Lupo.

ARTICULUS I.

De Lupo in genere.

Aldro-
vand.
Hiflor.
Digit.
l. i. c. 6.
Nomen.

Descri-
ptio.

Ælian.
H. A. l.
19. c. 26.

Clamorg.
l. de lu-
por. ve-
nat.

Galenus
de ufu
partium
l. 10. c. 2.
Plin. H.
N. l. 28.
c. 20.
Galen.
l. 11. de
ufu part.
c. 8.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.
Locus.
Paufan.
in Phoci-
cis. Ari-
ftot. in
Mirabil.

Olear.
Itiner.
p. 119.
Cada-
muft.
c. 29.

Cibus.

LVpum in genere & specie considerabi-
mus, eidemque *Gulonem* adjiciemus.
Dicitur Latinis lupus, vel quasi leopus, quod
in pedibus leoninam virtutem gerat; vel à
Græco *λύκος*, à rabie nempe rapacitatis; vel
ἀπὸ τῆς λύκῃς, à diluculo, seu quod in colore
pellis crepusculorum albedinem æmuletur,
seu quod primâ luce ad raptum exeat; seu
quod oculi ipsorum sint terfi & in tenebris
fulgeant. Græcis dicitur *λύκος*, *κυνίας*, si tex-
tus apud Varinum corruptus non est, He-
fychio *ὄλκος*, quod potest esse ab *ὀλέω*. Alibi
κυλέρητοι κύνες vocantur. Foeminae, *λύκαινα* no-
men. Sunt verò lupi canibus magnis,
mastinis, seu pastoralibus similes, coloris,
ut in differentiis dicitur, varii. Habent
oculos ramos, qui splendent lucemque jacu-
lantur. *Dentes* ferratos, teretes, acutos, &
inæquales. Rictum amplum, & os quod ma-
ximè diducunt. *Collum* in eas brevitatis an-
gustias compulsum, ut contorqueri retro-
que versari non queat: & si retrò velit aspi-
cere, totum corporis truncum contorqueat
necessè est. Ideò quidam ex solido ossè con-
stare prodidere, sed falsò. Clamorganus
enim in dissectis vertebrae observavit, cui
& Philes adstipulatur. Habent & musculos
temporales magnos & nervosos, prodente
Galeno. *Cerebrum* quod cum luna crescit &
decrescit, si Alberto credimus. *Cor*, si sic-
cetur, odoratum. *Iecur*, ungulæ equinæ
simile. *Genitale* osseum. *Pedes*, priores
quinis digitis distinctos, posteriores qua-
tuor. *Ossium* substantiam densiorem. *Reines*
aliis similes, sed qui, in senectute, vermes
vel serpentes, quod se in tribus vel quatuor
cadaveribus observasse, Clamorganus scri-
bit, producant. In *vesica* lapillus reperitur,
qui Syrites dicitur. Nulli sunt in Sardinia,
si Pausaniæ credimus; Creta, si Aristoteli;
Olympo monte Macedoniæ, si Plinio &
Solino. Angliam hoc animalis genus non
alere certum. Sub Edgardo, Ednii II. ex-
scindi cœpti, in totum postea eradicati sunt,
non in Cambria tantum, sed in aliis quoque
provinciis. In Septentrionalibus provinciis
magna luporum copia: in Muscovia inpri-
mis, pecori, jumentis & hominibus insidian-
tur, cujus exemplum apud Olearium in iti-
nerario Orientali invenies. Haud paucos in
regno Senegæ inveniri, prodidit Cadamu-
stus. In provincia Scotiæ Angusia, ejusque
valle Glamore reperiri, qui ferarum dunta-
xat raptu vivant, apud Boëthium habetur.
Carnivori sunt, & inprimis ovillam appe-
tunt. Ideò caulam ingressi, omnes ferè inte-
rimunt. Equis, bobus, anseribus, insidiantur.

Humanæ sapore maximè illiciuntur, si hu-
manum cadaver prius gustaverunt. Præ-
gnantibus capto odore insidiari Olaus M.
prodidit. Sed nec suæ speciei, si fames pre-
mat, parcunt: restaturque Clamorganus
duos lupos die antecedenti occisos, ab aliis
nocte subsequente devoratos fuisse. Ælia-
nus verò animadvertit, fame urgente mul-
tos simul excurrere, vertigine correptum &
cadentem à cæteris laniari. Coram catulis
qui ablaçantur, prædam nuper voratam
evomunt, & grandioribus factis agnum vel
anserem apponunt. Præter carnes, plantam
illam Scythicam Borametz dictam appe-
tunt. In regno Congo oleum quod ex pal-
mis elicitur, sorbent. Terram quoque &
argillam comedunt. Inde fortè lapis lithar-
gilos dictus, qui in ventriculo, undecim un-
cias pendens, gyris & plicis intortus, à
Schenckio observatus est. Albertus, non fa-
me sed naturali instinctu id facere, dixit, ut
gravior redditus, quæ invasisset, sua mole
deprimere posset. Edsaturatus per magnum
temporis intervallum fert inedia, eique
tum venter latè projicitur, lingua tumescit,
os obstruitur, mansuetusque evadit: lingua
extenuata, iterum in lupum transformatur.
An cibos defodiant, ex æquo eosdem divi-
dant, & ad reliquias ululatu alios advocent,
quod Albertus prodit, venatoribus deciden-
dum relinquo. Coeunt eo modo quo canes,
in medioque coitu, inviti etiam cohærent;
coeuntque uno anno non nisi per dies duo-
decim, quos à natali Christi quidam compu-
tant. Libidinis tempore acrius in eos qui ac-
cesserint sæviunt, inter se tamen, quod gre-
gales non sint, non dimicant. Gerunt utero
duos menses, & tandem quoad numerum &
cæcitatem catulorum ut canes pariunt. No-
vem catulos generare vulgaris apud Helve-
tios sermo, teste Gesnero, qui etiam ex Rhæ-
to quodam audivit, catulos in Rhætia circa
Calend. Maij, septem vel novem aliquando
ex una parente, ex latibulis auferri. Idem
ajebat vulgò ferri lupam primo partu uni-
cum eniti catulum, secundo geminos, & sic
deinceps, singulatim catulo semper auctio-
rem fieri partum; usque ad decem, inde
sterilescere. Intra duodecim dies parere,
quod Latonam oberrantem totidem die-
bus ex Hyperboreis Delum deduxerint,
sub specie lupæ, propter metum Junonis,
fabulosum est. Antipater apud Plutarchum
partum projicere adserit, cum glandiferæ
arbores florem abjiciunt, quo gustato uteri
illarum referantur; cum ejus copia non est,
partum in ipso corpore emori, nec in lu-
cem venire posse: præterea regiones illas à
lupis non vastari, quæ glandium quercuum-
que feraces non sunt. Potus sunt parcissi-
mi. De *Antipathia* hæc apud authores oc-
currunt. Homo, quem prius viderint con-
ticescit: & anticipatus obtutu nocentis,

Olaus de
gent.
sept. l. 18.
c. 10.
C. a. norg.
l. de ve-
nat. lupi.

Porta
Physiog.
l. 4. c. 4.
Linschot.
in Navig.

Schenck
in Hift.
monstror.

Genera-
tio.
Aristot.
H. A.
l. 5. c. 2.

Aristot.
H. A.
l. 6. c. 15.

Plutarch.
prob. 38.

Antipa-
thia.
Solin. in
Polyhist.

licet clamandi votum habeat, non habet vocis ministerium. Oculus erutus, quadrupedes domesticas terret. Mulier si unquam supra calidam lupi urinam minxerit, non concipiet. Cauda ad præsepe suspensa, facit ne comedant. Rumpi traditur equos, qui vestigia luporum sub equite sequantur: quod si lupi calcaneum equi quadrigam trahentes conculcent, sistuntur tanquam ii cum quadriga congelassent. Oves ab eo ad eas suaviorem habent carnem, verum lana pediculos & pruritus generat. Agni nuper nati, nec alicujus animalis effigiem extra caulam conspicati, audito repente luporum ululatu, examinantur. Pellis eorundem lupinæ superposita statim depilatur. Stercus in ovili occultatum, pecudes quiescere prohibet, nisi auferatur. Fides ex intestinis ovium, cum intestinis luporum permixta, obstrepentes omnem citharæ concentum interturbant, quod tamen falsum esse experientia docuit. Scillam si contigerit repente contrahitur. Lapides ideò perhorrescit, quòd in parte à saxis ista vermes nascantur. Scintillis ex filice emicantibus ita terretur, ut etiam famelicus accedere non audiat. Tympanum ex ejus corio formatum cætera animalia fugat. Cantus denique & sonus ipsi inimicus est. Pythiocaris tibicinem, cum tibiâ magna contentione incitatos numeros caneret, impetum luporum repressisse prodit. Gesnerus verò novit quendam, qui cum lapidibus lupum terrere non posset, sono tympani, quod gestabat, perterrefactum fugavit. Dicitur Psittacum amore prosequi. *Morbos* si attendas, rabie, podagrâ, & cynanche laborare solet, lycoctono sumpto interit. Vulneratus, in luto se volutat, & sic sanguinem sistit. Per multos annos vivunt, & ex dentibus in senectâ malè afficiuntur, ita ut etiam edentuli fiant. De *Moribus & Ingenio*, ut aliquid dicamus, viscera quia habent infirma, ideò herbas comedunt, Dracontium inprimis ad acuendos dentes. Breves, inter cæteros magis audaces putantur. Cum in foveam inciderunt, vel se inclusos sentiunt, præ stupore innoxios se exhibent, quòd una & altera historia, Gesnerus confirmat. Percussores cognoscunt, & ex observato invadunt. Fætus suos amant: fœmina partus custodit, mas pro catulorum salute cibos ad ipsam deferret. Cum fugiunt, catulos secum ferunt. Cælo præcipuè nubilo insidiantur, ut magis lateant. Cum per folia incedunt, ne strepitum faciant, lingua pedes suos lambunt, & lubricos reddunt. Fluvios transmissuri, ne undarum fluctibus abripiantur, singuli apprehensis morfu prænantium caudis, unâ serie transmittunt, à quo ingenio *λυκίστας* annus dicitur. Suidas *χειμῶν ὁ ὄρεα*, ita transmittere ait. Apprehensis quoque mutuò caudis, bovem è palude extrahunt. Dum cibum capiunt, vel in-

tuentibus irascuntur. Si homo pariter & aliud animal se offerant, semper homini, narrante Alberto, parcent. Narravit sanè mihi, inquit Conradus Gesnerus, quidam, lupum se vidente, morfu comprehendisse lignum triginta vel quadraginta librarum in sylva, & cum eo se assuefecisse transilire grandem eo in loco arboris abscissæ truncum: tandem, cum satis peritus transiliendi sibi videretur, se abscondisse: & adveniente propter fatam ibi avenam porcâ sylvestri, cum pluribus ætate differentibus porcis, aniculis, bimis, prorupisse, apprehensoque porco, qui æqualis pondere videbatur ligno, quo cum transilire truncum didicerat, saltu retrò truncum se recepisse, & interemptum ibi porcum devorasse. Aliquando cum canibus amica societate confœderantur, & caulas invadunt. Si in minorem aliquam pecudem inciderint, auricula comprehensa, secum currendo abducunt; renitenti clunes caudâ feriunt, ita ut lupo interdum celerius currat. Ubi caulas intraverunt, omnes interficiunt, antequam aliquam ad comedendum attingant. Tauros à fronte adoriri non audent, quòd cornua extimescant. Quamobrem primum, quasi rectâ viâ pugnaturi essent, minas gerunt, & illorum oculis sese crebrò inculcant: deinde se retorquentes in dorsum insiliunt, & acerrimè ad ejus perniciem incumbunt. More equorum & canum per ætatem canescunt. Famelici, noctu vento adverso, odorem escæ, per medium milliare sentiunt, inventumque cadaver trahunt & devorant. Quandoque uno ululante alii conveniunt, & omnes simul equorum gregem adoriuntur, quod in Bononiensi territorio sæpe accidere solet. Turmatim etiam progrediuntur, & nocte intempesta, juxta destinatum pagum commorantur. Interim illorum unus in pagum excurrens canes excitat, & simulata fuga, usque ad insidiarum locum, ad se persequendum invitat; ubi canes ab aliis lupis dilaniantur. Frondes & salices ramulos porrigunt, ut capras his gaudentes inescant. Vocis ferè oblitus eramus, quem eruditi ululatum vocant; Græci, per *ὑύου* & *αυύου* exprimunt. Ad mensas inter honestos non admittitur, quod carnem habeat siccam, crassam, fætidadam. In Insubriâ tamen aliquando editur. In *Medicina* multi est usus. Vivus, oleo cerati modo incoctus ad podagram laudatur. *Corio* ventrem constringere, in colica prodest, si Rhasi credimus. *Carnes* edisse, parituris prodest: aut si incipientibus parturire, sit juxta, qui ederit, adeò ut etiam contra illatas noxas valeat. *Adeps* antipodagricis unguentis admiscetur. *Sanguis* cum oleo nucum mixtus, surdidati prodest. *Caput*, sub pulvino reconditum, somnum inducit. *Oculus* dexter falsus ad alligatusque, febres periodicas arcet. *Dens* gingivas extenuat, quo

Gesner.
Histor.
Quadrup.
p. 723.

Ælian.
H. A. l.
5. c. 19.

Ambros.
fin. de
Digit.
l. 1. p.
147.

Albert.
l. 2. de
Animal.
Vox.

Usus.

Plin. H.
N. l. 20.
c. 14.

Ælian.
H. A. l.
1. c. 6.

Porta M.
N. l. 1. c.
14.

Oppian.
in Cyne-
get.

Morbi.

Vita.

Ingenium.

Gesnerus
Histor.
Quadrup.
p. 721.
Plin. H.
N. l. 8. c.
22.

Ælian.
H. A. l.
8. c. 14.

quo dentes levius proveniant. Qui per *lupi guttur* in synanche bibit, evadit. Hoc experimentum se ab Adolpho Occone accepisse, Agricola fatetur. Cor antepilepticis admiscetur. Medicamentum quod in M. S. Gesnerus invenit, ex visci quereini uncia unâ, visci de piro unc. f. mucronum de cornu cervi scobe dr. ij. cordis lupini dr. j. componitur. *Hepar* Archigones apud Galenum ad oris crustas commendat. Haud pauca de ejusdem usu apud Marcellum habebis. Idem, tussim ex vino tepido sanat, & phthisicis medetur. *Fel* cum elaterio umbilico alligatum, alvum solvit. Pars de *virga* in furno assa & incisa sumpta, veneris appetitum excitat. *Testiculus* dexter oleo permixtus, & cum lana genitali muliebri applicatus, desiderium coeundi adimit. *Stereus*, colicis potandum, tempore Galeni, cum successu dabatur: imò, vel appensum, juvabat: sed in fruticibus & vepribus colligebatur. Vide Galenum. Quin & ossa in excrementis inventa, colo medentur alligata brachio, si terram non attigerint. *Ossa* exsiccata & in pulverem redacta, dolorem intercostalem tollunt. Inservit & aliis. Nam caput in columbario suspensum, mustelas & feles arcere dicitur. Rostrum inveteratum veneficiis resistit. Sanguis circa agrorum fines sparsus, lupos arcet. Eodem olim in sacrificiis utebantur, cum Dæmonas invocabant. Adipe novæ nuptæ, postes apud Romanos inungebant. Cauda supra præsepe suspensa lupos à stabulis arcet. De *Differentiis* sequenti articulo agemus.

ARTICULUS II.

De Lupo in specie, & de
Gulone.

EX Lupis, alii sunt *Sylvestres*, alii *Aurei*, alii *Scythici*, *Marini*. *Sylvestrium* in Doffriis montibus, qui Norvegiam à Suecia dirimunt, Olaus, Sardinia Lonicerus, meminit. Villosior est vulgari, flavi coloris, & caudam erectam gestans. Frequens est ejus apud Mediæ populos in ludis usus. Armati cum eis congregiuntur. *Aurei* à colore flavo eoque pereleganti ita vocantur. Minores sunt lupis communibus, voracitate tamen pares. Gregatim incedunt hominibus & armentis innoxii. More canum latrare videntur. In Cilicia & Turcia visuntur. Turcarum domos & tuguria noctu subeunt, & quicquid in eis esculenti reperiunt, devorant: quod si nihil horum obvenerit, pileos, vestes, calceos, & quicquid coriaceum est, auferunt. Ex pellibus vestes parantur. *Scythicus* in ultima Scandinavia, post Norvegiam & Gothiam reperitur. Animal est lupi magnitudine, perpetuò iracundum, Ger-

mani ab acie unguium, quibus maximè sævit, Grimmeklaw vocant. *Marinus*, animal est amphibium, magnitudine ursi, pelle adeò dura, ut gladiis penè sit impenetrabilis. Caput habet enorme, Oculos permultis pilis obumbratos; naribus & dentibus caninis; pelle villis erectis hispida, nigris maculis distincta; caudâ oblonga, crassa, villosa. In ventriculo nonnulli lapilli reperiuntur. Pinguedine scatet. Conspicitur in Oceani Britannici littore. In Insula Angræ tanta eorum multitudo, ut quandoque miliaris armentorum grex esse videatur. Visuntur & in insula post portum S. Crucis sita, & in Maritimo Peru tractu. Inimicitias cum avibus Buitri dictis gerunt, à quibus aliquando interficiuntur. Adeò amplas alas habent, ut extensæ spatium XV. pedum occupent. Lupo conspecto, altera lupi pedes apprehendit, altera ipsum rostro excæcat. Rugiunt ad instar leonum adulti; parvi, vocem hædorum imitantur. Hepar est edule. Angræ incolæ carnibus eorum tam recentibus quàm salitis nutriti, diu vivunt. Pelles ad vestimenta adhibentur. *Guloni* nomen à voracitate impositum est. Scalliger Vulturem quadrupedem; Crollius Boophagon Germani *Bielfrasz* nominant. Est, describente Miechovio, magnitudine canis, facie catti, corpore & cauda vulpinis, colore nigro. Reperitur in Lithuania, Moscovia, & aliis septentrionalibus regionibus. Vescitur cadaveribus, tantumque vorat, tympani instar infletur. Plenus, angustiam duarum arborum aut rupium angustiam ingreditur, & vi per infernas & superas partes excrementa trudit, rursusque ad cadaver regressa, sese implet. Congener ipsi fera Arabibus *Dabub*, Africanis *Sesef* dicta, magnitudine & formâ lupum re-

Bellon. l. 1. de aquat. c. 3. Lopez. Hist. Ind. l. 1. c. 3.

Miechov. in descript. Sarmat. l. 2. c. 3.

Leo. African. l. 9.

Olaus l. 13. c. 6.

TITULUS II.

De Digitatis semiferis.

CAPUT PRIMUM.

De Vulpe.

ARTICULUS I.

De Vulpe in genere.

Ambro-
sin. Digit.
l. 2. c. 1.Nomen.
Isidor.
Origin.
l. 12. c. 2.Descri-
ptio.

Cibus.

Locus.
Miecho.
de Sar-
mat. c. 1.Genera-
tio.

Tantum de Digitatis feris. Semifera vo-
camus, quæ licet feris sint instructa mo-
ribus; ob parvam tamen corporis molem,
ab hominibus faciliè superari, regi, & doma-
ri possunt. Talia sunt; *Vulpes*, *Simia*, *Cerco-
pithecus*, & alia hujus generis Indica, *Cyno-
cephalus Papio*, *Upalim*, *Taxus*, *Castor*, *Lu-
tra*, *Ichneumon*, *Mustela*, *Genetta*, *Animal Zi-
bethi*, *Lepus*, *Cuniculus*, *Sciurus*, *Glis*, *Mus*,
Talpa, *Echinus terrestris*, *Hystrix*, & *Tatus*.
Vulpes, & ut alii volunt *Volpes*, vel est quasi
volupes, quòd semper tortuosis anfractibus
ad alias animantes decipiendas currat: vel
quasi volipes, quòd ob cursus celeritatem
volare videatur: vel quasi valipes, ob pe-
dum valorem, Latinis dicitur. apud Græcos
plurima habet nomina. Dicitur namque
αλώπηξ, quod nomen tam in masculino quàm
fœminino reperitur, *παρα τὸ αὐτὸ* & *ὡς ὁ πῶς*, à
fallendis oculis, *ρασαρίς* & *ρασαρίη* Cyrenensi-
bus; *δάμιξ*, *κερδα* ab astutia, quæ Græcis *κέρδιον*
& *κερδαῖον*; *καθέφι*, *περδαῖον*, *κερδαῖον κήλας*, *παρα τὸ κηλεῖν*,
quòd cauda ejus ad demulcendum apta sit;
κίραδον, quod nomen quidam bestię omni im-
ponunt; *κινάνδρα*, *κιδάφι*, seu *κίδαφον*, *κίρα*, *κίραφον*,
κιδάρις, *κοιλοβέρδον*, *κοροῖτις*, *λαμπυρίς*, *σκαφάρη*, & cætera.
ὄσανον Phrygibus vulpem etiam significat. De-
scriptione non est quòd insistamus cum notis-
simum sit animal. *Genitale* mari osseum ut
lupis, & mustelis. *Caudam* habet villosam,
Aures breviores quàm canis. *Cibum* si spe-
ctemus, delectatur gallinis, anseribus, a-
stacis, otidibus, cuniculis, leporibus, syl-
vestribus muribus, felibus, parvis canibus,
quos coercere potest, locustis denique. Cum
Massiliæ piscatores Buopas Mænarum ge-
nus & magnos astacos per noctem in navi-
cula reliquissent, vulpes buopibus insidia-
ta, ab astaco, forcipe, cui pedem inter-
posuerat, capta est. Ab uvis quoque ma-
turiis non abhorrent, ut nec à pyris, si
proverbium hoc sensu fumi debet. Non
habentur in Creta, si Solino credimus. At in
Russia frequentissimæ sunt: ut & Alpinis
Helvetiorum locis. Ideò mercatores mul-
tas ibi pelles coemptas, in alias regiones
divendunt. De *Congressu* tradidit Plinius,
ad latera projectas coire, alii ad terram. A-
ristoteles, supervenientes commisceri. In-
vadunt & diversi generis animalia, modò
corporatura & tempora graviditatis sint æ-
qualia. Ideò ex cane & vulpe, ad montem

Aristoteles, Canes Laconici, *Alopecides* Aristot.
dicti, generantur. Pariunt catulos cæcos, H. A.
quatuor ut plurimum; & parturientes ita se- 1.6. c. 34.
cedunt, ut rarissimè gravidæ capiantur. E-
ditum fætum lambunt, refovent, & conco-
quunt. Cum serpentibus adeò amicè vi-
vunt, ut in iisdem cavernis quietè moren-
tur. Hostilitatem verò exercent, cum plan-
tis, avibus, & quadrupedibus. Ruta sylve-
stris cum eduliis gallinarum mista, vel ejus
ramusculus sub alis gallinarum alligatus, eas-
dem à vulpe tutas reddit. Milvus, vultur,
& aquila, vulpium catulos sæpe rapiunt.
Circus & Æsalo pilos ab iisdem avellit, Cor-
vos & pulpem in caveâ clausos, tam acriter
dimicare Avicenna vidit, ut corvi caput fau-
ciatum sanguinem emiserit, corvus verò la-
bia vulpis adeò constrinxerit, ut hiscere ne-
quaquam posset. Taxi cum vulpibus sæpe-
numero præliantur: hi taxos, cryptas ster-
core fœdando, fugant. Cervi eorundem
gannitum reformidant. Lepores sunt in illis
insulis frequentiores, in quibus nullæ vul-
pes. Ululando & latrando canem imitatur, *Vox*.
quando irascitur & dolet; alioquin, cum ali-
quid, si domi alatur, petit, gannit & blan-
dè immurmurat. Hinc *κυνζαῖα* seu *κυνζέα*, pro-
priè de canibus, queribundem ululatum e-
dentibus, profertur. *Moribus & ingenio* est *Mores & Ingenium.*
dolosus. In Thracia amnes gelatos lacusque Plin. H.
nonnisi ad pastus itura redituraque transit: N. 1. 8.
& observatum, aure ad glaciem appositâ, c. 28.
crassitudinem gelu conjectare. In caverna,
multifores aditus facit, ne tam facile à vena-
toribus illaqueari possit. Quia lupus conta-
ctu scillæ convellitur, latebris suis eandem
apponit. Pulicibus infestata, manipulum fæ-
ni mollissimum, aut pilos ore continens, *Albert.*
paulatim à posteriori parte in aquam se mer- 1. 2. de
git, ut pulices ad caput ascendant, eoque Animal.
immerso, in fœnum vel villum colligantur.
Echinos in arctum constrictos, quia adoriri
non potest, urina in os redditâ, suffocat. *Ælian.*
Cum lepore se ludere velle simulat, & incau- H. A.
tum devorat. Famelica, insidiosè mortuam 1.6. c. 64.
se simulans, spiritu compresso, exerta quel in-
guâ, postquam se in argilla rubra, ut cruen-
ta quasi appareat, volutasset, accedentes
aves corripit. In Ponto sic Otidas venatur,
ut & sese avertens, & in terram abjiciens,
tanquam avis collum, sic caudam extendat.
Eæ, hæc insidiarum instructione seductæ, ad
illam tanquam suam gregalem accedunt, &
nullo negotio, capiuntur. In pedica capta,
morsu pedem præscindit, ut aufugiat: nullâ
fugæ patente viâ, mortem simulat. Gallinas
in pertica sedentes, caudâ huc & illuc impul-
sâ perterrefactas, dejicit & devorat. Nihil de
pisciculorum & vesparum captura, quos
cauda astutè capit, dicem. In procera arbore
deprehensa, jucundum aliquando sui spe-
ctaculum præbet. In ea enim tanquam in ar-
ce oppugnari solet: cum neque ignem timeat,
nisi

Blondus
apud
Gefne-
rum.

Ufus in
Cibis.

Bruger.
de re ci-
bar. l. 13.
c. 26.
Galen. de
viâtu at-
ten. c. 8.
Ufus in
Medica-
mentis.

Differen-
tiæ.

Scalig.
Exerc.
217.

nisi pars proxima ardeat : plærumque etiam acutas cuspides non fugiat, & perfodi potius sustineat, quàm in turbam canum descendere. Tandem verò descendere coacta, impetu quodam instar fulguris dejici solet, in numerosam canum cohortem, ut sagacissimos laniet, & à præstantioribus dilaceretur. Vulpium carnes nitidior vita damnavit. A Sarmatis tamen, Vandalis, & rusticis Gal-
lis seu elixæ seu assæ comeduntur, ut olim à Bœotis. Incolæ insulæ portus sanctæ Cru-
cis, aliquando crudas, aliquando parum fu-
mo induratas vorant. Brujerinus qui eas de-
gustavit, nescio quid virosi & agrestis habere scripsit. At Galenus, vim ei inesse carnibus leporinis similem, reliquit. *Cerebrum* infantibus sæpius exhibitum, à comitiali morbo eos præservat. *Lingua* in armilla gestata à lippitudine : arefacta, in collo contra albugineas suspenditur. *Pulmo* phthisicis commendatur : suspiriosis à Dioscoride, lienosis à Sexto propinatur. *Iecur* in jecoris affectibus præscribitur. *Fel* cum melle mixtum, oculorum caliginem delet : & in pectore, ad masculorum conceptionem, inditur. *Renes*, cum pinguedine, gonagræ opitulantur : iisdemque ad faucium tumores dissolvendos guttur perfricatur. *Testiculus* ad juvandum congressum & conceptionem in electuariis exhibetur. *Genitale* osseum oleo & bitumine imbutum, tanquam pessus, ad provocandos menses supponitur. *Pudendis* vulpis fœminæ in cephalaria caput circumdatur. *Sanguis* recens calculosis exhibetur, eodemque pudenda illinuntur. *Pinguedo* liquata & auribus instillata, affectiones earundem inveteratas tollit : nervorum morbis magno est adminiculo : Unguentum ad calculum ingreditur : in alopecia mirandum in modum valet. Eodem pedes & manus à frigore præservat, dum modo sæpius antequam intumescant inungantur. *Stercus*, cum sinapi mixtum, Plinius, in ulceribus capitis adhibet : Rhasis cum oleo rosaceo mixto virgam inungit, atque hoc modo venerem sopitam excitat. *Pellem*, Galenus in capillorum affectu, Sextus in Podagra, dum calceos ex ea parari jubet, utitur. Ischiadicos ab ea juvari campertum est. *Caudæ* summa pars brachio illius suspenditur, qui ad venerem iners est. Ex tota vulpe, oleum ad omnes arthritidis species valde efficax, paratur. Pellem in vestitu usurpari, notissimum : nigræ imprimis, quæ aliquando quindecim aureis vœnit. *Differentiæ* Vulpium, à magnitudine, colore & more sumuntur. *Magnitudinem* si spectes, Odonus minores in Ægypto quàm Græcia reperiri scribit. In Peruana quoque sunt pusillæ, teterrimi odoris, adeo ut si urinâ aliquid sædaverint, fætor nunquam ablui possit. Quantum ad *Colorem*, dantur in sylvis septentrionalibus nigræ, candidæ, rutilæ, crucigeræ, & isatides. Visæ nigræ, quæ ab

aliquibus albis pilis, quodam ordine digestis exornantur. Ruffescentium duas species. Vna quæ guttur in albo nigricans, veluti carbonum pulvere conspersum exhibet. Altera, candidum, quæ species tanquam rarior in Germania magnifit. *Albarum* major in Suecia & Norvegia copia : sed maxima circa Novem Zemblam, quæ sole sub horizon-
tem demerso emergebant ; emerso, occultabantur, quæque Hollandis ibidem vi frigoris constrictis, cuniculi carnes sapere videbantur. In *Crucigera* ab ore per caput, tergum, & caudam, recta nigri coloris linea protrahitur, deinde alia transversa per artus ad pedes, anteriores ducitur, quæ duæ lineæ crucis figuram exprimunt. *Morem* si attendas, Ælianus in Caspiis regionibus vulpes esse scribit, quæ & urbes innoxie ingrediuntur, & incolis tanquam caniculæ inserviunt.

Ælian.
H. A.
l. 7. c. 30.

A R T I C U L U S II.

De Vulpibus Indicis.

Vulpium Indicarum varia sunt genera, variisque ab iisdem nominibus insigniuntur, *Cojotl*, *Cuit lax cojotl*, *Azcacojotl*, *Ilpemaxtla*, *Oztoa*, & *Izquiepotl*. *Cojotl* animal est lupino capite, oculis vividis, magnis ac pallentibus, parvis & acutis auriculis ; rostro nigro, longo, nec admodum crasso ; Cruribus nervosis, & uncis ; Crassis ungibus ; cauda hispidâ crassâque ; noxio morfu ; fusco, longo, candidoque pilo. Magnitudine est inter lupum & vulpem mediâ. Frequens est in nova Hispaniâ, locis imprimis frigus & rigorem declinantibus. Viçtitat imbecilliorum animalium præda, maizio, & arundinibus saccharinis. Invadit aliquando & cervos & homines. Sagax est venatui, & vulpinis moribus, atque adeo injuria illatæ ultor, & ereptæ aliquando sibi prædæ memor, ut post dies aliquot agnoscat raptorem, insectetur obvium, & interdum etiam aliis sui generis comitantibus, adoriatur, & trucidet ; cognitisque magno studio & cura ædibus, ac interemtis quibusvis domesticis animalibus, ulciscatur injurias, & poenas sumat. Erga beneficos verò est tam gratus, ut allatis ante eum cohortalibus, & cæteræ prædæ parte, benevolentiam plærumque testari soleat. Fertur dolorem dentium pene ejus expurgatorum subito sedari. *Cuitlaxcojotl* iisdem quoque præditus est moribus, & forma etiam esset eadem, nisi Cuetlaztli pilo similis videretur, unde nomen accepit : collo crasso, & impensè hirsuto, pectorisque & faciei pilorum longiorum acervo terrificus. *Azcacojotl* formicarum cavernis insidit. Cum noctu ululat, multiformes edit clamores. *Ilpemaxtla*, candido, nigro, & fulvo pilo vestitur. Capite est parvo, articulis modicis,

Nierem.
H. Exot.
l. 9. c. 10.

corpore gracili, ac quatuor ferè dodrantes longo, rostroque prolixo & tenui. Offenditur ubique, sed præcipuè calidis in locis. *Oz-toa* genus est vulpis forma & magnitudine nostri simile. Tres dodrantes vix superat, nigro candidoque vestita pilo, sed quibusdam partibus fulvo. Incolit foveas. Alitur cohortalibus. In terræ cavitatibus occultè educat sobolem. Atrociter mordet. Cum aliter manus venatoris effugere nequit, simulat se mortuam. In cibi ibidem usum venit, quamvis crepitus ventris incolis sit fætidissimus. *Izquipotl* maizium tostum colore imitatur. Duos est ferè dodrantes longa humilisque, rostro tenui, parvis auriculis, piloso & nigro corpore, ac præcipuè juxta caudam, quæ longa est, & nigro candidoque pilo, quemadmodum & dorsum universum vestita. Brevibus cruribus, nigrisque, & uncis ungibus. Vivit in antris inter saxa ubi educat prolem. Vescitur scarabeis, & vermiculis, cohortales jugulat, solumque earum devorat capita. Fundit, cum pedit, halitum fætidissimum. De urina superius diximus. In extremo constituta periculo, reddita urina, aut fæcibus dejectis, ad octo pluriumve passuum intervallum (tanta vis est excrementi) sese ab omni vindicat injuria, ac vestes inficit indelebilibus luteisque maculis, & nunquam satis perspirante putore. Editur ejus caro sterminusve, saluberrimo eventu, ab iis qui lue Hispanica laborant. Sunt & alia duo vulpeculæ hujus genera, eadem penè forma & natura, quorum alterum *Izquipatl* vocatum fasciis multis candentibus distinguitur: alterum verò *Conepatl* seu vulpecula puerilis, unica tantum utrimque ducta, perque caudam ipsam eodem modo delata. *Bachira* quoque dicuntur animalia vulpibus similia. Rotundiora sunt & jucundæ carnis. *Anna* etiam appellantur ab Indis, animalia illa fele domestico minora, pestilentis odoris, quæ oppida noctu adeunt: Fætor illa prodit, etiamsi distent centum passus; nec fores, nec fenestra clausa obstant.

ARTICULUS III.

De quibusdam vulpi congeneribus.

PUNCTUM I.

De *Carygueja* & *Tajibi*.

Marc-grav. Hist. Bras. l. 6. c. 2.
QUINQUE inprimis in Brasilia invenio animalia, quæ vulpibus cognata esse videntur, *Carygueja nempe*, *Tajibi*, *Tamandua guacu*, *Tamanduani*, & *Coati*. *Carygueja* aliis *Jupatiima*, *Lerio Sarigoy*, *Ximeni Tlaquatzin* dicitur. Animal est ex descriptione *Marcgravii*, catuli seu mediocris felis magnitudine: *Caput* vulpinum habet. Ore acuminato, estque inferior pars oris paulò brevior superiore: linguam longam, quam

tamen os aperiens & morsum minitans non exerit, quamvis posset, sed versus posteriora attollit: *Dentes* instar felis seu vulpis, antè nimirum, tam superius quàm inferius parvulos, hinc quatuor longos caninos, superioris quidem longiores, inferiores breviores, hinc iterum sex alios, & de in molares: nimirum, sedecem molares, duodecim intermedios, quatuor caninos, & incisores parvulos, in inferiore mandibula octo, in superiore decem: nam duos majusculos in medio habet more leporis. *Nares* habet patentes, *Oculos* pulchros rotundos, nigras: *aurès* pro more corporis amplas, longas, latas, vulpinas, quas erectas gerit, sed constant tenui membrana glabra, translucente, cui fuscè aliquid admixtum. *Barbam* habet felinam pilis nigris, sub mento autem sunt brevès, in superiore parte oris longiores, supra oculos aliqui, & itidem in utraque genà. *Caput* tres digitos aut paulò plus longum: aurium quælibet duos digitos longa, sesquifèrè lata. *Collum* breve nec supra digitum longum: reliquum corpus septem digitos, usque ad caudæ exortum: *Cauda* pedem longam quam curvatum gestat, nam ea se arborum ramis more simiæ appendit. *Pectus* latiusculum. *Crura* duo anteriora breviora, nimirum quodlibet tres digitos longum, posteriora paulò plus quatuor. *Pedes* anteriores digitis quinque instar manus constant, ungibus albis, instar avium curris: posteriores longiores, ut in cercopithecis esse solet, item quinque digitis ut manus. *Pilis* vestitur longis, sed qui in capite, collo, infimo ventre & cruribus breviores: pili autem capitis, colli inferius, & caudæ inferius propè exortum sunt flavi: secundum longitudinem autem capitis per oculos & medium capitis, tendit ampla nigra stria; collo superius etiam nigri pili admiscuntur. Per totum autem dorsum, latera & caudam, superius propè exortum, maximam partem nigra est, sed luecophæis pilis admixtis. Cauda ab exortu suo tantum ad quatuor digitos pilola est, reliqua parte nuda, ubi cute vestitur, ad quatuor digitos nigra, quatuor digitos ultra albicante, fusco colore intermixto. Rotunda est, & sensim attenuatur. Mas foeminæ per omnia similis. In infimo ventre propè crura posteriora, pellis ejus dupla est, & exterior rima scissa duos & semis digitos longa, facitque quasi bursam, pomi aurantii majoris capacem. Est autem hæc bursa intus pilosa, & continet mammas in interiore pelle ad ventrem, octo papillis: bursæ autem os arctè clauditur, ut non appareat, nisi duobus digitis distendatur. Hæc bursa ipse uterus animalis est, nam alium non habet, uti ex sectione illius, inquit *Marcgravius* comperi: in hac semen concipitur, & catuli formantur: & hæc ipsa, quam describo, bestia sex catulos vivos & omnibus membris absolutos, sed

sed sine pilis in hac burfa habebat, qui etiam hinc inde movebantur; quilibet catulus, duos digitos erat longus: in ea tandiu retinentur, donec ipsi sibi victum quærere possunt: inter ea tamen interdum progrediuntur foras, & iterum ingrediuntur. *Testes* sub ano habebat interius jacentes. Pellis ejus facile detrahi potest, ut vulpinâ aut leporinâ, modò in ventre incidatur. Fætet animal instar vulpis aut Martis. Mordax est. Vescitur libenter gallinis, quas rapit ut vulpes, & arbores scandendo avibus insidiatur. Vescitur quoque faccari canis, quibus sustentavi per quatuor septimanas in cubiculo meo; tandem funi cui alligatum erat se implicans, ex compressione obiit. Tantum Marcgravius. Invenitur in Dariene Brasiliâ, & Floridâ, & nova Hispania. Videtur quidem ei Ximenis Tlaquatzin descriptio competere: quin Nierembergii Cerigonam Brasiliensibus vocari scribit: icon tamen, quam Nierembergii exhibuit, ab icone Marcgravii planè differt, ut ex collatione unicuique apparere potest. Sed nec Ambrosini Vulpisimâ, vel Simivulphâ, si iconem spectes, similis est. Ideò in mustellarum numero reposuimus iconem hic adjectâ. Vt ut sit, cauda hujus animalis, magni est in Medicina usus. Drachmæ pondere ex aqua vicibus aliquot jejunis hausta, mundat ureteres, calculos expellit, venerem excitat, lac generat, colicis doloribus medetur, parientibus prodest, partum accelerat; & si masticatam imponas partibus quibus spinæ infixæ, extrahit illas. *Tai-Ibi*, quod Lusitani *Cachorro do mato* appellant, animal est corpore tereti & oblongo. Vestitur pilis albis splendentibus, qui in extremitatibus nigricant. Caput habet vulpino æmulum, ore acuto, barba felinâ: oculos conspicuos & prominentes, nigros: aures subrotundas, molles, graciles, albas, teneras, ut charta mollis. Cauda in exortu ad quinque digitorum longitudinem pilis vestitur albis, in extremitate nigricantibus: reliqua pars major ad finem usque, corio tenui, squamoso, albicante, instar exuviarum serpentis cincta est. Caro graviter fætet: comeditur tamen. Pili tenui cuticulæ inserti sunt, quæ salvo corio crassiore detrahi potest.

P U N C T U M II.

De Tamandua-gvatu, Tamandua-i, & Coati.

Tamandua-gvatu animal est canis lanionum magnitudine, (Abbevillanus mollem equi attribuit) capite tereti, promuscide longissima, ore acuminato edentulo, lingua tereti, viginti quinque aut septem digitorum, imò duos pedes & semis subulæ instar, longa, quam in ore duplicatam gerit.

Oculos habet parvos, nigros. Aures subrotundas: caudam instar muscarii hirtam, setis equinis constantem, unius fermè pedis latitudine, qua diducta se totum potest tegere: crurâ teretia. Pedes anteriores quatuor habent ungues recurvos; duor in medio maximos, duos & semis digitos longos, & ad utrumque latus minores: volam pedis rotundam. Pili capitis & colli breviores & antrosum versi: anteriora albis vestiuntur: ad tactum omnes aridi sunt. Tardum est in currendo animal: & formicis vescitur. Tandiu enim illarum tumultu linguam imponit; donec ab iisdem obsideatur. *Tamandua-i* est vulpeculæ Americanæ magnitudine. Caput habet acuminatum, rotundum, conum acutum repræsentans, paulum infra incurvatum: os nigrum, augustissimum, edentulum: oculos parvos, nigros: aures erectas, unum circiter digitum longas. Pilos totius corporis duos, splendentes, & ex albo flavescentes. Linguam instar subulæ teretem, octo digitos longam, quæ quasi canali inter inferiores genas incumbit. In prioribus pedibus quatuor ungues incurvos. Ferox est animal, sed mordere non potest. Baculo tactum posterioribus pedibus insidet ut ursus. Totâ die dormit, capite sub collo & anterioribus cruribus abscondito; noctu vagatur. Quando bibit, pars per nares iterum exsilit. Quum mactarem hoc animal, inquit Marcgravius, maximam partem excoriatum adhuc vivebat, quamvis octiduum in ediam tolerasset. In rene sinistro superius processum triangularem inveni, per duplicem tenuem membranam reni adnexum: in intestinis multos teretes lumbricos: valvulas cordis insignes: vesicam fellis magnam. Corium est crassum: Caro vulpinam olet, & non comeditur. *Coati* est Brasiliensium vulpes, magnitudine felis, cruribus & manibus brevibus Cercopithecorum. Caput habet acuminatum, vulpinum: aures subrotundas & breves. Oris partem inferiorem superiore brevior: promuscidem longam & acuminatam: nares amplas quasi fissuras: oculos nigros: caudam suo toto corpore longiorem, quam superius erectam gestat & incurvatam, cujus pali annulatim variegati cum umbra & ochra. Quando comedit, anterioribus pedibus, tenet cibum. Arbores velociter conscendit ad ramorum extremitates. Habui aliquando ejusmodi animal cicuratum, inquit De Laet, & valdè domesticum & mihi amicum, ita ut ad os meum eniteretur, & ex illo cibum caperet: sed cum caudam suam prærodere cœpisset, non potuit ab ea abstinere, ita ut illam tandem penè totam consumeret, & moretetur.

Marc.
H. B. l. e.

Merc.
Hist. B.
l. 6. c. 6.

C A.

CAPUT II.

De Simia.

Nomen.

Anglic.
de re...
proprie.Descri-
ptio.Aristot.
H. A.
l. 2. c. 8.Galenus
Comm.
3. supra
Hippocr.
de articu-
lis.Galen. de
usu part.
l. 16. c. 6.Vesal. de
fabrica
corpor.
humani.

Simia seu Simius, vel à depressis & simis
naribus, (σιμὸς Græca vox est) vel quasi
mima, quòd faciliè hominem imitetur, La-
tinis dicitur: Festus *Clunas* appellavit. Bar-
tholomæus Anglicus quasi Simeas, id est,
hominibus similes dici voluit. Apud Græ-
cos vocatur *πίθηξ*, *πίθηκος*, *πίθηον*, *παρὰ τὸ πείθεσθαι*,
quod facile ad humanarum actionum i-
mitationem persuadeatur, *ἡμιμῶ*, quasi ge-
sticulator; *ἀριμῶ*, veteri Hetruscorum lin-
gua, *βέτης*, quòd faciliè arbores scandat;
καλλίαν Laconibus, Gyraldus *καλλέαν* vocari
observavit. Tam pronâ corporis parte
pilosa est, quàm supina. Pilo crassiore ve-
stitur. *Nares*, aures, dentes, tam primores
quàm maxillares, hominis more habet. *Ci-
lium* in utraque palpebra prætenue & proli-
xius, inferiore imprimis. In *pectore* binas
mammarum papillas; & brachia hominis
modo sed hirtiuscula, quæ & ipsa & pedes
ut homo inflectit. Manus, digitos, ungues,
hominis similia, etsi rudiora, efferatioraque.
Pedes ipsi sui generis, sunt enim velut manus
majusculæ, & digitis ut manus constant,
medio longiore. Vestigium etiam manui si-
mile est, nisi quòd in longum se porrigat, &
volam referens tendat ad postrema. Callosi-
us hoc sui parte extremâ est, & calcem ineptè
atque exiliter imitatur. *Lacertos* habet & fe-
mora proportionem cubitorum & tibiæ
brevia. *Umbilici* loco qui eminere solet, du-
rum quid. Partem corporis superiorem mul-
to majorem quàm inferiorem. Carent nati-
bus utpote quadrupedes, caudâ utpote bi-
pedes. *Internas partes* si spectamus, *Cor* ha-
bet pyramidale: quamvis cujusdam cum
duobus acuminibus repertum sit. Venæ &
arteriæ per brachia perinde ac in homine
distribuantur. Vena, quæ in dextram cor-
dis aurem fertur, moxque in ejus sinum dex-
trum penetrat, in iis supra aurem cordis sita
est. Quæ à cava propagantur, & in renes in-
feruntur, amplissimæ sunt, post deferun-
tur ad testes. Musculi temporales sunt exiles
& debiles. Auris substantia immobilis. Car-
nosi, qui nates integrare solent, ridiculi
sunt. Etsi verò in multis partibus homini assi-
miletur: in multis tamen quoque differre
certum est: nempe, musculis thoracis &
brachia moventibus; in iis quia cubitum &
femur agunt; in manus internâ structura; in
musculis digitos pedis moventibus; in ten-
dine pedi sublati; in colo, mesenterio, &
pulmonis quinto lobo venam sustinente. Sed
& in ossibus ab humano sceletio discrepat. Ad
lumbos enim sex vertebræ conspiciuntur:
humeri articulus plurimum est à thorace ab-
ductus: Crura non recta ad spinam tendunt,
ideo dum bipes incedit, claudicat. *Pedes* ha-

bet concavos, & digitos valdè fissos. Plura
apud Aquapendentem occurrunt. In plaga
Orientali, & aliis calidiori cœlo subjectis na-
scuntur. In Lybia, Mauritania, parte Cauca-
si montis quæ in mare rubrum porrigitur, re-
gno Basman, & cæteris. Omne latifundium,
quod inter Ægyptum, Æthiopiam, &
Lybiam diffunditur, omni simiarum gene-
re repletum est. In Indiæ montibus, tanta
earum copia, ut sæpè Alexandri exercitui
terrorem incusserint. In regno Basman, cap-
tæ, & macatæ, excepto mento depilantur,
& aromatibus conditæ exsiccantur, merca-
toribusque venduntur, qui aliò translatos
pro homunculis marinis venditant. Monta-
nis tamen potius quàm planis delectantur.
Ideò montes Enisæ, prodente Leone, fre-
quentant. Herbis & tritico delectantur, i-
deò ad maturas spicas magno comitatu ince-
dunt. Pediculos quoque humanos, vermes
& araneos vorant. Inter fructus pomis &
nucibus potissimum fruuntur: at reperto in
iis amaro cortice, totum abjiciunt: sed &
carnium sagina delectantur, à quarum esu
pilos deponunt. Vinum etiam bibunt. De
Generatione pauca occurrunt. Natalis Co-
mes circa æquinoctium vernum commif-
ceri, & circa solstitium æstivum duos ca-
tulos parere prodidit. Ælianus quoque
binorum fætuum meminit, quorum unus
charior ulnis gestetur, alter contemptus
penes matrem inambulet. Solent tamen
quando in urbes ducuntur, in sexum mu-
liebrem furere. Amicitiam gerit cum cornice
& cuniculis: cum gallo, testudine, torpe-
dine, & limacibus dissidet. Cornix, sedulo
ipsius speciem admiratur. Cuniculos ali-
quando in Anglia, apud virum nobilem,
contra mustelas defendit. Ob antipathiam
matricidæ culeo insuto, gallus simia & vi-
pera addebantur, ut simia gallum perseque-
retur, vipera gallum fugiens, in hominem
sæviret. Testudinem in capite pueri conspi-
cata Romæ quædam, ita exhorruit, ut præ-
timore, alvi & vesicæ excrementa redderet.
Si limacum corona eidem circumponatur,
nec eas comprimere, nec attingere audet.
Laborat hernia, propter omentum ponde-
rosam, morbo comitali, atrophia, inflam-
matione hepatis, splenis, vesicæ &c. Gale-
nus valdè emaciatam disseuit, & cæteris
partibus illæsis in pericardio tumorem præ-
ter naturam invenit, qui humorem qualem
hydatides emittere solent, continebat. De
morsu nihil dico. Virosum esse tradunt, &
Avicennas, emplastrum excinere cum mel-
le & amygdalis amaris imponit. Naturam,
mores & ingenium quod spectat, in maxil-
larum cavitatibus cibaria condunt, indeque
sensum ad mandendum manibus expro-
munt. Adeò petulantes sunt, ut & leones,
illorum clunibus affixæ, exagitent. Injuriam
diu meminisse prodidit Albertus; facile obli-
visci,

Aqua-
pend. de
sensib.
l. 2. c. 8.
Locus.Leo A-
frica. l. 3.
Cibus.Genera-
tio.Ambros.
Histor.
Digit.
l. 2. c. 5.Porta
Physiog.
l. 7. c. 8.Galen. de
l. aff. l. 5.
c. 2.Natura
& In-
genium.

vîsci, alii. Mansuefactæ catulos suos omnibus ostendunt. In nœomenia exultant, in interlunio summâ tristitiâ afficiuntur. Statim atque per tactum, aut mortem, aut morbum putridum deprehenderint, inusitato narium strepitu personant. Ideò Crollius credit, Medicos sphygmicam ab hoc animali edoctos. Aliquando transverso lare facilius gradiuntur. Inventæ quæ aurigæ munus obibant: latrunculis cera effictis ludebant. Fuit quædam, quæ cum infantem à nutrice lavari & fasciis involvi videret; absente, eundem nudatum in ferventem aquam abluendi gratia imposuit, & interfecit. Quæ Pareus de simia in ædibus Ducis Somei habet, vide apud Ambrosinum. Dum quæ venatores facere vident, imitantur; faciliè capiuntur. Nunquam ita mansuescunt, quin faciliè fiant rabidæ. Delectantur, quidem puerorum & canum lusu; sed non custoditos strangulant, vel ab alto præcipitant. Vino inebriantur. Zabeces & Zygentes Africæ populi, iis vescuntur, ut Herodotus prodidit. Carnem frigidam & austeram Rhæsis iudicavit. Cor assum & cum melicrato coctum memoriam acuit: quod Porta signaturæ adscribit. Quantum ad *Differentias*, forma, colore, jubis & magnitudine discrepant. Aristoteles in Caudatas, sine cauda, & canicipites dispecit, quod & Oppianus sequitur. Plinius, coloris albi apud Orseos in India vagari asseveranter scribit. Marcus Polus, quasdam erectas incedere, humano more; prodit. Huc pertinent *Orang-outang* Indorum, ex Angola delatus, & Frederico Henrico Arausionensium Principi donatus, quem Tulpius, *Hominem sylvestrem*, vocat. Erat quadrupes, longitudine pueri trimi, crassitie sexennis. Corpore nec obeso, nec gracili, sed quadrato: habilissimo tamen ac perniciosissimo. Artubus tam strictis, & musculis adeò vastis, ut quidvis auderet & posset. Anterioribus glaber: at ponè hirsutus ac nigris crinibus obsitus. Facies mentiebatur hominem: sed nares simæ & aduncæ rugosam & edentulam anum. Aures verò nihil discrepare ab humana formâ. Vti nec pectus, quod ornatum utrimque mamma prætumida (erat enim sexus foeminei.) Venter habebat umbilicum profundior: & artus cum superiores tum inferiores, tam exactam cum homine similitudinem, ut vix ovum ovo videris similis. Nec cubito defuit requisita commissura, nec manibus digitorum ordo: nedum pollicis figura humana, vel cruribus suræ, vel pedi calsis fulcrum. Incedebat multoties erectus, nec minus gravatè attollebat, quàm transferebat, quaecunque gravissimi oneris pondus. Bibiturus prehendebat canthari ansam manu altera; alteram verò vasis fundo supponens, abstergebat madorem labiis relictum. Cubitum iturus in-

clinans caput in pulvinar, corpus stragulis firmiter operiebat. Tantam habere animi confidentiam Rex Sambacensis retulit, ut non semel in viros armatos impetum faciat. Foeminarum tam ardenti flagrant desiderio, ut sæpe raptas constuprent. In Guinea scribit P. Jarricus, esse quasdam, quæ instar famuli in pila tundunt quæcunque in ea imponuntur, quæ aquam à fluviis in hydriis capite domum deferunt, ita tamen, ut ubi primum domus fores attigerint, illico hydriis exonerandæ sint, alioqui eas excidere, casuque isto frangi. Dicuntur *Baris*. Torosi sunt & robusti. In India meruit etiam quædam simia alba divinos titulos. Reliquias Zeilan servavit, dentem duntaxat. Præda tandem, inquit Nierembergius, fuit, Constantini Proregis Lusitani, cum barbari Principis thesauros cepisset, inter quos & dens ille fuit. Tantâ summorum Regum reverentiâ & divinitatis opinione, habebatur, ut singulis annis à Pegu mitterentur legati, magnis onusti donariis & muneribus, ut solum permitterentur, in argillâ quadam aromaticâ, quam in auro custodiebant, imprimere sigillum ejus, ut absentiam tanti pignoris divini, ejusdem adoratione vel solum per umbram solarentur. Deinde conscius Rex Pegu captum à Lusitanis sacramentum suum, misit ad Constantinum legatos, onustâ navi mercibus, & auri cruciatistrecentum millibus pro redemptionis precio. Plærique Lusitani donandum censuere, exactâ majori summa: usque ad millionem expectabant. Et quidem Rex ille plus dedisset: at noster Rex, in angustia ærarii, prætulit lucro pietatem, atque ut omnibus constaret, publico confessu iussit dentem afferri, agnosci, extrahi, è locupletissima theca, gemmis & auro exornata: deinde manu sua in æreum mortarium jactit, tundi jubet usque ad pulvisculum: mox pulverem in ignes ad hoc præparatos dissipat, ut in fumum evanuerit.

C A P U T III.

De Cercopitheco.

Cercopithecus caudatûm simiarum genus est. Unde nomen sortitur. Græcis eodem vocabulo venit *κίρκου* caudam, *πίθηκος* simiam significat. Dicitur & *πῆπιος*, quod vocabulum alii *κῆβος*, *κῆβλος* & *κῆτος* efferunt. Non desunt qui à voce Græca *κῆτος* levis vocari putent, quòd hoc animal ob miram levitatem, in diversas partes saliat. Albertus Mamone-tum vocat, Itali Spingam, Celtæ *δελφίνας*. De Descriptione dum in genere de eo agimus, non est quòd simus solliciti: in specie de iis acturi, singulas describemus. Genitalia nobis delineavit Aurelius. Inveniuntur

Nierem:
H. E. l.
9. c. 45:

Nierem:
H. E. l.
9. c. 46:

Nomen.
Ambro-
sin. de Di-
git. l. 2. c.
6.

Descri-
ptio.

Locut.

Strabo
Geogr.
l. 15.

in Æthiopia, & quidem, si Plinium attendimus, nigris capitibus pilo asinino: in sylvestribus Javæ, & regni Congo; in India supra Emodos montes, quod Strabo scripsit: in monte editissimo, urbi Aden Arabiæ, vicino: in omnibus denique continentis Indiæ locis. In Malabar vilissimo precio venduntur, quod nuci Indicæ, à qua ad incolas magnum commodum, infesti sint. Censentur esse inter *πυμφάγας*; sed quando desiderio carnis premuntur, propriam caudam arrodere solent. Crocodilos adeò acerbo odio prosequuntur, ut pelle ipsorum visa ferè exanimentur. In Orientali India, quæ Lusitanis subest non tantum comeduntur, sed & in morbis, tanquam saluberrimi exhibentur. In deliciis propter mimicos gestus haberi, notum. Ossâ tusa & hausta dolores Gallicos, evocato sudore levant. De *Ingenio & Moribus* ipsorum ita eleganter *Nierembergius* scripsit. Omnes, inquit, penè filiorum charitate insignes sunt, amplexu graves. Vescuntur fructibus arborum & ovis avium. Ebibunt plures lotium & sordes suas. Nonnunquam videntes hominem solum, descendunt ad ludendum cum eo. Omnes sunt astu industrii. Mirificum est, arborum stipites, quas conscenderunt, in viatores torquere & jaculari, transilire flumina caudis invicem apprehensis, & ab arboribus fluvii vicinis vibratas, tamdiu, donec extremus oppositæ trans amnem arboris ramum abripiat: quo affixò arbori, catena simionem utrimque protenditur. Deinde cum is qui in alterâ parte hæsit, tutò se affixit, vociferatur, signum jam notum ipsis, quo audito, alter extremus se solvit; ita omnes transmittuntur. Super omnia sagitta aliove telo confossi, vicissim quantam possunt, ne dicam quantum solent homines hominibus, opem ferunt, ad motisque foliis muscove arborum vulnere, sanguinem confluentem callent sistere, atque ita vitam, si fieri possit, tueri. Educunt filios, singulos pariunt, circumferunt, amplexu tenaci adhætescentes mirâ pietate & amore erga prolem, atque id juxta montium verrucas, & summa cacumina, ubi venatores pyram construunt maizio circumdatam, adjecto lapide cacalotetl sive corvino, cujus est natura, si igne calefactus fuerit, tonitru edere, atque dissilire. Accurrunt cercopithecî, juxta incubant, edentes sparsum cacacoatl: sed terrente eos subito in illos emissolapide, obliti filiorum, ac velut expertes luminis, aufugiunt, deferentes sobolem charissimam venatoribus prædam. Deportant quoque in tergoribus prolem, donec commode jam sibi possit providere. Complectitur filiolus matrem manibus per collum, pedibusque per spinam. Magna aliquibus pernitas: ferè volucrum ritu occupant arbores, transvolantque ab una in aliam. Visus est qui transcenderit uno impe-

Nierem.
H. E.
l. 9. c. 44.

tu fluvium. Plura de calliditate dixi alibi, pauca adhuc hîc appendam, & diversa. Simiarum duces, quando agmen aliquod nostrum transire sentiunt (nec enim pauci, ne dicam soli, auderent) plebejâ multitudine variarum specierum convocatâ, procurrunt obviam, & clamoribus horrendis ex arbore in arborem transilientes, nostros, quacunque gradiuntur, infecutæ, mille scurrilitatibus & gestibus mille derident; caudatæ præsertim, finguntque sæpius velle turmatim nostros impetere; sed ubi, ad arborum jam truncos demissæ, vident sagittas & sclopetas, quas expertæ sunt aliquando, aptari, ac in se dirigi, vento velocius ad arborum culmina resultant, ibi conquestibus rabidis emissis, dentibus frendent minabundæ. Tantam esse illarum dexteritatem inquirunt, ut discussas in sua corpora sagittas evitare sciant; & manu prehendere, ac si sponte porrectas acciperint: sclopetarum tamen globulos non ita disjicere didicerunt, quibus multas juniores, fortè non ita sagaces, nostri extinxere. Quando sociam vident aliquam de suo grege præcipitem ruere vulneratam, à nostrisque tolli è terra, tanto fremitu ac strepitu tonant & replent æthera, ut mille leonum rugitus & tigridum totidem superent runcatus. Sed unum est auditu gratissimum. Quæque simia, quando jam captant arbores ascensu suo, lapides quotquot unâ manu gestare potest, ore etiam aliquot supportat; indeque lapidibus certant in transeuntes, quando aut sagittas, aut sclopetas in eas jaculari cessant nostri. In vetulam melampo majorem, caudatam simiam, sagittarius è nostris tetendit scorpionem: expectaturam se simulavit simia; sed ubi jam dirigi oculo clauso sagittam vidit, jaculato in sagittarium lapide, faciem acriter contudit, & dentes illi dicitur confregisse. De novo tamen stratagemate pœnas cercopithecus dedit: quo enim tempore lapis ad sagittarium decidebat, sagitta in simiam ascendebat. Interfectam comederunt indeliiciis. Comedisent & bufones, aut si quod deterius; tanta illos fames urgebat. Quod de occurso in milites fertur, occasionem puto dedisse priscis, ut simios aliquos vetusti orbis homines putarint ob simile stratagema. Hæc natalitia Cynocephalorum fabulis. Aliquando putavi & pygmæorum fortasse fuisse, adeò in pluribus simulant humanos actus. Illud mirum commercii quodammodo capaces esse. Johannes Ardenois scribit, magnam familiaritatem contrahere simios cum barbaris, pro argento cum illis ludere, deinde ex lucro parato invitare ad tabernam, & solvere pretium vini numerata pecunia. Fortasse major est calliditas quam ob oculato teste accepi. Aderat inter milites Havanæ, dum luderent simius: observabat illum qui plus lucraretur, hærebatque ejus lateri donec col-

colludium largiretur pro more. Si nolebat, pugnis simius cædebat; si donaret statim ad tabernam convolabat, & manu acceptum vas porrigebat vendenti vinum, ut sibi infunderet. Coronato calice tunc ebibebat, mox solvebat pretium, colludio tradito, & recedebat: quod si excederet pretium colludii, expectabat ut rursus venditor infunderet merum: quod bis aut ter repetebat pro valore argenti. Iosephus Acoſta alium narrat miſſum ad tabernam, non prius tradere ſolitum pecuniam; quam acciperet lagenam plenam, quam adverſus pueros tutabatur, fugans eos correptis per intervalla lapidibus: & quamvis vini avidus potoreſſet, illibatam tamen Domino referebat. Idem mulieribus fuco ornatis valde inſenſus, diſcerpebat crines & cultum. De *ferocia* illud admirandum, quod Petrus Martyr prodiſcit hac hiſtoria, animalia nutriti in arâ Cariai eadem, quæ jam diximus: ſed unum reperere naturæ longè diſſonæ, id eſt grandi cercopitheco par, cauda longiore procerioreque. Cauda ſuſpenſus, & robur, ter quaterve ſe devolvens, captando, ex ramo tranſiliit in ramum, & ex arbore ſeſe projecit in arborum, ac ſi volitaret. Arcuarius è noſtris unum ſagitta conſixit. Vulneratus ſeſe dejecit cercopithecus, hoſtem vulneratorem rabidus adoritur. Striſto enſe agit in pecus venator, lacertum cercopitheco abſcidit, cepitque mancum ferociter renitentem. Ad claſſem perductus, inter homines parumper manſuetudinem induit. Dum ſic ferreis vinctus catenis ſervatur, è littoribus adducunt aprum venatores alii (cogebat namque carnum deſiderium nemora perluiſtrare) cercopitheco aper, & ipſe ferox oſtenditur. Setas excutit uterque. In aprum cercopithecus ſubribundus ſalit, cauda circumligat aprum, cum ſervato à venatore victore ſuo lacerto, guttur apri prehendit, reſiſtantem ſuffocavit. Aſtuto etiam ſtratagemate ſuo uſum alium ſimio Hiſpali, quem volebant occidere: ille per domorum tecta fugax, vidit ſe à ſagittario peti. Deſcendit illico per fenestraſtā quandam, & caſu obvium infantem ab incunabulis corripiens, complexus eſt, iterumque ſe tectis reſtituens quoties ſagittarium videbat, objiciebat pro clypeo infantem. Conſcius erat, non emiſſurum ſagittam cum periculo innocentis. Tantum Nierembergii. *Differentiæ* Cercopithecorum ſunt variæ, ſeu magnitudinem, ſeu colorem, caudam, & alia ſpectes. Scribit Megaſthenes referente Æliano, in Præſiana Indorum regione vagari maximis canibus non inferiores, caudamque quinque cubitorum longam trahere. *Coloris* ratione, alii ſunt nigri; alii cinerei, cæſii, varii. Scaliſger aliquos nigros cum maculis albis; alios gilvos; alios furvos; alios fulvos obſervavit. Caudam alii longiorem, alii breviorē

habent. Cæterum optimè mihi in *Barbatos*, *Erectos*, *Leoninos*, *Moschatos* & *Ambiguos* diſtingui poſſe videntur. *Barbatorum* aliquot ſunt genera. Qui *Guariba* apud Braſilienſes dicitur, caprinam & rotundam habet. Ipſe magnitudine eſt vulpis noſtratis: facie elata, oculis nigris, ſplendentibus: auribus brevibus ſubrotundis: cauda longa & verſus extremitatem nuda, quam ſemper torquet; pilis totius corporis nigris, longis, & ſplendentibus. Maximo numero in ſylvis inveniuntur, ibique horribilem clamorem excitant. Singulis diebus, inquit *Marc-gravius*, ante & poſt meridiem ſemel atque iterum conveniunt. Unus eorum minor in medio & altiori loco reſidet, reliqui paulò inferius circumſident, tunc præcinit ſuperior alta voce & ſigno manu dato, reliqui omnes accinunt, tamdiu cantiones prorogantes, donec ſuperior iterum manu ſignum det, tunc omnes uno momento ſilent, & ſuperior grandi voce cantionem finit. Catulos ſuos in dorſo geſtant in ramis arborum diſcurrentes. Mordax animal, nec domari poteſt. Dantur & alii nigri ingentes, qui longam, nigram, & villoſam barbā habent. Nigritam mulierem ſi ſolam offendere, vi adactam ſtuprant. Quem Cluſius deſcripſit, hoc peculiare habebat, quod ejus ſatis longa cauda in floccum deſineret, leonum ritu. Guineenſis ille qui in Congo vocatur *Exquima*, pilos habet fuſcos, ſed per totum corpus quaſi aduſtos: fuſcis punctulatiſm albus inſpergitur. Barba, quæ egregiè alba, capillis duos digitos longis paſſis, & quaſi pexis conſtat. Iratus, os amplè diducit, & mandibulas celeriter movet. Ad hunc referri poteſt *alter* magnitudine par, qui in utraque gena, magnam copiam pilorum longorum ex albo flaveſcentium, inſtar magnæ barbæ hircinæ, utique & ad utramque aurem tenet. Crura & pedes nigri. Ludit & clamat ut alter. Ambroſinus trium icones exhibet. *Primum* Callitrichen eſſe putat, quem in alio cœlo, quàm Æthiopico, vivere poſſe negat. *Alter* quoque ipſi congener eſſe videtur. *Tertius* facie eſt ſenis, caudâ longiſſimā nigrā. *Erectum* nobis Geſnerus prodidit; facie, cruribus, & membro virili hominem æmulantem. Stando magis perſeſverat; ideò nomen dedimus: pueros & mulieres non ſecus amat ac homines ſuæ regionis; conaturque, ſi vincula effugerit, palam cum illis concumbere. Tantæ eſt indiſtriæ; ut aliqui homines, minus ingenio valere dicantur. *Leoninorum* aliquot ſunt ſpecies. Prima eſt illa, quæ Braſilienſibus *Cagvi*, Congenſibus *Pongi* dicitur: eſtque *major* & *minor*. Major obtinet magnitudinem Cercopitheci Cay, cui & aliquomodo ſimilis eſt. Facies illi rotunda, leonina; aures nigræ & pilis nudæ: os leoni-

Marc-grav. Hiſt. Nat. tur. Braſil. l. 6. c. 5.

Marc-grav. Hiſt. Braſil. l. 6. c. 5.

num: oculi nigri. Cauda unum pedem & quatuor digitis longa, & pilis ruffis vestita. *Major*, Leonem quoque facie refert; capite parvo, & vix pomum minus æquante; naso exiguo; oculis tenens: dentibus acutissimis; auribus subrotundis: cauda decem digitorum longa; ex albo quasi & fusco annulata. Velocissimus est in saliendo: & vescitur pane, farina Mandioca & aliis. Totum corpus longitudinis est sex digitorum. *Altera* est, quæ *Sagovin* dicitur, formâ, quantum ad collum, rostrum, anterioremque corporis partem, leoninæ similis: sed adeò delicata, ut navis in mari agitationem nullo modo ferre possit. Præterea, adeò superba, ut ob levissimam occasionem inediâ potius & cibi abstinentiâ, vitam finire cupiat, quam minimam molestiam perferre. Quem Nierembergius vidit & descripsit, à Roderico Lincio advectum, erat sciuro minor, & adeò delicatulus, ut villosa pelle fovendus esset. Rostrum & capitis pars anterior, leoninam quodammodo formam referebat; fuscoque colore, cui rubedo permixta erat prædita. Aures albicantibus villis erant hirsutæ; quibus ruber color etiam admixtus: guttur & pectus longioribus villis, partim fuscis, partim albis tecta habebat: reliqui pili per corpus sparsi nigri & albi, radiati à dorso ad ventrem alternis erant dispositi: Cauda etiam, quæ longa erat, similis coloris pilis alternatim erat tecta: venter nigris pilis tectus: Crura breviores albi pili quâdam rubedine infecti tegebant. Pedes in quinque digitos, non valdè longos fissi, albis unguibus erant præditi; fortasse nullus elegantior. *Moschatus*, Brasiliensibus *Caitaja* dicitur. Pilo est longiore ex albo flavescente. Capite subrotundo; fronte haud elatâ, aut penè nullâ, naso parvo & compresso, cauda acuta. Altissima voce clamat: & facilè ad iram commovetur. Memini me apud Generalem Wardenburgium ex Brasilia reducem Amstelodami vidisse. Est & alia hujus species pilo magis fusco, instar Zobellinorum. Ad *Ambiguos* spectant, *Macaquo* Congensium, *Cay* Brasiliensium, & *Guineensis* alius. *Macaquo*, colore est lupi: naribus bifidibus elatis; capite ursino; natibus calvis; cauda arcuata. Longitudo corporis à capite ad caudam, unius pedis & supra: Crassities ubi maxima, unius pedis & novem digitorum. Clamat, hah, haha. Penem habet humano similem. *Cay* apud Touvoupinam butios est frequentissimus, pusillus, & nigri coloris. Maxima ex parte in sylvis versatur, & potissimum peculiaribus arboribus insidere solet, ferentibus siliquas perinde crassas, ut nostræ majores fabæ, quarum fructu vescitur. *Guineensis* alius, pilo est ex umbragryseo, fuscae & flavo ex umbra admixto, ferè ut in dorso leporino: capite parvo, & cauda longa.

Nierem.
Hisor.
Exot. l. 9.
c. 44.

Marc-
grav. Hist.
Brasil. p.
227.

Marc-
grav. Hist.
Brasil. l.
6. c. 5.

Lerius
Hist. A-
merican.
c. 10.

CAPUT IV.

De Cynocephalo, Papione, &
ferâ Upalim.

Cynocephalus à canino capite nomen accepit, quasi *κυνος κεφαλή*, Gesnerus Tartarinum alicubi vocat, quod primum ex Tartaria hoc animal advectum sit. *Ælianus* *κυνόπροσωπον* dixit, quod faciem caninam habeat. Aristoteli fortè est *χοιροπιδνης*, seu simia porcaria. Ejusdem fermè formæ est cujus simia caudata: at in corporatura, crassior, validior, & magis efferatus, faciemque caninam à natura adeptus est. Strabo faciem Satyro similem ei tribuit. Fœminis sua natura excidit, ut palam expositam extra corpus vulvam, per omnem vitam ferant. Reperiuntur in Æthiopiæ partibus, si Solino fides, in regione Arabiæ à Dira usque ad Austri cornu, & præcipuè in ultimo promontorio, si Straboni. *Ælianus* montes supra Dachinabadem ipsis tribuit; Herodotus regionem quam Aratores in Lybia versus occidentem habitant. *Cibus* ipsis idem cum simiis. Fructus testaceos dum edunt, in volucra rejiciunt. Carnibus quoque & assis & elixis vescuntur: illis inprimis, quæ ad delicias in cùina paratæ sunt. Vini potionem non recusant. *Vox* iisdem rudis & varia. Aliquando acutum strident, aliquando ululant. Orus latrare dixit. Ad *Naturam* & *Mores* Cynocephalorum pertinet, quod facilè ad iram effunduntur: quod nunquam à petulantia sunt alieni, præterquam quod, teste Plinio, simiis sint efferatior: quod instinctu quodam naturali ducti, *Æliano* auctore, tempore æquinoctii, singulis horis diei ac noctis mingunt, & clamorem quendam edunt: quod denique mas in interlunio, nec comedit nec quopiam intuetur, sed faciem in terram dejicit: fœmina verò, etiam sanguinem è genitali emittit. Lunæ exorienti congratulari dicuntur. Ideò in sacris ab Ægyptiis nutriebantur, ut inde tempus Synodi luminarium scire possent. *Ingenio* quoque sunt singulari, & proximè post elephantinum ad humanum accedens. In Ægypto discunt ad quemlibet epistolas deferre. Observevit Bellonius qui nummos hero deferendos, manu protensa, à spectatoribus exigebant. Referri ad Cynocephalos potest, tum illud animal cujus Alvarez in Æthiopico itinere meminit; tum illud cujus Clusius. *Illud* vervecem magnitudine æquat, & instar leonis hirsutum est; gregatimque in monte secus locum Calote dictum incedit. *Hoc*, corpus villis longis cineracii coloris oblitum habebat, caudam cercopitheco brevior, rostrum longum, extima parte obtusum; nates glabros prorsusque depiles, & sanguineo colore refertas, ac si cutis ab illis detracta fuisset. *Pavio* Germanis *Pappon* ani-

Nomen.

Gesner. in
Appen-
dice qua-
drup.
Descri-
ptio.

Locus.

Cibus.

Vox.
Ælian.
H. A. l.
6. c. 48.

Ælian.
H. N. l.
6. c. 5.

Strabo
Geogr. l.
15. Bel-
lon. Ob-
serv. l. 2.
c. 52.

Ambro-
sin. Hist.
Digit. l.
2. c. 7.

animal est, ex descriptione Gesneri, magnum, hirsutum, horrendo capite, brevibus cruribus, cauda ferè vulpina, sed admodum brevi & plerumque erecta. Pedes sunt humanis similes, & proceritati corporis minimè respondentes. Tam est solitissimum animal, ut ad foeminarum conspectum effervescat. Vescitur pomis, pyris, & aliis arborum fructibus: aliquando panem & vinum pro potu appetunt. Foemina geminos marem nempe & foeminam unica pariturâ, ut plurimum eniti solet. *Fera Upalim* Cercopitheci æthiopici est magnitudine. Pellis quasi cocco tincta rubet, maculis aliquot in locis conspersa. Caput instar globi rotundum. Pedes rotundi & lati, nocuis unguibus vacui. Mauri carnem assulis veberatam ut tenerior evadat, comedere solent. Quibus cibariis delectetur, ignotum.

C A P U T V.

De Ignavo.

DUas Ignavi species nobis authores prodidere. Primam Lusitani *Pirillo ligero*, seu Caniculam agilem per antiphrasin vocant; aliquando *Priguiza*. Magnitudine est mediocris vulpis nostratis. *Collo* brevi, duos ad summum tres digitos longo: *Capite* parvo & subrotundo: *Oreturbinato* non amplo. *Dentes* habet instar agni, nec acutos; *nasum* glabrum, elatum, nigrum: *Oculos* parvos, nigros, somniculosos: *auriculas* nullas: *caudam* obtusam figura panis sacchari. *Ungues* in singulis pedibus tres, ex albo flavescetes & deorsum incurvatos; superius arcuatos, inferius excavatos. Totum corpus prolixis & duos digitos penè longis pilis est vestitum cinerei coloris, Taxi similibus, sed mollioribus & cum albedine mistis. Animal est ignavissimum, & tardissimi incessus, adeo ut cum in vivo cum admiratione Cl. de Laët, observavit. In arboribus lentissimè rependo progreditur, ibique habitat, foliis arborem vescens. Nunquam bibit. Vocem iiii rarissimè edit. Arctissimè quæ semel unguibus apprehendit, tenet. Pluviam etiam levum metuit. In dissecta foemella observatum, cor motum suum, corpore avulsum, per semihorium retinuisse: placentam uterinam constituisse multis particulis carneis, instar substantiæ renum, rubicundis, magnitudinis variæ instar fabarum: in quas per multos ramulos vasa umbilicalia inserta erant. Fætum, pilos, dentes, ungues habuisse. Cor foemellæ, inquit Marcgravius, duos insignes habebat auriculas, cavas. In ventriculo os superius duos digitos transversos à pyloro: eratque in altera parte ventriculi, ubi superius alias communiter os esse solet, processus instar intestini spithamæ longitudine, sed nullum exitum habens. In ventriculo planè viridis materia foliorum

arboris comestorum inveniebatur. Papillas duas in pectore. Corium solidissimum & tenax. Animal, addit idem, sine dubio vivax. Intestinis enim omnibus exemptis adhuc se movebat, & pedes contrahebat. Icon quam adjicimus, paulo longius collum exhibere, De Laëtius, qui vivum vidit, testatur. Addunt quidam tanta pertinacia adhærescere, ut, nisi mortuus non avellatur. Hernandus unius diei spacio vix quinquaginta passus pertransire posse dixit: Nocte duntaxat sonitum edere, posterioribus syllabis sensim magis ac magis gracilescentibus: & in arboribus viginti aliquando dies nullo cibo assumpto commorari: obtuso denique visu præditum esse, addidit. *Altera* species, quæ Lerio *Hay* dicitur, simiæ habet faciem, cutem hispidam & villosam, crura hirsuta, ternos in singulis pedibus acutos & oblongos ungues. Capta sine difficultate cicuratur.

C A P U T VI.

De Taxo.

TAXUS nullum proprium apud Græcos nomen habet. Latinis dicitur etiam *Daxus*, ut Alberto, fortè à Græco *δαῦς* hirsutus & villosus; *Meles* seu *Melis*; *Melus*, ut Bartholomæo Anglico; *Melo* & *Melotus*, ut Isidoro, seu propter membrorum rotunditatem su propter aliud quid. Est animal fele majus, & vulpe, ad cujus naturam accedit, humilior, pelle villosa, rigida, coloris luchophæi. *Pilos* plures habet albos quàm nigros. *Caput* in medio nigrum, in lateribus album: *Dorsum* latum: *dentes* acutissimos. *Crura* sinistri lateris ipsi quidam breviora assignant, sed experientiâ reclamante. Reperiuntur passim, in locis montanis Italiæ, Helvetiæ, & aliis. *Vicitant* crabronibus & vermiculis; pomis & uvis, quorum esu autumno potissimum pinguescunt. Cuniculorum tamen carne apprimè delectantur, tum anseribus, pullis & aliis avibus. Foetus more vulpium in utero gerunt, & cum luna ternos orbes compleverit, pariunt. Adventante autumno quandoque duos, interdum tres enituntur. Summa taxis cum vulpibus antipathia. Hi enim ubi egressos observavere, latibula eorum excrementis conspurcant, & foetore replent, ut alia exstruere cogantur. De *Natura* & *Moribus* habe, Pellem adeo densam gerere, ut ictui resistat: Nasum tam imbecilem, ut violato, moriatur. Ideo fortè Plinius, has bestias distenta & sufflata cute moribus canum & ictibus hominum reluctari scripsit. A canibus aut aliis feris vexatus semetipsum resupinat, atque dentibus & pedibus repugnat. Brevitatis pedum conscius non longè à latibulo digreditur. Urgente bruma occultatur, & somno pinguescit. Ad focum hyemè allatus, in carbonem se conjicit, ut Carolus Stephanus observavit.

Ambros. Hist. Digit. 1. 2. c. 8.

Ambros. Hist. Digit. 1. 9. c. 9.

Nie-remb. H. E. 1. 9. c. 15.

Marcgr. Hist. Brasil. p. 221. Clus. in Auctar. Exoticor.

Ambros. Hist. Digit. 1. 2. c. 11.

Descriptio.

Locat.

Cibus.

Generatio.

Antipathia.

Natura & Mores.

Plin. H. N. 1. 8. c. 28.

Olaus
Magnus
l. 18. c.
18.

vavit. Crescente lunâ adipem ejus augeri, decrecente minui, interlunio eâdem destitui, incertum. Morsus ejus exitialis, quod crabronibus & aliis venenatis victiter. *Ingenium* in quibusdam ostendunt. Dum latibula effingunt, ignavum effossæ terræ vectorem constituunt, & postquam supra fupinum extensis cruribus terram accumulavere, per pedes mordicus apprehensos, extra antrum educunt; idque toties repetunt, donec latebræ latitudo habitatoribus sufficere possit. Tantam palarum & foliorum prosternendo sibi lecto, unica vice, capite & pedibus intra foveam ducunt, quantum homo sub brachio deferre non posset. Latibula cum duobus ostiis fabricant. Flante Austro septentrionale aperiunt, flante Boreâ, australe. Victum pro hyeme colligunt; quâ durante, dum mäs an ad vernum tempus sit duraturus dubitat, ne foemina ad satietatem comedat prohibet. Quando in senio excœcantur, tunc ex fovea ad pastum non egrediuntur, sed se invicem nutriunt. Dum in eminentiori colle deprehensi venatores sentiunt, pedes anteriores supra capita ponunt, corporeque in globum redacto, more urforum, sese præcipitant. In Italia, Germania, & aliis regionibus, habentur Taxorum carnes in deliciis, inprimis si autumnô capti fuerint. Apud Helverios cum pyris coquuntur. *Savanorola* porco sylvestri assimilat; *Platina* carni hystricum. Quantum ad *Medicinam*, adeps taxi per clysterem infusus, dolores nephriticos mitigat; mammaram scissuris prodest, in compositionibus arthriticis adhibetur. In membris contractis oleum commendatur, cujus parandi rationem Veckerus docet. Sanguis fictatus lepræ medetur, si Carolo Bobuillo credimus. In peste cum sale & cornibus animalium destillatus offertur. Lonicerus diebus tantum canicularibus destillat, & drachmas duas præscribit. Gesnerus compositionem quæ recipit sanguinem taxi, terram Armenam, Crocum, & tormentillam, sævissimâ peste, feliciter adhibitam, se legisse scribit. Cinis supprimendo sanguini inservit. Nihil de cerebro, testiculis, & dente vel pede sinistro, quem brachio subligatum memoriam juvare, Albertus prodit, dicam. Ex pellibus Taxorum olim quoddam genus vestis texebatur, quæ ab humeris usque ad lumbos pendebat. Ex iisdem canum collaria conficiuntur. *Differentias* si attendas, Olaus *Domesticorum*, qui ludicri, & *sylvestrium*, quorum setæ rigidæ, mentionem facit. Communiter in *Caninos* & *Porcinos* distinguuntur. Ambas in agro Matisconensi se accepisse, affirmat Brujerinus. *Canini* ritu sunt canino; latibula in locis fabulosis fodiunt, & quidem sine multis cuniculis; & cadaveribus, illisque cibis, qui canibus in deliciis vescuntur. *Porcinos* Carolus Ste-

Ufus.

Bruyer.
de Reci-
baria. l.
13. c. 3.

Vecker. l.
2. Antid.
Special.

Differen-
tia.

phanus subalbidus & caninis majores facit; & circa ostium cavernæ, parvâ prius rostro excavata fovea, excrementa deponere scribit. Addit Gesnerus, radicibus, fructibus, & omnibus quæ sives appetunt, vesci. In regione Americana quoddam animal vagatur nomine *Heyrat*, quod bestiam mellis avidißimam significat. Colore est castaneo, magnitudine Cati. Quotidiè apum opificium inquirens, in arboribus versatur. Postest ad Taxum referri: *Quaupecotli*, & *Tzcuintecuan*. Illud, animal est duos plus minus dodrantes longum; rostro prolixo, tenui: versus superna contorto, prolixâ item cauda, pilo longo, circa alvum candente; cætera fusco aut atro, candentique, sed circa dorsum nigriore, atris pedibus & incurvis unguibus. Mitescit facilè, vorax est; nullis escis oblatis parcat; placidum est item, ac mille modis blandiens, sed ignotis noxium. Reperitur in nova Hispania, & gaudet montibus. *Tzcuintecuan*, seu *Cynodeticus*, est huic congener, non solum magnitudine & moribus, sed etiam rostro, quod prælongum est ac tenue, & pedibus. Color albus est, maculis nigris ac magnis distinctus. Nomen habet à mordendo. Vivit non longè à mari Australi. Hisce congener est *Tlalcoyotl*, animal pilosum, duas spithamas longum, unguibus melis, cruribus brevibus, nigro vestitis pilo, brevissimâ cauda. Caput habet parvum, rostrum tenue & longiusculum, caninos exertos, corpus album in fulvum vergens, sed dorso ac superna capitis parte & colli nigris, lineaque distinctis candenti. Victus eadem ratio, quæ quanperotli.

Nie-
remb.
Hist.
Exot. l.
9. c. 43.

Nie-
remb. l.
9. c. 77.

Nie-
remb. l.
1. c. 73.

CAPUT VII.

De Castore.

Castor, Græcis κάστωρ, nomen ἀπὸ τοῦ κάστωρ; *Nomen.* *Cid* est à ventre invenit, ὑπογάστριον γὰρ τὸ ζῶον, *Ambrosin. Hist. Digit. l. 2. c. 13.* & χεῖρὸν ὅθεν κοιλία: quod ferè totum hoc animal venter sit. Ridiculi, qui à castrando deducunt, quasi venatoribus visis, conscius se propter testiculos peri, eosdem dentibus evellat, & abjiciat. Parvos enim habet & spinæ adhærentes, qui superstitie ipso, avelli non possunt. Dicitur & *Fiber*, non tam quod circa extremas fluminum ripas assidue versetur, & fibrum antiqui extremum dixerint: quàm ab Æobeo *φιβέρις* mollis, quod molles pilos habeat. Lutram ab iisdem extremis fluminum oris dici, quæ Priscis, lytræ, falsum. Diversa enim sunt animalia. Bellonio est Aristotelis *Latax*, sed falso. Distinguuntur enim. An Orchia dici possit, non decido. Quidam Semipiscem ob vitam amphibiam dixere. Colore est ex albo cinereo in dorso nigricante: pilo quam Taxi subtiliore, qui quo nigrior, eò pellis preciosior. *Dentes* habet acutissimos, quibus ligna secat, anteriores rubidos. *Pedes*

Salmasin
Solin.

Descri-
ptio.

Plinius
H. N.
l. 8. c. 30.
Bellon.
Hisor.
Aquat.

Pedes priores caninis similes, posteriores propter membranam interjectam anserinis quibus in natando utitur, utrosque quinque digitis constantes. *Caudam* piscium similem fecit Plinius. Secundum eundem, in majore, sesquipedalis est, senos digitos lata; duos crassa, quatuor interdum librarum pondo; ad margines in tenuitatem desinens; membranâ glabrâ & lividâ contexta; super quam lineæ quædam, squamas piscium mentientes, incredibili artificio depictæ sunt. In inguinibus geminos habet tumores ori anserini magnitudine, utrinque unum, membranâ sua conclusum. Inter hos pudendum residet. Tumores hi, folliculi sunt membrana contexti, in quorum medio meatus, ex quibus liquor pinguis & cerosus exsudat, quo, admoto ore deterso, corporis quos contingere potest partes, velut oleo oblini, non aliter ac aves quedam, quibus supra podicem vesicula est, liquorem pinguem & olei æmulum continens, eundem rostro exhauriunt, & pennas perungunt, ne sub dio morantes, madereri possint. Testes non esse, vel exinde colligere licet, quod nullus ab his conspiciatur meatus. *Partes* internas sispectemus, lingua, corde, ventriculo, intestinis, & hepate in quinque lobos diviso, porco potius quàm alteri animali similis est. *Fel* sub minoribus jecoris lobis latitat. *Splen* parvus pro magnitudine corporis judicatur. *Renes* magni tanquam vituli anniculi, & copiosa pinguedine obducti. *Vesica* suillæ similis. *Testes* parvi & spinæ adhærescentes. *Fœmina*, observante Matthiolo, unico tantum meatu; & parit, & egerit, & mingit, uteri & vesicæ cervicibus illuc concurrentibus. In secto Castoreo; comperit Gesnerus, substantiam in folliculo flavam, solidam, ceræ similem, acrem & minimè terream. Ipsum unius libræ pondere fuit. Comperit & genitale, quod unico osliculo constabat. Invenit ut utroque tumore & alium folliculum, substantiam melleam & foetidam putrescentis casei instar, continentem. Habetur & in fœminis, sed adeò exiguum, ut vix unciam ponderet. In quo Bellonius calculos ovi magnitudine invenit, adulteratum sine dubio erat. Reperiuntur Castores, apud Burgundiones circa Matronam fluvium; Sequanos in agro Cabillonensi, Lotharingos, Austrios, circa Danubium ubi Biferi nominantur, in Helvetia, circa Arulam; Rusam, & Lomagum fluvium. In Polonia quoque, Russia, Prussia, & Italia, ubi potissimum Padus in mare se exonerat. Denique circa fluvios Ponti, unde optimum castoreum venit, & in Hispania. Aquas septentrionales potius quàm Rheni, Danubii, & alios qui continuo navigiorum decursu sollicitantur, frequentare, Olaus Magnus author est. Ubique autem degit, amphibium est animal. Ideò vicinas littoribus cavernas ponit. Vescitur foliis arbor. Corti-

Locus.
Scalig.
Exerc.
215.
Brujer.
Rei Ci-
bariæ.
l. 18. c. 4.

Cibus.

cibus item alimi; populi & aliorum. Salices tamen platyphilli maximè, ob summam amaritiem appetit. Piscibus vesci Albertus falsò prodidit. Nam Pelicerius Episcopus Monspeliensis frequenter vivos & mortuos apponebat, quos tamen nec olfacere quidem voluerunt. Ineunte æstate, quo tempore Delphini constellatio unâ cum sagittario occidit, in libidinem solvuntur. Tempus paritura finis autumnus est, quo folia delabi solent. *Vocem* Julius Pomponius cum per Onomatopæiam exprimere non posset, scriptis mandavit; vagitum infantis apprimè repræsentare. *Naturam* & *Mores* saquentia testantur. Non prius mordere desinunt, quàm fragorem ossium audiverint. Quando domi aluntur, tantus ipsis pudor, ut nec stercore nec urinâ domum inquinent: si non patet egressus, querulantur. Tanto amore foetum prosequuntur, ut quædam, portis & clavis evulsis, ex exalto se præcipitem dederit, quod ab Episcopo Monspeliensi Pellicerio proditum. Pedibus anterioribus tanquam manibus ori cibum admovent. Alvo, propter arborum cortices quibus vescuntur stipata, seu quòd parum fellis ad intestina confluat, partes posteriores sæpe in aqua maderfaciunt. De avulsione testium, dum venatores fugit, quòd dicitur, falsum est, nataque inde opinio, quòd eas tam astutè occultet. *Ingenium* singulare habere, observatio dedit. Nam cum ligna ad exstruenda habitacula convehunt, super senes resupinatos eadem artificiosè inter crura componunt, eosdemque arreptis caudis ad destinatum locum trahunt. Senibus dorsum mirum in modum glabrescit. Illi qui Scythiis *servi* dicuntur, poma legunt, & cortices cadunt; alii supra duorum junctorum dorsum, crate ex bacillis composita, poma & cortices superimponunt. Idem nigris, qui & *Domini* vocantur captis, luctum & gressu & facie indicant. Ligna cæsuri, semper eadem semita à fluvio ad arborem gradiuntur, arboremque non prius relinquunt quàm totam dentibus dissecuerint, & propè casuram, ne opprimantur, singulis ictibus suspiciunt. *Ædificia* denique, quandoque; in loco altiori, aliquando in de cliviori, prout amnis undare solet, construunt. Mutant ea pridè quàm fluminis aqua augeatur. Carnes non sunt insuavis gustu, si omnem virositatem apparatu deposuere. Partes anteriores de calore participant, posteriores, teste Matthiolo, tanta scatent frigiditate, ut ad instar testudinum terrestrium, jejunii tempore admittantur. Cauda apud Lotharingos in deliciis est, & saporem muranæ benè præparatæ refert. Assatur à quibusdam, & pauco zingibere conspergitur. Gesnerus saporem carniū thunni vel anguillæ præ se ferre scribit. In *Medicina*, Castorei, fellis, coaguli, urinæ, caudæ & pellis usus est. *Castoreum*, quod fecun-

Genera-
tio.

Natura
& Mores.

Ælian.
H. A. l.
13. c. 47.

Usus.

secundum Dioscoridem, multis naturalibus tunicis circumdatum; liquore intus velut ceroso, gustu acri, & odore gravi, eligendum est; quod ab animali in vigore ætatis constituto, extrahendum est, & extractum, cum melleo liquore, in tunicis contento, exsiccandum; quod denique ad septennium vires obtinet; in morbo comitiali, lethargo, in aceto acerrimo cum ruta decoctum, vertigine, si eo cum semine viticis, ex oleo rosaceo, vertex perungatur; oblivione chronicos morbos insequente prodest. Cum ammoniaco & aceto mulso asthmaticis opitulatur. Singultuosus à plenitudine vehementer succurrit. Colicam affectionem sedat. Gonorrhœam, in succo viticis & aceto decoctum, cataplasmatibus instar pectini & genitalibus applicatum, sistit. Adjuvandam conceptionem suffimenti ex eo genus, Rondeletius commendat. Omnes uterinos affectus à frigidis causis procidentes, inprimis suffocationem, compescit. Puerperii excrementa purgat. Opium optimè corrigit. Plurima denique medicamenta, aquas nempe, pilulas, extracta, olea, unguenta, cerata ingreditur. *Fel* venerem stimulat. *Coagulum* in morbo comitiali incredibili adjumento esse solet. *Urina* contra venena datur. *Cauda* intestinorum vulneribus medetur. *Cinis pellis* cum pice liquida combusta, succo porri mollitus, sanguinem undiquaque manantem, excellenter suppressit. Eadem paralytici utiliter vestiuntur. *Dentes* de collo suspenduntur, tanquam amuletum contra casum. *Pinguedine* pisces inescantur. Ex pilis mollioribus galeri & tibialia fiunt. Ex pelli-
 bus apud Gelonos populos rhenones. Circa
 Differentiam nihil planè occurrit. Scythæ
 in *Nigros*, *rufescentes*, & *ex utrisque mixtos*
 distinguunt; illos *Dominos*, hos *servos* ap-
 pellant.

Differen-
tia.

CAPUT VIII.

De Lutra.

Lutra, quæ & *Lytra* Varroni, vel *ἀπὸ τῆ λύειν* seu solvendo, quod arborum radices ad fluminum ripas sitarum dissolvat, vel *ἀπὸ τῆ λύνειν*, à lavando, quod piscem in aquis investigando, frequenter se in aqua abluat; nomen sortita est. Græcis vocatur *λύτρες*, ab aqua, quod in eadem degat; Aeolibus *ἐλύδρες*, unde fortè *Lutra*. Suidas cum ea *Ictim* confundit. Sylvaticus Hydrion perperam vocavit. *Gaza* *Lutria* vertit. Aetio est *κύων πατάμιος*, canis fluviatilis, quod canis instar prædam in aquis requirat. Corpore est quàm *Castor* graciliore & longiore, capite canino, dentibus instar canis venatici; formâ oris quadrata, unde *παραγωνοπρωτοπ*, dicitur, auribus *Castoris*, cauda oblonga, terete, & in fastigium desinente, vulpinis cruribus, paulò tamen crassiori-

Ambros.
Hist. Di-
git. l. 12.
c. 13.
Nomen.

Suidas l.
37.

Descri-
ptio.

bus, pedibus posterioribus planis & membrana, communitis, pelle denique minus quàm *Castoris* spissa, frequenti & brevi pilo conspersa, nonnihil ad castaneæ colorem accedens. Reperiuntur passim in Europa. *Locus.* Sed & in America haud parva ipsorum copia; in Canada inprimis. Maximè verò circa fluentia & lacus degunt, & quio cavernas quoque sibi effodiunt, inter amphibia reponuntur. *Brasavolus* copiosiores in agro Neapolitano stabulari prodidit. Vescuntur *Cibus.* piscibus quorum tantam copiam interdum in cavernas deferunt, ut aëris infectio metui possit. Vescuntur & mollibus herbarum caecuminibus, fructibus arborum & corticibus. Agricola hyberno tempore ad pastum egredi scribit. Ad *Naturam, mores & ingenium* referri debet, quod in urinando aërem per intervalla exortis naribus hauriunt, ne suffocentur: quod in antro veluti tabulatum ex ramis & virgis construunt, super quo, ne madefiant noctu cubare solent: & quod per aliquot milliaria ex aquæ rivulo piscinæ ordorem excipiunt. Facilius etiam auram secundo flumine hauriunt. Jejunæ cursum amnis superant: saturatæ cum aquæ fluxu delabuntur. Piscinam ingressæ mirâ agilitate meliores pisces aggrediuntur, & in omnes quamvis devorare non possint, sæviunt. Facile cicurantur, & ad certum signum in aquas ad pisces capiendos se conjicere edocentur. In Suecia, ad coqui nutum pisces ex piscina in culinam deferunt. Carnes in Germania & Gallia à rustici comeduntur, sed sunt crassæ lentæ & pituitosæ. Gesnerus etiam Carthusianis concedi scripsit. In Medicina præstat suum usum. Nam *adepts* medicamentis digerentibus infarctæ & exaffatæ ad tollenda articulorum vitia, teste Hollerio, perutilis est. *Sanguis*, si *Ælianum* sequimur, cum aqua & aceto mixtus, nervis humanis intumescens conductit. *Testes* in morbo comitiali à quibusdam laudantur; castoreo tamen minus sunt efficaces. *Iecur* in furno tostum ad dysenteriae suppressio- nem commendatur. Sedilia ex *pellibus* hæmorrhoides levaet. Pelles ipsæ paralyti, vertigini, & capitis dolori conducunt. Calceamenta ex iisdem dolores pedum mitigant. Ex iisdem apud nos chirothecæ villosæ ad aëris injuriam coercendam confuuntur. Nec non ex pelle integra, cum capite, pedibus & cauda semimanicæ hyemales fiunt. Circa *Differentias* nihil ferè occurrit. Congenere videntur *Lutræ*, *Saricouime*, & *Carygueibeju*, animalia Americana. *Saricouime*, non excedit magnitudinem felis, pilo est molli, leucophæi coloris: pedes membranibus quibusdam fulciuntur. Amphibia est. *Carygueibeju*, aliàs *Iiya*, est magnitudine canis mediocris, capite obrotundo quasi felino sed acutiori, auribus obrotundis, & quæ inferius sitæ sunt, cruri-
 bus

Locus.

Cibus.

Bellon.
Aquatil.
l. 2.

Natura &
Ingenium.

Scaliger.
Exerc.
215.

Usus.

Brujen.
de re ci-
bat. l. 13.
c. 31.

Ambros.
Hist. Di-
gitat. l. 2.
c. 13.

Marcgr.
Hist. Bra-
sil. l. 6. c.
9.

bus & pedibus Cercopithecorum more. Quinque digitos quilibet habet, quorum interior brevior reliquis. Pilis tegitur ad tactum mollibus haud longis. Totum animal atrii est coloris excepto capite, quod obscure fuscum. In gutture maculam habet flavam. Vivit gammatis, piscibus, & farinâ Mandiocæ in aqua madefacta. De *su* quod Ambrosinus ad Lutram redegit, alibi agemus.

C A P U T IX.

De Ichneumone.

Ichneumoni nomen ab *ixvθen*, iuvestigando, quod noxia diligenter investigans, alimenta à venenis optimè distinguere valeat, impositum est. Albertus *suillum* appellat, quod pilis suillis induatur, & perperam *Ibin*, & Anschycamum. An Avicenna Thyamonem dixerit, ignoro. Manardus Alcasim vocatum putat. Græcis est *ὄλλος*, porculus, seu suillus; quod more suis rostrum dum investigat, semper in terra habeat. Hodie teste Bellonio, *Mus Pharaonis*, seu Ægypti vocatur. Ælianus, *murem Indicum* dixit. Alii *Lutram Ægypti*. Magnitudine est felis, sed longior, *pilis* instar pili lupini duris, albicantibus seu subflavis per intervalla, & leucophæis. *Rostrum* habet nigrum, suillum, *auriculas* breves & rotundas: *crura* nigra, quinque in pedibus posterioribus *digitos*, quorum postremus ab interiori parte perbrevis est. *Caudam* longam, & circa lumbos crassam. *Testes*, linguam, dentes, felis instar. Meatum denique extra foramen excrementi per amplum, undique pilis cinctum, pudendo muliebri non dissimilem, quem, magno urgente æstu, loco excrementi interim clauso, aperire solet. Hinc scriptores omnes indiscriminatim Ichneumones & mares & foeminas esse arbitrati sunt. Sola Ichneumonem Ægyptus proferre creditur. Ideò Ichneumonem Ægypti vocavit Aristoteles. Haberi tamen & ex altera parte montis Atlantis, ad Nili capita, Vitruvius prodidit. Amphibium est animal, & ad Niloticas ripas commoratur. Vescuntur muribus, serpentibus, limacibus, lacertis, chamæleonte, ranis, & aliis huius generis. Aves, & in primis gallinas vehementer appetunt. Hepate Crocodilorum delectari; & ideò in dormientium ventrem irrepere, communiter proditur. Ideò etiam singularis inter Ichneumonem & Crocodilum antipathia esse creditur, cujus ova in littorè inventa frangit, Ægyptiorum, ne tot Crocodili nascantur, bono. Adversatur etiam aspidi, & omni serpentum generi. Ventum maximè abominatur. Ideò eo flante gradum ad latibula accelerat. Mures & serpentes, more felium & mustelarum depopulari, (ideò in Ægypto cicurantur,) assidue collusionibus gaudere, ne frigore læda-

tur, caput inter genitalia abdere, & Echini terrestris instar, in pilam se contorquere; conspecto aliquo animali pilos erigere, & magno etiam se cani opponere, selemque tribus dentium ictibus strangulare, omne animantium genus, equos etiam & camelos adoriri; tot numero foetus quot canes eniti, ad *Naturam* & *mores* spectat. Quæ de utroque sexu apud Ælium extant, & quomodo victi muliebria pati necesse habeant, fabulosa sunt. *Ingenium* multa testantur. Prædatur se in posteriores pedes erigit: prædam verò conspiciens, tranquillo per humum tractu se promovet, & tandem magno impetu adoritur. Hostes suos, nunquam nisi advocatis sociis aggreditur. Contra aspidem dimicaturus, in luto prius volutatus, in sole apricatur, donec quasi lorice munimentum acquirat: si lutum desit, aquâ madefactus, in pulvere se volutat. Gnarus teneras sibi naves, solo, caudæ flexu in acerrima dimicatione eas tuetur. Inservit & in Medicina. *Lotium* cum vaccæ nigræ lacte propinatur contra dolorem colicum. *Cinis* pellis combustæ in aceto maceratus adversus serpentum ictus facit, si eo homines illinantur. *Pilorum* suffumigatio, contra lumbricos facit.

C A P U T X.

De Mustelis.

A R T I C U L U S I.

De Mustela vulgari.

Mustelarum duo summa genera inveniuntur. Sunt aliæ *vulgares*, aliæ *sylvestres*. Hic de prioribus agemus. Nominis originem quidam à mure & telo deducunt, ut sit quasi mus longus. Telum à longitudine dictum, omnium ferè Lexicographorum placitum est. Alii à mure & *τῆλε* quod est longè. Figulus à *μῦς* & *σίλλα* furripio, quod mures è cavernis ad se trahat. Græcis antiquis dicitur *γᾶλῆν* & in prosa *γᾶλῆ ἀπὸ τῆ γάλακτος* à lacte vel candore, quod hoc animal vel secundum se totum vel secundum partem candidum sit: quibusdam *κερδα*, quod vulpi ob astutiam convenire superius diximus: recentioribus *νυμφίτιστα*. Circa *Descriptionem* nihil singulare occurrit. Vulgaris ista in lateribus & dorso est rutila, raro subflava, circa guttur semper alba. Corpus ei tenue, cauda brevis Albertus de candida scribens dicit, Ermineum esse animal candidum, figuræ mustelarum, & in extremitate caudæ nigerrimum. *Dentes* habet minores quàm mures, *cor* parvum, sed in comparatione ad alia animantia satis magnum. Inveniuntur passim: sed albæ, in regionibus septentrionalibus in primis. In Mauritania sunt prægrandes, in territorio Tartesi urbis extra Herculis columnas maximæ, ut Suidas auctor est. In Java loca sylvestria incolunt. In Pordecelene insula limites non transeunt.

Ambro-
sin. Hist.
Digit. 1.
2. c. 14.
Nomen.

Bellon.
observ. 1.
22.
c. 22.
Descri-
ptio.

Locus.
Arist.
Hist. 1. 9.
c. 5.

Cibus.

Oppian.
Cyneget.
1. 3.

Anti-
pathia.
Ælian.
H. A. 1.
9. c. 1.

Natura,
Mores,
Ingenium.

Arist. H.
A. 1. 6. c.
35.

Arist. H.
A. 1. 9.
c. 6.

Usus.

Ægineta
1. 4. c. 58.

Ambro-
sin. Hist.
Digitat.
1. 2. c. 15.

Nomen.

Descri-
ptio.

Locus.

In Bœotiam delatæ aut percunt, aut statim aufugiunt. In cavernis, petrarum fissuris, fœnilibus, & stabulis habitant. Est ex animalibus *πύμαρον* Vescitur ut plurimum muribus, & talpis. Non abhorret à serpentibus. Insi- diatur vespertilionib. In columbariis ova ab- sorbet, & avium interemptorum sangui- nem fugit. Defunctos invadit, & eorum o- culos effodit. Lepores denique invadit. Vi- sa quæ eum ore tenebat. Ore parere vulga- tis fabula est, ex illa quæ de Galanthide Alc- menæ ancilla in mustelam à Junone conver- sa, conficta. Uterum habere certissimum est.

Antipathiam cum corvo & cornice gerit, quod harum avium ova absorbeat. Gallinæ auditâ mustelarum voce ferè exanimantur. Cum catis decertat. Cum serpentibus con- greditur, ramo rutæ vel soncho munita. his destituta, opprimitur. Ad *Naturam* & *Inge- nium* spectat, quod earum fimus, si per a- gros & sylvas liberam vitam agunt, mo- ichum redolet: quod ratione ætatis varium colorem induant: catulis visum deperditum herba quadam restituant: facile cicurentur, inprimis si dentes allio confricaveris: majo- ra etiam animalia adorianur: Caveas dua- bus foraminibus munitas exstruant, quorum alterum Septentrionem, alterum Austrum versus obvertitur: fœtus spacio unius diei in diversas loca transferant: cum serpentibus denique nonnisi ruta vel soncho munitæ congregiantur. Quia in rabiem concitatur morsus ejus lethalis est. Ideò & vaccarum ubera, sica attigerit, in inflammatione corri- piuntur. Oleum in quo mustela compu- triuit, remedio est: vel si locus affectus pelle ejusdem sicca confricetur. Aristides Lo- crensis ejus morfu periit. Mexicani eas in *Cibis* adhibent. Galenus sale conspersas & exsiccatas, carnibus leporinis respondere scripsit. Quantam ad *Medicinam*, *Cerebrum* exsiccatum adfert haud parvam Epilepti- cis utilitatem, teste Galeno. *Ventriculus* co- rriandro impletus demorsis à serpentibus au- xiliatur, apud Dioscoridem. *Pulmo* in pul- monis affectionibus efficax est. *Iecur* verti- gini & epilepsiæ prodest. Quia decrescente luna minui dicitur, crescente augeri, Epi- lepticos quoque, teste Glyca, juvat. *Fel* con- tra omnia veneficia salutare deprædicat Plinius. Matthiolus eodem cum succo fœ- niculi mixto, in auferendis oculorum nube- culis, & in cute emaculandâ utebatur. *Virga* exsiccata singulare est stranguriâ laboranti- bus remedium. *Testiculi* & *Uterus*, more la- pidis ætitis, fœtum in utero cohibere dicun- tur. *Sanguinem* cum succo Arnoglossæ in mitigando podagræ dolore extollit Lonice- rus. Galenus parotidibus eundem illinit. *Finum* melle exceptum & cum farina lupi- norum vel fœnu græci mixtum, ad strumas discutiendas magnificè Matthiolus. Est & *tota* in usu. Dioscorides sale inveteratam,

detractis intestinis, contra venenatorum morsus commendat. Pulverem exsiccata in morbo comitiali adhibuit Galenus. Mat- thiolus crematæ cinere aqua subacta & illito vehementes capitis dolores mulcet, & ocu- lis caligantibus injecto, suffusiones emen- dat. Marcellus ad catarrhum in fauces de- scendentem, eandem die Jovis, Luna decre- scente, in olla rudi, ita cremat, ut in pulve- rem redigi possit, quem cum melle mixtum patientibus exhibet. De *Ufu in Variis*, con- sule Ambrosinum. Apud Portam legimus, semina rosæ cum seminibus sinapi, & pede mustelæ intra ramos arboris infœcundæ su- spensa, eandem in fœtus resolvere. Gesne- rus tradit equum à subito & pernicioso mor- bo, *Cach* Germanis dicto correptum, por- tione pellis Mustelina exhibita, à veterina- riis liberari. Quidam semina cineribus mu- stelæ permixta per agros spargentes mures à segetibus abigunt. Alii in copiosa aqua fervefaciunt, & decoctionem postea ad su- gandos mures à campis feliciter adhibent. Circa *Differentias* variant authores. Plinius appellatione Mustelarum & Ictida & Galen- complexus, duas species constituebat, alte- ram in domum tectis errabundam & dome- sticam, alteram in agris & nemoribus ver- fantem & sylvaticam cognominabat. Caro- lus Figulus, vulgaris duas species ponit, alteram totam albam, *Hermellani*, alteram secundum pectus & ventrem, *Vifelam* di- ctam. Ad easdem referuntur sequentia. *Rosola* Alberti seu *Guifela* cujus excremen- tum odoriferum est. *Quadrupes digitatum* variis maculis insignitum & *Salamandra* di- ctum, fortè quod ob colorum varietatem *Salamandræ* ex genere lacertorum assimile- tur. *Girella* muris, genus in Austria, magni- tudine mustellæ. Pelliones Itali nigri ruti- lique coloris pellem parvam ex regionibus frigidis delatam ostendunt, hancque *Roso- leum* vel *Romulum* nuncupant. Alii *Chiur- cam* inter mustelas connumerant. Georgius Agricola in genere Mustelarum *Vormela* animantis Viverra seu Furone minoris me- minit, & Cardanus *Lardironi*. Idem Ge- nettam quandam mustelam esse statuit. *Chiurcam* verò ita Scaliger describit. Vi- verræ inquit, est facie & magnitudine, capite vulpino, sub terra habitat, Fœcundissima est, duodenos parit exiguos. Cauda ei te- nuis pænè glabra. Ipsa pilo atro. Catulos in burfa sub alvo obtenfa secum fert. Est & *Africana mustela*, quæ apud Clusium ita de- scribitur. Erat, inquit, hoc animalculum majoris muris seu gliris non prorsus adulti magnitudine, corporis forma mustelam & sciurum quodammodo referens. Nam ca- pite & cauda longis pilis prædita sciurum æmulabatur: illam quidem attollens, mi- nimè tamen supra caput retorquens ut ille, sed in altum nonnunquam valdè explicans.

Porta
Phytogn.
l. 6. c. 4.

Differen-
tie.

Figul. in
Dialogo
de Mu-
stela.

Nie-
remb. H.
E. l. 9.
c. 32.

Co-

Comedens clunibus sciuri instar insidebat, anterioribus pedibus cibum tenens & versans. In utraque mandibula binis longioribus dentibus in anteriore rictus parte erat præditum: aures ferè orbiculares habebat, & pilorum colorem varium à spadiceo, fusco, & albo, singulis coloribus à capite ad caudam, secundum corporis longitudinem virgatim & radiatim excurrentibus. Summa venustas erat in cauda, similibus coloribus etiam virgatim distinctâ, cum ut dicebam, illam interdum valdè explicaret pavonis caudæ panè instar. Pedes in quinque digitos erant divisi, quaternos antrosum spectantes, eorumque binos medios longiores, quintum autem brevem calcari non dissimilem retrorsum spectantem. Omni cibo ipsi objecto indifferenter vesci intelligebam, præsertim verò pane delectari: ferox non esse sed facilè cicurari & domesticum fieri, ut liberè nullo vinculo adstrictum, quo vellet vagari, permitti posset. In navi qua vehebantur, tam cicura hæc animalia evasere, ut nautarum sinum & caligas subirent. Nierembergii Mustelam Lybicam vocat.

ARTICULUS II.

De Mustela sylvestri & Putorio.

Mustela sylvestris, quibusdam, Furo, Firus & Furunculus seu Furectus, seu quòd more furis noctu surripiat, seu à fureo, id est, obscuro colore, quòd subterraneos meatus & cuniculos ingrediatur & effodiat, dicitur: aliis Viverra, quod vi verruncet, id est animantes à cuniculis expellat. Græcis est *ιπτις*, & per aphæresin *ιπτις*, fortè *ἀπὸ τοῦ ἰκτίρος* ab ave hujus nominis cujus colorem pilus ejus æmulatur. Grapaldus pholitam vocat, Gesnerus pholeutam, & rectè, legit. *φωλετά* apud Græcos lustrum est. Author de natura rerum, colorem ei esse inter album & buxum medium, ventre albo, oculis rubicundis, mustelâ domestica majorem. Aristoteles corporaturæ catelli Melitensis facit, in pilo verò, formâ, albedine partis inferioris, multum à Mustela vulgari discretam. In Italia, Gallia, & Germania non reperiri Gesnerus prodidit. In Africa tantum esse, Strabo. In Anglia haberi multi perhibent. *Victitat* melle, piscibus, columbis, & carne cuniculorum, quam maximoperè appetit. Foeminæ libidine correptæ, nisi se mari commiscuerint, inflatione correptæ pereunt. Coeunt more felium. Septem vel octo catellos unicâ pariturâ edunt: dum tamen spacio quadraginta dierum utero gesserint. Foetus post partum per triginta

dies cæci sunt, & die quadragesimo post acceptam visionem ad venationem proficiunt. Ad iram provocatæ excrementa alvi odorata egerunt. Cicurati in capsis ligneis plurimum temporis dormiendo consumunt. In Gallia Narbonensi utuntur eis in cuniculorum venatione. Alibi, in extrahendis de nidis parietum, inaccessis inprimis, aviculis. Pertinet ad eam Viverræ insula Zeilan genus, serpenti coronato inimicissimum. Quoties adversus eum dimicat, radicem ligni colubrini præmorder. Nec alterius est generis animalculum illud quod Agricola *Hamester* vocat. Majus est mustela domesticâ. Color dorsi leporinus, ventris niger, & laterum rutilus. Pedes breves. Multa frumenti grana in specum congerit. Ager Thuringiæ eis abundat.

Putorius, ab odore nomen fortitus est. Semper enim putidum ab ore halitum emittit. Quidam Ichthim dixere, quòd piscibus valdè delectetur. Scaliger Catum foetentem, ni, fallor, dixit. Corpore Marte est similis, sed major. Circa collum angustior, circa imum ventrem latior, in cauda & cruribus nigrior, & ad latera flavior. Pellis duplici pilorum ordine constat. Alii sunt breviores & flavi; alii longiores & nigri. Crura sinistri lateris breviora esse, à quibusdam creditum, sed ipsa *αὐτοψία* repugnat: *Incolunt* horrea, stabula, sylvas, & ripas. *Victitant* muribus, gallinis, avibus, quibus statim caput auferunt, piscibus, ranis, &c. Tempore vernali pelles gravissimè olent: hyeme non item. Albertus meminit cujusdam mustelæ quam *Noerxam* vocat, magnitudine martis. Pili ad colorem lutræ accedunt. In remotissimis nemorum penetralibus latet, & putidum odorem de se emittit.

CAPUT XI.

De Marte & Mustela Zibellina.

Martes à ferocia nomen accepit. Est enim Martia. Alii Martam & Marterum vocant. Nonnulli Foinam, Gainum, & Scismum. Dentes habet candidissimos inæquales & asperos. Canini in utraque mandibula eminent, quibus sex exigui diversæ altitudinis interjiciuntur, qui incisorum munus obeunt, cum hac tamen differentia, quòd incisores mandibulæ inferioris perexigui sint. Molares, quorum octo, sunt ferrati, triangulares quidam. Ultimi in superiore oris parte multò cæteris interioribus sunt, nempe, in ipso palato Severino circa interiore sequentia sunt observata. Sub cutem *fibræ* nervæ extant, numero & situ costis omnibus respondentes. *Costæ* autem num. 14. *Membrana* nulla carnosâ: *Musculi* abdominis inter duas peritonæi tunicas; ideo videtur peritonæum crassum & densum, non minus

Differentia.

Clus. Exot. 1.

Agricola de animalibus subterraneis.

Ambrosii Hist. Digigit. 1. 2. c. 17.

Ambrosii Hist. Digigit. 1. 2. c. 16. Nomen.

Descriptio.

Locus.

Vitus.

Generatio.

Ambrosii Hist. Digigit. 1. 2. c. 18.

Zootomia Demonstratio. p. 317.

quam cornea tunica oculi bovini. In longitudine per eam lineam, quæ respondet umbilico carnosum erat, sed non late & in infima sui parte. *Omentum* ventriculo inferne annexum intestinis & lieni, sed *lien* parvulus satis parte sinistra ventriculo appensus, omenti parte adalligante. *Ventriculus* amplior: quam pro pusillo corpore, constans duplici tunicâ, sed externa albidior & levigata interna, utraque tenuis. *Intestina* retrorsum annexa spinæ per membranam. Nullum cœcum intestinum, uniformia omnia. *Vesica* urinaria oblonga, tenuis, sed ventriculo magis, recto intestino incumbens. *Hepar* septem fibris constans, quarum infirma quædam trifida, velut pes pulli, media sic triangularis figuræ, venæ cavæ per membranulam parvo spacio annexa. *Ren* dexter superior. *Emulgens* sinistra longior quam dextra, utraque ab arteria magna enascens, à vena cava non item: Dubius tamen sum & nescio, num per injuriam non obferim. Ad cavam venam hinc & hinc *glandula* subrubræ seu flavæ, sed dextra superior annexa hepatis per venularum furculos. *Vena cava* multos spinæ ramos mittit per lumbarium musculorum intercapedinem, sic & magna arteria cavæ subdita. *Vasa spermatica* à renum medio descendunt, sed parte ima finduntur utrinque, quorum alter ramus continuus testis fit, abdomen extra pervadens. *Penis* à ligamenti coccygis nascens cartilagineus & durus instar ossis, summa sui parte contortus ut terebella; amictus suâ tunicâ, quæ juxta sui principium validè adhærebat, in extremo perforatus, ut acus; ureter dexter insertus vesicæ superius, quàm sinister, nervus subtilissimus descendit rectus adalligatus dextero lateri cavæ venæ, inferens sese in principium cavæ. Nervulus item alius latere sinistro descendit ad orificium superius œsophagi. *Diaphragma* ad fines hepatis oblique descendens eadem illi parte connexum. Inferitur vena cava in dextrum ventriculum cordis propè auriculam dextram, quæ nigra & plena sanguine, major quam sinistra: hæc autem alba & exsanguis. Eadem cava variè in pulmonem conspergitur parte dextrâ. Arteria magna inserta in sinistrum cordis ventriculum, dum se contorquet ac flectit ad inferiora: Vena cava dextrorsum pulmonem parum supergressa sese contorquet & divaricatur in sex ramos, fitque *αζυγος*, ascendit eadem superne ad utramque mandibulam inferiorem. Pulmo dextrorsum quatuor constat fibris minoribus, sinistrorsum duabus majoribus. In Septentrionalibus regionibus ut plurimum inveniuntur: in Germaniæ Alpibus quæ meridei & Italiæ obvertuntur. Incolunt magnorum ædificiorum tecta, nec non faginas & abjetinas sylvas. Retulit quidam rusticus Gesnero, se in præaltâ abiete

Martem cum quatuor catulis comprehendisse. Gallia Martibus abietum caret: ex Polonia deferuntur aliquando colore fusco diluto. Dicuntur præter cibos mustelis suctos, fruticibus etiam vesci. Excrementa Moschum redolent. Facile circulantur. Habebat cicurem Gesnerus, canis quo cum nutriebatur amantissimum, quem in itinere sequi solebat. Vinculis soluta circa ædes vagabatur, & semper redibat, supina quoque cati ritu ludebat. Infida tamen est: ideo nonnulli suadent, ut canini dentes amputentur, Pellis est in usu. Ex illa quæ sub gutture, salutare capiti pilei concinnantur. In Canada mulieres infantes suos eis insuunt. Duæ ipsius sunt *species*. Altera *Domestica* pilo fulvo nigricante vestitur, excepta ea gutturis parte quæ albicat, quam pelliones Fainam vocant. Est corporaturæ felis, sed paulò longior, cruribus ungulisque brevioribus. Per rura vagatur, gallinas jugulat, & ova exhaurit. Altera est *silvestris* pilo clariore & molliore, gutture luteo. Ex his aliæ sylvas fageas, quernas, & ilignas inhabitant: aliæ piceas & abiegnas. Circa lacum Bregantinum dicuntur versari quæ noctu lubent. *Mustela Zibellina* Aristoteli ex quorundam sententia sub nomine *Satherii*, sub *Cebali* Nepho venit. Alciatus *murem Sarmaticum* & *Scythicum* vocat Agricola paulò minorem Marte facit, totam obscuro colore fulvam, præter guttur, quod cinereum est. Inveniuntur in partibus septentrionalibus & extremis Moscovitarum sylvis; sed & in Lithuania, alba Russia, & locis mari Cronio vicinis: ut & in Lanceruca Scandinaviæ sylva. Præstantissimæ sunt pelles quas Tartari & Lapones mittunt. In regni Congani provincia quadam copiam ipsarum dari, descriptionis Guineæ historia testatur. Insidiantur aviculis, dum in opaco saltu latitant. Animalia sunt natura agilia & semper inquieta. Observatum est pelles ipsorum in imo arce repositas & aliis vestibus onustas, post triduum plus minus in summum ascendisse. Si manibus tactantur semper æquales remanent. Præstantiores, quibus pili longi, & ad nigredinem vergentes. Soli expositæ corrumpuntur. A blattis præservabis, si sæpè concutias, & ramis absynthii involutas, reponas. Pretium illis ingens, Quadraginta pelles mille coronatis emptas vidit Agricola. Semimanicam hyemalem ex iisdem concinnatam quadringentis libris Bononiensis monetæ Ambrosinus. Incolæ Obdoriæ eas idolo suo Zlata baba dicto, offerunt. Magni Tartarorum Chami tentoria, iisdem subduci, M. Paulus Venetus testis est.

Renod. l.
3. Pharmacop.

Differentia.

Ambrosius. Hist. Digitat. l. 2. c. 19.

C A P U T XII.

De Genetta, & Animali
Zibethi.

Ambros.
Hist. Di-
git. l. 2. c.
21.

Ambro-
fin. Hist.
Digit 1.
2. c. 22.
Scalig.
Exerc.
211.

Ronde-
let. Phar-
mac. l. 3.
c. 16.

Bellon.
obser. l. 2.
c. 20.

A Nimalis, quod *Genettam* vocamus, no-
men, unde desumptum sit, ignoratur.
Quidam, quia Hispanicum est, ab aliquo
ibid. loco appellatum, credunt. Alii *Cat-
tum Hispania*, quidam *Genethocatum*, vo-
cant. Nonnulli *Pantheram minorem* Oppia-
ni opinantur. Minor est vulpecula. Cor-
pus totum maculis nigris eleganter distin-
guitur: nam reliquum fuscum, vel cano fus-
cum permixtum est. Tota pellis molli &
denso pilo & lanuginosa, non ingratum odo-
rem spirat. Reperitur in Hispania, & qui-
dem circa aquosa loca, ut inde victum quæ-
rant. Semimanica hyemalis ex illius pellib.
constans, viginti quinque, imò triginta libris
monetæ Bononiensis venditur. *Animal Zi-
bethi*, quod antiquis fortè ignotum est, mo-
derni Græci *Zapetion*, Scaliger *catum zibe-
thicum*, Ludovicus Roman. *selem zibethi*,
alii *Sivettam* seu *Civettam*, & *Catum sylve-
strem*, Gyllius *Pantheræ* genus, quod veteri-
bus hæc sola odorata ferebatur, Bellonius
Hyenam veterum, vocant. Armatur denti-
bus & pilis asperioribus. A capite ad initium
caudæ integrum hominis brachium adæ-
quat: altitudo crurum usque ad pedes ad
trientem brachii reducitur. Magnitudinis
ferè est vulpinæ, colore lupino maculis
nigris resperso insignitur. Folliculum circa
inguina gestat, in quo odoramentum Zi-
bethum dictum, colligitur. Rondeletius
addidit, rictu esse oblongo instar Taxi, lin-
guæ non tam scabræ ut felis. Reperiuntur
in Pegu, regno Congitano, China, Camba-
ja, sylvis Æthiopiæ, quod apud Leonem
Africanum legimus. Advehuntur & ex
Ægypto, ubi copiosum partum enituntur.
Ex Hispania in Italiam deferri, non malè
Cardanus scripsit. Delectatur crudis carni-
bus & muribus sylvestribus. Romæ apud
Cardinalem Galeottum carne pipionum ale-
batur. Comedit etiam dulciaria & oryzam
cum ovis in China, lignum dulce quod Co-
maron vocant, si id animal est, cuius Pigaf-
fetta in itinerario suo meminit. Adeò cicu-
ratos Romæ & Mantuæ vidit Scaliger, ut
innoxie supra humeros ab hominibus gesta-
rentur. Consul Florentinorum Alexandria
adeò mitem habebat, ut cum hominibus col-
ludens, nasum, aures, labra, dentes sine noxa
apprehenderet. Ab ineunte ætate humano
lacte educabatur. Excrementum quod ex
loculo circa extremam abdominis partem
intra femora, cavernis & angustis instructo
dimanat, primò est album, teste Fallopio,
progressu temporis subluteum, tandem ni-
grescens. Primis diebus hoc odoramentum
grave est, namque mirandum in modum fe-

rit: concretum & aëri expositum, suavita-
tem gratissimam acquirit. Nonnulli sperma
animalis esse voluerunt. Colligitur coch-
leari argenteo, æreo, vel corneo, singulo
quoque die drachmæ unius pondere. Ma-
jorem zibethi copiam fundit, si, antequam
colligas, virgula exagitetur, ut in iracun-
diam præceps feratur. Alii spontè certo an-
ni tempore incallescere, & liquorem odori-
ferum è genitali ejaculari scribunt. Col-
lectum in vase corneo melius & diutius
quàm alio servatur. Sunt quidam Ulyssipo-
ne nobiles, quorum ex zibetho reditus, ad
mille & quingentos aureos ascendunt. *Usum*
tam in Medicina quàm alibi habet. In Coli-
ca effectione granum unum umbilico inun-
gitur, pane calido supra posito. A Crollio
in vertigine & apoplexia commendatur un-
guentum, cuius compositionem & hic succus
ingreditur, extremitatibus narium, tempo-
ribus, & vertici illitum. In uteri suffocatio-
nibus pudendo affricatur. Adulteratur fel-
le bubulo, styrace liquida, & melle. Parantur
ex eo pulveres Cyprii: saponēs, aquæ,
olea, essentia, suffitus, de quibus consule
Ambrosinum.

Majol.
Colloq.
7.

C A P U T XIII.

De Lepore.

L Epus Isidoro dicitur quasi Levipes, ob
currenti celeritatem; vel quòd mollissi-
mè propter villosos pedes incedat: aliis ab
Æolibus Bœotiis qui antiquâ voce, animal
hoc, *λίπορι* indigitabant, descendit. Dici-
tur autem ita quasi *λείος περιόριον*, quòd
lubricè eat, nec facilè sit eum apprehende-
re, aut retinere. Scaliger tamen *λίπορις*, &
λιπόρις legit. Aliis Græcis dicitur *λαγός*,
λαγίος, *λαγός* Atticis, *λαγός* Jonibus, ut
Eustathius docet. Vocatur & *δασύπους*, à pe-
dum villositate, *δρομαλός*, *πτόξ*, & *ταχίνος*, sine
dubio, à cursus celeritare. Cretenses Le-
pores *κακίνας* vocant. Albertus Lupo-
rem, Trochum Aristotelis interpretatus est.
In *Descriptione* non est quòd immoremur, *Descri-
ptio.*
Caput habet breve & rotundum: *collum* an-
gustum, rotundum, molle, oblongum; *aures*
sublimes *scapulas* rectas & laxas: *pectus* non
carnosum: *spinam* teretem: *ventrem* depres-
sum: *Crura* levia, quorum priora exiguo in-
tervallo distinguuntur; posteriora, in fragenu
instar literæ A divaricantur: *Corpus* denique
totum flexile. *Interiores* partes si spectes,
Cor ipsi datum maximum: illis verò, qui
circa Briletum, Thernen, & in Chersoneso
ad Propontidem vagantur, quique in Sy-
cino agro circa Bolbam versantur, duplex
jecur, seu quòd revera tale sit, seu quòd adeò
fissum est, ut duplicati jecoris faciem repræ-
sentet. *Oculi* sub angulo anteriori cartilago
latior est: vermiforme corpus cerebello po-
stremum: corpus concameratum in aliis non

Isidor.
Origin.
l. 12.

Varro. de
LD. l. 3.
c. 12.
Nomen.

Descri-
ptio.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

Zootom.
Democr.
P. 309.

Aristot.
de partib.
animal 1.
3. c. 15.
Locus.

observatum: os auriculæ tenuè pellucidum-
que ut felis. Inter animantia dentata, uni-
cumque ventrem habentia, solus coagulum
obtinet. Reperiuntur passim, tam calidis
quàm frigidis regionibus. Ex Lybia albos
delatos reliquit Pausanias. In insula Indica
Mazzua dicta, tanta ipsorum copia, ut ab
incolis passim interimantur, si Ferdinando
Lopezio credimus. In Atho quoque monte
tot, ut Ovidio in proverbium abierint. In-
colunt tam culta quàm inculta, ista tamen
præcipuè, quæ à venatoribus non frequen-
tentur: In Ithaca non esse, nec vivere illatos
prodidit Aristoteles. De *Victu* leporum ita
elegantur Bargeus:

Ovid. l. 2.
de arte a-
mandi.

Aristot.
H. A. 1.
8. c. 29.
Vidus.

*Decerpunt latiturgentia gramina campi,
Et culmos segetum, & fibras tellure repostas
Herbarum, & lento morsus in cortice figunt.
Arboris, atque udos attendent undique li-
bros;*

*Nec parcut strato pomorum, aut glandis
acervo,*

*Aut vicia, aut milio, aut procera frondibus
ulmi,*

*Præcipuè grata sylvestria gramina mentha.
Quæque colunt riguas inculta sylvibria val-
les,*

*Et vaga serpilli, & pulegi nobile gramen
Percipiunt.*

Bargeus
Cyneget.
l. 3.

Genera-
tio.

Commiscentur averfi, ut omnia animantia
quæ retrò urinam mittunt. Solvuntur quò-
cunque tempore anni in libidinem: Xeno-
phon tamen & Pollux verno potissimum
tempore congregi statuunt. Post primum
congressum superfoetat, ut verè Poëta scrip-
serit.

*Proles amans, gignit fœtus, lactatque te-
nellos*

Dumque superfœtat, dum parit; usque coit.

Non est ergò mirum, catulos prægnantes in
dissecto lepore inventos, quod apud Ælia-
num legimus: nec mirum, Astypalæam ex
geminis leporibus, tempore Antiochi Go-
natæ, brevi tempore, tot leporibus fuisse re-
fertam, ut intra annum spacium plures sex
millibus caperentur, ut apud Athenæum le-
gimus: totamque Geronem Sarii maris in-
sulam olim leporibus vacuum, intra breve
tempus, à prægnante lepore, fœtu occupa-
tam fuisse. Enituntur in locis nemorum se-
cretioribus; nunc duos, interdum tres, ali-
quando quatuor catulos. *Sexum*, sic optimè
agnosces, si consideraveris, foeminam esse
capite oblongiore, corporaturâ crassiore, au-
ribus oblongioribus, & pilo dorsi leuco-
phæo, ad nigredinem vergente, canibusque
persequentibus semper suam regionem cur-
rendo circumambire, & per eundem locum
pluries transire: marem verò humeros hab-
ere rubentes, in quarum medio pili oblongio-
res, observentur; caput brevius & obtusius,
pilos barbæ & palpebræ longiores; aures

Athen.
Dipnos.
l. 9.

Sexus.

breviores & latiores, canibus persequentibus
recto itinere se comittere, & quando-
que ad decem millia passuum currete. *Inimici-
micitias* gerunt cum aquilis, corvis, muste-
lis, vulpibus & canibus. *Vivunt* ad septen-
nium. *Ætas* ex cavernis vel potius fissuris
secus foramen excrementorum colligitur, si
Archelao & Alberto credendum. *Vocem* *Vox.*
habent acutam. Philomelæ author gemitum
appellat. Ad *Naturam* pertinet videndi fa-
cultas eximia: nam dum dormit oculos aper-
tos tenet: auditus acerrimus: nam & ad le-
vissimum foliorum motum concitatur & fu-
git: Utitur etiam auribus tanquam incita-
mento ad cursum, quibus eundem digirit &
moderatur. Dormituriens, ne cavernæ lo-
cus deprehendatur, huc illuc discurrentes,
vestigia primo disturbant, tandem magno
saltu in cavum profiliunt; ubi decumbentes,
fæmen ilibus subjiciunt, cruribus prioribus
ut plurimum junctis, & auribus super utrum-
que humerum demissis. Cavernis egressi,
libentissimè serenis diebus apricantur. Lo-
ci natalis tam sunt amantes, ut nullum pere-
grinum admittant. Facile cicurantur, & ni-
mis pinguefacti, intereunt: at levi datâ oc-
casionè vincula effugiunt, & ad pristinos
mores redeunt. In sylvis rarò pinguescunt;
fortè quòd sibi metuant. Ad *ingenium* spe-
ctat, quod hyeme impendente cubilia in lo-
cis apricis constituunt; æstate ad Aquilonem
cubant: quòd ad pabula longinqua profici-
scuntur, ut longo cursu exerciti, pedum ce-
leritatem firment: quòd, ut venatores fallant,
per flexuosas incedentes vias, frutices o-
mnes evitant, ne pili iisdem affricati, odorem
canibus prætereuntibus præbeant: quod ubi
segnes ad persequendum canes vident, lento
gradu properant; ubi urgere, citatissimo-
cursu feruntur: quòd denique à venatore
agitati inter glebas, quæ sunt ejusdem secum
coloris, ingeniosè latitant. In *Cibis* eos Judæ-
is gustare nefas: at apud gentiles, postquam
ab Attalico Cydoniensi ad epularum appa-
ratum deducti sunt, in deliciis semper fuere,
adeò inter mattyas caro leporina poneretur,
formositateque vultus conciliare crederetur.
Ideò certè Alexander Severus, ut in
Lampridio legimus, singulis diebus come-
debat, & aliquod hujus vestigium apud
Martialem ad Galliam habeamus. Cæte-
rum cujus sit caro hæc temperamenti, non
est quòd multis disquiramus; sola distin-
ctione res confici poterit. Bimestres, tri-
mestres, & ad summum semestres, opti-
mi sunt succi, & facilis concoctionis. An-
niculi & adultiores crassum sanguinem ge-
nerant. Visi tamen venatores, quorum quo-
tidianus leporina cibus, qui tantum abest ut
mœrore distraherentur, ut etiam lætitia per-
funderentur. Quod autem Cato, Censori-
nus oleribus & carnibus leporinis ægrotis
ali volunt, de catulis fortè intelligendum
est.

Inimici-
tia.

Ætas.

Vox.

Natura.

Ingenium.

Martial.
l. 5.
Epig. 30.

Brujerin.
l. 13. de re
cibaria.

est. Meliores verò nōs qui ad aquas degunt, illi qui in montosis & planis habitantes, serpillio, pulegio, & aliis vescuntur. Maximè etiam urgente bruma in cibis commendantur. Præparandi rationem vide apud Ambrosinum. In *Medicina* nulla ferè pars est quæ usum non præbeat: imò & excrementa eidem inserviunt. *Caput* ustum cum adipe ursino aut aceto alopecix mæderi, Galenus reliquit. *Cerebrum* dentitionem infantum promovet, si gingivæ sæpius eo illinantur: ex vino potum, urinæ incontinentiam cohibet. *Cor* quartanariis alligatur: pulvis sicci cum tertia parte mannæ thuris epilepticis à Sexto in vino albo propinatur, septem dierum spacio. *Pulmo* oculis dolore affectis superponitur. *Hepar* celiacis cum vino austero propinatur. *Fel* saccharo exceptum gemmas & oculorum nubeculas delet. *Coaguli* si ab animali quod nondum quicquam præter lac degustavit, & ad solem vel in fumo exsiccatum est, magna præstantia. Fluxu dysenterico laborantibus à Dioscoride propinatur. Spinas partibus infixas extrahit si cum thuris polline, & visco querno misceatur. Ad punctiōnes serpentum adhibetur. Viri congressum & fœminæ conceptionem juvare perhibetur. Dioscorides potum fœtum necare ait. *Renes* coctos in lithiasi Matthiælus exhibet. Inveterati & pedibus alligati podagram levant, si Olao Magno fides est. Ex *Matrice* medicamentum ad fœditatem concitandam Quercetanus parat: eadem in vesicæ malis commendatur. *Carnem* in oleo frixam Albertus in dysenteria & intestinorum ulceribus per clysterem infundit. Iisdem *sanguinem* assatum. Dioscorides propinat: quidam cum farinâ hordeaceâ miscent. *Lac* mulieres fœcundas reddit. *Adeps* extrahendis spiculis cum floribus fabarum inservit. *Dens* appensus dolorem dentis mitigat. *Talus* seu ossiculum illud in posteriori suffragine leporis, in colica affectione funiculo ex pilis leporinis à Marcello alligatur: pulvis adversus colicam feliciter bibitur: à Trago mulieribus ut facilius pariant, in liquore stillatio pulegii propinatur: in Epilepsia, cum visco querno, margaritis, corallis, & femine pæoniæ præscribitur. Urinam denique in lithiasi validè provocat. *Pellis* ceratum ad hernias ingreditur. *Pili* coercendo sanguini undecunque mananti inprimis ex naribus confert. *Pedes* à vivo abscissi in dolorem podagrico applicantur. *Urina* hydropticis cum spica nardi utiliter propinatur. *Stercus* à mulieribus gestatum conceptionem impedit, si quibusdam credimus: si Matthiolo, subtus immissum nimios mensium fluxus cohibet, & humentem uterum exsiccat. *Totius* cremati pulvis, ex vino tepido, calculosis propinatur. Ad eundem affectum Montagnana electuarius componit, eidemque lapidem judaicum, & spongas in lapil-

lis repertas addit. *Differentie* à colore, quantitate, pinguedine, eo loco sumuntur. *Ratione coloris*, sunt alii cyanei, alii in terris nigris fusci, alii in rubris rutili. Oviedus in America quosdam vagari scribit, quorum dorsum leporini est coloris, reliquum corpus album, latera leucophæa. Observati, ut Plinius prodit, albi in Alpibus, & in summis Ananix vallis montibus. Gesnerus quoque candidum vidit, cum pilis in summitate aurium nigris, carnemque cæteris teneriorem expertus est. *Magnitudinem* quod spectat. Elymæi vulpes corporatura adæquant. In Macedonia & Gallia trans Alpina sunt magni; in Italia & Hispania minores. *Pinguiores* in Pannonia inferiore quàm Italia Marnardus observavit. Quantum ad *odorem*, dicitur quoddam Leporis genus ita moschum redolere, ut canes persequentes in furorem agantur. A *Loco* sunt montani, campestres, palustres, Italici, Gallici, Hispanici, Indici. *Montani* à cæteris nigritia, magnitudine, ferocia, & densiore pilo discrepant: *Italici*, secundum Varronem, sunt primis pedibus humilioribus, dorso pullo, & ventre albo: *Gallici*, ut plurimum candidi visuntur. *Hispanici* cuniculos complectuntur. De *Indicis* ita Nierembergus. Leporem *Citli* vocant Barbari novæ Hispaniæ. Similis nostratibus est formâ atque alimento, sed auriculis pro corporis magnitudine longissimis latissimisque. Intexi solent ejus pili ab indigenis vestibus & linteis, quibus utuntur palliorum loco. Brasilienses *Cotias* nominant animalia quædam magnitudine & formâ, & sapore leporum, rufo colore, parvis auribus, caudâ ferè nullâ. Majores sunt ejusdem ferè speciei, quas *Pacas* vacant, rostro tereti, ad faciem felis, fusco colore, candidis maculis interstincto: neque carne tantum, sed & corio ipso prætenere: ideò in delicates epulas expetuntur. Amatus Lusitanus quoque tradit animal facie & magnitudine leporis in India vagari, quod incolæ tam diu baculis cædunt, donec moriatur. Mortuum pelle nudant, & carnem ex ictibus lividam continent, manibusque quasi ad pastam redigunt, quam pellibus ejusdem animantis involutam, Moschum nominant.

C A P U T XIV.

De Cuniculo.

Quadrupes quod *Cuniculum* dicimus, à cuniculis quos sub terra fodit & inhabitat, nomen sortitum est. Ab aliis vocatur lepusculus, ab Æliano parvus lepus. Recentioribus Græcis est σύναλις aliis δασύπους quem Plin. à cuniculo & lepore distinxisse videtur. Strabo γαταρύχας λαγίδας lepores fossores nominavit: nec non λαβυρίδας, fortè à voce λειρίς, quæ Græcis antiquis ὁ τῆς ὀφθαλμοῦ γῆρας, serpentis spoliū. Hinc Cuniculus recens

Differen-
tiæ.Plin. H.
N. l. 18:
c. 555.Ambro-
sin. l. 2.
De Di-
git. ovi-
par. c. 23:Nie-
remb.
Hist.
Exot.
l. 9. c. 8:

Nomen:

Strabo.
Geogr. l.
3.Galen. 1.
II. de
simpl.
med. fa-
cult.Mon-
tagn. An-
tidot. l. 2.

Descri-
ptio.Zootom.
Demo-
crit. p.
327.Vetus.
Carol.
Stephan.
Agriculi.
l. 9. c. 2.Genera-
tio.Natura &
Ingenium.

recens natus & adhuc impilis, *liberis*, *labe-
ris* & *lauris* appellatur. Hermolaus in Dio-
scoridem *Adapis* nomine indigitavit, fortè à
vocabulo *ἀδῆπιος*, quod rem quæ minimè
potest consumi denotat. Fœcundissimi e-
nim sunt. Erotianus *λεμπορίον* vocavit, quod
annonæ penuriam faceret. Circa *Descriptionem*
non est quod laboremus. Notissimum
enim est animal. In secto sequentia Seve-
rino sunt observata. *Musculi* omnes abdo-
minis inter duas peritonæi tunicas dispositi,
firmè ipsis adhærentes. Intestinum rectum
satis exile. *Cor* exile: *hepar* magnum, renes
magni; *lien* oblongus magnitudine respon-
dens parvæ hirundini; gallinacei: *παρῆπαρ*
figurâ cultri calcearii cum manubrio latro,
medium inter latas fibras hepatis. *Ventriculus*
figura parum varius à suillo, simillimus verò
muris & gliris. *Cystis* exigua affixa hepati.
Cæcum uno palmo vulgari & ampliùs magni-
tudine respondes communi pollicis cellu-
latum & cum appendiculo trium digitorum
aut ampliùs satis exili. Processus *lumbarium*
vertebrarum longiusculi, quos intercurrent
insignes interni musculi. In insula Ebuso
generari negat Plinius, at alibi plurimi repe-
riuntur; in Germania nempe, Gallia, Italia,
Mauritania, Moscovia, Polonia, &c. Scal-
lig. circa Mosaiscum Moscovitarum oppi-
dum innumeram cuniculorum multitudi-
nem ponit. Maximus tamen eorum in Hi-
spania proventus. Balearibus insulis, olim
devotaris mœsibus non vulgarem tamen at-
tulerunt. Apud Zelandos quoque in ipso
Oceani aditu, immensa vis cuniculorum
conspicitur, quâ post solstitium brumale
tota Brabantia alitur. Vescuntur gramine,
trifolio, brassicâ, lactucâ, cichoreo, rapo-
rum putaminibus, pomorum corticibus, &
baccis lauri inprimis. Sanguine humano
citissimè pinguescunt: sed ab omni humidi-
tate abhorrent. *Semestres* vel potius anniculi
congrédiuntur: & singulis mœsibus in cali-
dis regionibus concipiunt. Niphus à quodam
eorundem altore accepit, fœminas binos &
ternos enixas, post quatuordecem dies ite-
rum totidem peperisse. In Germania tamen
& Italia brumali tempore rarò enituntur.
Quinos & ad summum novenos in lucem
edunt. Nonnulli in hoc animantium genere,
tam marem quàm fœminam parere fabulati
sunt. Fœmellæ per spacium unius diei supra
viginti lac catellis præbent. Si quis eos ma-
nibus pertractet indignantur, & vel deserunt,
vel lædunt, vel etiani interimunt. Mares
etiam libidine stimulati fœtus enecant, &
inprimis, si fœminæ liberis, nutriendis inten-
tæ, eos refugiant. *Naturam* & *Ingenium* se-
quentia detegunt. Saltu captum evadunt.
Locum, si quid in eo periculi senserint, dese-
runt: migrante verò uno, reliqui quoque
gregatim abeunt. Ruminare compertum
est. Sibi invicem aliquando ita æmulationis

studio infesti sunt, ut alter alterum quando-
que auribus, quandoque pedibus mutilet.
Facilè tamen mansuefiunt. Observavit Car-
danus quendam qui canes ultrò persequen-
batur. Terram assiduè fodientes, specus
multiforès sibi parant. Quare M. Varro
relinquit, in Hispania non incelebre oppi-
dum in loco arenoso ædificatum, adeò à
cuniculis subrutum fuisse, ut incolæ aliò mi-
grare coacti fuerint. Ex cuniculis nonnisi
manè & vesperi egrediuntur, nec longè ab
iisdem abscedunt. Foveas in quibus stabu-
lantur arenâ cooperiunt, ne à transeuntibus
deprehendi possint. Caro cuniculorum te-
nerior est leporina, juniorum inprimis. Pri-
mus, Hispanus quidam in escam mensis ap-
posuit. Circures in Hispania contemnuntur,
quod nutrimenti saporem concipiant. Agres-
tes in deliciis habentur. Durantes primò
elixari jubet, post herbis odoriferis & pin-
guedine suilla confici. Quantum ad *Medi-
cinam*, pinguedo nervos mulcet, & nonnullis
urinæ affectibus præsto est. Adhibetur con-
bustus ad curandam synanchen, à Marcello,
de quo vide Ambrosinum. *Differentia* cu-
niculorum à colore, magnitudine, Extis &
Loco sumuntur. Coloris ratione, sunt albi,
nigri flavi, cinerei, variegati, candidis, nigris,
vel rutilis maculis stellati. Magnitudine si spe-
ctetur vidit Valerianus Veronæ apud circu-
latorem nostris quadruplo majores, & mirâ
corpris obesitate. In Betica Plinius gemi-
nis extis esse putat. Quantum ad locum sunt
animalia quædam in India, Utia dicta, ma-
gnis foricibus similia, & cuniculis æmula.
An à Thracicis & Macedonicis cuniculis
differant, quas Scaliger leporino pilo, bre-
vioribus auriculis, corpore crasso, & com-
pacto, cauda longa & ad sciurinam acceden-
te descripsit, judicandum lectori relinquo.
Alii mures Pharaoni, squidam Indicos lepo-
res vocant. Ex Indicis cuniculis sunt etiam
illi, quos *Porcellos Indicos* nominamus. Ma-
gnitudine sunt cuniculi nostratis, sed cruri-
bus brevioribus, cum digitis senis in pedibus
anterioribus, & quinis in posterioribus.
Dentès iis ut in muribus: cauda nulla: ro-
strum acutum: aures parvæ & rotundæ, &
setis potius quàm pilis vestiuntur. Vox non-
nihil ad grunnitum procellorum accedit.
Vescuntur omni herbarum genere, fructi-
bus, pane & avena. Multorum sæpe men-
sium spacio, sine aqua aluntur. Fœmellis
septenis vel novenis mas unus sufficit. Ritù
cuniculorum superfatant. Hyeme quoque
catulos non cæcos ante sexagesimum diem
enituntur. Duo mares præsentè fœmina
præliantur. Adjecimus & alterius cuniculi
Indici iconem. Nierembergius novem cu-
niculorum Indicorum species facit. Prior,
inquit, est *Paçli*, seu Hispanicus, si in pin-
guibus versetur agris; non minus jucundam
præstat quàm apud Hispanos alimoniam.

Usum.

Differen-
tia.Nie-
remb.
H. E. l.
9. c. 8.Nie-
remb. H.
E. l. 9.
c. 7.

Secur-

Secundus est *Eliztaçtotli*, seu candens pectus. Tertius *Cuitlatepotli*, seu brevis caudæ. Quartus pertinet ad Peruvios vocatur *tocanthoçtli*, talpæ Mexicanæ (quam tucam vocant) figurâ. Quintus *quauchtoçtli*. Sextus *metoçtli*. Septimus *cacatoçtli*. Octavus *cuitlatepotli* alter. Ultimus verò ac nonus à rubeo fulvoque colore, quo variat, nuncupatur *hapaztoçtli*. Omnes formâ non nihil inter se distant, ideò diversis appellantur nominibus. Nutrimentum nostratum alimento est insuavius ac durius. Hæc ex manuscriptis Doctoris Francisci Hornandi. Labet adjicere alterius scripti sententiam de cuniculis Hispaniolæ. Erant inquit Anonymus auctor, cuniculi forma & cauda marina, licet aliquantulum minores quam Castellani cuniculi. Caro idonea & jucunda. Degunt inter herbas & in montibus non sub terrâ. Quatuor eorum species: quidam quemi dicti, in majores & duriores, alii utiæ, alii molles, alii curies, hi parvuli, delicatiores & salubriores. Huc pertinent *Vischaca*, cuniculi genus, quod feles imitetur prolixitate caudæ. Amant nyctes quos ibi etiam inquirunt gula. Pilus olim gratus, in precio & usu.

C A P U T. XV.

De Sciuro.

Primus qui hoc animalculum Sciurum vocavit, Oppianus est, qui Antonini Cæsaris temporibus vixit. Nomen videtur à *scius*, id est, umbra, & *çra* cauda, quod sibi cauda umbram faciat, fortitum. Dicitur & *καμψιου*, forte *ἀπὸ τῆς κάμπτειν* flectendo, quod clunibus infidens caudam supra dorsum flectat. Quidam *λειόν* nominavere: quod nomen gloriæ propriè competit. Latini communiter vocant Sciurum: quidam *Nitelam*, ut in Glossographo vetere extat, à nitendo, quod in scandendis arboribus nitatur: Vincentius *Pirolum*, Albertus etiam *Spiriolum*, Belluacensis *Scurulum* à currendo. Ex murium est genere. Dentes inferiores longiores habent: & cæcum intestinum quod ventriculo magnitudine respondet. Ubique ferè reperiuntur: maximè tamen in tractu Septentrionali, ubi colore pulchriores sunt. Pomis, castaneis, nucibus avellanis, faginis, pineis, glandibus etiam vescuntur: & tempore æstivo cibos pro hyeme in cavernis condunt. Tempore verno coeunt, & inter altissimos arborum ramos ex bacillis & foliis arborum nidos sibi construunt. Catuli post tertium vel quartum diem nidum deferere dicuntur. Tres vel quatuor simul pariunt. *Naturam* & *Ingenium* in eo ostendunt, quòd instinctu quodam naturali priorum pedum ministerio pro manibus utuntur: quòd aliquando ita ciculantur, ut scuriliter ganniant: quòd dum gradiuntur caudam post se trahunt, sedentes

supra dorsum eandem erigunt, & in saliendo ab eadem tanquam ab ala adjuvantur: quòd in solis ardoribus se eadem inumbrant: quòd amnes tranaturi, cortice conscenso, eadem pro velo utuntur: quòd denique tempestate prævisa, obturatis unde spiraturus est ventus cavernis, ex altera parte fores aperiunt. Apparantur à quibusdam in cibis: apud Vellejos populos inter lautitias censentur. Adeps emollit, & in aurium dolore mirum in modum à Galeno commendatur. Dentibus præstigiatores in prædicendis futuris utuntur. *Differentias* à colore & loco mutuari placet. *Colorem* si spectes. In Germania intra primum ætatis annum nigri sunt, cum adolevere rubent. In Polonia leucophæum colorem cum rutilo admixtum habent. In Russia cinerei toti conspiciuntur. In Podolia tradente Cromero, vagantur animalia sciurorum magnitudine, quæ in cavernis degentia, variis & maculosis pellibus insigniuntur. Quantum ad *Loca*, sunt Sciuri qui Mures Pontici & à colore varii dicuntur, sunt Getuli, & Indici. *Mus Ponticus* à Ponto ita dicitur Aristoteli & Plinio, quòd ex regionibus circa Pontum olim ad usum & vestitum peteretur. Matthiolus videtur *Murum Laßicum* nuncupare: alii Venetum vocant, Poloni Popieliza. Est in candido cinereus, nec adeò amplam caudam ac sciurus vulgaris gerit. Ejusdem cum sciuro naturæ. Tempore hyberno profundo somno opprimitur. Sunt alii in dorso magis cinerei, alii magis rutili. *Getulus* mixti est coloris ex ruffo & nigro, ab armis ad caudam per latera & dorsum, albæ & fuscæ lineæ alternatim certis distinctæ intervallis elegantissimè depingunt. Minor est paulò vulgari sciuro & aures habet demissas, capiti ferè æquales, orbiculares, & per cutis superficiem deductas, in longum caput ranæ capiti assimilatur. *Indicorum* sunt quinque vel sex species, de quibus ita Nierembergius. Prior *Quauhtechallotl* species dicitur *Tliltic* sive *Tlilocoteqvillin*, cognomine sumpto à corporis & caudæ colore, nempe nigro, & à pinibus quas incolit. Vescitur pomis quæ ex arboribus decerpit, in earundem cavitatibus reconditis servatisque in hiemalibus alimonias, ubi etiam sobolem educat, & nihil non abrodit. Versutus est, passerum voces sonat, & caudam, qua se totum aperit, lanigeram gestat. Mitescit facili opera, & quibuslibet alitur nutrimentis. Dum comedit, posterioribus insistit pedibus, ac ori cibos admoveat prioribus, attollens, majori ex parte caudam, aut corpus eadem, nisi in cursu tegens, tunc enim protendit illam. Iratus ejusdem pilos erigit. Adjunguntur eorum pelles internis vestium partibus, caloris conciliandi atque ornamenti gratia, fugata ad eum modum hiemalis rigoris sævitia. Secundus *Quauhtechallotl*, *Quapachtli* aut

Ufus.

Brujer. 1.
13. de re
cibar. c.
29.

Differentie.

Ambrosio. de Dig.
vit. 1. 2.
c. 27.Nierember.
H. E. 1.
9. c. 34.

Cortic-Oloteqvilin, à luteo alvi colore dictus, in duplam ferè crescit magnitudinem, alboque, nigro & fusco colore promiscuè tegitur, si ventrem excipias, qui pallens est, aut fulvus, quemadmodum attigimus, & caudam gerit prælongam pilosamque, qua se interdum operit. Vivit in terræ foraminibus & antris inclusus, in quibusetiam educat prolem. Vescitur Indico frumento, quod ab arvis raptum in hiemen recondit. Versutus est velut & reliqui, nec unquam cicuratur, aut congenitam deponit feritatem. Tertius *Techallotl* dictus, caudam ferè depilem gestat, ac breviorè, nec dodrantem vincit longitudine. Non cicuratur, sed semper mordet atrociter, & corrodit ablata omnia. Fusco & candenti colore promiscuè tingitur, & posterioribus quoque innixus pedibus, oblatam edit alimoniam, sed præcipuè maizii spicas apprehensas anterioribus. Oculi sunt magni, si illos cum cæteris partibus conferas. Vivit in antris, quæ ungibus facillè excavat, consternitque lana, gossypiove & quovis alio stramento molli, ac passeris voce imitatur. Quartus *Talmo-totli* dictus, spithameus est, caputque & oculos habet pro corporis amplitudine maxima: caudam verò longam pilosamve, & lineis albis, fuscis ac nigris interstinctam, quæ se eodem quo alii modo tegit. Color totius corporis varius est, & aliquando in fulvum inclinans, cætera præcedentibus similis. Quintus dictus *Quimichpatlan*, seu mus volans, fusco pilo nigroque promiscuè tegitur, qui propè brachia ac crura prolixior est, ac parvarum volucrum forma, cujus gratia tanta celeritate in has & illas arbores sese vibrat, ut volare dicatur. Est autem cæteris minor, parvo & murino capite, magnis auriculis, nec alia quam cæteræ horum animalium differentia utitur alimonia. Caudam ejus iustam ac redactam in pulverem, & in corpus sumptum, ajunt parientes juvare. Est & aliud genus *Xtactechalotl* vocatum, cæteris forma simile, prolixitateque & lanuginosa cauda; capite, collo & clunibus desuper fulvis; cauda per alterna intervalla cyanea, subalbidaque, sed fulvis distincta lineis, cætero corpore subalbido, unde nomen habuit.

CAPUT XVI.

De Glire.

Ambro-
sin. de
Digit.
Vivip. l.
2. c. 29.
Nomen.

GLIREM à pinguedine nuncupatum putavit Isidorus. Gliscere enim, crescere & pinguescere significat. Tota is hyeme in cavernis degit & pinguescit. Græcis dicitur *γλισ*, quod antiquioribus addito gamma, *γλισ*, unde forte glis. Vocatur ita, seu ab *γλισ*, quoniam in sylvis & locis apricis degit: seu ab *ελισ*, quod in arborum foraminibus per integram hyemem circumvolutus &

soporatus maneat. Alii *λαγύριον* quasi leporem dormientem vocaverunt: quidam *μυοζόν*, quasi rictum in comparatione ad alios mures magis acutum habeat. Est rostro, ut dixi oblongiori, acutioribus auriculis, caudâ non æquè villosâ, ventre medio magis protuberante, quàm in sciuro, latere & tergo cinerei prorsus coloris; quamvis subruffi aliquando in ventre capiantur. Non tantum in sylvis, sed & sub tectis rusticis stabulantur. In Hibernia non haberi proditur vulgo, nec alibi in illis ædificiis quæ ex lignis Hibernicis structæ sunt, quod me, falsum, experientia docuit. In montibus conterminis Goriciensi agro, & in Alpibus Carniolæ, Carinthiæ, & Styriæ, maxima illorum fætura. Vescuntur glande fagina, nucibus regiis, pomis, & aliis. Poma tamen edere quidam negant: aperire duntaxat, ut nucleis fruantur. Quantum ad *Naturam* & *Ingenium*, hyeme in cavis arborum stertendo pinguescunt: & tam altum trahunt somnum, ut igne vix revocari possint: imò

dissecti tanquam mortui jaceant; nec citius membra moveantur, quàm in aquam ferventem coniecta fuerint. Æstivo tempore congregiuntur, & autumnò suos fætus edunt. Parentes senio confectos insigni pietate nutriunt. Murium ritu, ædes ruinosas, trimestri etiam spacio, antequam collabantur, deserunt, quod earum compagem sensim dissolvi præsentiant. Senectus hyberna quiete finit, cum tantummodo sextum ætatis annum excedant. Omnes aliquando ejusdem sylvæ congregantur, & si aliqui monte vel flumine discreti ad eos accedunt, præliantur invicem. Aliquid venenati habere, constans authorem opinio: vulgatumque in cauda illud hæere, urinamque super partem aspersam, illam usque ad ossa putrefacere, vulnusque insanabile reddere. Epiphanius fætus à vipera excæcari, & untriri, sic venenatos reddi, scribit. Q. Scaurus primus in sumptuosis cœnis carnem glirium apponi jussit. Apud Romanos in lautitiis habebantur, hinc & glirariorum constructio. Optimi à mense Octobri ad Januariū censentur, quod tum valdè pingues sint. Durantes juniores in cibis commendat. In *Medicina*, invenit quoque locum. Carnis esu bulimo laborantes liberantur. Pinguedo ad conciliandum somnum plantis pedum inungitur. Excrementa in liquore aliquo pota calculos discutunt: eadem cum aceto & rore marino alopeciam sanant. Cinis combusti ad claritatem oculorum prodest, si Plinio credimus. Sunt aliquot eorundem genera. Est, Bruyerino referente, apud Allobroges, Sabaudos, & agro Tarantefio, animal quod saxa rupesque incolit, magnamque anni partem dormiendo consumit, in cibis gratissimum. In Orientalis Indiæ tractu quodam sunt Ne-

Descri-
ptio.

Locus.

Cibus.

Natura &
Ingenium.
Aristot.
H. l. 8. c.

Usus.

Differen-
tiæ.

Nefren-

frendis magnitudine, qui domos subruunt, & muros profodiunt. Ibidem sunt alii pilo rubicundo, odorem moschi spirantes. In Chiapa est animalculum, cuniculi magnitudine, gliris formâ: prolem dorso vehit, cum victum quæritat.

C A P U T X V I I.

De Muribus.

A R T I C U L U S I.

De Muribus domesticis.

Mures in Domesticos, Agrestes, Avelanarum, Arancos, Alpinos, & Aquatiles dispecimus. *Domesticus*, Latinis Mus, Ratus & Sorex, dicitur. *Mus*, à Græco *μῦς* descendit. *Ratus* majoris nomen est, à rependo vel rapiendo Græcis nuperis *ῥάττω*. *Sorex* vel à sono, quem in rodendo edit: vel quod in modum ferræ res præcidat: aut quod ex putri ut plurimum materia nascatur. *σὸρὸν* enim apud Græcos putridum significat. Apud Græcos plurima occurrunt nomina. *Μῦς*, unde mus, dicitur communiter. Scholiastæ Nicandri lingua Æolicâ *ῥάττω*, quoniam rostrum fuillo perquam simile habet. *σμίθω* Hesychio & Varino. *ἀρρῖν* Thracibus, *λαμῶς* aliis. *Descriptione* externarum partium non opusest aliquâ. Aristoteles & Plinius quantum ad interiora cor maximum habere, felle aliquando carere retulerunt. Alibi apud eundem habemus, in solis cornutis animalibus, altera tantum parte dentatis, quibus dasy-podes, vespertiones, & mures utrinque dentati adduntur, inesse uterum acetabula habentem, & potissimum tempore, quo fæ-tus in utero continetur, à quibus per media vasa pendet embryo. In iisdem à M. Aurelio Severino sequentia observata sunt, *Auricula cordis* dextra longè major est sinistrâ, inquit, & illa nigra velut cruor. Ad orificium ventriculi superius processus quidam circularis revolutus in seipsum, parte quâ ventricul-um respicit, similitudinem habens avis, qui collum & caput in pectus reflectit & condit. *Vena cava*, ubi primum ab epate exsurgit, amplo suo initio, mox verò exilior & perpetuò æqualis ascendit. Cæcum habet intestinum figuram habens ventriculi suilli, magnitudinem & circumferentiam paulò minorem. *Testes* habet non minores pullo vel grandiusculo omninò, aut magno ad corporis rationem. Credo etiam, addit, epididymida descendere inferius quàm ipsi conditi testes, estque dexter venosior quàm sinister. *Ren* dexter vicinior cavæ quàm sinister. *Veretrum* qua proximè terminatur, cartilagineum & trifido acumine compositum, ni fallor, reliquum duobus nervis. Glandulo fas habet prostatas ad vesicæ cervicem insignes. Diaphragma media sui parte pellucidum, oblongum & rotundum. Te-

stium systema ibidem vide. Dissecuit idem aliquando & murem prægnantem. In eo uteri cornu dextrum quatuor fætus continebat, in sinistra duos, sua unicuique placenta rotunda ante umbilicum disposita connectæque. In Paro insula nullas esse scripsere quidam: in Scotia circa castellum Slani, major si importetur interit, si Hæctori Boëtio credimus. In Peruana quoque olim, nulli: ex Hispania cum mercibus delati sunt. Frumento, leguminibus, pane & carnibus vescuntur: sæpe capas & allia degustant: ex pluribus caseis optimum. Sorbent quoque vinum, & lambunt oleum. Fame impulsæ, in seipsos sæviunt. Fœminæ sæpe solo salis linctu implentur. Ideò Plinius generationem eorum lambendo constare dixit, non coitu. Coire tamen certum, & unico partu, plures catulos eniti. Ex una genitos CXX. tradiderunt: apud Persas verò prægnantes & in utero parentis repertas. Generantur & ex domorum ac navium sordibus. Hinc legimus in India Orientali vermes quosdam infra digiti crassos, ex putri materia in arundinibus nasci, quorum alii paulò post in papiliones, alii in mures degenerant. In nonnullis quoque Joniæ civitatibus, ob Mæandri fluminis inundationem, tanta copia murium teste Pausania orta est, ut incolæ aliò migrare coacti fuerint. Ex putri natos non generare, & si generant, vim prolificam in filiis cessare, Cardanus prodidit. *Vocem* Homerus per *ἰζονόζων* expressit. *Antipathiam* exercent cum elaterio, scilla, colocynthide, mustela, accipitre, felibus, &c. *Sympathiam*, cum majorana ad cujus radicem in morbo confugiunt & cum suis. Muris enim jecore in ficu suis dato, nullo edito grunnitu porrigentem sequuntur, hujusque experimenti periculum Pierius Valerianus Patavii fecit. De *Natura & Moribus* hæc pauca occurrunt. Acris, nempe, esse auditus, & lumen noctu odio habere, quod oculorum aciem perstringat: in officinis aurariis & ferrariis micæ metallorum devorare, & sine dubio concoquere. Theophrastus apud Plinium author est, in Gyaro insula cum incolæ fugassent, ferrum quoque rosisse eos, id quod natura quadam & ad Chalybas facere in officinis ferrariis. Aurariis quidem in metallis, ab hoc alvos eorum excidi, semperque futurum id deprehendi. Urina alicui parti aspersa eandem erodit, si Arnaldo credimus. Plures in aquam delabentes, mutuas inter se caudas mutuo tenent, ut uno exeunte omnes evadant. Albertus in inferioris Germaniæ partibus murem se conspicuum tradit, qui nutu sui magistri candelam tenendo lumen ministrabat. *Differentias* magnitudo, color, pilus, odor, & locus suppeditant. *Magnitudinis* si habeatur ratio, Aristoteles mures in Arabia soricibus longè majores scripsit. Vitriacus in Orientis partibus vulpibus pares. Americus

Locus.

Cibus.

Generatio.

Plin. H. N. l. 10.

c. 65.

Aristot. H. A. l. 6.

c. 37.

Antipathia & Sympathia.

Natura & Mores.

Plin. H. N. l. 8. c. 57.

Differentia.

Aristot. H. A. l. 1.

c. 28.

in insula quadam maximos invenit. Quantum ad *Colorem*, asinini sunt plerique: sunt tamen & cinerei: alii etiam nigricant, alii ex fusco ad rufum tendunt. Vidit Gesnerus albidissimum in Germania mense Aprili captum, rubicundis & prominentibus oculis, barbâ multis & oblongis pilis hirsutâ. Vidit & Scaliger alium, oculis igneis, & candore insignem. Albertus quosdam albos, eosque salacissimos, & in quorum excrementis albi lapilli inveniuntur, reperiri scribit. Si *pilos* attendamus, molliores alii habent, duriores alii, & setarum instar. Plinius in Cyrenaica regione, Ælianus apud Ægyptios pilis erinaceorum acutis indutos inveniri produnt. Apud Herodotum, *ixines* genus quoddam murium leguntur. Si *odorem*, jucundi odoris à quibusdam excrementa deponi, Ruellius author est. Est & in Italia genus quoddam, quod Moschardinum dicitur. *Rationem loci* si spectes, vidit Bellonius, hoscyami semine tantummodo victitantem, dorso cinereo, ventre candido, corpore oblongo, cauda proluxa, & ore mucronato. Apud Scholiasten Aristophanis sunt *σκαλοπες* dicti. In Cappadocia apud Varinum quoddam genus *μύζης* vocatur.

ARTICULUS II.

De Muribus Aquaticis.

Mures sylvestres rusticam vitam ducunt. Servius Nitedulas, Marcellus, mures subterraneos nominare videtur, quod terram pedibus fodiendo, cuniculos sibi faciant. Græci *αρουραίοι* si per culta vagantur, *αρουραίοι* si per nemora, vocant. Nullibi eorum major copia, quam in Ægypto. Juxta Thebaidem post Nili inundationem, sole humum calefaciente, variis in locis ex terræ hiatus innumeri prodeunt. Bellonius inter Gazara & Belba tantam multitudinem vagari scribit, ut nisi ab avibus Perenopteris devorarentur, omne feminum genus abligurirent. Vorant lupulorum, pastinacæ, & omnium leguminum radices. Cinaræ maxime expetunt, An. 1271. adeò depopulati fuisse frumenta, ut magna exinde annonæ caritas subsecuta fuerit. In Boreali regione, sub nivibus latitantes, vermibus, Cardano prodente, vescuntur. Gignuntur in quibusdam locis, post repentinos imbres, aut fluminis inundationem. Muris pars anterior conspicitur formata, posteriore informi. Aliquando & ex semine propagantur. Ex Aristotele habemus, accidisse ut cum agricolæ pridie metendum statuerint, postridie totam segetem à muribus consumptam invenirent. Galeni vidimus, inquit Niphus, quod unicâ nocte totum campum segetibus maturis refertum, mures agrestes absumpserunt. In Cantabria quidam accepta mercede mures venabantur. Æoli & Trojani, mu-

rium agrestium abundantiam vexati, Smynthio Apollini sacrificarunt. Aliquando ex cuniculis egredi; eosdem sub terræ superficie struere, & bipalio apertos mox reparare: læsos, ad chondrillam confugere, naturæ ipsorum est. Reducuntur ad eos plurimi, *Differentiæ.* imprimis autem. *Mus avellanarum*, *araneus*, *Alpinus*, *aquaticus*, & *Coyopollin Nierembergii*. Nam de foricibus, qui caudam in extremo villosam gerunt, & præter alios strident: nec non bestiola Olao *Leem* dicta, quæ per repentinos imbres de cælo decedit, & donec herbam renatam gustaverit, vivit: nec non mure Napelli, quem napello vivere Matthiolus scribit, non est, quod dicam. *Mus avellanarum*, qui aliquibus Plinii forex est, aliquibus mus corylinus, duplex est, *Major* nempe, & *Minor*. Illum Gesnerus vivum aliquot dierum spacio nutrit, & refert forma & magnitudine ratto assimilari, colorem murinum per tergum & per latera magis rufum, præsertim verò in capite habere, auriculis magnis glabris, & ventre candido peditum esse: pedibus esse rubicundis, cauda tota hirsuta, oculis majusculis eminentibus nigerrimis, barba partim alba partim nigra: ab eo denique animalidomesticorum odorem emanare. *Minorem* Albertus rubicundi coloris esse scribit. Estque vel *odoratus* rarior, Muschardinus Italis, vel inodorus frequentior. Quidam *Luciolum* nuncupant, quod illius oculi maxime lucidi esse videantur. Valdè est muri araneo similis: nec fortè à mure peregrino Hieronymi discrepat. Nidificat inter ramos Coryli, vel Eupatorii Avicennæ Cannabinæ nuncupati. Nidi forma ab Ambrosino exhibetur. Tam cavernas arborum quàm terræ latibula incolit, inque iis nucibus avellanis vescitur. Quidam à fine autumnii ad initium veris dormire, & quidem continuo scribunt: alii & ex his qui nutrire, interpolato somno corripit. *Mus araneus* à figura nomen muris, ab agilitate, (super tensum filum, vel aciem gladii impune ambulare potest) aranei accipit, si Sipontino credimus; si Gesnero, à venefica facultate, ut piscis quidam araneus vocatur. Græcis est *μυζήνη* vel *μυζήνη*. Mustela eum multò minorem, colore ad cinereum declinante, & dentibus tenuibus Aëtius prædicat: brevem & gracilem caudam Albertus, rostrum verò longum & acutum Matthiolus ei attribuunt. Oculos in comparatione ad totum corpus tam pusillos habet, ut Plinius eum obtusa acie præditum crediderit, & Nicander *μεγαλὴν τυφλόν*, Vegetius murem cæcum appellaverit. Colore est partim fusco, partim rufo, cum albo ventre. Rostrum habet porcinum, pilis refertum; caudam in comparatione ad alios mures duplo minorem. Dentes Ambrosinus ita describit. Dentes, inquit, quos in illo mure conspeximus, anteriores

Scalig.
Exercit.
59.

Ælian.
H. A. 1.
15. c. 26.

Ruell.
Hist.
Plantat.
1. 4.

Ambro-
fin. de Di-
git. Vi-
vip. 1. 2.
c. 32.

Ambro-
fin. de Di-
git. Vi-
vip. 1. 2.
c. 31.
Nomen.

Ælian.
H. A. 1.
6. c. 21.
Locus.

Cibus.

Cardan.
derer. va-
riet.
Genera-
tio.

res in utraque mandibula duo erant exertī; inter maxillares nullus locus extabat vacuus, sed omnes continuati: maxilla unicum tantum habebat punctum longiusculum. Secundus omnium minimus tria habebat puncta, adeò exigua ut visum omninò effugerent. Subscquebantur maxillares quatuor: quorum priores tres majores dividebantur in tria puncta: quarti verò punctum adeò perexiguum erat, ut difficulter videretur: quatuor tamen asperitatibus aliquantulum eminentibus insigniebatur. In oris parte inferiori, præter quatuor dictos, cæteri sunt sine ullo spacio continuati. Quocirca omnes numerum vigesimum quartum explebant. Ultra Appenninum non haberi attestatur Plinius: at secundum Matthiolum in universa Italia, & præcipuè in Tridentino agro, Germania quoque habentur. Hyeme in stabulis versantur: æstate hortos & loca fimo bubulo repleta frequentant. Vescuntur herbarum radicibus: sed carduos præcipuè esculentos, magno agricolarum detrimento, devorant. Gesnerus, cadaveribus quoque vesci audivit. Veneno in agro Tridentino carere, Matthiolus prodidit: ab orbitis rotarum maximè abhorrere Barbarus. Acutissimam in comparatione aliorum murium habet vocem: sed quia hallucinantis visus, segnis. Morsum ipsius venenatum esse vel exinde colligas, quod à fele captus, non comedatur. Prægnantis, prægnanti majus parit incommodum. *Mus Alpinus* à loco in quo degit, nomen accepit. Hermolaus Marmotam vocat. Nonnulli Græci *ἀπὸ τοῦ ὄρους*, ob similitudinem quam cum mure & urso gerit. Albertus ad eum Empetram refert, sed quid hoc animalis sit, hodiè ignoratur. Capite leporem refert, magnitudine cuniculum, auresque tam breves habet, ut vix suprapilos emineant: vario oblongoque pilo instar taxi vestitur. Caudam habet brevem; pedes unguibus acutis armatos, quibus altè terram effodit. Hyeme quandoque ita pinguescit, ut monstrose intumescat. Nonnulli addunt, dentes ejus anteriores esse leporinos, & si forcipibus secantur, unâ nocte renasci. De *Interioribus* observationes Severini hæ sunt. Testes aliquantulum superiores. Cæcum peramplum; ventriculi modo, internè asperum & reticulatum, in quo vulva insignis introrsum externè. Hepar multifidum septenis lobis distinctum, quorum major vergit ad sinistram partem, reliqui ad dextram, omnes à se invicem distincti. Cystis fellis cholidochi valvula ad duodenum. Splen longus hirundinis majoris modo. Ureteres non recto ductu descendentes à renibus, sed dorso hærentes & exigui. Frequentissimi in Annanienfibus Tridentini soli montibus conspiciuntur. In nivosis quoque & frigidioribus Germaniæ partibus versantur. Vescuntur

fructibus, lacte inprimis, quod more porcellorum sugunt. Ideò sæpe in pastorum casis deprehenduntur. Cicurati edunt pulmentum, panem, pisces & alia quæ illis objiciuntur. Circa festum Nativitatis Dominicæ terrâ effossa dormientes deprehenduntur, nec citius expergiscuntur quàm à solis vel ignis calore resoluti. Levem ob causam metu consternantur: indignabundi, argutam, sibilantis fistulæ instar, vocem edunt: vel aëris mutationem prænunciant. Odore sunt tam gravi, ut vix æstate perferri possit. Nec deest ipsis ingenium. Appropinquante hyemè fænum & paleas in latibula convehunt. Vnus stratus humi fæno oneratur: alii caudâ onustum in cryptam pertrahunt. Duo foramina in uno quoque latibulo parare solemne ipsis est, per quæ in unum locum tendunt, & juxta unum excrementa deponunt, & per aliud in cryptam ingrediuntur. Adventante frigore meatum ingressus claudunt; exasperato, aliud adeò obturant, ut ne bipalio quidem penetrari possit. Circa finem Septembris in cryptam ingressi, conglobati, septem pauciores vel plures, sed impari plerumque numero, super stramine ad vernum usque tempus sterunt. Reliquis egressis, cryptæ custos adstipit, & ex alto speculatur. Si quid observaverit, voce acutissima monet. Sic ad cryptam concurrunt, ipse ultimus ingreditur. Sereno duntaxat cælo colludunt, obmurmurant, & aliquando, observante Stumpfio, canicularum instar latrant. Cicures dentibus pediculos hominis, simiæ instar, venantur. Veniunt apud Alpium incolas in cibum, inprimis circa hyemis initia. Assantur, coquuntur injure nigro, & sale inspersi infumantur. Puerperis etiam conceduntur. Pinguedo nervos contractos emollit, & illita umbilico somnum conciliat. Ventriculus colica laborantibus utiliter imponitur. *Muris aquatici* meminit Aristoteles in *Mirabilium* libro. Bellonius ipsi tres meatus assignat, unum pro facibus, alterum pro urina, tertium pro fætu. Si Clusium sequimur, magnitudine ad talpam accedit. Coloris est fusci præterventrem, qui pilis ex albo cinereis vestitur. Villis tegitur densis & molli-bus. Caput pro ratione reliqui corporis est parvum: pars superior rostri prominula. Dentes quatuor, in utraque maxilla bini, sed in inferiore minores & obtusi. Oculi vix conspicui. Rictus latera longis cinereis villis obsita. Cauda rarissimos pilos habet, & ossæo quodam nervo mediam secundum longitudinem secat. Posteriores pedes anterioribus sunt longiores & magis plani, & membrana quadam, prout in palmipedibus cernitur, conteguntur. Ad Strymonem & Nilum frequentissimi sunt, & serenis noctibus vagantur. Gesnerus in parvulis rivis versari scribit. Aristoteles Lusis Arcadiæ in fonte

quodam. Vescuntur plantis aquaticis, frugibus, & piscibus. A Magis olim Zoroastrem secutis mali Dæmonis esse putabantur: si modo de muribus istis, & non testudinibus id sumendum est. In nonnullis Galliæ locis in cibo adhiberi, proditum à quibusdam. De *Coyopollin* ita Nierembergius. Vocant Indi Coyopollin parvum animal, muris mediocris magnitudine, aut paulo majus, caudâ verò auriculis & rostro Tlacuatzin simile: nam caudâ & pro manibus utitur, & natus matrem, cum metuit, stringit amplexu. Cauda est crassior murinâ, firmiorque: venter ex albo pallefcit: auriculæ sunt translucidæ, pedes & crura candida. Educat in arboribus sobolem. Posset ad genera Tlacuatzin referri, nisi alicui præplaceat pertinere ad mures, aut esse sui generis. Invenitur in montibus tepoplanicis. Cæterum crocodilis quoque cauda pro manu est, illâ nimirum arripiunt prædam, belluas, homines.

CAPUT XVIII.

De Talpa.

Ambrosin. de Digite. Vivip. 1. 2. c. 36. Nomen.

Descriptio.

Nomen Talpæ huic animali quod descripturi sumus Latini indidere, seu à Græco *τάλα* inhumo, quod assidua terræ effossione seipsam quasi inhumare videatur: seu quod cæcum sit, quod Græci *τυφλόν* vocant: seu quod se perpetuo *ταλπῶν*, id est foveat, sub terra: seu à Thaldæico *thalda* finire, quod terram findat. Græcis dicitur *σπίλαξ* & *ἀσπίλαξ*, *παρά τὸ σπῆν*, quod terram unguibus assidue vellicet: Nicocli *σπάλος*: Varino *σίφνης*, quod terram fodiendo evacuet. *σίφνης* terram, & *σιφνύειν* Varinus interpretatur. Volaterranus & alii nuperi auctores Græcæ blactam, *ἀπὸ τοῦ βλάττειν*, id est à nocendo vocant, sed perperam. Descriptionem quod attinet, Scaliger muri non valdè similem scripsit. Corpore latiore & depresso, pedibus quodammodo urfinis, cruribus brevissimis, capite bufonino. Albertus quinque digitos in pedibus anterioribus, quatuor in posterioribus habere scripsit: Gesnerus, quintum ita introrsum spectare, ut minus curiosè spectanti occultetur, reliquit. Palma anteriorum pedum lata & manui simillis: *Collum* inter crura anteriora brevissimum & propè nullum: *pili*, breves, densi, & in nigredine splendentes. *Interna & Anatomica* si spectes, *Dentibus* binis & antè conjunctis caret, sed instar canis & mustelæ utrinque ad latera singulos eminentiores habet. *Pulmones* cum multis fibris separatis, nullo inter se communi principio cohærentibus, una cum corde, versus inferiorem ventrem siti sunt. *Crura* anteriora ex duobus constant ossibus, quæ in os humeri inferuntur.

Sic fortius bestia hæc fodit: posteriora crura habent, quod paulo infra genu in alia duo dividitur. M. Aurelius Severinus hæc de internis in talpa mare habet. Viscera, inquit, omnia, sicut in aliis quadrupedibus. I. Præterquam, quod nullum colon, intestinaque reliqua ferè uniformia, nullum enim cæcum. II. *Testes* intrò conditi sicut in dasipodis, colore tamen nigro: neque in loco, qui proxime renibus esse solet, sed à lateribus vesicæ, in infima abdominis cavitate. III. *Renes* conjuncti proximæ venæ cavæ pusillo, sive spatio emulgentium. IV. *Fel* pro corpore majusculum, cum conspicuis cholidochis. V. *Ventriculi* janitor lineâ quâdam transversa, veluti ligatus atque distinctus. VI. Vasa ferentia suffulta (si rectè memini) ureteris. VII. Larynx, qualis in testudine terrestri, mutum enim animal. VIII. Observata in *interna aure* duo, malleolus & incus, mire perpusilli: Os inter medium duobus aurium ossibus egregiè pumicosum. IX. Processus inferioris *maxille* utrique tres, X. Vera equidem sunt, quæ scribit Plinius de *oculis* talpæ. Visuntur enim ipsi in suo loco nigri toti, contexti cute pusilli, quale est semen Psyllii: nulli ipsis inserti nervi optici, (quantum mihi advertere licuit) nec satis scio, num fungi videndi munere possint; non eam solam ob causam, quod tecti corio sunt, verum quod multa eis adhuc desint, quæ necessaria sunt. Omnino autem existimârim, vestigia hæc esse oculorum potius, quam oculos verè, in quibus ludere voluisse naturam appareat, atque ostendere, non deesse sibi facultatem oculos fingendi, quando velit; aut verius fortasse fingimus hæc ipsi. Rursus & in alia talpa Anno 1617. observata hæc: *Panniculus carnosus* totus & mirè commissus cuti. Cerebrum pro ratione magnum & benè distinctum & exornatum. Auriculæ non sunt externæ, interna penitus abdita, cujus ossicula tria supra modum perpusilla; intestina funiculi simplicissimi modo exilia. In Thessalia adeò humus talpis familiaris, ut suffossus ab iis ibi oppidum quidam prodiderint. In Orchomeno agro, prodente Aristotele, frequentissimæ vagantur. At in Lebaica nullæ sunt, nec illatæ effodiunt, forte propter soli duritiem. Lumbricis præcipue vescuntur: ideò stercoreatis & sterquiliniis gaudent. Absumunt & omne aliud vermium genus, eoque deficiente, terram comedunt. Visi radices herbarum & frugum, bufones etiam infestare. Ex terra pulvis madida, & putrescente, ut plurimum generantur. Nec per horæ spacium supra terram vivere posse dixit Albertus, sed falsò. Visum quidem habent hebetem, sed auditum excellentem. Invenit in Medicina & aliis usum. *Dens* à viva evulsus dentium dolores sedare creditur. Pilullæ ex ea cum melle

Severin. in Zootomia Democrit. p. 317.

Locus.

Plin. II. N. l. 8. c. 28.

Cibus.

Usus.

melle subacta & devoratae strumas absumunt. *Caput* incisum, & cum terra à talpis eruta tustum, inque pyxide stannea in pastillos digestum, contra omnes colli dolores exhibetur. *Sanguis* pilos restituit: & ad paronychias commendatur. *Adeps* ad capillorum augmentum suppressendum conducit. Marinellus in hoc casu unguenta quæ ex pinguedine talpæ & vespertilionis componuntur, præscribit. Cinis in sanandis fistulis chirurgis inservit. Mizaldus periclitaturus an æger moriturus sit, nec ne, chelidonium cum talpæ corde pulvino ægrotantis supponit. Cantaturum, aut clarâ voce vociferaturum credit, si convalescet: fleturum, si minus. Aquâ, in qua talpa maduit & pilos deposuit, pili restituuntur. Ex pellibus pileolos confici, memorat Agricola.

C A P U T X I X.

De Echino terrestri.

EChinus, non ab aculeorum hirsutie, sed *potius* ἀπὸ τῆ μὴ δυνάσθαι ἔχιδνα διὰ τὰς ἀκάνθας, quod ob aculeos teneri non possit, nomen sortitus est. Galenus Acanthionem terrestrem vocat; Suidas ἀκανθοειδὲς. porcum spinis horrentem, γόλιον, & χοιροχρυσάλλον: Hesychius ἀκανθοειδὲς, propter dorsum spinis refertum: Lycophron ab insigni vaframento Nauplium nuncupavit, quod nomē Latini Echino marino tribuunt. Quidam cum Plinio, Hericem, Hericium, & Herinaceum proferunt; nec malè. Ab horrore enim, vel etiam ab hærendo, quod fructus ejus spinis adhæreant, hoc animal dictum esse videtur. Est bellua, ut Hermolaus breviter descripsit, cuniculi magnitudine, aculeis vallata præterquam in ore, & pedibus, parte inferiori, quam rara lanugo tantum operit. Observata in illo. *Musculi* conglobatores totius corporis. *Intestina* æquè crassitudinis, imò verius tenuitatis quàm longissimæ, sine cæci aut alterius distinctione: in summa, qualia muri. Quin paria istorum stercora, pares testiculi, qui proximi peni; hic longissimus exortus in viam caudæ compressus semen emisit, muciflavioris imagine. Septipinne *jecur*. Peni adstites carunculæ quædam subalbidæ, racemosæ, in pinnulas distinctæ, rupis preruptæ modo, quas pulmonis fibris quadantenus assimilare possis. *Testes* intus latent, & lumbis affiguntur. *Ossa* quædam rotunda, quædam planiora, acuta alia, alia obtusa conspiciuntur. Ubique locorum reperiuntur, Cretam si excipias, si Plinio credendum. Ad annum absque cibo durare posse, scripsit Aristoteles. Pomis verò & uvis ut plurimum victitat, quæ decussa & spinis infixa ad latibulum defert. Lacetiam & vinum in ædibus potare animadversum. *Inimicitias* gerit, cum urso, lupo, vulpe, vi-

pera, & potamogeto herba. In orbem colligi, & quasi mortuum jacere, simulatque vel canum latratum sensit, vel ferarum odorem vel venatorum accessum; cubilia ad Aquilonis & Austri vicissitudinem commutare; & si domi alatur, pro ventorum flatu modò ad hunc, modò ad illum parietem accedere, ut Aristoteles reliquit; dum capitur, urinam, cujus contactu spinæ dorsii decidunt, emittere; humano denique ritu congregi, ad naturam ipsius spectat. Venit apud quosdam suillus erinaceus in cibum: sed nisi benè apparetur, stranguriam adfert. Ideò unico ictu mactandum, & vasis urinæ expurgandum quidam censuere. Mense Augusto ob pabuli copiam sunt pinguiore. Durantes cum multis aromatibus in artocreate coquit: Gesnerus in aceto & vino fervefacit, deinde lardo & caryophyllis distinctam, in veru torret. In Medicina multum adfert emolumentum. *Hepar* renum vitiis miro est auxilio. *Felle* contactæ verrucæ siccantur. *Lien* affatus & pulverizatus efficacissimo est lienosis remedio. *Caro* ad prohibendum abortum præscribitur. Eadem, unico ictu mactati stranguria laboranti commodè suspenditur. *Exsiccata* plica laborantibus exhibetur. *Adipe* in autumnio capti Poloni in eodem morbo utuntur. Idem in lithiasi insignem habet prærogativam. *Sanguinis* haud spernendus est in lapide vesicæ, renum, & ardore urinæ usus. Cinis *Combusti* cum adipe ursino capillis decorem restituit. Eodem ad præcavendum abortum cum oleo unguine multi utuntur. Adhibetur idem in renum doloribus aqua intercute & aliis. *Fimus* recens cum sandaracho, aceto, & pice liquida, fluxum capillorum cohibet. *Corium* cum spinis olim ad extergenda vestimenta adhibebatur. Distinguitur in Suillum, qui rostrum sui simile habet, & *Caninum*, qui canis. Ex eodem insignis fætor exhalat. In Brasilia, ut Jesuita quidam apud Majolum habet, animal Echino simile vagatur, cujus setæ prælongæ coloris pallidi & in summitate nigræ, valdè aculeatæ erant. Mirum in illis natura recondidit. Cuicunque enim cuspis ejus admovetur, etiam ab animante revulsa, illam, & præcipuè carnem penetrat: experimentoque compertum est, hujusmodi aculeum, unius noctis intervallo crassissimo corio admotum, illud perinde ac esset manu hominis impulsus, penetrasse.

C A P U T X X.

De Histrice.

ERinaceorum generi adscribit Hystri-
cem, Plinius, Ælianus & Oppianus. Græcis ὑστρίξ ὑστρίξ, & ὑστρίξ ὑστρίξ nuncupatur, à ὑστρίξ & ὑστρίξ sine dubio. Plinius foeminino genere effert, masculino Oppianus. Quidam sub muris Africani Plauto veni-

Aristot.
H. A. l.
9. c. 6.

Ufus.

Differen-
tia.

Ambro-
sin. de
Digit. Vi-
vip. l. 2.
c. 38.
Nomen.

Ambro-
sin. de
Digit.
Vivip. l.
2. c. 37.
Nomen.

Descri-
ptio.

Severin.
Zoot.
Demo-
crit. p.
319.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 12.
Cibus.

Ælian.
H. A. l.
16. c. 69.

Descri-
prio.

venire crediderint, quòd frequens in Africa esse perhibeatur. Isidorus à stridore quem aculei in motu animalis excitant, deducit, & sine aspiratione scribit. Claudianus eum ita descripsit.

os longius illi
Assimilat porcum, mentita cornua seta
Summa fronte rigent, oculis rubet igneus
ardor,

Parva sub hirsuto catuli vestigia dorso.

Locus.

Cibus.
Agricola
de Ani-
mal. sub-
teraneis.
Natura.

Usus.

Differen-
tia.

At si Agricola attendimus, habet Hystrix es leporino simile, dentes quatuor longos, duos in superiore, totidem in inferiore parte, aures humanis similes: pedes anteriores pedibus Taxi, posteriores ursi assimulantur. Dorso & lateribus spinæ bicolores, partim albæ partim nigræ insunt, & aliquando ad duorum vel trium palmorum longitudinem accedunt, quas animal, ut pavo caudam, erigere potest. Ingressuras in cavernam, erectas dimittit. Solinus in Æthiopia frequentissimos vagari scribit: quamvis in tota Africa & India inveniantur. Habentur & in Italia; sed in Gallia raræ. In Galæcia reperiri, Compostellani peregrinatores testantur, qui eorum aculeos in pileis deferunt. In dumentis autem & vepribus latent. *Victitant* pomis, rapis, pyris, pastinacis, & pane comminuto: bibunt aquam, sed vino mixtam avidissimè. Aculeos tensâ cute in hostem ejaculari, unde fortè sagittandi ars, & nomen *ακνυδοβία*; destinato ictu ferire, noctu magis quàm interdiu ad pascua progredi; hyeme in cavernis latere; tot dies quod urfa in utero gerere, à natura obtinuit. Nec huic gula pepercit. Commendatur enim in epularum magnificentia. Apparatum vide apud Ambrosinum ex Scapio. In Medicina videtur iisdem affectibus conducere quibus erinaeus. Mulierès ad discriminandos capillos aculeis eorum potius quàm acubus utuntur. Plinius ex iisdem dentiscalpia ad roborandos dentes conficit. Circa *Differentias* nihil ferè occurrit. Quidam in Marinum & Terrestrem distinguunt, & dentalium pro marini aculeis venditant; sed nimis audacter. Nemo enim authorum marini meminit. Referri huc potest incertæ naturæ animal, quod Cardanus Anno 1550. Papiæ vidit. Magnitudine erat vulpis, rictu leporino; dentibus prominentibus ad instar sciuri; oculis nigris & serpentinis; comâ hircinæ barbæ simillima, quæ à capite ad collum ferebatur, cum pedibus anterioribus taxi, posterioribus ursi; auribus in figura humanis; cum spinis ferè centum more hystricis, quarum quædam in apice curvabantur, alioquin immobiles, & in motu animalis strepitum edentes. Cauda animalis erat anserina, cujus plumæ paulatim in spinas degenerabant. Vox subobscura & rauca quasi latrantis canis: canesque odio prosequabatur. Fortè ex hystrice aliaque bestia natum erat.

CAPUT XXI.

De Tato, seu Echino
Brasiliano.

Tatum Nierembergii verbis describemus. Cataphractum, inquit iste, quoddam animal Indiarum varie appellatum invenio. Hispani nuncupant *Armadillo*. Lusitani *Sneubertado*. Itali Bardato: Thevetus Brasilico nomine *Tatau*, Maphæus *Tatusiam*, Gesnerus *Tatum*, nova Hispania *Chirquinchum*, alicubi *Cassamin*, aliis Indis *Ajatochtli* dicitur, hoc est, cuniculus cucurbitalis; specubus enim, quemadmodum cuniculus conditur. Una nocte spacium leucæ excavat; quare nil ligetur, nullibi se includi patiens, perfodit usquequò extra domum & oppida emergat. Variæ sunt species horum loricatorum: mihi omnium mirabilior *ajatochtli*, cujus & rarior mentio & sterilior, quare illum præsertim narrabo. Duris armatur laminis, quas ipse vidi. Canis Melitenensis est magnitudine. Pedes ei suis parvuli, rostrumque sed oblongum & gracile. Armatur undique crusta, militari & cataphracto equo persimili, in laminas connexas atque mobiles divisa, quibus se convolvit atque undique tegit. Auriculæ murinæ, sed longiores; nimis graciles. Cauda ejus est longa, teres, geniculata, eodemque modo laminis crustatis circumvallata. Venter candet, ac pelle operitur molli, humanæ haud dissimili, longiusculis exilibus, ac raris pilis vestita. Formicas venatur. Cubat supinus, atque cauda ori admota, qua rectà procedentes formicæ incidunt in insidias, & cibum deludenti suggerunt. Antonius Herrera addit, lotio proprio implere lacunam super ventrem inter crustas suas, sic formicas, humore obstante, per caudam procedere usque ad os. Cum fugit, in præceps caput caudamque ventri applicat, ac tuetur crusta, & sese in spiram convolvens rotat. Quòd si pertinacius quispiam insectari perseveret, semet in venatorem contorquet; ut haud rarò, validè tundens dorso suo pectus hominis exanimat. Versatur in uliginosis lacubus. Lumbrius, piscibus ac vermiculis vescitur, & quibusdam arborum baccis & pomis. Caro impensè pinguis, dulcis, ac pituosi alimenti, & excrementis redundans. Utebantur cauda antiqui ad eas, quas zebratanas vocant, (quarum apud illos usus frequens) munientas. Crusta multis rebus utilis, tum ad bellicos usus, tum ad pacem opportunis. Adjunt illius crustam tritam, ac drachmæ unius pondere intrà sumptam, evocato sudore magnopere conferre morbo Gallico curando. Invenitur locis calentibus lacustribus & uliginosis. Duæ apud Lucatanenses horum animalium sunt differentia. Quædam innoxia

Nieremb.
Hist.
Exod. l.
9. c. 6.

noxia & gratissimi alimenti sunt; alia noxia & venenata, ut vomitu ac flatu alvi citato syncopen inducant, tandem interimant. Antidotum est oleum olivarum, nisi virus invaluerit, frustranea tunc remedia. Si fortasse aliqua juverint, diffuunt superstitionibus capilli, languet color, marcent vites. Distinguuntur testarum seu laminarum numero. Innoxia octonis, noxia senis constant. Innocua etiam coxæ, osse carent, & maculis rubeis circa ventrem distinguuntur. Est autem hoc animal viperis, quæ sono quodam perstrepunt tam charum & amicum, ut eodem foramine, sine alterutrius injuria condantur. Primum illud genus videtur descripsisse Consalvus Ferdinandus Oviedus hac sententia. *Κατάφευξις*, sive undique armis munitus, animal est aspectu admirabili, valde diversum ab iis quæ aut in Hispaniâ, aut in aliis Europæ regionibus conspiciuntur. Quadrupes est animal, totumque corpus cum caudâ corio tectum habet simili corcici lacerti, de quo infra sumus dicturi (crocodilum Americanum intelligit) coloris inter album & cinericeum mixti, ad album tamen magis accedentis. Ejusdem verò est formæ cum equo undique armis munito, caniculæ autem vulgaris magnitudine. Non est animal noxium; domiciliumque habet in terrenis tumulis, pedibusque terram egerendo, squalatibula fodit cuniculorum instar. Capiuntur hæc animalia retibus & balystis, petita occiduntur, magnâ autem ex parte sementis tempore, quando stipulæ aduruntur, aut agricoluntur, ut gramen producant in boum & animantium pabulum. Aliquoties me hoc animal vefci contigit, ac sanè melioris saporis quam hædos, & salubrem cibum esse comperiebam. Caterum si hæc animalia in iis Provinciis conspecta fuissent, in quibus equos undique armatura muniendi consuetudo originem sumpsit, ex hujus animalis aspectu exemplar desumptum opinari quis posset. Cum alii Auctores Oviedo refragentur, aliud genus armatorum, quàm ille cogitant. Diversa, quæ de loricato animali seu tato narrantur, de diversis speciebus, pro diversitate provinciarum accipienda sunt. Sic Monardes prodit, nunquam visum edere, ideoque sub terra duntaxat, & ex ipsa terra ali: Gesnerus contrâ, licet perpauca, de illo ait, allatum in Galham seminibus & fructibus visum vefci. Neutrum refuto, cum de diversis loqui possint. Agnoverunt quoque tria genera horum armatorum Jacobus Plateau & Clusius: unum brevissimæ caudæ, quod sic describit: *Habebat porro id animal pedis unius & quatuor unciarum longitudinem, corporis verò ambitus erat quatuordecim unciarum, binis videlicet minore longitudine. Ejus tegmen durum & testaceum, fuliginosi coloris, quem forte vetustate & ma-*

nuum tractatione contraxerat, quodammodo tessellatum. A collo ad medium corpus, quasi orbiculatæ figuræ tessellis variè pictis distinctum, medio autem corpore ternis ordinibus quadrangularem tessellarum variè etiam picturarum insignitum. Postrema tegminis pars similibus orbibus distincta erat, qualibus pars anterior. Totum etiam caput ad nares usque similibus testis tectum. Aures patentiores, nec adeò mucronatas habebat. Cauda brevis erat, duobus digiti humani extremis articulis non major, tota etiam orbicularis tessellis tecta. Ventrem nulla crusta tectum fuisse, sed villis duntaxat obsitum, pictura repræsentabat, quemadmodum etiam crurum posteriorem partem, atque guttur & nares. Posteriores pedes ternis digitis, & calcari præditos fuisse, pictura fidem faciebat: anteriores vero duntaxat binis & calcari, nisi à pictore fuerint prætermissi: penem satis longum & exertum habebat. Nescio an huic desit virtus, quam de Armadillo, sive tato caudato Monardus dixit. Præcipuam ejus vim in caudæ osculo esse: cujus in tenuissimum pulverem redacti pilula, confecta magnitudine capitis avicule, atque auri indita, dolorem ejus sedare; Et tinnitum etiam cum exigua surditate conjunctum curare traditur. Certè dolorem sedare, frequenti experientia probatum est. Adjicio astum Chirquinchi, quod audiavi ab his, qui primùm fama, deinde visu acceperunt. Testes oculati sic referunt. Pluente cœlo supinus jacet: in ventre qui exermis est, colligit aquam contentam inter crustas laterum, sic perdurat transacto imbre fermè diem integrum, donec occurrat incaute cervus sitibundus, qui accendens ad potum, immergit buccam, tunc claudit se Chirquinchus, labra & nares comprehendens cervi. Hic discurrit hinc inde: nunquam laxat prædam chirquinchus, donec fatigatam interimat angustię spiritus. Astum quoque erinaceorum habet, in crustis suis se, dum timet, conglobat, nec nisi ad ignes relaxatur. Conchulis hujus animalis utuntur Indi in maleficis, præcipuè ad explorandos & puniendos fures. Tangunt prius cum concha terram à fure calcatam, sive aliud quicquid ille attigerit: implent maxillam potione quam chicham vocant: tympanis deinde circumsonant, concha interim sponte subsultante & tripudiante. Hoc beneficio notatur vultus furis pustula, in genis quæ per utramque maxillam serperet, nisi maleficium diligentur dissolvatur.

TITULUS III.

De Quadrupedibus Domesticiis.

CAPUT I.

De Canē.

Ambro-
fin. de
Digit.
Vivip. 1.
3. c. 1.
Nomen.Descri-
ptio.M. Au-
rel. Seve-
rin. Zoo-
tomia
Demo-
crit. p.
306.

Tantum de Semiferis, sequuntur *Dome-
stica*, *Canis* nempe & *Felis*. *Canis* vox o-
lim Canes, ut plebes, trabes, pronunciaba-
tur, venitque si Varroni attendimus, à ca-
nore latratus, quòd voce signa edere soleant.
Græcis veteribus dicitur *κύων*, & in obliquo
casu *κυῶς*, sine dubio *παρὰ τὸ κύω*, amo, seu
quòd proniores sint in Venerem: seu
quòd animal sit *φιλοδόξον*. Modernis vo-
catur *κύων* nomine fortè à Scylax detor-
to. Aliis *ὀλέκτωρ* latrator, à voce quam e-
dit: nec non *ἀκυνθὶς* apud Hesychium &
Suidam, *παρὰ τὸ ἀκύνειν*, quod cauda no-
tis blandiatur. *Descriptionem* non est quod
addamus. Notissimum utpote animal est.
In Cane secta sequentia observata sunt Se-
verino, quæ ejusdem verbis exponemus. *U-
terus*, inquit, bicornis, cervice brevitate &
angustia medio digito respondente. Cor-
nua lata, quantum manus caperet, longitu-
dine majori, quam palmari communi men-
sura, crassitudine ubique æquali circumvo-
luta autem simplici gyro, non anfractuosa
vel cellulata, uti fuillus. Feruntur extre-
ma cornuum usque ad renes colligata venis,
quæ ad uterum veniunt, & testibus ipsi in-
cumbentibus per membranam. Ad ostium
primum cervicis visitur corpus quod dum
mole, figura atque colore referens caput li-
macis exertum à sua cochlea. Impositus in
hujus os stylus ferreus non est admissus, nisi
postquam est dissectus parum. Dissecto u-
tero inventi sunt involuti fætus, involucria
autem tria, chorion, allantoides, amnion:
sed priora vix dividi possunt; adeò sunt
aînnexa, adeò sunt tenuis substantiæ: In
dextro cornu catuli quinque, in sinistro
quatuor, singuli suis involucriis contenti,
chorion unicuique per medium; transver-
sim positæ zonæ latæ duorum digitorum, di-
stinctæ lineis atris ab extremo, & rubrâ in
medio: singulæ autem sanguinem fuscum co-
lore sibi respondentem repræsentant. *Omen-
tum* veluti faccus, qui integit intestina supe-
riora; nascitur ejus pars superior è fundo
ventriculi per mediam ipsius lineam totum
ambiens; simpliciter & pars posterior quæ
inferitur in lienem & in pancreas. *Pancreas*
autem statim apparèt post exortum duode-
ni, illigatum huic & venæ portæ. *Vena porta*
mittit triplicem ramum ad conterminas
partes mesentericum, celiacum, spleni-
cum. Celiacus excurrit partem ventriculi

concavam. Splenicus mittit superne ra-
mum ad ventriculum parte hujus convexâ
per mediam lineam, usque quo superius
ventriculi os pertingat. Ligatus est *splen*
diaphragmati per mediam membranam
plus digito latam, & ventriculo per omen-
tum: Habet splen figuram propè pedis
amplè calceati. *Colum intestinum* nullum,
recti finis partem accepit cæcum, cujus
figura veluti involuti, quod explicatum
longitudine est medii digiti. Ad finem recti
internè *valvula* una insignis, altera in cæci
principio sed minor. *Rectum* parte inferio-
re valdè corrugatum: Ab aorta sursum
convolutus ad cava hepatis plexus arteria-
rum, qui appropinquat pancreati, attra-
ctum hoc attrahit hepar & superiora visce-
ra. Supra os superius ventriculi glandulæ
duæ, major & durior dextra quam sini-
stra, ambæ succulentæ humidiores. *San-
guis* canis ater valdè, propter adustionem
quippe. Ad finem *linguæ* inferitur muscu-
lus teres descendens per mediam ipsius li-
neam. *Auricula cordis* dextra duplo major
quam sinistra. In cranii parte tum dextra,
tum sinistra, quas integunt muscoli tem-
porales; nulla apparet involvens membra-
na, præterquam ea, quæ propria muscu-
lorum est: in aliis vero cranii partibus ma-
nifesta apparet. In radice linguæ utrinque
est glandula parva & producta obliquo fi-
tu. Circuli arteriæ asperæ transversim po-
siti, non sicut in sue obliqui. *Canis cere-
brum* majus quam suis. Inverso cerebro
patuere processus mamillares & spinalis
medullæ initium, per quorum medium
facta sectione profundiori patuerunt duo
ductus parvi, alter, qui à parte mamil-
larum per rectam lineam tendit ad finem
usque cerebelli, alter paulò citerius super-
ne positus huic obliquè. De cætero, pedes
canum anteriores in quinque digitos, po-
steriores in quaternos distincti sunt: foemi-
narum venter, duplici mammarum ordine,
in utroque scilicet latere, exornatur. Al-
bertus etiam generosi canis imas nares, ro-
tundas, solidas, & ferè obtusas observat.
Aristoteles verò & Ælianus calvam futuris
carere asseverarunt. Galenus denique mu-
sculos temporales in canibus veluti in lupis
& leonibus robustissimos observavit, quòd
in fragendis ossibus maxillas exercere so-
leant. De *Loco* hoc tantum pono, nullos in
Brasilia ante Vilagagnonis expeditionem
fuisse, si Lerio credimus: si Textori, Si-
garon Arabiæ insulam non ingredi; ingres-
sos, vagari donec pereant. *Induræ* sunt:
nec vel à piscibus, vel à cadaveribus absti-
nent, quod primum Balbus in itineralio
prodidit. A carne tamen suæ speciei, ut &
fulmine iectis abhorrent. Gramen etiam
comedunt, sed medellæ gratiâ. Fraxini
fructu abstinent, quòd vertebræ coxarum
dolo-

Galen. de
usu part.
l. 11. c. 9.

Locus.

Cibus.

dolorem inde incurrant. Potione vini vel aquæ ardentis dementantur, & divagantur, donec vapor evanuerint. De *Generatione* nota. Semper eis coitum opportunum: Tardivus tamen veris initium, rarius autumnus tempus congregiendi idoneum, scripsit. Coeunt ad annum duodecimum & implentur: sed sæpè post novem sunt inutiles. Degenerant, si annui venere utantur: si quarto anno, generosiores producant. Quatuordecim diem spacio vel circiter libidine tenentur; & post sextum mensem à partu marem iterum appetunt. Dum turgescere incipiunt, foeminæ genitale prominet & humescit. Congrediuntur autem & cum aliis animantibus; ut cum lupis in Cyrenensi agro, unde nati Crocutæ: cum leonibus, unde Leontomiges: cum Castoribus unde Castorides; cum vulpibus unde Alopecides. Averfam exercent Venerem & cohærent. Ferunt dies sexaginta, quædam sexaginta tres. Pariunt duodecim: aliquando & sex decem. Visa Bononiæ leporaria, quæ septendecim enixa est. Albertus verò prodit, se, ex illorum genere qui Mastini dicuntur, vidisse, quæ primo partu novendecem, altero octo decem, tertio tredecem dedisset. Quæ mulieribus in deliciis, singulos ferè enituntur catellos. Primum mares parere, & in cæteris fæturis alternare ex Plinio dicuntur, dum modo tempore opportuno congressus fiat: primusque catulus, in lucem prodians, secundum nonnullos patrem refert: cæteri, ut casus tulerit nascuntur. Gignunt cæcos, & quo largiore aluntur lacte, eo tardioris visum accipiunt: non tamen unquam ante vicesimum primum diem, nec ante septimum. Quidam tradunt, si unus gignatur, nono die cernere; si gemini, decimo. Idemque in singulis adjici, totidemque esse tarditatis ad lucem dies: quod tamen nondum experientia demonstravit. Lac ante diebus quinque quàm pariant habent magnâ ex parte: quibusdam quatuor diebus anticipat. Crassius id quàm cæterorum animalium, scrofam & leporem si exceperis. Non excedunt annum decimum quartum communiter: quamvis quidam ad vigesimum secundum ascenderint. Laconici, inquit Plinius, annos decem, foeminæ duodecim, cætera verò canum genera quindecim vivunt. Junioribus albisissimi sunt dentes, & vox acuta: senioribus hebetes, crocei, & vox crassior. *Vocem* authores variè expressere. Latrare & bauba edicuntur communiter: βάλζειν Græcis catuli, ὀλακλῆν adulti: λαπλεν dum bibunt: κνυζάσαι grunnire, dum queruntur aut blandiuntur: σκυζῆν, canire & cattillire; dum libidine feruntur: προκωεῖν, quando latrant antequam feram invenerint: ἀπαρίζειν, quando irritantur. De *Antipathia*

hæc pauca sufficiant. Metuere hyænam in tantum, ut ejus umbra, si Plinio & Solino credendum, eos obmutescere cogat: Crocodilos in tantum, ut secus Nilum currendo, aquam ejus, etiam sitibundi lambant. Cum lupis eam colere inimicitiam, ut vel ideò Porta pellem lupi suspensam super demorsum à cane rabido, aquæ timorem amolire dixerit. Ab otide metui, quòd tardo & humili volatu utatur. Abhorre quosdam à quibusdam. Blondi canis gallinarum carnem ne attingebat quidem. Alii ossa avium sylvestrium respuunt. Olim in templum Herculis victoris non ingrediebantur, seu ob odorem clavæ in limine positæ, seu ob rem aliquam invisam sub folio sepultam. Nonnulli ad citharæ pulsus miserabiliter gement: ad clangorem tubarum ululant: in disphonie bombardarum longissimè aufugiunt. Quantus inter eos & homines sæpe sit consensus, in sequentibus audiemus. Ad *Naturam* canum pertinet, quòd citò iram concipiant, & ideo ob unicum os diutius inter se digladiantur: quòd domos vigilias agendo custodiant: ob somni lævitatem facillè excitentur: cum mulieribus aliquando Veneris consuetudinem habeant, & palam congregiantur, unde à Spartanis templis arcebantur. Idem odorum differentias nobis incognitas sentiunt: posteriora odorantur, quod cum sagaces sint, teste Plinio, qualitates habitudinum corporis odore cognoscant. Capitibus ad terram demissis odorem trahendo investigant, & ideò primi aëris infecti halitum hauriunt. Auditu pollent: quarto ætatis mense dentes caninos mutant, & hybernium pilum amittunt. Si stomachi gravidine laborent, gramen vorant. Facillè abortiunt, si mas, ex quo concepere, occidatur. *Ingenio & memoria* polle-
re, docilesque esse, multa testantur exempla. Ille apud Plutarchum, tot lapillos in ollam oleariam injecit, donec intumescere oleo illud lambere posset. Itinera quamvis longa meminere: nec ulli præter homini memoria major. Quidam Venetiis in medio foro suum Dominum post triennium agnovit: Ulyssis post viginti annos. In Theatrum Marcelli spectante Vespasiano introductus fuit, in omnibus saltationibus instructus, & qui ægritudinem bellè simulare novisset. Nam post signa contracti doloris, tanquam mortuus concidebat, atque huc & illuc se trahi patiebat; mox tanquam ex profundo somno experrectus, sese movebat. Franciscus Marchio Mantuæ per morbum mutus, canem ita instruxerat, ut ad suos nutus, quemlibet aulicorum vocaret. Coram Justiniano

Plin. H.
N. l. 8. c.
40.

niano Imperatore, spectante populo, alius, annulos spectatorum ab hero confusos ita cognovit, ut unicuique suum redderet. Quis pauper vel dives, meretrix aut vidua quæ esset rogatus, veste cujusque ore apprehensa, demonstrabat. De *Fidelitate* erga heros ita Plinius: Pugnassee adversus latrones canem pro Domino accepimus, confectumque plagis à corpore non recessisse volucres & feras abigentem. Ab alio in Epiro agnitum in conventu percussorem Domini laniatu & latratu coactum fateri scelus. Garamantum Regem canes ducenti ab exilio reducere præliati contra resistentes, propter bella Colophonii, itemque Castabalenses, cohortes canum habuere: ex primæ dimicabant in acie nunquam detrectantes. Hæc erant fidissima auxilia, nec stipendiorum indiga. Canes defendere Cimbris cæsis domus eorum plaustris impositas. Canis Jasonis Lycio interfecto, cibum capere noluit, inediaque consumptus est. Is verò, cui nomen Hircani reddidit Duris, accenso Regis Lyfimachi rogo, injecit se flammæ: similiterque Hieronis regis. Memorat Pyrrhum Gelonis tyranni canem Philistus. Memoratur & Nicomedis Bithyniæ Regis, uxore ejus Consingi lacerata propter lasciviozem cum marito jocos. Apud vos Volcatium nobilem, qui Cæselinum jus civile docuit, asturcone è suburbano redeuntem, cum advesperavisset, canis à grassatore defendit. Item Cœlium senatorem ægrum, Placentiæ ab armatis oppressum: nec prius ille vulneratus est, quam cane interempto. Sed super omnia in nostro ævo actis populi Romani testatum. Appio Junio & P. Silio Coss. cum animadverteretur ex causa Neronis Germanici filii in T. Sabinum; & servitia ejus, unius ex his canem nec à carcere abigi potuisse, nec à corpore recessisse, abjecto in gradibus gemoniis mæstos edentem ululatus, magna populi Romani corona circumstante: ex qua cum quidam ei cibum objecisset, ad os defuncti tulisse. Innatavit idem cadavere in Tiberim abjecto sustentare conatus effusa multitudine ad spectandum animalis fidem. Huc ille pertinet, qui Domini sui occisorem & prodidit & jugulavit: ut & Corfus ille, qui non citius enecti frigore heri corpus auferre familiarissimis etiam permisit, quàm perimeretur. Nihil interim de illis dicam, qui cum heris cremari vel sepeliri voluerunt: qualis Poli Tragoædi, Pyrrhi, & Theodori erat. Eupolidis Poëtæ Comici canem post ejus mortem, vitam inedia finivisse, Jasonis Lycii capere cibum noluisse; Darium, ultimum Persarum Monarcham solum comitem ad mortem habuisse, Xantippi, navigantem herum eo usque secutum, donec natando periisset; Historici prodidere. A carnium caninarum usu, omnes ferè moratiores gentes abhor-

Scalig.
Exerc.
292.

Athen. H.
A. l. 7. c.
33.

Uf. s in
Cibis.

rent; nisi necessitas urgeat. Populi Senegæ eis vescuntur, si Cadamusto credimus: incolæ Guineæ, si aliis. Galenus nonnullas gentes castratis vesci scripsit. In *Medicina* maximi est usus. *Calva* in pulverem redacta, testium tumores resolvit. *Cerebrum* fracta ossa restituit, si instar emplastri superponatur. *Dente* maximo si gingivæ scarificentur, dolor dentium tollitur. Longissimus nigri canis, quartana laborantibus appenditur. Caninus canis rabidi exemptus & in aluta appensus, rabiem compescit. *Coagulum* in vino dissolutum, colicos dolores sedat; in aceto, hydropicis propinatur. Per vomitum, hydropicorum ventribus superimpositum, hydropicorum aquas Sextus educit. *Hepar* rabidi assatum, singulare est in rabie remedium. *Fel* cum melle ad ulcera interna adhibetur. *Lienem* recenter exemptum, Marcellus regioni lienis applicat. *Sanguis* partibus à rabido cane percussis, magno est adjumento. *Pinguedo* ad mentem Æsculapii, podagra laborantes sublevat. *Adipe* catuli varii in cicatricibus & maculis faciei auferendis, Plinius utitur. *Lac* in mitigando oculorum dolore adhibetur. Eodem Sextus gingivas infantium assidue linat. Potum, foetus mortuos expellit. *Lotium*, pilos & verrucas aufert: cum nitro mistum lepram abstergit. *Stercorum* pulvis in angina, dysenteria, & ulceribus inveteratis commendatur, si ossa per triduum comedat. Marcellus ex eodem ad solem exsiccato & cribrato, cum cera rubra, per partes, & modico olei, medicamentum pro ischiade concinnat. Plinius, ossibus in stercore canino inventis & alligatis, syriasin puerorum tolli putat. *Pellis* ad destillationes, si digitis inducatur, & ad anginam, si corrigiis ter collum circumdetur, adhibetur. *Pili* morsui canis rabidi impositi, venenum ad se attrahunt. In supprimendo sanguine adhibentur. Mizaldus denique in expugnando febre quartana, lotium ægri quantum in uno paroxysmo, unica vice reddidit, cum farina subactum, in placentam conficit, quam famelico cani exhibet, & sic quartanam transfert. Reliqua vide in Gesnero. Weckerus ex duobus catellis recens natis, quatuor libris olei violacei, & libra una vermium terrestrium præparatorum, unguentum ad vulnera machinis bellicis inflicta, componit. Ex catulis quoque Andreas Furnerius aquam destillat, quam in cohibendo pilorum augmento mirificè commendat. *Differentiæ* Canum sunt multæ. Dicuntur olim & in Helleponto reperti cornuti. Si *vocem* spectes, in novi orbis insula Hispaniõla non latrant, ut Oviedus prodidit. In Guinea, si Clusio credimus, latrare conantur, sed non possunt. Si *munera*, sunt alii sagaces, alii cursores, cubicularii, portæ, venatici,

Galen. l.
3. de A-
lim. sa-
cult. l. 2.
Ufus in
Medicina.

Centur.
6.

Wecker.
in Anti-
dot.

Differen-
tiæ.

Ambro-
fin.
quadr. di-
gitat. l. 3.
c. 2.

tici, villatici. Si *locum*, sunt Epirotæ, Sco-
tici, Anglici, Cyrenaici, Arcades, Indici &c.
Nos hi cagemus ordine de *Rabido*, *Melitenfi*,
Venatico, *Leporario*, *Sagace*, *Villatico*, *Bellico-
so*, & *Inutili*. *Rabidi* ab esu putridorum cibo-
rum, & carnibus vermibus scatentium tales
evadunt, Canicularibus inprimis. Cūbum
tum abominantur & potum, ab aqua abhor-
rent, huc & illuc vagantur, latratum edunt
raucum, spumam ab ore & naribus copio-
sam fundunt, torvum intuentur, demissam
ferunt caudam, & nullo edito latratu homi-
nes mordent. Multi multa remedia adhi-
bent. *Ætius* helleborum album ad vomitum
cum polenta exhibet. *Mizaldus* stercora gal-
linarum cibis permiscet. Blondus post ter-
tium diem venasturgentes in cruribus tun-
dit, vel canem in lacunam projicit, in qua
multæ hirudines innatant, ut sanguinem ex-
sugant. Hinc totum corpus unguento popu-
leo illinit, & pharmacum cholagogum pro-
pinat: tandem canem decocto fumarie, la-
pathi acuti, & radicum enulæ abluit. Ad
præservationem, exhibet *Plinius* catulo lac-
mulieris quæ marem peperit. *Columel-
las* caudas catulorum post diem quadragesi-
mum ab ortu castrat. Prehenditur caudæ
extremum, in quod ultima spinæ articulatio
definit, & tandiu digitis torquetur, donec
excidat. *Melitenfes* ab insula Melita, quæ
Pachyno Siciliæ promontorio imminet, no-
men habent. Sunt vel breviores vel proli-
xioris pili & jubati. Blondus partim al-
bos partim nigros commendat: hodiè rufi
& candidi in precio habentur. Magni-
tudine sunt mustelæ sylvestris. Ut parvi
fiant & maneant, canistris includuntur, ibi-
demque nutriuntur. Delicatissimis vescun-
tur cibis. Si plures fœtus concipiunt, subito
moriuntur. Ut villosiores nascentur, curato-
res, loca in quibus cubant, velleribus pecu-
dum insternunt, ut ea præ opulis semper ha-
beant. Lugduni in Gallia singuli decem
aureis vancunt. Bononiæ quadringentis li-
bris venduntur. Mulieribus sunt in deliciis.
Venatici canes ubique ferè locorum habentur.
Præstant, quos *Hircania* ex canibus & *Tigri-
dibus* natos, *Epirus*, *Molossorum* regio, &
Chaonia proferunt. Apud *Perfas* fuere au-
dacissimi & velocissimi teste *Megasthene*: in
regione *Thebeth* inveniuntur maximi: in
provincia *Gingui* tam audaces, ut Leonem
adoriri non dubitent. Quomodo nutriendi
sint, illi qui de re rustica scripsere docent. E-
rant in precio apud *Alphonsum* *Neapolita-
num* Regem, *Magnum Tartarorum* *Cha-
mum*, qui ideò quinquies mille aluit. Distin-
guuntur variè. Nam si ferarum differentias
respicias, sunt alii leporarii, alii humiles qui
taxo tantummodò insectantur; alii ad aves,
qui illas pedetentim in retia pellunt; alii
ad aquas; alii ad magnas feras. Si locum
natalem, sunt.

Arcades, *Aufonii*, *Cares*, *Thraceſque* &
Iberi.

Pannonici, *Argivi*, *Lacedamonii*, *Tegeate*,
Sauromate, *Cretes*, *Celta*, *Magnetes*,
Amorgi.

Si colores, sunt leucophæi, mellei, albi, ni-
gri. *Albi* parumper aquam formidant. Iidem
nigris maculis insigniti, pedes crassos & te-
nellos habent. Leucophæi fortes & audaces
sunt, sed cursu non ita valent. Nigri validi
sunt, sed cum crura habeant humilia, cele-
ritatem alborum non assequuntur. Eligen-
dus verò est canis, atroci vultu, capite ma-
gno, labro superiore ad infra pendente, ocu-
lis rubicundis, naribus apertis, dentibus
acutis, collo tumente, pectore amplo ut *Leo-
nis* similitudinem præ se ferre videatur.
Canis leporarius optimus est, qui longo &
plano est capite, auribus acutis retrorsum
directis & parvis, labiis superioribus supra
inferiora non pendentibus, collo longo &
aliquantulum turgido, pectore acuto, costis
longis & validis, ilibus strictis, cruribus al-
tis macrisque potius quàm obesis, caudâ non
crassâ, nec admodum longa, qui rarò aut
nunquam latret. Alii ad venationem ducun-
tur: alii spontè exeunt, & comprehensis lepo-
ribus domum revertuntur, *Vertagi* dicti. *Sa-
gacium* tot ferè sunt quot *Venaticorum* ge-
nera. In *Scotia* tres sunt canum species.
Quidam sunt audacissimi, in cursu celebra-
rimi. Alii odorisequi, qui & pisces inter saxa
latentes investigant. Nonnulli ut plurimum
aut rufi nigris maculis aspersi, aut nigri ruffis
imbuti, qui fures & furto ablata tanta cum in-
dustria persequuntur, ut & flumina tranent.
Scotis & *Anglis* tales alere fuetum: & si quis,
eum, qui sua, cane sagaci duce inquit, in se-
cretiora non admittit, pro fure habetur. Si
Blondum sequimur, debet esse brevis, simo
potius quàm adunco rostro, capite concin-
no, cruribus eadem posterioribus ferè altitu-
dine, quam sunt anteriora, pectore non ven-
tre majore, dorso plano & ad caudam por-
recto, auribus pendulis, oculis agilibus.
Palmam reliquis præripiunt *Gnosii*, *Thusci*,
Britanni, *Hispani*. *Canis villaticus* & pecua-
rius est qui villam & pecus custodit. *Albus*
probat, ut à lupis distinguipossit. Tales
apud *Turcas*, *Bellonio* prodente, herum
peculiarem non habent, ideo nec ædes in-
grediuntur. *Tegetibus* in arca stratis incu-
bant. Olim apud *Romanos* quingenti ad
stabulorum tutelam alebantur. De *Bellicosiss*
& *Inutilibus* nihil ferè occurrit. *Anglia* illos
producit: sed & hoc anno inter homines
sanguinarios canes alere cœpit, diris devota
capita, qui ne *Regio* quidem sanguine ad-
huc usque satiari potuerunt. Talibus cani-
bus & *Hispani* contra *Indos* in præliis ute-
bantur, quos etiam saginâ humani corporis
ad capiendos homines alliciebant. *Vasquez*
Nunnez

Ambro-
fin. l. 3. c.
5.

Ambro-
fin. l. 3. c.
6.

Bellon.
observ. l.
3. c. 46.

Nie-
remb. H.
E. l. 9. c.
36.

Nunnez loco carnificum usus est. Obliti-
rè eramus Indicorum, de quibus ita Nierem-
bergius. Genus caninum variat in novo or-
be, præter illos quos vetustas novit. Natura
& moribus pænè omnia nostris vicina sunt,
nec specie valdè diversa. Illud quod *xoloitz-
zeuimli* vocant Barbari, excedit mole cor-
poris, tres plerunque superat cubitos, nullo
pilo protegitur, molli tantum & depili cu-
te, fulvis & cyaneis maculis aspersum. Al-
terum appellant *Itzeuin teporzotli* & à pa-
tria, unde datur, *Michuacanem*. Simile est
Melitensibus. Variegatur candido, atro &
fulvo colore, & quadam deformitate, ac-
commodum deliciis, & gratissimum, nec in-
ers blanditiis, gibbo quodam foedum à capi-
te velut ab humeris eminenti, collo enim pæ-
nè caret. Tertium *Tetichi* dicitur, cetera no-
stratibus simile, nisi quod triste aspectu, In-
disedule, quemadmodum olim Thracibus,
quod fortasse in usu Græcis fuit, si sexto
Empyrico credimus. Certè Diocles Medi-
cus, ex eorum scholâ qui Asclepiadarum
tempore fuerant, quibusdam ægrotis catulo-
rum carnes dari præcepit. Sed Indis *Cozumel-
la* canes non tantum sunt alimentum, sed gu-
la. Nutriebant comedendos quemadmo-
dum Hispani cuniculos; quos ad esum de-
stinant, castrant, ita pinguescunt oppidò.
Procreandæ soboli servant foeminarum co-
piam, ex maribus exiguum numerum, quem-
admodum apud nos pecuarii. Iidem ino-
pia puerorum canibus litant. Alco etiam vo-
cabant Barbari quoddam genus canum par-
vulorum, quorum societate mire delectan-
tur, & quos mire diligunt. E suo cibo detra-
hunt, ut illos alant. Cum iter agunt, com-
portant secum aut humero, aut gremio. Cum
ægrotant, consortio inseparabili & familia-
ritate catelli recreantur. Sunt quoque *canes
muti* apud Indos, qui non latrant & vulpino
vultu. Cozumella insula hos alit. Quin &
percussi nec gemitum, nec clamorem edunt.
Hos in Hispaniolâ Oviedus statuit pro Cala-
mitâ ranâ. His naturâ est: nec opus sunt
membrana ex secundis caninis, nec fimus le-
poris, nec pilus. Superstitiose ista Plinius
obmutescendis canibus quærit. Anonymus
manuscripti mei auctor, in Hispaniola me-
morat fuisse canes parvulos, sine latratu, so-
lùm cum grunntu, & solum palato aptos.
In Quivita maximi canes onerantur sarcinis.

C A P U T II.

De Fele.

Ambro-
fin. l. 3. c.
10.

Salmafin
Solin.

Nomen.

FELIS nomen à *φῆλα* impostor, fallax,
quod astutissimum sit animal: vel ab
αἰλῆς, adulator, quod cum Æolico digam-
mate *φαιλῆς* pronunciabatur, ut maximo Sal-
masio Placet. Dicitur Latinis etiam Cat-
tus, vel Catus, seu à capiando; seu quod sit
cautus. Græcis vocatur *αἰλῆρὸς*, παρὰ τὸ αἰόλειν & ἀνὰ γῆν

τὴν γῆν & κινεῖν, quod caudam subinde move-
at, eademque adblandiatur. Apud Sui-
dam est *αἰγίληρος*, albi καὶ πῆλιν, *Spatalem* etiam
quidam cattum vertunt. In *Descriptione* no-
tissimi animalis non est quod immoremur:
observata circa Anatomiam ad finem ca-
pitis habebis. Ubique fere inveniuntur.
Non fuisse aliquando mansuetos verisimile
est. In Iberia apud Tartessios nasci maxi-
mas, omnes authores consentiunt. *Vescun-
tur* carnibus, piscibus, muribus, avibus, *Locus.*
lacertis. Bufones interimunt. In Cypro
viperas, & chamæleones venantur. Ju-
nioribus etiam leporibus insidias struunt:
nec propriæ speciei parcant. Novimus hic
Bononiæ, inquit Ambrosinus, feles adultas
cum parvulis primum colludere, deinde illis
laniatis vesci. Vivunt sex annos, aliquando
decem, castrati plures. Quantum ad *Gene-
rationem*: in Europa mensibus Januario &
Februario plerumque exardescunt: in In-
dia omni fere anni tempore luxuriantur. Fœ-
minæ in congressu clamant, seu quod à fer-
vido nimis semine adurantur; seu quod à
mare unguibus lædantur. Mas stat, fœmina
subjacet. Fœminæ plus libidine agitantur
quàm mares. Gerunt foetum duos menses
lunares, seu dies sex supra quinquaginta. *Arif. H.*
Martio editus præfertur: Augusto, propter *A. l. 5. c.*
pulices minus. Ut plurimum quinque vel *2.*
sex catulos enituntur. Fœmina sobolis est
amantissima: Mas inventam sæpè interimit,
ut fœmina novorum catulorum desiderio
mota, morem iterum gerat. Exercent *ini-
micitias* cum quibusdam, ut muribus, bufo-
nibus, serpentibus, vulpansere, aquila,
ruta, felle proprio, suavi odore, & humidi-
tate. Rutâ certè à columbariis pelluntur. *Sympa-
thia & Anti-
pathia.*
Unguentorum odore aliquando in rabiem
aguntur. Si aquâ mergantur, nec statim
exsiccentur, pereunt. E contra, Valerianæ se-
libenter affricant: mentha cattaria delectan-
tur. Fœmina gravida, si mas interim occida-
tur, abortit. Circa *Naturam* occurrunt quæ-
dam singularia. Oculi enim felium ad Lu-
næ vices modò majores modò minores eva-
dunt: imò solis vices sentiunt, & pupillas
oculorum syderis cursu mutant. Diluculo
enim protenduntur, meridiè in orbem con-
trahuntur, Sole occidente hebescent. Car-
danus malè pupillas pro arbitrio contrahe-
re & distendere protulit, quia nullos ha-
bent musculos. Noctu medium illuminant.
In sacco procul delati, redeunt. Mutante
hospite ædes, easdem non deserunt. Ma-
nu hominis demulceri ambiunt. De astu
ita Plinius. Feles quidem quo silentio,
quàm levibus vestigiis obrepunt avibus?
quàm occulto speculatu in musculos exi-
liunt? Excrementa sua effossa obruunt terrâ,
intelligentes odorem illum indicem sui es-
se. Adhibetur à quibusdam mensis, in
Hispania inprimis, Hollandia, & Bra-
bantia,

Plin. H.
N. l. 10.
c. 63.
Genera-
tio.

Arif. H.
A. l. 5. c.
2.

Sympa-
thia &
Anti-
pathia.

Mizald.
cent. 4.
Natura

Plin. H.
N. l. 10.
c. 73.

bantia, sapore que leporinam referre dicitur. Pestiferum halitum emittere, & tabem adferre, Brujerinus, haud sine causa, prodidit. Cerebrum insaniam inducit, cujus aliquod exemplum in Uratis lavienfi puella, in Weinrichio, ni fallor, (liber nunc ad manum non est) invenies. Habet & in *Medicina* locum. Pulvis *capitis* in olla cremati, & in oculos insufflati, caliginem abstergit, si Portæ credendum. *Carnem*, corpori infixam tela extrahere, Galenus prodidit: hæmorrhoidum quoque & dorsi doloribus medetur. *Iecur* ustum & tritum, calculosos summopere juvat. *Fel* fætum mortuum extrahit. *Pinguedo*, podagræ illinitur. *Urina* destillata ad surditatem valet. *Feces alvi* cum resina & rosaceo permixtum & suppositum, muliebri profluvium supprimit. Evonymus prodit, quosdam anserem pinguem, medicamentis & carnibus felium minutatim concisis farcire cum sale, & lento igne in veru assare, destillanteque liquore arthriticos feliciter inungere. *Adeps* in ferro à rubigine præservando aliis non cedit. Quantum ad *Differentias*, Cati alii sunt *Domestici*, alii *Sylvestres*, alii *Exotici*. Ex *Domesticis*. Hispanici rapaciores sunt, agiliores, & mollissimâ cute teguntur. *Exoticorum* precipuæ sunt *Syriaci*, qui varii, ore torvi, pectore torosi, pedibus amplis, paucio cibo contenti. *Sylvestres*, domesticis sunt majores, densiore & longiore pilo, colore fusco, caudâ crassiore. Vescuntur aviculis, & aliis animalibus. Suffitu rutæ ab arboribus depelluntur. De illis qui in Malabar ita *Scaliger*. In Malabar provincia feles agrestes supra anbores versantur, quarum celeritate nihil unquam memorabilius proditum est. Saltu valere potius. Peculiaris verò volatus. Idque, quod mirum magis est, sine alis. Membranam ab anterioribus ad posteriores usque productam tendi. Quam, dum quiescunt, ad alvum contrahunt. Ubi volare instituunt, pedum crurumque agitatione protenta, collectaque membrana, dum sustinent, tum feruntur. Est & in India genus quoddam, pilis vestitum nigris & promiscue candentibus. Rostrum ei est longum, auriculæ parvæ, crura breviora, cauda fasciis nigris candidisque intercisa. Pulvis febrientibus conferre dicitur. Huc pertinent & monstrosi, quorum unus, pedes habet horrendos, alter sex. Feli simile est animal in regione Singui, pilo cervino, pedibus multifidis, dentibus in utraque mandibula binis, duorum digitorum magnitudinis. Vesicam habet carneam, prope umbilicum, sanguine plenam, qui moschum redolet. Iconem adposuimus cujusdam animalis felis similis, quod caput in suprema parte valdè acutum habet. Appellamus felem *ἰσχυραλόν*. Observationes Anatomicæ, quas apud M. Aurelium Severinum invenimus, quasque superius promissimus, aliæ felem sectum, ut

ipse ait, aliæ musculum concernunt. In fele secto hæ sunt insigniores. *Lienis* oblongi veluti remi nostratis pars, quæ ad aquas spectat. *Cervix* visicæ fellis veluti varicosa non semel vel bis: Ad fundum ejus rectæ descendunt venæ extrinsecus procurrentes. Bini nervi à lateribus *asperæ arteriæ*, utrinque unus, descendunt ad orificium ventriculi superius, qui interim ad dicta latera asperæ arteriæ & ad pulmones mittunt ramulos. Nectuntur dicti nervi communi nervulo oblique descendenti; à sinistro inferuntur in ventriculum pluribus fibris. Vbi primum finditur aspera arteria, apparent nonnullæ *glandule* majores, & parvæ albæ, rubræ, cineritiæ, mistæ. In *aspera arteria* semicirculi, ut in homine divisi, sed parte posteriore duplici tunica comprehensi: Alterâ quidem externa & carnosa; altera verò interna & nervosa, quæ interna, nascitur ab extremis circulatorum marginibus. In *corde* auriculæ differentium colorum, dextra quidem albo & atro distincta magis, quam sinistra: Præterea dextra crassior & rotundior, sinistra tenuior & oblongior; caninæ similis. Ambæ intus cavæ & filamentosæ veluti sinus cordis. In sinu dextro plexus reticularis magis quam in cane conspicuus & prolixus; sed contra in hoc non valvulæ sicut in cane. *arteria magna* ferè in medio cordis; magis tamen ad sinistram declinat. Interna tunica *ventriculi* satis rugosa, rugis secundum ventriculi ductum procedentibus, & in rotundum replicatis, veluti in ventre bovis. Tunica ventriculi tenacissimæ, adhærentes ab orificio superiori ventriculi, tunica interna rugis transversis distincta. Color *hepatis* veluti caniculæ piscis. In osse *auris cochlea*; labyrinthi; fenestella, annulus, musculus rotundus; tria ossicula, sed stapes non perforata, ut Casserius describit. In *cerebro* sinus tres, sed duo circulares cum plexu choroide. In *oculo* uvea parte anteriore non cohærens corneæ; hinc dilatatio huic generi majori minor. Eâ parte est uvea colore pallidi folii. Opticus ferè ad medium, quamvis declinet ad inferiora, membrana externa crassa oculum aliqua parte velans, ut in gallinaceo genere. At in *Fele masculo*, hæ observationes occurrere. Extra abdomen, infernè supra pubis os, prodeunt per duo foramina, *vasa spermatica* ad testiculos descendunt, qui testiculi per mediam membranam cuti alligantur à lateribus penis, qui *penis* medio digito longus, infernè fulcitur musculo oblongo desinente ad medium penis vel amplius; fulcitur etiam musculo oblongo descendente ad medium spacium musculi spincteris, cujus officium est, anum claudere. Linea alba lata digiti tertia parte per rectum abdominis descendens; subjacet musculis peritonæi, membrana in hoc animali tenuissima; *Peritoneum* sub

ensifor-

ensiforme satis pingue. *Omentum* præpingue alligatum fibræ uni dextræ hepatis, & spleni & ventriculo, & intestino duodeno, ad figuram marsupii, s. sacculi cujusdam constitutum. Alligata *vesica* peritonæo supernè, ad fundum vero alligata intestino infernè recto. *Testiculi* quatuor tunicis sunt recti; quæ dicitur scrotum, id est, bursa externa testiculorum; secunda dicitur dartos, etiam externa: Tertia dicitur erythroides, id est, rubra, quæ propinquior est prædictis; quarta vero est immediata. Descendunt ad testiculos *vasa præparantia semen*, & sunt venæ & arteriæ: Venæ quidem quæ descendunt à vena cava; & arteriæ, quæ descendunt ab arteria magna: & ista vasa, postquam attingerint proxime testiculos, constituunt corpus quoddam, quod dicitur epididymis; corpus, sive substantia sub testiculis posita. Vidimus *vasa jaculatorio* sive deferentia dicta propterea, quod deferant semen in testibus præparatum ad glandulas parastatas, quæ deferentia primò oriuntur ab infima parte per medium testiculorum & vasibus præparantibus annexa usque ad medium ipsorum recurvantur ac reflectuntur, donec pervenerint ad parastatas: vidimus & *ureteres* descendentes à parte sima seu contraria renum ad collum vesicæ, & præcipuè ubi desinit ipsum collum. Vidimus & *venas emulgentes* ad renum tendentes partem gibbam, ambas nascentes è trunco cavæ, sed altior sinistra quam dextra altitudine modii grani hordei, & eadem sinistra longior fere duplo est quam dextra. *Intestinum rectum* colligatum caudæ principio per medium ligamentum. Habet *intestinum rectum*, venas & glandulas quasdam miliares asperas, quæ in cane nobis alias sunt observatæ. Vidimus *mesenterium* & venas meseraicas etiam *pancreas*, id est, corpus glandulosum. Vidimus & *intestinum cæcum* latitudine pollicis longum. Præter *intestinum rectum* & *cæcum*, totum, quod reliquum est intestini, uniforme est, sed tortuosum, adeò, ut si violentius extendas, ferè disrumpatur. *Renes* perampli, magnitudine nucis majoris, intra quos paucæ cavitates sunt & sinus (non ut in cane) in quibus percolatur urina. Vidimus & *venam portam* facientem duos ramos, unum quidem mesentericum, id est, ad mesenterium propagatum, quique descendit usque ad extremum intestini recti. Alterum vero splenicum, id est, transmissum ad splenem per totam ejus internam partem, rectâ viâ distributum per multos ramos hinc inde. A dicto ramo splenico derivatur alter *cæliacus*, sic dictus, quia ventriculum circumplectitur; hic ducit humorem melancholicum ad ventriculum, ut possit appetere. Vidimus *venam ascendente* perforare diaphragma & cor petere, in cujus partem dextram se inserit. Vidimus & *venam sine pari*

ramificatam ac propagatam, à dicta vena cava juxta cor reflexam & descendente, per spinam à parte dextra, quæ ramos mittit, costis dextris ad sinistras, ad ipsas nutriendas. *Hepar* sex fibris distinctum. Medio duarum à parte dextra egreditur foràs *fel*, ita ut fundus inter duas, ad modum prominentis oculi, appareat. Dicta *vesicula felis* habet duos ramos, alterum, qui derivatur ab hepate in duodenum intestinum ad expellendas fæces; alterum, qui recurrit ad vesicam, ut ibi contineatur. In *intestino duodeno* digitis quatuor infra poros cholidochos, inventus lumbricus quidam parvulus magnitudine ureterum. A lateribus venæ cavæ ascendente, descendit *nervus* quidam ad circulum carnosum diaphragmatis, alter verò à sinistra descendit fultus membranæ asperæ arteriæ, deportantes sensum diaphragmati. Vidimus *nervos recurivos*, qui à sexta nervorum conjugatione propagati ad caput asperæ arteriæ inseruntur; alter quidem à sinistrâ revolutus sursum circa arteriam magnam, & alter circa arteriæ ramos, qui tendunt ad jugulum: cor cum duplici auricula, dextra & sinistra; dextra major & subnigra est; sinistra vero concolor cordi: Habet *cor* ventriculum dextrum, in quo generatur spiritus vitalis; sinistrum, ad quem ducitur sanguis venalis: Habet & quatuor *vasa magna*; primum est *vena cava* ascendens, quæ inseritur in auriculam dextram; *arteria magna*, quæ inseritur in auriculam sinistram. Tertium *vena arterialis*, vena quidem dicta, quoniam continet sanguinem; arterialis verò denominata, quoniam constat duplici tunica, quam habet veluti arteria: Inseritur hæc in pulmonem, ut illum nutriet: quartum est *arteria venalis* quæ inseritur ad sinistrum ventriculum cordis, cujus officium est, sanguinem in dicto ventriculo præparatum ducere sursum ad cerebrum, ad generationem spiritus animalis. In ventriculo dextro sunt *valvæ* quædam sive septa, quæ impediunt exitum sanguinis, sic etiam sunt in sinistro. Habet *pulmo* pinnas sex. Visi sunt muscoli interni circum *laryngem*, id est circa caput asperæ arteriæ, quibus inflammatis fit vera angina. Apparuerunt in radice penis *glandula prostata*, quibus inflammatis fit Gonorrhœa Syphiliæ, quæ sunt paulo majores: Est *penis glans*, id est, caput, velut lingua ipsius felis. Observavimus meatum, qui ducit ad vesicam. Felis *cranium* lineis quibusdam rubris distinctum venarum similibus. *Auricula* interior cum primis exsculpta: Hoc enim organo non vulgariter opus erat eidem ad noctu prædandum, sicut & visu. In hoc observata communio arteriæ magnæ & venæ magnæ: ubi scilicet primum usque scinditur in iliacos. Credo commune animantibus omnibus, quod observavi in medulla spinæ felis domestici. Membranæ enim

enim propiis cum integatur secundum extrema, quæ respondet duræ menynge, interior, quæ tenui vestiunt & hæc prodeuntes nascentesque ex se ipsis nervos: Verum cum in plures veluti funiculos prodeant singulæ harum conjugationes, licet adnotare, dictos funiculos, postquam aliquantisper processerint, mox in unum quasi nodum coire, non dissimilem à geniculis culmorum in plantis frumentaceis & id genus. Porro cum singuli funiculi iisdem membranis tegantur, si retrahas ad te harum substantiam, spoliatur funiculi, quoad nodum illum pertingant. Observatus in *costa* unâ legitima felis domestici, nodus quidam teres similis tuberibus, qui innascuntur arboribus, cujus disrupti medullium porosum crebrisque fossulis perforatum cum guttulis sanguinis. Dubitatum inter sodales sectionis, num fractura ossis

ferruminata, num error in formatione, luxuriante materia. Homini in sima parte ossis frontis quæ interjacet, æquè duo supercilia incubant rectæ nasi radici: In hac si effoderis vel terebra os pertuderis, invenies fossulas duas oblongas, obliquè incedentes, sub cranio, parte superiori: cæcas infernè, cancellis donatas: Nullus dubitari posse videtur, esse has cameras olfactus, ubi concluditur implantatus spiritus, ut & in aure. Nescio siquidem, quid de eo senserint Anatomici; credo incompetas huc usque. Porro confirmat sententiam nostram, quod in cane sensu hoc eximiè pollente sunt hæ cryptæ, & latiores & magis conspicuæ quàm in homine; in simia autem caudata non licuit invenire; fortasse, quod eo sensorio præstare minus debuisset.



HISTORIÆ NATURALIS

QUADRUPEDIBUS

D E

LIBER IV.

De Quadrupedibus Digitatis Oviparis.

TITULUS PRIMUS

De Digitatis oviparis cute tectis.

CAPUT I.

De Rana.

ARTICULUS I.

De Ranis aquaticis.



Actenus de Quadrupedibus viviparis egimus, sequuntur Ovipara; quæ vel cute teguntur, vel crusta. Cute autem teguntur, *Rana*, *Lacerta*, *Salamandra*, *Stellio*, *Scincus*, *Cordylus*, *Chamaeleon*, & *Crocodylus*. Rana alia est *Aquatica*, alia *Terrestris*. Illa à sua garrulitate Isidoro dicitur, quod æstivis diebus suum ra ra perstrepat: aliis à 7 Ebræo, quod est vehementer exclamare. Grecis dicitur *βράτταχος*, παρὰ τὸ βραὶν τροχέαν ἔχειν, quod asperam vocem edat. Vocatur Varino & *βωξ*, *βόπλαχος*, *βρόταχος*, *βύπλαχος*, *βύσουαχος*, κατὰ τὸ βωξ, *βλίναρος*; Cypriis *βρέχελος*, Ionibus *βάθρανος*, Phocensibus *βραγχοβή*, Ponticis *βάλανος*, modernis Græcis *βρόδανος* sed & *γυρίος*, pro eadem, simpliciter apud Ethymologum sumitur. Varino etiam *βρίναι* & *παρφυοίδες*, ranæ sunt, quod buccas inter clamandum inflare soleant. Animal est amphibium, cujus pars prior carnosâ latitudine caret: naturâ, portionem carnosâ posteriori parti in qua crura posteriora crassâ & longa, anteriora breviora sunt, addente. *Digitos* habet quinos, longos, membranâ intertextos, ut commodius natâre possit. Fœmina mare major.

Terga caput tangunt, colla intercepta videntur, Spina viter, venter pars maxima corporis albet. Internas partes si attendas, linguam illis instar linguæ infantium primam adhærere, intimam verò à gutture absolutam Plin. scribit. *Lienem* esse parvum. *Hepar* secundum Bellon. in tres dividitur lobos, sub quo una utrinque pulmonis pars conspicitur, spumo-

sa & minimè sanguinea. *Intestina* nodulis intercepta sunt. *Testes* & reliqua membra animalium terrestrium membris similia. In Anglia virides non conspiciuntur. In Germania, Italia, Bononiensi inprimis territorio, plurimæ sunt. In irriguis Ægypti locis tam frequentes, ut nisi à ciconiis vorarentur, omnia fœdarent. In Cyrenaica & Seripho insula mutas esse dicunt, fortè propter aquarum frigiditatem. Et si verò & in fluentis appareant: libentius tamen in illis aquis versantur, in quibus junci & arundines vire-scunt, & ulva crescit. In illis qua nunquam gelu concre-scunt, omni tempore reperiuntur. Ne dicam de bituminosis, in quibus eas viscositate sua naphtha obruit. Deglutiunt innatantia animalcula, vorant & apes, talpasque mortuos. Herbis quoque vesci verisimile. Permiscuntur mare superveniente, quod apud Aristot. legimus, prioribus pedibus alas fœminæ apprehendit, posterioribus clunes: deinde ova pariunt. Plin. carnes nigras partu edi scripsit, quas oculis & cauda insignes gyrinos vocavit: formam raninam adipisci, dum cauda in duos posteriores pedes finditur. *Mirumque*, addit, *semestri vita resolvuntur in limum nullo cernente, & rursus vernis aquis renascuntur, quæ fuere nata, perinde occulta ratione, cum omnibus annis id eveniat*. Sed id de temporariis potius sumendum est. Nam de quibus agimus, etiam hyeme in aquis calidioribus durant, & vere veteres natantes conspiciuntur. Ova circa ripas stagnorum & paludum effunduntur, continuo veluti filo sibi cohærentia, quæ nigrarum & concisarum carniū speciem referunt. Chymici sperma ranarum appellant. Odio prosequuntur ciconias, cygnos, Buteonem, Salamandram, putorium, lucium piscem, anguillam & ignem. A ciconiis devorantur. *Cygnus*, Michaële Glycâ authore, ab affectione quadam esu earum sibi medetur. Cum *salamandris*, sæpiissimè præliantur. De *Lucio* & *anguilla*, res notissima est. Noctu accensis circa littora luminibus non coaxant: imò loco non moventur, & facilè manibus capi possunt. *Vox* ipsarum est *βρακενέξ*, καὶ *βοξ*.

Locus.

Vitus.

Arist.

Hist.

Animal.

l. 9. c. 40.

Genera-

tio.

Arist. H.

A. l. 5. c.

3.

Plin. H.

N. l. 9.

c. 51.

Arist. H.

A. l. 7. c.

14.

Antipha-

tia.

Mizald.

Cent. 9.

Memo-

rab.

Vox.

καὶ *βοξ*.Ambro-
fin. Di-
git. Ovi-
par. l. l. c.
1.

Nomen.

Descri-
ptio.Arist. H.
A. l. 4. c.
ult. Ovid.
Metam.
lib. 6.Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

ῥαυζ. Aristoteli autem *ῥαυζ* vox dicitur, quam ranæ mares effundunt, pum foeminas

Plin. H. ad congressum vocant. Quando læduntur, N. 1. 11. Alberto prodente, vocem instar formidantis muris exilem reddunt. In Cyrenaico c. 51. agro non erant olim vocales. Illatis è continente vocalibus durat earum genus. In Seripho quoque; & quodam Thessaliæ lacu Plin. H. N. 1. 8. c. 58. mutas, apud Ælian. legimus. Caro ipsiis Ælian. H. A. 1. naturâ, laxa, albida, humida, & putredine 3. c. 37. obnoxia. Ideò quibus frequenter in usu, Natura. colorem ammittunt, & in febres incidunt. Mense Augusto, ita compressa habent labia, ut difficulter aperiantur, si Alberto credimus. Ubi diutius pectori incumbunt, latere subtus aquam, Mizaldus colligit. Nisi aliquandiu respirent, suffocantur. Quia aquas tepidiores amant, ideò æstivis duntaxat mensibus coaxare solent, & adventante hyeme occultantur. Busbequius dum Strigonium properaret, mense decembri coaxantes audivit, quòd aqua in quibus degebant, mineræ sulfureæ viciniâ, incallescere. Cum pluvia imminet, clamosiore sunt, seu quòd frigidiora sentiant; seu quòd dulcioribus impense delectentur. Diu sub aqua urinantur, quòd exiguum pulmonem habeant. Brumali tempore interire, & verè iterum renasci, à quibusdam creditum: latere & terrâ condi vel inde certissimum, quòd verno tempore, non solum ranarum fœtus, sed & ranæ compareant. Noctu & quidem in sicco congregiuntur, non tam ob verecundiam, quàm timorem. In Ægypto, dum natricem sibi occurrere vident, frustum arundinis obliquum apprehendunt, ne deglutiantur. Ab iis civitatem in Gallia pulsam, Plinius prodidit. Marem à foemina si discernere volueris, dorsum acu tange. Ex mare rubeus sanguis, ex foemina, flava aqua effluet.

Miza'd. cent. 8. Arist. H. A. 1. 8. c. 2. Ælian. H. A. 1. 9. c. 13. Plin. H. N. 1. 18. c. 35. Plin. H. N. 1. 11. c. 37. Ælian. H. N. 1. 9. c. 13. Plin. H. N. 1. 8. c. 29. *Ufus in Cibus.* Quo in *Cibus* habendæ essent loco, Galenus non indicavit. Facile digeri, & bonum præbere succum, frigidum tamen & humidum, vulgata est sententia. Nullo olim apud Romanos in usu. Hodiè totum corpus, capite abjecto, assum vel elixum apponitur, à mense in primis Majo ad Octobrem. Coxæ in primis laudantur. Mundella in frigidis innocentiores putat, & cum à Venere abstinent. Amatus Lusitanus omnes, quia venenatæ, à mensis arcet. Præparationem vide apud Ambrosinum.

Ufus in Medicina. Et tota & partes variis affectibus pellen-
dis inserviunt. Sugillationibus impositæ, livorem auferunt. Maxillis alligatæ dolorem dentium; in aceto decoctæ, mobilitatem. Succus cum eodem, anginam tollit, & tonsillis prodest. Eodem remedio certo strumæ delentur, si Porta non fabulatur. Pulpa earum phthisicis, cum carne caponis, pineis & saccaro exhibetur. In oleo elixa nervorum dolores emollit. In omni virulento animalis morsu vehementer à Dioscoride,

Ætius, & aliis commendatur. *Cinis* combustæ adeò sanguinem sistere Geleatius de S. Sophia prodidit, ut cum quidam eum collo gallinæ alligasset, amputato post ejusdem capite, nihil ex vulnere sanguinis profluxerit. Habbarrhamanus Asutensis in nares insufflari in hæmorrhagia jubet. Idem in plumbeo vasculo cum oleo lilior. Interemtam, cum unguento rosaceo contorsionem vultus sanare scribit. Oleum quomode paretur, vide apud Ambrosinum. In doloribus articulo- rum à materia calidâ vehementer laudatur.

Partes si attendas, *Oculi* in sindone contra lippitudines in collo suspenduntur. *Cor* febrium algores minuit. Alii in febribus ardentibus ad cor alligant. Contra fistulas cuidam profuisse, apud Villano vanum habemus. *Pulmo* per tergus extractus, folio brassicæ involutus, & in olla concrematus, epileptico exhibitus, opitulatur. Alii id de jecore sumunt. Hoc certè remedio Elector Palatinus restitutus dicitur. Pulvis *jecoris* in accessione quartanarum utiliter sumitur. Plinius, objici formicis oportere scribit: eam partem quam appetant, contra omnia venena esse pro antidoto. *Fel* dysentericis remedio est, & vermes in uceribus nascentes interimit.

Adeps auribus instillatus, dolores tollit. *Spermaranarum* in erysipellate, & aliis inflammationibus vehementer est utile, hæmorrhagiam comprimit: scabiem & impetiginem pellit. Quercetanus aquam in rubore faciei commendat. Modum ejus parandi vide ibidem. Baculus quo rana à serpente excussa fuerit, parturientes adjuvare dicitur. De *lingua* fabulosa Plinius. Democritus, inquit, tradit, si quis extrahat ranæ viventi linguam, nullâ aliâ corporis parte adhærente, ipsaque dimissâ in aquam, imponat supra cordis palpitationem mulieri dormienti, quæcunque interrogaverit, verâ responsuram.

Quantum ad Differentias, variæ illæ sunt. Excluduntur quædam ex ovis, quædam ex limo, quod in Ægypto accidere, Diodorus Siculus prodidit. Sunt viridis, sublividæ, cineræ. In Stochornii Bernensium montis duo sunt lacus, in quibus ranæ magno capite & caudâ longâ conspiciuntur. Præcipuam differentiam in initio Articuli dedimus.

A R T I C U L U S II.

De Ranis Terrestribus.

P U N C T U M I.

De Bufone.

RANÆ Terrestris sunt *Bufo*, *Ranunculus* viridis, & *Rana temporaria*. quem nos hic Bufonē, fortè quod in appropinquantes maximo impetu spiritū efflat, vocamus, is etiam *Rubeta*, quod inter rubos frequenter versetur, dicitur. Græci *ῥάβρον* vocant, Aristoteles

Ætius 1. 13. c. 55.

Habbarrham. de propriet. Animal. c. 41.

Plin. H. N. 1. 32. c. 10.

Hartm. in Praxi Chymiatr. Plin. H. N. 1. 32. c. 5.

Plin. 1. c.

Differentiæ.

Ambros. 1. 1. c. 2. Nomen.

φρύνη. Ethymologus *φρύνη*, fortè à *φρῆς* mens, quòd venenum caput petat, & vertiginem inducat. Nisi *ἀπὸ τῆς φρυγανῆς*, seu frutice derivare volueris. Chrysippus quidem apud Plin. Phryganion febrib. quartanis alligatum remedio esse autumat, sed animal non describit. Luciano est *φύσαλ* quòd leviter contactus mirum in modum turgescat. Qui *μύσζον*, appellant, falluntur.

Plin. H.
N. l. 30.
c. 11.

Descri-
ptio.

In ejus descriptione, non est quòd multum immoremur, quia vulgare est animal. *Cutim* habet densissimam, & adeò crassam, ut sæpè nec acutissimo quidem palo perforari possit, lurido colore perfusam, maculis veluti quibusdam pustulis asperam, *ventre* turgido & inflato; unde *ventrosus* vocatur. *Capite* crasso, *dorso* lato. *Pilis* caret. *Amphibium* esse animal scripsit Plinius: sed fortè de palustri accepit. Opacis nemorosis cavisque ac putridis locis gaudere tam certum, ac incertum, in Hyberniam illatum, solà pulveris aspersione interire. Non haberi ibidem, à quibusdam proditum.

Locus.

Cibus.

Terreo humore, herbis, lumbricis, & apibus vesci notum. Tantum verò singulis diebus terræ absumere, quantum anteriore pede comprehendere possit, à vulgo quidem creditur, sed nullo experimento fultum. Ob victum *μύσζον* à Græcis dicitur. Sub salvia sæpè stabulari, una & altera historia comprobavit. Periere subitò, qui degustaverant, ut à Mizaldo & Parco proditur. An verò ea vescatur, ignotum.

Mizald.
Cent. 1.
memo-
rab. Pa-
reus 1.
20. c. 24.
Genera-
tio.

Nascitur ex ovis, & materia putrida. Ex cremati pulvere sepulto emergere, proditum. In Dariene, si Petro Martyri credimus, ex guttis dextrâ mancipiorum manu cadentibus, dum pavimenta irrigantur, gignuntur. Exanate sepulta idem fieri, Reufnerus canit: ex menstruo sanguine Porta, cum mulieres aliquando rubetas enixas fuisset, legamus.

Porta
Magiæ
Natural.
l. 2.
Sympa-
thia &
Antipa-
thia.

Inimicitia ipsis intercedit, cum *sale*, *gravi* odore, & odore *florentis vineæ* ex inanimatis; cum *fele*, *talpa*, *araneo*, ex animalibus. *Sal* conspersus, ad ossa usque consumitur, si Alberto credimus, Rutæ, nasturtii, & hisce similium si urantur odore pelluntur. De florentis vineæ odore idem affirmatur. Cum *fele* dimicat & interimitur. A *talpa* devoratur; ut & hæc ab illo. *Aranei* ictu interit. Affixerat se cujusdam supinè dormientis ori arctè, oppressissetque hominem, nisi tertio aranei ictu interire coactus fuisset. De *Sympathia* nihil singulare occurrit, præter id quod de salvia diximus. Mustelam in os rubetæ illabi, à viris fide dignis Porta se accepisse scribit. Plantagine contra morsus araneorum sibi mederi, apud Plinium alicubi extat.

Natura,
Ælian.
H. A. 1.
8. c. 34.

De *Natura* & *moribus* habet, hyeme & interdiu latitare, noctu verò per loca ab hominibus trita vagari: noctu potius quàm de die

vivere; imo à solari splendore abhorrrere: tardo gradu incedere, aliquando salire: sæpius verberatum, inflato corpore, virus primò ex clunibus emittere, mox guttas quasdam malè olentes effundere. Solet herbas salivâ inficere, quæ non minus est lethalis quàm napellus. Solent sonum gru gru edere. Pluviam, dum vesperi è cavernis egrediuntur, præfagiunt.

Agricola
de ani-
mal. sub
terra la-
tentibus.

Paucum venenum & mite habere, scripsit Albertus; quòd fortè de iis qui in frigidioribus regionibus degunt, sumendum est. Illarum qui in calidioribus, primi generis est. Sal ipse, quo bufo extinctus est, si in aqua dissolvatur, ita eam inficit, ut linteum vel indusium eâ madefactum, incurabili scabie hominem inficiat. Si detrahare volueris, vel pellem punge, vel virga exagita, vel superficie punctam, in aquam conjice. Virus infecta evadit. Infectus, tumore, palore, singultu, spirandi difficultate, & gonorrhæâ afficitur. Aliquando, dysenteria, gutturis inflammatio, & vertigines accedunt. Fuit qui canna qua bufo infixus fuit, ita proprias manus infecit, ut tractatum iis cibum subinde evomeret, nec citius vomitus cessarent, quam ex aliorum manibus sumisset. Qui evadunt, edentuli plerumque fiunt. *Medelam* multa suppeditant; inter hæc præcipuè. Cancri fluviatiles triti & poti, cinis rubetæ, cornu cervi dextrum, lac muliebre, saliva hominis jejuni, radices arundinis, poterion herba, quæ & phrygion in vino exhibita, terra Melitenensis, Smaragdus, Theriaca, & extra, oleum de scorpionibus. Sunt qui ipsius bufonis lapidem extollunt. Mithridatium, & quintam essentiam theriacalem his adde.

Venenum.

Mizald.
Memor.
Cent. 3.

Noxia etsi bestia bufo, & venenata, multum tamen contra venena, & alia prodest. Marcellus eum cum adipe ursino, in olla rudī pro arthriticis coquit. Oleo in quo decoctus est, strumis felicissimè inungitur. Dissectus, & renum regioni applicitus, lotium provocat. Servatos hoc remedio quosdam hydropicos ferunt. Coctus & emplastri instar cynanchicis impositus, certo liberare dicitur. Idem filum quo suspensus erat facere apud Mizaldum legimus. Pinguedo exenterati, & radice laureolæ, stercore gallinæ, sale, & unguento dialthææ infarcti, inter assandum cadens, fistulæ benè in unguntur: pulvere verò ita ad combustionem assari, asperso, optimè curantur, si Arnolde fides est. Exsiccatur in umbra & in manu linteolo involutus detentus, hæmorrhagiam sistit. Cinere minus hæmorrhoidum fluxus, certissimè curatur. Nicolaus emplastrum ex eo format. Alii arefactum tanquam amuletum contra pestem, collo appendunt. Crollius pulverem contra quoscunque venenatos morsus aspergit.

Usus in
Medicina.

Mizald.
Cent. 8.
Memor.

Arnold. l.
3. Brev.

Qui-

Hel-
mond. in
Tumulo
pestis p.
76.

Quidam in ulcere cancroso bufonem cras-
sum sumit, in balance ponderat, additque
ejusdem ponderis cancras vivos, deinde in
olla rudi, diligenter luto munita, relicto
tamen exiguo foramine, lento igne urit, &
pulvere felicissimè utitur. Helmondus à
Butlero Hyberno edoctus, ex bufonis cada-
vere, & terrâ ac animalculis quæ ad focum
suspensus intra triduum in patinam ceream
evomere solet, trochiscos cum tragacantho,
& cerea illa patina format, qui ad mammam
sinistram gestati contagium arcent, & loco
alligati, virus extrahunt. Recentes sunt
minus validi: validiores, qui ante in usu fue-
re. Bufo, mense Junio, post meridiem ca-
piebatur. Idem Julio mense, decrefcente
lunâ bufones cœpit, quorum oculi (*ver-
ba ejus sunt*) scatebant albis vermibus: ni-
grisque capitibus prominentes, adeò ut u-
terque oculos totus in vermes transformatus
esset, fortassis 50. numero. in singulo oculor.
foramine erant densè compacti, quorum
capita foris eminebant: & quoties aliquis
egredi vel prominere conaretur, statim bufo,
appositâ manu, egressum vetabat. Animal-
cula quæ evomit, erant muscæ nitentibus
alis, subviridi colore quasi decoratis. Mox
à vomitu obiit. *Pedes* viventis, Lunâ vacua
& ad synodum properante abscissi, strumas
curant, si eis collum circumdetur. De bufon-
is lapide agemus alibi.

Usus in
Cibis, &
aliis.
Martyr.
Decad. 3.
l. 10.

In insula novi orbis Peragua, Hispanus,
coctos bufones, fame premente edisse, Pe-
trus Martyr author est. Lerus, Brasilianos
minimè exenteratis, & tostis vesci prodidit.
Vstus falconi in cibo datur, ne pennæ à ti-
neis exedantur, prohibet. Sunt qui novo
fictili inclusum in medio segetum obruunt,
& sic noxias tempestates arcent. *Osciculum*
dextri lateris ad venerem concitandam alli-
gabatur.

Differen-
tia.

Differentia à loco, figura, & mole corpo-
ris sumuntur. *Locum* si attendas, reperiuntur
quidam in sacrorum commissuris. Snebergæ
& Mansfeldii eductus primò turgēt, mox
perit. Tholosæ in saxo arenario rubro albis
maculis distincto reperitur. Latomus qui-
dam Antverpianus, in marmore invēnit.
Agricola in illis ex quibus lapides molares
fiunt reperiri scribit, & antequam formen-
tur benè considerari an lateant, debere. I-
dem eundem *περίφρων* vocat. De *figura*
& *mole corporis* ita Ambrosinus scribit. O-
viedus in summario Indiæ &c. p. 608. *us-
que*, quia non clamet nisi lædatur. Gesne-
rus Gibbosi bufonis meminit, cujus iconem
damus.

P U N C T U M II.

De Ranunculo viridi, & Rana
Temporaria.

Ranunculus viridis, vocatur Plinio *rana* Ambros.
minima & viridissima; aliis *calamites*; l. 1. de o-
vipar. c. 3.
quod inter arundines & calamos versetur;
Isidoro *Agredula*; quibusdam, *Rana sylve-
stris*, quod sylvis delectetur; vel ad diffe-
rentiam ranæ viridis quæ editur. Græcis
est *καλῆς*, quia suâ voce imbres prælagit.
Aliis *δρυοπέλῃς*, *δρυοδάτης* quod per arbores in-
cedat. Quibusdam *δρυοπέλῃς* quod quasi de
cœlo delabi videatur. Hermolaus *δρυοδάτην*
vocat; *δρυοπέλῃν* fortè dicere voluit; id est,
quasi in arbore natam. Vocantur & *βρέζαντες*,
ob vocem quam edunt.

Ita eam Ambrosinus describit. Rana hæc *Descri-
ptio.*
ubique viridi colore perfusa est, præter pe-
des &c. vide Ambrosin. p. 622. *usque* cæte-
ras fugat.

Conducit ad multos affectus. A tussili- *Usus.*
berari qui in ejus os exspuerit, Plinius au-
thor est. Extinguit febrile incendium, si
manu detineatur, Sylvius. Guainerius pro
hecticis gallinas pulte ex farina hordei &
carne ejus elixa nutrit, gallinas ægro præbet.
Timotheus per medium dissectus renibus
hydropicorum applicat, & aquas educit.
Iecur in pellicula gruis ligatum, venerem
concitat, si Plinio credimus. Adeps, si denti
dolenti illinatur, frangit eum. *Cruor* vesti-
giis pilorum à genis evulsorum instillatus,
renasci eos prohibet. Marcellus acu cuprea
ranunculum pungit, & sanguine inde ma-
nante loca, pilis revulsis, inungit.

De *Rana temporaria* Ambrosini verbis *Ambrosi-
de digi-
git. Ovi-
par. l. 1.
c. 4.*
agemus. Ita verò ille de ea. Ex differentiâ
huic ranæ addita, unusquisque conjicere
potest, hoc animal &c. p. 623. *usque*, ducen-
tes diu vivere nequeunt.

C A P U T II.

De Lacertis.

A R T I C U L U S I.

De Lacerto vulgari.

Lacertus seu Lacerta, nomen à lacer- *Ambro-
sin. Di-
git. Ovi-
par. l. 1.
c. 5.
Nomen.*
torum humanorum similitudine, & quod
pedes veluti homo quadrupes incedens,
manus flectat, fortitus est. Græcis veteribus
σαῦρα, *σαῦρα*, Hesychio & Varino *σμίλλα*,
modernis *κολισαῦρα*, aliis *σαῦρα ἡλιακή*, vulga-
ris inprimis, dicitur. Plures quidem eo-
rum sunt *Differentiæ*: nam Plinius lacerto- *Differen-
tia.*
rum, quorum color ad ferrugineum accedit,
meminit: Scaliger in minusclos & majores
distinguit: nos tamen, in *vulgares*, *virides*, *Animal.*
Chalcidicos, & *Brasilienfes* seu *Indicos* dispe- *Arist.*
sce- *pag. 204.*

Vulgaris. scemus. *Vulgaris* digitos habet quinos valdè exiles, cum unguiculis tam in prioribus quàm in posterioribus pedibus. In his, qui indicis locum obtinet, longissimus est; pollicis, inferior locus datur. Albertus ei pilosam *linguam* attribuit, ex Plinio Aristot. Bifidam, secundum quem, siccum *pulmonem*, *lienem* perexiguum, & rotundum, *testes* spondyliis adhærentes; *foeminæ vulvam* ut in avibus, cujus cervix infernè sit magis carnosâ, ova proxima septo contineantur, habet. *Reperiuntur* in Italia copiosi; in insula Capraria magni: in India, prodente Linschotano tam frequentes, ut in lecticas quandoque irrepant. Arabiæ sunt cubitales: in Indiæ verò monte Nyfa xxiv. pedum, in longitudine, colore fulvi, aut punicei, aut cærulei. Incolunt plerumque sepulchra, cavernas, spincta, & rudera. Genuæ, in arce Principis Doriciæ, plurimos conspeximus apicantes. *Vescuntur*, carnibus, herbis, apibus, formicis. *Generatio.* *Congrediuntur* circa finem Martii, & quandoque, ita complicantur, ut duo capita & unum corpus representare videantur. Post, ova, more serpentum pariunt, & teste Arist. terræ committunt, ex quibus sine incubatu statutis temporibus catuli erumpunt. Ore parere, vel foetus, uno inerte excepto devorare, fabulosum. *Abhorrent* à ciconiâ, quæ lacertis pullos nutrit, bufonibus scorpionibus, araneis, & serpentibus. Aranei parvos lacertos in foraminibus, parietum, aggressi, filamentis obducunt, & ictibus obruunt. Cum serpentibus præliantur: ideo ophiomes *χῶν* accepere nomen. *Delectantur* carnibus cochlearum, dictamno herba, ad quam à serpentibus vulnerati confugiunt; & homine, quem etiam à serpente defendunt. Ori admoti, puitam humanam avidissimè lingunt. Historias vide ap. Scaliger. citato loco, & Erasmus in tractatu de sympathia & antipathia. Temporis tractu visum amittere, eundemque iterum seu solis beneficio, in quo tam diu donec convalescant, morari dicuntur, seu beneficio naturæ, recuperare, cujus apud Ælium exemplum; mensibus hybernis sub terra condi, & sic quasi semestrem vitam agere, unde *ἐξαμηνῆσι* dicuntur, hybernum & autumnale spoliū deponere; foemineum sexum majorem esse: compares incedere, & uno capto alterum in capientem efferari; ovorum quæ pepere oblivisci, ut apud Plin. habetur, per medium divisos, propter glutinosum humorem, non perire; imò naturali quodam vinculo coalescere; quòd ex cicatrice colligitur; ad *Naturam* & *mores* pertinet. Dicuntur & caudæ sæpius amputatæ renasci. Theocriti interpres exsiccatum in viperam transmutari falsò scripsit. Reperiuntur & monstrosi visus quidam, teste Schenckio. In ceti magnitudinem Lutetiæ excrecere. Dantur duab. & tribus caudis instructi, quòd ab ovis dilecythis fortè profi-

ciscitur. Sed & *ἀμφικέφαλοι* seu bicipites. Amphibænæ iconem, in qua unius cauda conspicitur, hic quoque adjicimus. Quantum ad *usum in Medicina*, divulsa lacerta ictib. scorpionum applicatur: in cibis ad Salamandræ virus à Plin. præbetur. Oleum ex iisdem in oleo suffocatis & percoctis, dissolvendis strumis, cum fimo pecudum inungitur: & ad delendas faciei lentigines commendatur. Crematar. Cinis cum melle Cretico ad oculor. Caliginem adhibetur. Efficacius est, si ex viridibus componatur. *Cerebrum* insuffusio-nibus valet. *Caput* contusum & appositum, seu solum, seu cum aristolochia longa, radice arundinis, & narcissi bulbo, sagittas & spinas tenaciter adhærentes extrahit. *Cor* combustum & cum amurcâ mixtum, torporem membro inducit, ut Chirurgi ferrum non sentiat. *Sanguis* varices succrescere prohibet, si pusionum crura eo diligenter illinantur: in herniis quoque infantum commendatur. *Stercus* medicamento contra equorum stranguriam miscetur. In urina virili necata, ejus qui fecit, venerem cohibet.

ARTICULUS II.

De Lacerto Viridi & Chalcidico.

Lacertus viridis, à colore ita dicitur, Græcis *σαῦρα χλωρά* & nuperis *χλωροσαῦρα*. Alii *Majorem* ob magnitudinem vocant. Syllvaticus *Ophiomachus*, à superandis & impugnandis serpētib. Amant isti loca calida: ideo in Italia frequentes apparent, ubi nonnulli, (verba sunt Ambrosini) eos observant multos simul obviam egredientes, quandoquidem tum morbos præfagire affirmant. Æstivo tempore in arboribus morantur, & more ranunculorum viridium vociferantur. Sunt & bicaudati. De *Descriptione* non adeò sumus solliciti. Icon namque subvenire poterit. *Usus est* in Medicina singularis. In strumis à Plinio alligatur, & post dies triginta renovatur. Ramices infantium, morfu ejusdem dormientibus applicati, emendantur. Deinde animal arundine transfixum in fumo suspenditur. Vivum cum vino decoctum phthificis jejunis Marcellus exhibet. Oleo decocto faciei lentigines depelluntur, de quo vide Gesnerum. Eodem cum pice liquida, & adipe fuillo veteri Hierocles ungulam equorum inungit, ut firmior reddatur. Fumanellus in capillis denigrandis utitur. Pro iisdem regenerandis, composuit Veckerus aliud. Uguentum pro Epilepticis apud Ambrosinum vide. Cinere strumæ exulceratæ curantur. *Oculus* vivo erutus, quartanariis alligatur, pellis caprinæ involutus. *Sanguis* attritos hominum & jumentorum pedes fanat, & claves eruit. *Offa* Epilepticis profunt, postquam vivus sale optimè in fictili acpersus, eadem carne amissa deposuerit.

Lacerta
Chalcidi-
ca. Art.
brof. l. I.
c. 7.

Lacerta Chalcidica nomen à Chalco seu ære; quòd dorsum ejus lineæ æræ percurrant, datum est. Dicitur Hesychio *Σίγας* Belonio *Samiamithon*, sed malè ut Salmasius docuit. Aliis *Seps*, à putredine, quod caro ad ejus morsum contracto livore putrescat: quibusdam & *Tarantula*, sed perperam. Similis est parvis lacertis, & illius serpentis colore quem Cæciliam dicimus. *Columna*, totam colore æreo refertam observavit. Nicandri scholiastes in Syria, Lybia, & Cypri nasci & inter saxa degere scripsit. More viperæ suos foetus enititur, nisi quòd more aliorum oviparorum in ventre ova gerat. Fabius Columna in Gallicano castro inventum hujusmodi animal interfecit, & in dissecto illius ventre quindecim partus invenit, quorum alii membranâ exuti, alii pellicula diaphana circumdati, conspiciebantur. Galenus dissectum morsui applicat, & cibum falsamentorum præscribit.

Galen. de
med.
simp. fa-
cult. l. I.

A R T I C U L U S III.

De Lacertis Indicis.

P U N C T U M I.

De Senembi seu Iguana.

Marcgr.
Hist. Bra-
zil. l. 6. c.
II.

Lacertorum Indicorum plures sunt species, inter quas celebres, *Senembi*, *Tejuguacu*, seu *Temapara*, *Taraguira*, *Americima*, *Carapobebe*, *Ameiva*, *Taraguyco*, *Aicuraba*, & *Tejunhana*. Describemus eas verbis ipsius Marcgravii. Ita verò de prima iste. *Senembi*, Brasiliensibus; nobis *Iguana*, *Cameliaon* Lusitanis falsò, & falsissimè Belgis Legvan. Erat longitudo totius animalis, quod hic describo (reperiuntur tamen longe majores,) ab ore ad extremitatem caudæ, trium pedum & octo digitorum: corporis ambitus vel crassities, decem digitor. ubi maxima. Tota *cutis* elegantur viridis, sed maculis nigricantibus & albis, in modum panni undulati, hinc inde variegata. *Cutis* constat è squamulis, in dorso, cruribus & caudæ initio paulo majoribus, quam in reliquis partibus. *Squama* caudæ omnes æquales, non ut Car. Clusius observat. A cervice ad extremam caudam seriem habet planarum, sed mucronatarum instar ferræ, spinarum secundum dorsi longitudinem, etiam virescentis coloris: suntque spinæ istæ ad cervicem majores, semperque minores fiunt, mininæ in extremo caudæ. *Caput* longitudinem habebat duorum digitor. ferè aut paulo minus, singularibus squamis, majoribus quàm in aliis partibus tectum: *colli* longitudo sesquidigiti, crassities quinque. Magnos claros habebat *oculos* nigricantes & binos nates patentes in prona & ferè extremâ capitis parte, singulæ mandibulæ, exiguorum *dentium*, & nigricantium, & bre-

vium numerum habebant, & os *linguam* crassam: Pone caput in utroque latere albicantem maculam instar branchiarum in piscibus sub mento ingluviem ad pectus usque propendentem, maximam partem nigricantis coloris; quam contrahere potest, & cum irascitur vel terrore afficitur propendere sinit. Ab ore ad ingluviem. in collo inferiori etiam habebat spinas in dorso. Quattuor *Cruribus* erat præditum, & totidem *pedibus*, quorum quisque quinque digitos continebat; cruraque & pedes squamis tecti ut reliquum corpus. Bina anteriora crura breviora posterioribus & non ita crassa, longitudo quattuor digitorum aut paulò minus; *digiti* quinque, & in ii. medii breviores, quam medii posteriorum pedum: intimus & extimus digitus binis articulationibus duo illis proximi tribus medius quattuor constabant, omnium *ungues* nigri incurvati & breves instar avium. Posteriora crura longiora & solidiora anterioribus, nimirum longitudo eorum usque ad pedes, eadem quæ crassities colli vel caudæ propè corpus, nimirum quinque digitorum, pedum posteriorum longitudo unius pedis aut amplius: digitorum prior extimus anteriorum digitis extremis æqualis magnitudine & articulationibus duabus sequens hunc tribus tertius quattuor, quartus, qui longissimus, quinque, quintus seu ultimus versus caudam etiam quattuor, æqualis cum tertio longitudinis: *ungues* ut in anterioribus *Cotyledonum* series nulla ut Clusius aliàs observavit. Saltem postica crura (tam superius quam inferius) instar humanæ suræ se habebant, priora autem non item: Crassities *caudæ* proxima corpori, erat quinque digitorum, & attenuabatur semper, donec in extremitate planè exilis esset & acuta instar subulæ. Quum mactassem, movebatur adhuc pelle detracta, & cor exemptum subsiliebat. Habebat in utroque latere *ova* ultra decem, quædam cerasi magnitudine, quædam & minora: *pinguedinem* insignem instar gallinarum: in ventriculo insignem copiam fructuum, maxime limonum dulcium: quibus pro cibo erat usus: Comedunt etiam farinam Mandiocæ aquâ madefactam. Diu inediam tolerare possunt; habui, inquit Marcgr. ad duos aut tres menses sine omni cibo & potu, & denique aufugerunt, ita ut judicem sine dubio famem diutius ferre posse. Caro boni est saporis, cocta & diu frixa butyro, & æquè bene sapit ac caro pullorum & cuniculorum. 28. Maij 1640. mactavi & secui unum, pinguedinem habentem multam instar gallinæ. Partes internas, cor, pulmones, jecur, vesiculam fellis, renes, vesicam, genitalia vasa, habet ut alia animalia: amplum jecur; duplicem ventriculum, unum anteriorem, in quem cibum prius recipit, hinc intestinū habet minimi degiti crassitie, ac

ac decem circiter digitos longum, cui annectitur alter ventriculus, ubi cibus planè concoquitur, hinc cætera intestina usque ad rectum. In anteriori ventriculo magnam copiam farinæ Mandiocæ & Milii Angolensis crudi habebat: Posterior, major, totus semicocto cibo plenus erat, cui multi vermiculi vivi instar eorum qui in caseo generantur, inhærebant. Intestinum ultimum s. rectum sterco continebat. Detracta pelle toti animali, & cauda amputata, hæc adhuc movebatur. Vivax animal, nec si quinque aut sex ictus in capite acceperit, moritur, nisi cervix cultro influcto vulneretur, tunc n. cum sanguine vitam effundit. Caudæ caro, meris fibris & nervis constat. Mense Decembri 1641. vidi eximi lapidem è ventriculo Senembi, ovi gallinæ mediocris magnitudine & figura, sed compressiorem paulo: exterius glabrum, albicantem, interius compositum è tunicis instar Cepæ, ita ut una ab altera separari posset lapide contuso. Coloris erat interius albicantis s. grysei, duræ substantiæ ut Bezoar. Capiuntur fune, nam arboribus insidere solent, quod Brasilienses, fusti longo adaptabant funem, hoc videns animal, miratur, nec tamen se movet, sed tunc se illaqueari finit, & ita capitur, alias currit velocissimè. Juniores toti sunt viridis coloris, grandiores ætate, variegati fiunt, & cinerei: senes enim ut plurimum sunt fusci vel cinerei coloris. Fr. Ximenes scribit, in capite hujus animantis interdum reperiri lapillos, qui præsentissimo remedio lapides renum comminuunt & dejiciunt, drachmæ pondere è liquore idoneo hausti, aut etiam corpori alligati. An autem qui in ventriculo reperiuntur aliquando eis, dum viribus polleant, mihi non constat, periculum posset capi sine ullo, meo judicio, discrimine.

PUNCTUM II.

*De Tejugvacu, Taraguira,
& Americima.*

Marc-
gra. Hist.
Brasil. l.
6. c. 11.

Tejugvacu & Temapara Tupinambis; Lacertus egregius: corporis figura, capitis, oculorum, oris, pedum, caudæ, convenit cum Senembi; in hoc autem differt. Primo totius corporis color est niger, elegantissimis maculis albis inspersis variegatus, & versus extremam caudam, sed quasi aculeos habet albos. Secundo cauda crassior in exortu. Tertio caret illis dentatis aculeis per dorsum longitudinem. Quarto in pedibus posterioribus exterior digitus paulo remotior est à reliquis, & brevior. Quinto, linguam habet bifidam longam, rubram, glabram, quam velocissimè instar serpentis, ad digiti longitudinem protrudit & retrahit. Nullam edit vocem:

patiens est, lubenter vescitur ovis, quæ cruda sorbet. Inediæ patientissimum animal: detinebam alligatum, sed cum se vinculis absolvisset, liberum permisi (verba sunt Marcgravii) per cubiculum currere, & interdum dedi haustum aquæ è vitro bibendum, ita adhuc obambulat quando sitit, alias toto die in angulo suo ordinario sedet. Libenter incumbit cineribus calidis: Vigesimo Martii quispiam partem caudæ calcando detraxerat; postea tamen de novo ad duos digitos crevit; primo Julii moriebatur inedia planè tabidus factus, septem enim mensium spacio nihil comederat, tantum aliquando haustum aquæ sumpserat lambendo. Caro ejus comeditur. *Taragvira* Brasiliensibus: Lacertus in & propè domos, in hortis & ubique frequens: Longitudo ejus circiter pedalis: (quanquam reperiantur & minores) *Corpus* habet teres, totum squamulis triangularibus cinereis seu leucophæis tectum. Caret *ingluvie* sub mento; *dorsum* æquale: nutant velocissime capite quando aliquid vident & celerrime currunt motando corpus. Si videant hominem dormientem cui serpens veneatus, aut aliud venenatum animal lædendi causa appropinquat, illum excitant ne lædatur. *Coire* volens mas leni morfu apprehendit fœmellæ cervicem, paulo post ad latus se inclinat, & fœmina propriam caudam sursum levando admittit marem, qui pedibus complectitur corpus ejus à tergo. *Americima* Brasiliensibus: Lacertulus tres digitos longus & pennam olorinam crassus, ubi crassissimus: crura & pedes similis figuræ & tot digitis, ut Senembi. *Ocellos* habet nigros: *corpus* autem fere quadratum videtur. Totum *dorsum* squamulis vestitur leucophæis, latera autem fuscis; *caput* itidem & crura, cauda vero cæruleis: omnes autem splendent, & ad tactum apprimè sunt læves. *digiti* in pedibus instar setarum porcinarum. Venenosum est animal ut Lusitania affirmant, & cupidum ex fugendi sanguinem ex gravidis mulieribus. Referunt fœminam semel tactam ab hoc lacerto, vel solum ejus indumentum, nunquam postea concipere.

Marc-
grav. l. c.

PUNCTUM III.

De Caropopeba, Ameiva, Taraguycu, Aycuraba, & Tejunhanâ.

Carapopeba Brasiliensibus; Lacertulus tres, quatuor vel quinque digitos longus, venenatus. Figura corporis est ut reliquorum. Quatuor cruribus & pedibus: in anterioribus quinque, in posterioribus quatuor habet digitos. *Corpus* totum hepatici est coloris, cum albis notulis, in cauda autem albis lineolis, hinc inde etiam aliquantum flavimix-

Marc-
grav. Hist. Bra-
sil. l. 6. c. 12.

mixtum; *Oculos* habet splendentes, & quasi vitreos. *Ameiva* Brasiliensibus & Tubinambis; alia species Lacertorum & superius descriptæ Taraguiræ per omnia similis, excepto quod caudam furcatam habeat, id est, desinentem in duo cornua recta. *Taraguiræ Aycuraba* Brasiliensibus, Taraguiræ alia species, superiori item similis, excepto quod cauda ab initio ubique habet triangulatas squamas parvulas: *Cauda* extremitas planis squamulis tecta est, & præterea quatuor maculis fuscis, *dorsum* & præcipue post caput undatum maculis variis fuscis. *Tejunhana Brasiliensibus*; Lacertulus est minimus digitum crassus; *capite* acuminato ut Senembi; *oculis* nigris, circello aureo: *crura* habet quatuor ut Senembi; Longitudo ejus ad posteriora crura & trium digitorum; *cauda* longitudo sex digitorum & semis: estque cauda teres & instar aviculæ in extremitate acuminata. *Capitulum* tegitur squamosa cute; *dorsum*, latera & crura superiore latere cute vestiuntur ad tactum molli instar holoserici; *cauda* autem squamulis quadratis constat minuscule: guttur & infimus venter itidem squamulis quadratis teguntur, majusculis, capitis testa fuscescit: *Dorsum* & *latera* superius fusca, vel potius tribus lineis dilutæ umbræ coloris, & aliquot undis ejusmodi variegatur: latera in ferius viridia; superiora autem in fusco linea notat viridis secundum longitudinem, à capite ad crura usque posteriora: itemque alia linea viridis est, ubi fuscum & viride separantur: Inter duas autem lineas ordo est punctorum viridum in fusco; & sub inferiori linea viridi series est punctulorum nigrorum in viridi. *Crura* etiam in lateribus superioribus obscure flavi seu cerei obsoleti sunt coloris, variegata maculis parvis fuscis. In inferioribus lateribus sunt alba. Cauda quoque superius coloris, cerei obsoleti, inferius cerei cum albo mixti. *Caput* inferius, guttur & infimus venter, candidi sunt coloris, sanguineis notis variegati. Bifidam habet linguam.

C A P U T III.

De Salamandra.

Salamandra, unde nomen fortita sit, incertum est. Nam dici vel quasi valincendram, quod contra incendium valeat, ut Isidorus vult: vel quasi sola amans sit τοῦ πυρός, id est ignis; vel quod σαλαμάνδραν id est quieta latibulum teneat; aut quod σελαμάνδρα dicatur, id est inter spacia inania caularum & speluncarum stabulans; aut denique quod σέλα μανὰ δειρᾶ, id est, splendoris laxet & pellat, ridiculum nimis est. A Saanbras vel Samabras Arabico dici, verisimile est etsi incertum. Plinius *animal stellatum* nominavit: Ætius *Lacertam venenariam*.

Dux ipsius sunt species. Alia enim est *Terrestris*, *Aquatica* alia. Illa lacerto viridi est similis, caput & ventrem, quæ crassiora, si excipias. Breviorem habet caudam, colorem nigrum maculis luteis inquinatum, sed quâdam lævitate pellucidum. Gesnerus unam in Alpibus invenit, totam fuscâ, absque splendore, caudâ brevi, succus lacteus à percussâ dimanabat. Matthiolus in quibusdam Germaniæ sylvis, dorso nigerrimas, ventre rubentes observavit. Vitriacus ei caudam longam & tortuosam, ungues aduncos & hamatos adscribit. Nicander λατρίων quod splendida, renitente, & quasi pingui delibuta cute sit, vocavit. *Loca* frigida, humida, & opaca incolunt. In Germania multæ simul quandoque conglobatæ inveniuntur. In agro Tridentino & potissimum in valle Ananiensi conspiciuntur frequenter. Sunt qui ore aërem haurire credunt. Alii favos, apes, & lac appetere: ideò alvearia & vacas infestare scribunt. Nihil gignere, reliquit Plinius; nec genus masculinum foeminumve habere. At Bellonius vidit multos fætus sine involucro enixam. Procreat scilicet intus ova, in quibus fætus ad perfectam maturitatem nutriuntur. Quantum ad *Naturam*, an in igne vivat, vel eundem extinguat, in Exercitationibus, Deo volente, disquiretur. Lacteam succum percussam fundere, superius diximus. Cælo pluvio apparet, ideò visâ, tempestatem rustici præfagiunt. Nec æstate, nec hyeme conspiciuntur. Tardè incedit. In Cumana, gallinarum instar gracillare, Cardanus prodidit. Si viva gladio in duas partes secetur, pars anterior progreditur, posterior retrocedit. Instinctu quodam naturali ranas & testudines odio prosequitur, cumque illis acerrimè dimicat. Venenatam esse compertum. Integras familias periisse tradunt, quæ aquas in quas Salamandra ceciderat, biberant. Sed & fructus salivâ oris ejus aspersi, lethales creduntur. Plinius dente Salamandræ percussam, obire scribit. Eiusdem, Nicander, Aëtius, & Abensina meminere. Ubi semel partio dentem inflexit, nunquam extrahere; si avellatur, lethale esse, quidam Gesnero narravere. At ipse, duas quas domi habuit, nunquam os ad mordendum, diduxisse, etsi irritatas, scribit. Nec audivisse quempiam à Salamandra in Germania morsum. In Galliis tamen morsus lethalis est: & Rethi, ab eadem læsum, tot Medicis indigere, quot maculas bestia habet, proverbio jactant. *Saliva* Medici inter psilothra utuntur. Kiranides cor pelli nigræ involutum, contra quartanam de brachio suspendit. Quæ de Zona ex pelle, & aliis contra incendia sparguntur, quia absurda hypothesi, ignem nempe extinguere, nituntur, falsa quoque sunt. *Aquatica Salamandra*, aliis *Lacertus aquaticus*, Bellonio *Cordulus*,

Terrestris.
Descriptio.

Locus.

Vitus.

Generatio.
Plin. H.
N. 1. 10.
c. 68.
Bellon.
obs. 1. 3.

Natura.

Cardan.
derer. va-
riet. 1. 7.
c. 33.

Plin. H.
N. 1. 29.
c. 4.

Usus.

Aquatica.
Ambros.
l. 1. de
Digit.
Ovipar.
c. 9.

Monachis qui in Mesuen commentati sunt, *Sincus aque*, cum lata caudâ dicitur. *Quadruplex* ipsarum genus est. *Unum* cum caudâ, figuræ rhombi, quam Ambrosini, ad distinctionem dicimus. *Linguam* habet brevissimam & latiusculam: dentes exiles, ut visum effugiant. *Caudam* in medio crassiusculam, quæ prona & supina ad instar figuræ rhombi contrahitur: *Pedes* anteriores in quatuor, posteriores in quinque digitos fisos: *Cor* spongiosum, quod dextro lateri incumbit: cuius auricula sinistra maiorem pericardii partem occupat: *lienem* subrubrum: *renes* spongiosos: *hepar* nigerrimum. *Ova* magnitudine pisi in bicorni utero ordine quodam digesta gerit, ex quibus postmodum vivi fætus erumpunt. Bellonius ei tergo tuberculis horridum adscribit; Agricola colorem cinereum, vel in cinereo fuscum. Illa, quam Gesnerus secuit, longitudine erat septem digitorum, colore nigra cum punctis albis in ventre: reliquum corpus nigrum punctis concoloribus asperum; *Alterum* genus est quoque *duplex*, unum majus, semicirculis in dorso albicantibus distinctum: alterum minus. Quartum est Matthioli, Utinensibus frequentissimum, capite terrestribus rotundiore & brevior, caudâ anguillarum modo, dorso nigro luteis maculis insignito. Lacunis opacis & pingui solo fitis delectantur, aquis inprimis, in quibus limus albus est. Ibi sub petris hærent, & rarò ad superficiem veniunt. In vas aqua plenum coniecta à Gesnero quædam os proferebat. Lento gradu in terra progrediuntur, & oratenaciter claudunt, nec aperiunt, nisi violenter expresseris. In sal coniectæ caudam movent, & moriuntur. Verberatæ diu vivunt. Pellis adeò dura, ut gladio resistat. Ex vulneribus lactea sanies prodit. Irritatæ, intumescunt; & in pedes erectæ sudorum virulentum effundunt, laceissentemque in tuentur. Sues si aliquam comederint, moriuntur.

Agricola
de ani-
mal. sub-
terraneis.

CAPUT IV.

De Stellione.

Ambro-
fin. de
Digit.
Ovip. l. 1.
c. 10.
Nomen.

STellio inter genera lacertorum quoque sponitur: nomenque ex eo habet, vel quod maculis, vel quod eminentiis instar stellarum distinctus sit. Ideo quidam *Lacertam stellarem* dicunt: vel quod venenum cibo stillat. Græcis dicitur, ἀσκαλός, seu ἀσκαλότης, fortè παρὰ τὸ ἀσκαλῶς βαίνειν, à molli & tacito gressu: vel quasi καλοβάτης, quod artubus suis innixus, per parietes repar. Unde & Xylobates à Kiranide vocatur: tum γαλεώτις, quod more mustelæ, quæ γαλὶ clanculum per quodcunque ascendat: tum καλώτις. Modernis Græcis est λακὼν, θαμνιόνη, & φαμαρόνη. Non ausim tamen quicquam

Differen-
tie.
Plin. H.
N. l. 29.
c. 5.

certi dicere. *Genera* stellionum sunt varia. *Stellio* *Grecorum* quem Coloten & Asca-

laboten dicunt, lentiginosus est, & stridoris acerbi, omnibusque promiscuè vescitur. *Stellio* *Italarum* Chamæleonum naturam quodammodo imitatur, rore & araneis vescitur, & venenatus esse fertur, ut ille innocuus. Ad Stelliones referri possunt, *bestiola alba*, pusillis lacertis similes, lucido & fragili corpore, ut Gesnero oculatus testis retulit, quæ in agro Romano, Hermolao prodente, reperiuntur, & *Tarantula* nomine veniunt. Sed & *lacertus parvus* coloris lucidi & argentei, quem Græci λακὼν vocant. Bellonius in Gazara stellionem se observasse scribit, colore nigro, magnitudine mustelæ, crasso capite & tumidâ alvo. An verò Stelliones magnitudine & figurâ accedant, ad illos lacertes virides majores, quos vulgus apud Italos *ramatos* vel *Ligures* vocat, alibi dicitur. Hic *Stelliones* *Matthioli*, & *Lacertum* *facetanum*, qui *Tarantula* quibusdam, in iconibus exhibemus. In Germania, Gallia, & Anglia non dantur. In Thracia, Sicilia, & Syria, vagantur. Ibi lethales sunt magisquàm in Italia: hic, in caminis commorantur. Plinius in angulis ostiorum & fenestrarum libenter stabulari scripsit, qui etiam prodidit, genus illud quod scorpionibus adversatur, in Italia non nasci: ibidem venenatos esse, reliquit Aristoteles. De *Natura* notandum, mensibus hybernis latere, nec quicquam edere, & latere in angulis ostiorum, fenestrarum, & speluncarum: anguis modo senectutem exuere, eamque protinus devorare; præripientes, comitali morbo remedia: dolose apibus insidiari: araneos & scorpiones persequi: rarò mordere, cum dentes obliquos habeat, quos in vulnere relinquunt, morsu denique hominem stupidum reddere, & raro interimere. Invenere in *Medicina* usum. Caro furculos corpori humano infixos extrahit. Ipse morsui proprio medetur, & in oleo putrefactus, scorpionum ictus sanat. In quartanis, Magi capfulis inclusum, capiti patientis subjiciunt, & in fine paroxysmi dimittunt. De *Cinere* prodit Plinius, sinistrâ manu detentum, Venerem excitare; in dextram translatum, inhibere. *Partes* somnum inducere, & stuporem membris conciliare, creduntur. *Hepar* tritum odontalgiam, si superspergatur, tollit. *Stercus* tritum verrucas delet. *Senecta* in epilepsia maximè prodest. In vino suffocatus, maculas in facie generat, si vinum bibatur. *Fel* in aquâ dissolutum, mustelas congregare dicitur.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 26.

Bellon.
observ. n.
79.

Locus.

Plin. H.
N. l. 8. c.
31.

Aristot.
H. A. l.
8. c. 29.
Natura.
Plin. H.
N. l. 8.
c. 31.

Usus.

CAPUT V.

De Scinco.

Quem Latini *Scincum* vocant, hic Græcis σκίγγα, & σκίγνα, seu à Tinsā Arabum, quo nomine Scincum Abensina vocat, seu aliunde. Dioscorides *Crocodylum*

Ambro-
fin. de
Digit.
Ovip. l.
1. c. 12.
Nomen.
ter-

terrestrem vocat, Bellonius *Crocodylum minore*, vel quod Crocodilo sit similis; vel quod crocum timeat. *Descriptionem* si spectes, quadrupes est magnitudine lacerti viridis, aut Salamandræ, ut Bellonius scribit; pollicis crassitiem & longitudinem quadrantem non excedens, caudâ rotunda & squamosâ. Renodeus animal quadrupes esse ponit, *squamis* exiguis, frequentibus, & subluteis, *capite* longo, vix colli crassitiem superante, *ventre* quadantenus alato, *caudâ* rotunda lacertarum ritu, sed brevior, & ad finem incurva. A capite ad caudam discurret linea. Gesnerus vidit digitis quinque cum unguiculis instructum, latitudine sesquipollicis, longitudine duorum palmarum. Vidit & alius sex palmares. Constantinopoli. In Arabia tantum nasci prodidit Abensina: circa Mecham vagari, Bellunensis. Versantur circa Nilum, & inde ad nos per Alexandriam & Venetias deferuntur. In veniuntur & in locis mari rubro vicinis. *Vitit* odoratus floribus: ideo non est mirum talem fimum excernere. In sicco *pariunt*, & ova terræ gremio committunt. *Ufus*. Caro scincorum magnis antidotis miscetur; unde quædam contra venena, *Diascincor* appellatur. Rhasis, animal ipsum, supra pusionem metu somniorum laborantem, cum fructu suspendit. Pulverizatus, ad excitandam Venerem drachmæ unius pondere exhibetur. Eadem caro elephantis in India exhibetur, & corpora pinguefacit. *Cor* in lana ovis nigræ, primopartu genitæ portatum, quartanas abigere creditur. *Fel* cum melle mixtum, in suffusionibus decantatum est. *Renes* sperma augent. *Sanguis* cum borrace illitus faciei maculas delet. *Pinguedo* dolorem renum expellit. *Pellis* ustæ cinis super partes secandas spargitur, ne dolorem sentiant. *Ægineta* unguentum *Entaticon* componit, quod caudæ Scincorum ingrediuntur. Ex *intestinis* suffitus paratur, qui hysteris vehementer conducit. Ex *stercore* medicamentum antepilepticum à Serapione componitur. Idem in extergerendis oculorum maculis Plinius vehementer laudat. Optimum autem est, candidissimum, friabile, & quod in aqua ampli instar citò liquefit. Ex eodem, ad faciem erugandam, unguentum meretrices parabant. Dum teritur veteris fermenti aciditatem spirat. Olim stercore sternorum qui oryza alebantur, adulterabatur. De *Differentiis* hæc habe. Maximos Indicum & Arabicum, secundum Plinium esse. In India bestiam nasci scinco specie similem, canis Melitensis magnitudine, cujus pellis asperis squamis patet, quam Indi Phatagenem dicunt, eandem fortè cum Caudiverbera. In *Cypro* lacertæ speciem magnam nasci, scincum omnibus notis referentem, cujus imaginem hic exhibemus. In *lacu* denique Vi-

centino, scincos ab aliis diversos haberi, sed qui ad Salamandras potius referri debent. Ad easdem pertinet & *Scincus Rhasis*, cauda non rotunda, sed circumlatera compressa.

C A P U T VI.

De Cordylo quadrupede, & aliis quibusdam lacertis.

DE Cordylo hæc Ambrosinus habet. Hæc lacertæ species Cordyli nomine fortassis insignitur, quoniam Cordyli piscis figuram aliqua ex parte repræsentet. Alioquin à nonnullis recentioribus *crocodylus terrestris* appellatur; cum tamen Scincus verus, Crocodilus terrestris Antiquorum fuerit. Nuperi quidam hoc animal *caudiverberam* nominant, quoniam continua caudæ agitatione diverberet. Græci ad imitationem latini vocabuli *Uromastigen* dicerent. Bellonius prædictam lacertæ speciem depingit, & crocodilum terrestrem nuncupat, quoniam primo aspectu crocodilo Nilotico assimilatur. Verum postea ab ipso discrepare asseverat: quia hoc animal caudam in modum clavæ tuberculis eminentioribus asperam gerat. Quapropter corpora quibus appropinquat, atrocissimè diverberare dicitur. Hinc caudi verberæ nomen sibi vindicavit. An verò habeat branchias, quemadmodum scribit Bellonius, & confirmat Rondeletius, non facile potest exponi. Siquidem in exuviis hujus bestię, quæ in publico Musæo adhuc servantur, duo tantum foramina secus rictum observantur. Quarum meminit Bouffuetus his carminibus:

*Cordylus effigie hic talis depingitur ipsa
Qualis, & in terris, & ferè degit aquis.
Inter quadrupedes rimam unam, sive foramen
Postoris rictum (respice) solus habet.*

An verò istæ rimæ, vel foramina sint illa, quæ sub branchiis esse solent, aliis considerandum relinquimus, & ad clariorem hujus animalis descriptionem accedemus. Thomas enim Erastus Helvetius Medicus & Philosophus insignis describit hoc animal crocodilo simile, minus tamen, & inferius *labrum* movens, figura *capitis*, & *oris* testudini respondens, cum brevis collo, & in parte inferiori tumido. *Pedes* habet quatuor quinque digitis more lacertarum distinctas. Reliquum corpus non squamigerum, sed pelle duriuscula, instar corii serpentis vestitum, *cauda* illi in est rotunda, in circulos quosdam squamatim divisa, modo feræ inexplicabili. *Squame* sunt durissimæ, videnturque ossæ, & quasi quadrangulæ, cavæ parum sunt, ut caudam rotundam efficiant. Alioquin tanquam tegulæ, quæ domorum culmina coeperiunt, simul junguntur, extermitas cujuslibet squamæ in spinam acutissimam definit. Amplius tales *squame* pellucidæ,

Ambrosinus de Digit. Ovip. l. i. c. 12.

flavescentes seu pallentes instar cornu videnter. *Venter* hujus animantis magis quam in crocodilo tumescit. *Tergus* denique latum, & quodammodo planum est, ut in iconelicer conspicari. Quid si hoc animal *phatages Indicus* sit *Æliani*? hic enim author prodidit in Regionibus Indicis nasci bestiam, crocodili terrestris speciem gerentem, cujus pellem asperam ad dissecandum adhibent.

CAPUT VII.

De Chamaleonte.

Ambrosio.
fin. de
Digit.
quadru-
ped. l. I.
c. 14.
Nomen.

Descri-
ptio.
Plin. H.
N. l. 8. c.
33.

Aristot.
H. A. l.
2. c. 11.
Theophrast.
de mutan-
tib. colo-
rem.

DE Chamaleontis ethymo; quæ vox parvum leonem significat, nihil occurrit, præter hoc, ridiculum nimis esse Isidorum, qui à camelo & leone deducit: & recentiores Barbaros, *Gamaleonem*, *Zamaleonem*, *Hamaleonem*, & *Maleonem* eundem vocare. In *Descriptione* variant authores, tam antiqui quàm recentiores. Plinium si sequimur, figurâ & magnitudine esset lacertæ, nili *crura* essent erecta & excelsiora. *Latera* ventri junguntur, ut piscibus, & spina simili modo. Eminent *rostrum*, ut in porco, haud absimile suillo; *cauda* prælonga in tenuitatem desinens, & implicans se viperinis orbibus; *ungues* adunci; *corpus* asperum ceu crocodilo; *oculi* in recessu cavo, tenui discrimine prægrandes, & corpori concolores. *Caro* in capite & maxillis & ad commissuram caudæ admodum exigua, nec alibi toto corpore. *Sanguis* in corde & circa oculos tantum. *Viscera* sine splene. Idem ferè apud Aristotelem invenies. Theophrastus addit, parum abesse quin pulmo totum corpus impleat. Aristoteles verò, lacertam planè repræsentare, & rostrum simiæ porcariae habere. *Ambrosius* ita hoc animal descripsit. Primitus, inquit, si caput meditemur, à medio capite retrorsum ossica pars triquetra eminent, reliqua pars antrorsum colligitur cava, & quasi canaliculata, eminentibus utrinque ossibus marginibus asperis, & leviter ferratis. *Oculi* in cavo recessu prægrandes, & colori concolores conduntur, cujus pupilla non movetur, sed animal totius oculi motu circumspicit, ore semper hiante, linguam habet longam & terrestri lumbrico similem, in cujus extremitate spongiosus quidam & glutinosus nodus existit. Ideò Johannes Laudius (referente Scaligero) huic animali assignat *linguam* palmi longitudine, & quid tanquam acerabulum in summa ipsius parte cum muco, quo prædam citò tollit. *Dentium*, & *gingivarum* loco, os quoddam continuum, & ferratum habet: nec non superius labium brevius. *Gula* atque *arteria* ex mente Aristotelis in eodem situ ut in lacerta est. *Pulmo* in comparatione ad molem corporis illi, inest maximus. *Cor* habet magnitudine cordis muris domestici; *hepatis* lobos duos, quorum sinister est major: *folli-*

culus fellis; granum hordeaceum æmulans, sinistro jecoris labo adhæret. Denique *intestina* omnia interaneis lacertæ similia esse prodit Aristoteles. *Crura* postea illi insunt recta & longiora, quam lacertæ, quamvis inflexus sit similis. Demum pedes anteriores à posterioribus valdè discrepantes Natura huic animali concessit. Etenim teste Bellonio, priores pedes ternos digitos intra binos extra, posteriores verò ternos extra & binos extra possident. Itaque ex Gesnero longitudo hujus animalis à summo rostro ad initium caudæ septem, vel octo digitorum est. Altitudo digitorum quinque, medius locus inter imum ventrem, & summum dorsum flexus costarum continet circiter, sexdecim. Et demum maculis distinctus ut pardus conspicitur. At paulò aliter de quibusdam *Gassendus*. Sunt enim secundum hunc Chamaleoni *dentes* eleganter dispositi. Unicum *intestinum* non circumvolutionibus sed curvaturis solum productum. *Excrementum* satis liquidum, nisi quâ parte ad anum accedit. *Hepar* bifidum, & ex gibba parte quidem sanguinem in cor auriculatum infundens, at non superstita ascendente descendenteve caudice venæ: quippe aliunde non porta modò nuncupata, in intestinum; sed venæ quoque aliæ, ad cæteras partes directè procedunt. *Pulmo* inflatus, abiit, inquit, in membranam tenuissimam, toti animali ambitu æqualem. In *imo ventre* nullum peritonæum, sed membrana solum partes dextras à sinistris dirimens. Non item *lien*, non *vesica*, non *renes*, sed carunculæ solum observatæ sunt; quæ genitalia fortè fuerunt. *Lingua* est pedalis propè longitudinis. Habentur in Asia, Africa, India, & Madagascar insula. Cairi hortorum sepibus ad Nili ripas insident. Per solum rarò vagantur, quòd sibi à cerastis & viperis metuant. Bellonius in fruticibus Rhamni plurimos conspexit. Aëre victitare credidere veteres: muscas, locustas, erucas, scarabæos vorare, observatum à recentioribus; à Peirescio, vermiculis qui ex farina ceis mactris colliguntur, vehementer delectari. Linguâ ut promuscide utuntur, quam jaculi instar evibrant, & tantâ quidem celeritate, ut penè visus aciem effugiat. Id præstatur, addit Gassendus, beneficio ossiculi, quod bifurcatione quadam implantatur utrinque ad extremas fauces, & cætera teres secundum oris longitudinem, deservit implicandæ explicandæque linguæ; cavæ scilicet, intestini instar, nisi quòd in summo caruncula est, nonnihil viscida; ut prædam corripit. In foemina una ex illis octo quas Peirescius aluit, ut formationem eruptionemque observaret, fuere ova intra membrulam supra centum, quorum nonnulla exitere magnitudinè nuclei olivæ, in quibus visum luteum solum, nihil vero albuminis; cum tamen parva viderentur quan-

Gassend.
in vita
Peirescii
l. 5. p.
325.

Locus.

Bellon.
observ. l.
2. c. 34.
Cibus.
Plin. H.
N. l. 8.
c. 33.

Genera-
tio.

Antip. ibid. quandam lactis speciem referre. *Inimicitias* gerunt cum *accipitre*, *corvo*, *elephante*, & *viperis*. *Accipiter* degustata chamæleontis carnie interire creditur. Idem *corvo* accidit, nisi se lauri foliis muniat. Ab *Elephante* frondibus concolorem deglutiri fabulatur Solinus, & cum dispendio vitæ; nisi statim oleastro sibi medeatur. Metu viperarum & serpentum, in fruticibus & arboribus degit. Saliva ejus ab ore in caput serpentis demissa, ob viscositatem fili instar, eundem interimit. Circa caprificos ferum, innoxium alioqui Plinius facit. *Naturam* & quædam alia si attendas, nunquamos aperit, inquit Plinius, sed rotius oculi vorseione circumspicit. Ipse celsus, hianti semper ore. Defuncto pallor est. Hybernis mensibus latet ut lacertæ. Coloris natura mirabilior. Mutat namque eum subinde & oculis, & cauda, & toto corpore, redditque semper quemcunque proxime attingit, præter rubrum candidumque. De pallore, idem Ambrosinus affirmat, & quidem experientiæ innixus. De coloris mutatione addit, & candidum recipere, adducto viri nobilis testimonio, qui sudario seu mucinio inclusum, ideò periisse putabat, quod ejusdem albedinem mentiretur. At Peirescii Chamæleontes, rerum objectarum colores non induebant. Seu virides, seu cinerei sint, inquit Gassendus, atrorem solem quandam subeunt, quâ parte ad solem aut ignem obvertuntur. Id rarum & admirabile; non moveri oculos Chamæleonis conjugatos; sed uno aliquorsum spectante, reliquum vel stare immotum, vel in aliam partem deflecti. Deflectuntur quoque versum, propter quatuor trochleolas, nullâ ostentata distinctione iridis; sed solâ pupilla, ad quam cornea undique (cum sit ut corpus reliquum radiata, variegata, granulata) terminatur. Incolis Cochinchinæ in cibus esse author relationis illius prodidit. Multi simul colligati venduntur; empti, in ignem conjiciuntur, eidemque ita, vinculo adusto reluctantur, ut incedere conentur: tandem superati torrentur. Pelle abrasâ, caro candidissima remanet, quæ in liquore butyro nostro simili coquitur. Habet & in *Medicina* usum. Ad epilepsiam profligandam Trallianus eum in fictili novo cum oleo decoquit, donec tabescat. Ad podagram verò depellendam, unguentum mirabile componit quod apud ipsum vide. Arnoldus Villanovanus *linguâ* super obliuiosum suspensâ, memoriam reddit. Alii ad evitanda puerperii pericula, eandem alligant. Marcellus hypochymata felle tollit. *Cor* Plinius contra quartanam in lana nigra primæ tonsuræ involvit. Decoctum Chamæleontis viridi colore in balneo aspersos inficere: caput & guttur, lignis quernis adusta, imbres & tonitrua ciere; *linguâ* cum radice herbæ chamæleontis & cynoglossæ homines obmutescere cogi, *hepar* amatoria

dissolvere; *intestina* & excrementa cum fimiurum urina mista, odium hominibus conciliare, si januis illinantur; armum dextrum ad hostes superandos valere; Democriti apud Plinium sunt ineptiæ. Integrum enim de eo scripsit librum. Palamque est, addit *Plinius*, virum aliàs sagacem & vitæ utilissimum, nimio iuvandi mortales studio prolapsus. Quantum ad *Differentias*, Bellonius varias ejus species observavit. Pallentes in *Ægypto*, in Arabia prædictis multò minores, colorisque diversi. Albicantes erant, subfulvi, & rubentibus maculis distincti. Nos hîc pallidi, nigri & varii icones damus.

Plin. II. N. l. 28. c. 8.

Differentiæ.

CAPUT VIII.

De Crocodilo.

DE Crocodilo hic agimus, quia ad lacer- torum genus refertur, & Palladius hanc bestiam, generis vocabulo *lacertum* appellat. Græcis dicitur *κροκόδειλος* & quandoque *κροκόδειλος* à quibus & Latini sumere: sine dubio, *παρά τὰ τὰς πρόκας αἰετίδας*, quòd littora timeat. *δειλός* Græcis tumidus. *Hesyfychius* *τύλην*, & *δεμρίτην*, vocat. *Ægyptii* *χίμφαν*, vel *χαμφάν*, à quo Turcarum *Kimfac*, quod eidem indidere. *Lexicon Ægyptiacum* Kircheri habet *πιχαρούκι*. *Statio* est fera Pharia, Alberto Tenchea. In *Arfinoitica* præfectura, teste Strabone, dicebatur *Suchus*: Indis Cayman. Lacertæ figuram repræsentat. Croceo est colore, ventrem si excipias, qui subalbidus. *Corium* sub ventre molle, ut faciliè sauciari possit, in reliquis partibus tam durum, ut ne bombardæ manuariæ globo cedat. *Visus* ad viginti quinque, imò viginti sex cubitos excrevisse. Ille ætate *Psammetichi*, teste Plutarcho; hic, *Amasidis*, prodente *Æliano*. Circa urbem Panamam, ultra centum pedes in longitudinem crescunt. *Caput* habet latum, *rostrum* suillum, rictum oris usque ad locum aurium productum, *Oculos* præduros & suillis similes, ut Albertus prodidit. *Palpebram* inferiorem sine ulla nictatione. *Dentium* series pectinatim stipatur, & quidem magnorum, albicantium, robustissimorum. Sexaginta post *Ælianum* Gesnerus numeravit. Plures superiorem maxillam munientes dorsum prominent, ita ut ore etiam clauso conspiciantur. *Lingua* quia indiscreta, non mirum Plinium post *Diodorum Siculum* scripsisse, *Unum hoc animal terrestre lingua usu caret*. Unum superiore mobili maxillâ. *Lien* est parvus. *Testes* internis lumbis adherent. *Spina* sexaginta vertebis quas totidem nervi colligant, constat. *Crura* cum pedibus acutissimis unguibus armatis in latera parum flectuntur. *Cauda* longitudine reliquum corpus aequat. Gesnerus in ea pinnam per septem digitos ad postremam usque partem

Nomen.

Kircheri: p. 172. Linguae Ægyptiæ restituta: Descriptio. Arist. H. A. l. 2. c. ult.

Ælian. H. A. l. 17. c. 6.

Plin. H. N. l. 8. c. 25.

Ælian. H. A. l. 10. c. 21.

Arist. H. A. l. 1. c. 10.

Arist. H. A. l. 3. c. 1.

Plin. II. N. l. 8. c. 33. *Natura*. Plin. l. c. & l. 28. c. 8.

Gassend. l. c.

Ufus in Cibus.

Ufus in Medicina.

Plin. H.
N. l. 8. c.
26. Scallig. Exercit.
196.
Locus.

Acofta
Hiftor.
Ind. Oc-
cid. l. 3.
c. 15.
Cibus.

Martyr.
l. 2.

Genera-
tio.

Ælian.
H. A. l.
10. c. 21.
Plin. H.
N. l. 8. c.
25.

Antipa-
thia.

Plin. H.
N. l. 8. c.
25.
Ælian.
H. A. l.
8. c. 25.
l. 10. c.
47.
Acofta
Hiftor.
Ind.
l. 3. c.
25.
Ælian.
H. A. l.
10. c. 24

Seneca
Natural.
quæft. l.
4.
Phile in
Iambis.

Plin. H.
N. l. 8. c.
25.

observavit. Primus quinque Crocodilos Romæ, Ædilitatis suæ ludis, M. Scaurus temporario Euripo ostendit. Inveniuntur in Africa, Asia, & America. In Nilo inprimis & vicinis ipsi stagnis, Nigro fluvio, Gange circa Bengalam, in Bamboto flumine juxta Atlantem, quod Solinus prodidit; non longe à Chalcedone, sed parvi, quod Strabo. Acofta aquis in America calidis delectari scripsit, sed in Peruana usque ad Pacram non inveniri, inde frequentissimos esse. Quidam luto vivere dixerunt: sed revera piscibus saturantur, & humanæ carnis sunt avidissimi. In terris etiam animalibus insidiantur. Petrus Martyr in legatione sua Babylonica, comprehensum qui tres pusiones devorarat, scribit. In Arsinoitica præfectura olim facer, pane, carne & vino, à Sacerdotibus nutriebatur. Fuere, prodente Strabone, qui placentas, carnes assas, & mulsum iisdem, offerebant. Quantum ad *Generationem*, masculus foeminam resupinat, cum aliter ob crurum bevitatem congregi nequeapt: Parit foemina ova sexaginta, quanta anseres: eaque, prædinvinatione quâdam, extra eum locum semper incubat, ad quem summo auctu eo anno accessurus est Nilus. Totidem diebus ea parit, & totidem fovet, & tandem partus decursu sexaginta dierum peragitur. Gyllius arena obrui, & absque ullo incubatu catulos egredi observavit. *Veroniam* verum tempus indicat: nec aliud à minori origine in majorem crescit magnitudinem. Gerit ex quadrupedibus cum ichneumone, bubalo, tigre; ex avibus cum accipitre; ex piscibus cum hydro, porco pisce, delphino; ex aliis animalibus, cum scorpione, homine, Tentyritis, & plantis quibusdam inimicitiam. *Ichneumon* ova ejus conterit, & in aprico dormientis os illapsus, eundem eviscerare conatur. A bubalo prosternitur. Resupini ventrem, tigris sæpè in America dilaniasse visus est. Propter accipitrum odium, Coptitæ Crocodilorum veneratores, eos sæpè in crucem agunt. Hydro ita est hostis, ut propter fel à venatoribus gestatum, iisdem nocere non possit. A porco pisce quod spina circa caput armetur abstinet, ut Strabo prodidit. Delphini Nilum ingressi, aquis se immergunt, & subeuntium Crocodilorum ventrem dilaniant. Spectaculi testis fuit Babillus, quondam Ægypti præfectus. E-rumpentem ex ovo crocodilum, scorpius fauciare solet. Ad humanum strepitum perhorrescunt, & persequentem fugiunt. De *Tentyritis* ita *Plinius*. Quin & gens hominum est huic belluæ adversa, in ipso Nilo, Tentyritæ, ab insula, in quâ habitat, appellata. Mensura eorum parva, sed præsentia animi hoc tantum usu mira. Terri-

bilis hæc contra fugaces bellua est, fugax contra insequentes: sed adversum ire, soli hi audent. Quin etiam flumine innatant: dorsoque equitantium modo impositi, hiantibus resupino capite ad morsum, additâ in os clava, dextra ac læva tenentes extrema ejus utrinque, ut frænâ in terram agunt captivos: ac voce etiam sola terribitos, cogunt evomere recentia corpora ad sepulturam. Itaque uni ei insulæ Crocodili non adnatant: olfactuque ejus generis hominum, ut Psyllorum serpentes, fugantur. Romam ætate M. Scauri delatos, Tentyritæ custodes sequebantur, illosque à piscinis ad spectacula, à spectaculis ad piscinas ducebant. Ex plantis fabam spinosam, annotante Crescentiensi, vitant. Potamogeton tanquam quoddam contra Crocodilos amuletum, urinatores secum deferre solent. Et contra cum porco, & trochilo amicitiam colit. Porci circa Nili ripas impumè oberrant. De *Trochilo* ita *Plinius*. Dies in terra agit, noctes in aqua, temporis utrinque ratione. Hinc saturum cibo piscium, & semper esculento ore, in littore somno datum, parva avis, quæ trochilos ibi vocatur, rex avium in Italia, invitat adhiantum pabuli sui gratia, os primum ejus asultim repurgans, mox dentes, & intus fauces quoque ad hanc scabendi dulcedinem quàm maximè hiantes. Leo Africanus, vermes ex continuo piscium esu, inter dentes exortos devorare scribit. Crocodilum ut absumptos percepit, aviculas devorare niti, sed acuta quam supra caput gerunt spina punctum, os diducere, & ita dimitti. Quantum ad *Naturam* & *Ingenium*, è Nilo in terram egressi, per eadem vestigia regrediuntur, si Petro Martyri credimus; ob crurum brevitatem difficillimè in latus se vertunt: dum gradiuntur, gratum relinquunt odorem, adeò ut foeminam Arabicos odores æquare, Nili accolæ prodant. Quatuor mensibus secundum Aristotelem, quadraginta diebus secundum Suidam, sexaginta secundum Ælianum, latitant, & sine victu morantur. Artemidorum Grammaticum, adeò viso perterritum, ut, læsa mente, literarum memoriam perdidit, & sinistram crus sibi à fera ablatum crediderit, Coelius Aurelianus auctor est. Humanum depasti cadaver, ossa capitis lachrymis frangere, ut medulla inexistente vescantur, dicuntur. Nocentiores sunt Nilum ascendentibus, quod illa fluminis, pars à piscatoribus exhauriatur. Ferociiores inde facti, quod piscibus destituantur, homines & jumenta adoriuntur. Nec minus eodem ad proprium alveum post inundationem redeunte sæviunt, propter piscium inopiam, quam aqua in Nili fau-

Sympa-
thia.

Plin. H.
N. l. 8. c.
25.

Leol. 9.
Africa.

Natura &
Ingenium.
Martyr.
Legat.
Babylon.
l. 3.

Arist. H.
A. l. 8. c.
15.
Ælian.
H. A. l.
10. c. 21.

Coelius
de furore.

Petrus
Martyr.
l. c.

faucibus minus profunda facit. Tum, cœno indutus, aequatum venientibus insidiatur: & navigium flumen ascendens secuti, cum nauta conto ad expungendam navem inhæret, celeri caudæ ictu, nautam cum conto dejiciunt. Neminem iisdem diebus Apis natalis celebrabantur, læsisse, fabula fortè est. Rediisse, postquam Achmed Ben Tolon signum Crocodili plumbeum, in templorum fundamentis inventum dissolvi jussisset, apud Scaligerum legimus. De divinatione, supra dum de ovis ageremus, diximus. Ejusdem apud Ælianum exemplum legitur. Ptolomæum regem nescio quem, cum ex Crocodilis antiquissimum, *inquit*, & præstantissimum appellaret, exauditum non fuisse; quum cibaria objecisset, rejecisse. Inde sacerdotes morti vicinum collegisse. *Ingenium* indicant, quòd prolis indolem ex prædæ raptu colligunt: cicurati vocem humanam intelligunt; & manu tractati, diducto rictu, mantili, dentes sibi abstergi patiuntur. Non est ergò mirum in paludibus Ombitarum arte paratis nutritos, domesticos esse, ut Ælianus prodidit, iisdemque hostiarum capita objici. In oppido Anteo aniculam quandam in lecto cum crocodili deprehensam, Gyllius prodidit. Humanam ætatem æquant, si Aristoteli, Plinio, & Diodoro Siculo credimus. Ælianus sexaginta vitæ annos assignat. *Utuntur* iis quidam in *Cibis*. Apollonopolitæ vi legis carnem eam comedere tenebantur, seu quòd Pfammeniti Regis filia à Crocodilo devorata fuerit; seu odio Typhonis, quem in Crocodilum versum fabulantur, ut apud Herodotum extat. In partibus Indicis assari, Ferdinandus Lopez vidit: in Florida, alii: imò exsiccantur ibidem, & hyeme mensis apponuntur. *Ova* comesta, in authoribus novi orbis inveniunt. In Ægypto iisdem quosdam vesci, apud Leonem Africanum habetur. De *Uso in Medicina* hoc habet. Decoctum de morsis ab araneis opitulari: *Caninis dentibus* thure repletis, typos febrium arceri: quoscunque à vivo animali extractos, ipsoque dimisso, parti dextræ viri, & sinistræ mulieris adaptatos, Venerem stimulare, nisi fabulatur Kiranides. *Sanguis* visui claritatem conciliat, & partibus à serpentibus faucis, auxiliatur. *Pinguedine*, febricitantes contra horrorem inunguntur. Eadem antiquis vulneribus & carcinomati prodest. *Corium* crematum & cum olei amurcâ mistum, partem mutilandam adeò stupidam reddit, ut ferum secans non sentiat. Apud quosdam Indos olim ad supplicia alebantur, objiciebanturque eis vincti manibus & pedibus fontes. In fossis urbis Pegu habentur, prode Balbo, ne quis per aquam ad urbem accedere audeat. Incolæ, quia eos venerantur, aquam fossarum bibunt: occisi ab

ipsis animam, rectè ad superos evolare credentes. Firmus Ægypti Tyrannus pinguedine Crocodilorum inunctus, impunis inter eos natabat. Circa *Differentiam* pauca occurrunt. Plinius in *Magnos & Parvos*, qui Scinci dividit. Albertus Tencheæ meminit, cui omnia quæ prodidimus, applicari possunt. Ælianus duplices in fluvio Gange ponit, *Noxios* cum cornu in rostro, & *Innoxios*. In provinciâ Xanagarra à vivis crocodilis vagantibus odor moschi spirat.

Differentia.

T I T U L U S II.

De Digitatis Oviparis crustâ testis.

C A P U T I.

De Testudine in genere.

Testudo à tegmine testaceo nomen obtinuit, ut Isidoro placet. Grecis *χελύς*, *χελών*, *χελώνη*, à *χέω*, capax sum, dicitur: ut & *κλεμύς*, *σφαγίς*, *φέροιχα*, &c. quanquam hoc inter epitheta censeretur debet. Animal est ingratum visu. Tegitur testa figurâ ovalis, & instar scuti concavâ, sub quâ caput, pedes, & caudam recondit. Pacuvius ideò capite brevi, cervice anguinâ, & aspectu truci scripsit. Testa illa Palladio dicitur *Corium*, Marcello *tegumen*, Plinio *operimentum*, *putamen*, & *superficies*, aliis *operculum testaceum*, Græcis *χελώνην*, & generali nomina *ὄσρακον*. Loco *dentium* unicuique os continuum habet; inde *μόνιδος* dici posset: intus prægrandem *pulmonem* eumque exanguem, *jecur* vitiatum, *testes* lumbis adhærentes, *lienem* perexiguum. *Renes* & *vesicam* omnibus tribuit Aristoteles, lutariam si excipias. Unico tamen *excrementorum* exitu referta sunt. Ideò illa semper liquida & aquea. *Pedes* similes sunt lacertis, quinque digitis unguibus munitis instructi. In cauda Cardanus quandoque unguem gallorum calcaribus similem conspiciat, qui fortè à callo. Nam in his animalibus veluti & in lacertis, cauda amputata durior renascitur. De *Loco* hoc duntaxat ponimus, reperiri in terra, mari, & lacubus, vel locis cœnosis. In mari rubro reperiuntur copiosæ, ut Arrianus prodidit, quæ ad emporium venales deferuntur. In insula quoque Dioscoridis, quæ nunc Socotora, inveniuntur: ut & in insula Mauriti, quam Cernen veterum quidam credunt. *Coëunt* more viviparorum, & mas supervenit foeminam. Hæ quia nullam voluptatem in congressu sentiunt, difficulter admittunt, nec citius, quàm vehementer exagitata fuerint. Pariunt *ova* ovis gallinarum similia, sed minora & oblongiora, putamine, albumine & vitello prædita, ut in

Ambrosio. l. 2. c. 1. *Nomen.*

Descriptio.

Plin. H. N. l. 9. c. 10. Idem H. N. l. 11. c. 37.

Aristot. de partib. animal. l. 3. c. 8.

Cardan. de variet. rer. cap. 29.

Locus.

Arrian. in Periplo maris rubri. Herbert. in Itin. p. 249. *Generatio.*

Aristot. H. A. l. 5. c. 3. Ælian. H. A. l. 13. c. 40. Plin. H. N. l. 9. c. 51.

icone

Plin. H. N. l. 11. c. 4. Scalig. Exerc. 196.

Ælian. H. A. l. 8. c. 4.

Ælian. H. A. l. 9. c. 3.

Diodor. Biblioth. l. 9. c. 1. *Uso in Cibis.*

Leo Afric. l. 9. *Uso in Medicina.*

Baldus in Itiner. c. 35.

icone videre est. De *Natura & moribus* habet, testam, quam tam duram habent, ut nec à plaustris currentis rotis conteri possit, non mutare, quod crustacea faciunt: mensibus hybernis sine cibo in cavernis latere: exeuntes, lento gradu incedere, seu quòd onere premantur; seu quòd natura tardæ sint: cum perdicibus perpetuò rixari: Aquilas, quæ in sublimo sublatas ad petras allidunt, unde & Æschylo Tragico Poëtæ, cui caput calvum, & petræ instar, mors, abhorrere: diu secundum Hippocratem vivere: perexiguum sibilum colubrorum paulò altiore voce edere: denique cum serpentibus & viperis præliaturas, satireja, cunicula, vel origano se munire. Nihil quidem de earum *in cibis* usu apud Galenum vel Apicium. Brujerinus tamen carnes prius elixat, deinde in frustra sectas, in vase frixorio assat. Quo loco habendæ sint, disquiritur inter quosdam. Alii inter piscium carnes reponunt, ut Castor Durantes. Unde tempore jejunii piscium loco conceduntur: alii non item. Habent scilicet testudines ossa & spirant: ne de ovis quicquam dicam. Ut ut sit, apud quosdam Barbaros in America in deliciis esse certum est: nec dubium delicatis ventriculis obesse, & difficulter concoqui, validè tamen, si concoquantur, nutrire. In *Medicina* haud contemnendæ sunt. Hydropicis & phthisicis caro prodest. Coctæ fastidium ex melle natum, prodente Plinio ex Pelope, statim tollunt. Tegminis cremati cinere, in fistulis, capillorum defluxu, Porta; ulceribus pedum cum oleo & vino Marcellus: in suffumigio contra hæmorrhoidas Galenus utitur. *Ipsæ* crematæ cum albumine ovi fissuras mammarum apud Rhafen tollunt: & in herniis feliciter, si Crollio, credimus, ob quandam signaturam adhibentur. *Sanguis* ex capite resupinatæ amputato collectus, & insolatus donec exsiccet, sacrum ignem extinguit, verrucas abolet, porriginem pellit, & in capitis ulceribus adhibetur. *Ova* ad tussim infantium commendantur. Adhibentur & *ad alia*. Mizaldo si credendum, ex ovis formicarum, hyoscyamo, cicuta & testudinis sanguine, egregium paratur psilothrum: tegmen ollæ operculi loco superpositum ebullitionem impedit. Myrepso vinum cum sanguinis modico propinato, abstemios homines reddit. Albertus carne equos obefat. porcos pingues ea evadere, experientia comprobavit. Vegetius ex testudine viva supra sarmenta combusta, alumine crudo, medulla cervina & vino, medicamentum componit, pro pilis jumentorum citius augendis. Scobs tegminis fœminæ in aliquo liquore pota, Venerem inhibere creditur. Majora, ad mensas, vasa & lectos olim usurpabant. Placuit, inquit Plinius, *materiam & in mari quæri. Testudo in hoc secta. Nuperque por-*

tentosis ingeniis principatu Neronis inventum, ut pigmentis perderet se, plurisque vaniret, imitata lignum. Testudinum verò putamina secare in laminas, lectosque & repositoria his vestire, Carbilius Pollio instituit, prodigi & sagacis ad luxuriæ instrumenta ingeniis. Ideo Seneca. *Video elaboratam scrupulosa distinctione testudinem, & fœdissimorum pigerrimorumque animalium testas, ingentibus preciiis emptas, in quibus illa ipsa quæ placet varietas, subtilis medicamentis, in similitudinem veri coloratur.* Hodie Amazones corticibus se tumentur: quibus & alicubi pro cunabulis infantum utuntur. Quantum ad *Differentias*. Plinio testudinum genera sunt, *terrestres, marinae, lustrariae*, & quæ in dulci aqua vivunt: quarum has *emylas* vocant. De his omnibus insequentibus agemus. Visa & in insula à Zambolo reperta, quædam animalia parva, corpore rotundo testudinum instar, duabus lineis invicem per medium transversis in quarum singula extremitate, auris & oculus conspicitur, ita ut quatuor oculis intueri, & totidem auribus audire videantur. Unico constant ventre, sed pedibus pluribus, quibus innixa in utramque partem gradiuntur. Sanguini singulare aliquid inest. Nam omne corpus faucium, eo dum spirat illorum, cohæret. Gesnerus *Testudinem polypodem* vocat. Videtur ex Diodoro Siculo historia desumpta esse, ni fallor, nam author nunc ad manus non est. In insula Mauritiæ, quæ Zonæ torridæ subjacet, tam validæ inveniuntur, ut homines ferre & transferre possint. Lusitani de quindecim affirmant.

CAPUT II.

De Testudinibus in specie.

ARTICULUS I.

De Testudine terrestri.

Quatuor testudinum genera ex Plinio supra posuimus. Sed hæc ad duo, *Terrestres* nempe & *Aquaticas*, optimè reduci possunt. *Terrestres*, alii *montana*, *sylvestris*, *campestris*, *agrestis*, & *memoralis* dicitur. Græcis *χρυσόδαν*, Nicander *ἀρείν*, Oppianus *ἀρεσιφελον* vocat. Luteis & nigris maculis instar Salamandræ in tergore distinguitur: cortice superiore marinam valdè æmulatur. Fœmina à mare in eo differt, quod inferiorem testam planam habet, quæ mari concava; & semper ponderosior observatur. Interiora sic M. Aurelius Severinus describit. Principio, inquit, ablato cortice inferiore statim apparere duo *musculi* anteriores moventes, ut apparent brachia, utrinque unum; quanquam uterque distinctus videtur in duos, quorum major est exterior, minor verò interior. Oblique descen-

Plin. H. N. l. 9. c. 11.

Seneca de Benef. l. 7. c. 9.

Differentia. Plin. H. N. l. 32. c. 4.

Ambros. ex Bohem. l. 2. Ovip. c. 1.

Hebert. in Itin. Persiæ p. 349.

Ambros. fin. Ovip. Dignit. l. 2. c. 2. Nomen.

Descriptio.

Severin. Zootom. Demonstr. crit. par. 4. p. 321.

Ælian. H. A. l. 4. c. 22. Aristot. H. A. l. 4. c. 6. Aristot. H. A. l. 9. c. 6. Plin. H. N. l. 8. c. 16.

Usus in Cibis. Brujer. de re cibaria l. 22. c. 7.

Usus in Medicina.

G. Leo. Euphorist. l. 3.

Cent. 7.

Plin. H. N. l. 16. c. 43.

cendunt quasi ab axillis brachiorum, nascentes à membrana adhærescente cortici, & desinentes in tendinem acutum. Figura ipsorum oblonga, rotunda, quasi plantæ manus; infra hos musculos tum parte dextra, tum sinistra sex alii visuntur oblongi, flexores forasse brachiorum; duo totidem apparent muscoli deducti ad femora, nascentes ab externa dicta membrana corticis, qui tertio sunt minores brachialibus, neque in tendinem desinunt, ut illi, sed carnosiorum sunt, quod inferantur femoribus. *Spina* compacta est & validè innexa cortici, per longitudinis medium. Infra *caput* medio lato digito descendunt duo muscoli à lateribus positi, ipsum intra trahentes, cum duobus aliis paulo inferioribus, quatuor isti oblongi maximè omnes. *Iecur* parte dextra & sinistra æquali magnitudine bipartitum. Gibbum externè, cavum internè, sed dextra internè inæqualis veluti prærupta rupis complectens miro artificio ventriculi orificium inferius & portionem duodeni; sinistra complectens majorem ventriculi cavitatem, excavato quodam supercilio similis. *Cystis fellis* dextra in fibra hepatis profunde condita; *ventriculus* ad humanum vel suillum maximè accedens: sed postquam in intestina perducitur, tres amplas habet cavitates, in quibus totidem perfici coctiones & transmutationes assumptorum videntur. In prima, herbacea materia, in secunda item, sed elaboratior, & hinc externè adhærebat *lien* rotundior & ater; in tertia materia quædam subliquida & albissima, simile manse castaneæ, sed dilutæ. Aperta est conjectura, servire hanc in locum vesicæ, quæ ejaculatur quandoque humorem album, veluti gallinæ solent. Ampla est hæc & castaneæ figuram æmulatur: tenuissima est & amplo canali, quantum est intestinorum extremum similis, cui correspondet parte inferiore. Hæc validè adhærescit peritonæo atque immediatè illi incumbit. *Intestinum rectum* in fine habet processus illos laterales, qui sunt gallinæ omnibus sed divisostamen & in latera longè productos, usque ad renum viciniam. Cum his ponè sunt *ovorum* utraque parte productiones, *Mesenterium* amplis satis venis intextum. *Cor* rotundæ figuræ, sed non exactæ, ut lenticulam referat; colore subalbidum, intus uno sinu cavum; situm supra jecur statim. *Aspera arteria* (quæ dignissima omnino est observatio) paulo post initium bifida, quorum rami contorti. *Pulmones* parte superiore adhærescentes spinæ, substantiæ admodum raræ, non carnosæ, sed veriùs membranosæ, intextæ arteriæ asperæ, ramis velut rete quoddam implexum, colore subatro. Observanda dispositio ossis hyoidis & cartilaginis scutiformis. *Calvaria* testudinis marinæ septum est, quod supernæ testudini extensum cerebri par-

tes utrasque desternat præter cujuslibet calvæ conformationem.

Vagantur plurimæ in Africæ desertis: ut & in Lybiæ parte quadam, Mauritania fortè, ut Strabo scribit: proveniunt & in sylvis Arcadum, teste Pausania, ex quibus lyræ olim fabricabantur. Sed maximæ in insula Dioscoridis in mari rubro habentur. De insula Mauritii superius diximus.

In desertis quia inveniuntur, roscido duntaxat humores pasci quidam judicavere. Alii, olera germinare inchoantia, melopepones inprimis & sesamum, præcidere dicunt. Nicander *νικητωρ*, quod Cytiso, vel cytini delectentur, vocavit. Edunt & lumbricos, & cochleas. Domi fursure & farina nutriuntur.

Quantum ad *Generationem*, fabulæ sunt ex Gerano muliere in gruem mutata & Nicodamante natam: imò potius Boei apud Athæum locus est. *Coëunt* ut superius diximus. *Ova* durioris testæ intusque bicolora enituntur, quæ terra contacta, repetitis vicibus incubant, særumque sequenti anno ad pastum educunt. Flantibus ventis concipere, quod apud Nicandrum habetur, falsum: Certius, cum foemina ad Venerem tarda sit, herba quadam à mare concitare, quod apud Ælianum invenitur.

A Græcis non comedi, Bellonius author est. Hungari quidam cum Clusium carnem unius degustasse vidissent, morituum putabant. In India frequentissimè mens inferuntur: Augusto & Septembri, quod tempore segetum pinguiore sint, quidam laudant. Scappius à mense Februario ad Majum foeminas optimas, quod tunc ovorum plenæ sint, scribit: à Junio ad autumnum, mares. Sunt qui ex alliato eas mirum in modum commendant. Hodie, *verba sunt Ambrosini*, Bononiæ, testudo terrestris & præsertim foemina, decollatur, & toto effuso sanguine elixatur, donec tegmina à carne eximi possunt. Postmodum intestina non abjiciuntur, sed ab excrementis absterfa abluuntur, deinde una cum carne testudinis, croco pulveribus aromaticis, pineis, passulis, in vino malvatico diligenter coquuntur, & mensis inferuntur. Plura apud Scappium & Ambrosinum vide.

De Usu in Medicina ita *Plinius*. Terrestrium caro suffitionibus propriæ, Magicisque artibus refutandis, & contra venena salutares produntur. In Africa amputato capite pedibusque, pro antidoto dari dicuntur: & ex jure in cibo sumptæ, strumas discutere, ac lienes tollere: item, comitiales morbos. *Sanguis* earum claritatem visus facit, suffusionesque oculorum tollit: & contra serpentina omnium, & araneorum, ac similibus, & ranarum venena auxiliatur. servato sanguine in farina pillulis factis,

T

& cum

Locus.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 4.
Pausan.
in Arcadiciis.

Vitus.
Brujer.
Rei cib.
l. 22. c. 7.

Generatio.

Athen.
Dipnos.
l. 5.

Ælian.
H. A. l. 5.
c. 32.
Usus in
Cibis.

Scapp.
l. 3. Rei
cib. cap.
166.

Usus in
Medicina.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 4.

& cum opus sit in vino datis. *Felle* testudinum cum Attica melle glaucomata inungi prodest, & scorpionum plagæ instillari. *Tegumenti* cinis, vino & oleo subactus, pedum rimas ulceraque sanat. *Squamae* à summa parte derasæ, & in potu datæ, Venerum cohibent. Eo magis hoc mirum, quoniam totius tegumenti farina, accendere traditur in libidinem. *Urinam* earum aliter quam in vesica dissectarum inveniri posse non arbitror. Et interea hoc quoque esse quæ portentosa Magi demonstrent, adversus aspidum ictus singulare, efficaciore tamen, ut ajunt, cimicibus admistis. *Ova* durata illinuntur strumis, & h ulceribus frigore aut adustione factis. Sorbentur in stomachi doloribus.

Hactenus Plinius. Apud alios invenies, Syrupum ex testudinibus apud Bononienses haberi, qui phthisicis, emaciatis, feliciter propinatur: apud Amatum Lusitanum ex eadem decoctum in destillationibus russi, &c. describi: apud Veckerum, electuarium quoddam ad feminis acris repressionem ex testudine componi. *Iecur* Galenus tritum, in

Galen. in Euporist.

Differentia.

Ælian.

H. A. 1.

16. c. 15.

Marc-

grav.

Hist.

Brasil. 1.

6. c. 15.

In India gignuntur maximarum glebarum magnitudine. Testas exuunt, quemadmodum vermes ex verminosis plantis, lignibus extrahuntur. Pingues & suaves carnes habent. *Iaboti* Brasiliensibus. Testudinis terrestres species est, Lusitanis *Cægado do terra*. *Testa* nigra est tecta, cui multæ figuræ hexagonæ sunt insculptæ. *Rostrum* habet ut reliquæ. *Caput* & crura sunt fusca, verum maculis ex umbra variegata. *Iecur* hujus saporis est optimi, & antecellit omnium animalium suo jecora sapore.

ARTICULUS II.

De Testudine Aquatica.

PUNCTUM I.

De Testudine aquæ dulcis, & Lutaria.

Ambrosio de Digt. O. vip. 1. 2. 1. 3. Nomen aquaticæ.

Testudines aquaticas, in illas quæ in aqua dulci degunt, ad quas Lutariæ benè referri possunt, & illas quæ in mari, dividimus. *Aquaticam* Plinius murem aquaticum & *Emyda* vocavit, quod vocabulum alii ab *a*, alii ab *o* inchoant, descendere à Græco *μῦς* videtur. Niphus Mydam, quandam testudinem colore luteo dixit. Græci *ποτάμια χελώνια* vocant.

Locus. Gesner. de quæped.

Leo Afric. 1. 5.

Degunt in aquis dulcibus; lacubus, & fluviis. Gesnerus in agro Tigurino, in exiguo lacu, propè Adel fingum inveniri scribit. In balneo aquæ calidæ, Constantinæ vicino, quæ fluens inter rupes longè lateque diffunditur, ingentem copiam haberi, Leo Africanus prodidit. Dæmones à mulieribus illius civitatis appellantur, iisdemque causas mor-

borum adscribunt. Vagantur & in Gange ac Nilo fluviis ut Ælianus scripsit. Respirare etiam tum, apud Aristotelem habes. Tempore faturæ aquas deferere, & in locis siccis, scrobe effossâ ova ponere, postmodum diem trigesimo detegere, & fatum ad aquam continuo ducere, ex eodem habeo.

Ælian. H. A. 1. 12. c. 14. Aristot. H. A. 1. 5. c. 33.

De hujus usu in Medicina sequentia nobis Plinius reliquit. Ex quarto genere testudinum, quæ sunt in amnibus, divulsarum *pinguium* cum æizoo herba tuso admisto unguento & semine lilii, ante accessiones si perungantur ægri, præter caput, mox convoluti calidam aquam bibant, quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem quintadecimâ Lunâ capi oportere, ut plus pinguium reperiatur. Verum ægrum sextadecima Luna perungi tradunt. Ex eodem genere testudinum *sanguis* instillatus crebros capitis dolores sedat: item strumas. Sunt qui testudinum sanguinem cultro æreo supinarum capitibus præcis, excipi novo fictili jubeant: ignem sacrum cujuscunque generis sanguine illini: item capitis hulcera manantia, & verrucas. Idem promittunt omnium fimo panos discuti. Et licet incredibile dictu sit, aliqui tradunt tardius ire navigia testudinis pedem dextrum vehementia.

Ufus. Plin. H. N. 1. 32. c. 4.

Circa *Differentias Aquaticarum* nihil ferè occurrit, hoc unicum si exceperis, Indicæ fluviatilis, non minorem esse testam, quàm justæ magnitudinis scapham. Decem enim leguminum medimnos capit.

Ælian. H. A. 1. 16. c. 14.

De *Lutaria* etiam quædam occurrunt. Videntur eam Græci *χελώνη πηλαμίδα* vocasse, & per aphæresin amyda. Latitudo ei in dorso pectori similis, nec convexo incurva calice, ingrata visu. Stabulatur quidem in locis cænosis, sed verno tempore, ad fluentes quoque aquas proficiscitur. Vesicâ & renibus carere superius diximus, fortè propter tegumenti molliem, humor enim facile diffuere potest. Circa Ferrariam, in Gallia, Polonia, Hungaria, & alibi multas conspicies. De *Usu* inter cæterea hæc habet apud Ambrosium *Mizaldus*. Sunt, inquit, qui instantem grandinem observantes, manu dextra testudinem polustrem supinam circa hortum vel agrum ferant, & reversi unde exierunt, illam humi deponant, eadem figura, ut animal nubem grandine prægnantem intueatur, hacque ratione eam amoliri conantur. *Plinius* de ea ita. Ex hac quoque tamen aliqua contingunt, auxilia. Tres namque in succensa farmenta conjectæ, dividitibus se tegumentis rapiuntur: tum evulsæ carnes earum, coquuntur in aquæ congio, sale modicè addito: Ita decoctarum ad tertias partes succus, paralyfin & articulares morbos sentientibus bibitur. Detrahit item fel pituitas, sanguinemque vitiatum. Sistitur ab eo remedio alvus aquæ frigidæ potu.

Lateria.

Plin. H. N. 1. 32. c. 4.

Mizald. Cent. 4.

Plin. 1. c.

P U N C T U M II.

De Testudine Marina.

Ambro-
fin. de
Digit.
Ovip. 1.
2. c. 4
Nomen.

Testudo marina, Plinio est *mus marinus*; Græcis *χέλυς* quasi *χέλυς ἔνυδρος*, *θαλασσόνομος*, & *χέλων* diciter, Germaniæ & Flandriæ piscatores, & *Melitim* vocant, quod scutum & galeam gestet; & *Barchoram*, prodente Alberto, nomine fortè ab Ostracodermo corrupto. Idem adjicit *Zytyron* maris quoddam animal à Priscis. Militem dictum, à capite cute rugosa & dura galeato, & quod de collo quasi scutum suspensum gestaret.

Discri-
ptio.

Terrestribus eas assimilat Pausanias, pedes & magnitudinem si exceperis. Loco *dentium* habet os unum tam durum, ut crassos baculos unico ictu præcidat. Hinc apparet, Oppianum qui ei crebros tribuit, de rostri marginibus potius intelligendum esse. *Oculi* fulgorem procul emittunt, *pupillis* candidissimis & splendidissimis, si *Æliano* fides, instructæ. *Pedes*, alæ potius videntur, quibus tanquam remis ad natandum utitur. Reliqua in observationibus suis accuratè persecutus est Severinus, dum inquit: Inferiori primum cortice supinæ huic cultro transversim separato atque ablato, visa membrana *peritonea*, totam anteriore parte vestiens, à jugulo ad pubem continua, cortici inhærens, fibris quibusdam carneis, præsertim parte thoracis; *omentum* nullum, nullum *cæcum*; sed *intestina* supernè deorsum gracilefcentia, contrà quàm in cæteris quadrupedis. Quin à summo œsophago, qui duplicati pollicis magnitudinem æmulatur, donec ad recti initia pertingit, perpetim minuitur cum tota membri crassitudine, tum tunicarum, quæ tunicæ duplices, externa nervosior, carnosior interna. Sed hæc quoque villosa & lentore quodam pingui madida, haud valdè dissimilis à recto vaccæ intestino benè saginata. Parte priore & primo ductu Oesophagi aculei crebri transversim positi, majores, quam in bovina lingua; quod certè mirabile & à Rondeletio non observatum: Fabricati fortasse hi ad comminuenda alimenta, quæ duriora ab hoc genere ingeri perhibent. *Vesica* cervix recto intestino intrò respondens, ut utriusque recrementum uno ductu exitum habeat. *Lien* rotundus instar ovi, intestino superiori alligatus. *Renēs* plani & oblongi, quasi ex parvis pluribus compositi. *Cor* uvidum cum vasis valdè implexis in primo exortu. *Auricula* magnæ & pendulæ tenui membrana præditæ ac nigrescentes. *Pulmonēs* ampli, multo inferius quam cor descendentes. *Cervix* inflexa cum crebris musculis, sed duo longissimi intro in corticem caput trahunt.

Oppian.
Halient.
l. 1.

Ælian.
H. A. l. 4.
c. 28.

Severin.
Zootom.
Democ.
par. 4. p.
321.

Habitant in falsis aquis, & Pausanias circa Moluridem versari scribit. *Vicitant* pisciculis, cochleis, & ad terram delatæ, gramina depascuntur. Tempore *partus* terram petunt, & ova circiter centum, secundum Aristotelem, in scrobe deponunt, avium cohortalium similia: eaque nonnisi noctu incubant. Postquàm inhumavere, loco pedem imprimunt, ut reduces agnoscant. Hoc *Plinius* ita protulit. In terram egressæ, in herbis pariunt ova, avium ovis similia, & ad centena numero. Eaque defossæ extra aquas, & cooperta terrâ, ac pavida pectore & complanata, incubant noctibus. Educare foetus annuo spacio addit: sed id de terrestri intelligendum. Marinæ quadraginta diebus excoquantur & rumpuntur. In Americæ parte quâdam ter centena & ultra humo obruta, quæ à sole excocta, absque parentum adiumento pullulant, ut quasi exercitus testudinum fundi videatur, quod apud Petrum Martyrem legimus. Ad Naturam pertinet, quod extra aquam diu vivere non possint: quamvis vitulorum marinorum instar, in terra somnum quandoque capiant: quod, postquam pactum noctu egressæ, a videque saturaræ, lassantur, dum in superficie maris resupinata dormiunt, sonum quendam edunt: quod denique, quotiescunque solis radiis mari innatantes siccantur, ita ut in gurgitem deferri nequeant, intereunt. Eadem dum aërem captant, caput exerunt, vitulorum marinorum imitatione: & tantæ sunt audaciæ, ut tres homines adorianur. Capite amputato non moriuntur confestim, sed oculos movent, & manus si ad moveris morientur.

Armeniis olim à Patriarcha Alexandrino prohibitæ in cibis, sub excommunicationis poenâ. Scappius scriptor Italicus in convivorum apparatu eas commendat, si intra tempus quod à vere ad autumnum decurrit, capiantur. Conficit ex iisdem & artocreata, quæ apud Ambrosinum vide. In Brasilia capta aliquando tam magna, ut sola octuaginta hominibus sufficeret. Carnes lardo distinctas & tostas comedebant: sapor, vitulinæ erat.

De *Uso in Medicinâ* ita *Plinius*. Marinarum carnes admistæ ranarum carnibus, contra Salamandras præclarè auxiliantur. Neque est testudine aliud Salamandræ adversus. *Sanguine* alopeciarum inanitas & porrigio, omniaque capitis hulcera curantur. Inarescere autem eum oportet, lentæque ablui. Instillatur & dolor aurium cum lacte mulierum. Adversus comitiales morbos manditur cum polline frumenti. Misceatur autem sanguis heminis tribus aceti, hemina vini addita his, & cum hordeacea farina: aceto quoque admisto, ut sit quod devoretur fabæ magnitudine. Hæc singula & matutina & vespertina dantur,

Locus.

Pausan. in
Atticis.
Genera-
tio.

Aristot.
H. A. l. 5.
c. 33.

Plin. H.
N. l. 9. c.
10.

Plutarch.
l. Ultra
prudent.

Petrus
Martyr l.
9. dec. 3.

Plin. H.
N. l. 9. c.
10.

Aristot.
H. A. l. 8.
c. 25.

Oppian.
Halient.
l. 1.

Ælian.
H. A. l.
4. c. 28.

*Uso in
Cibis.*
Bellon.
observ. l.
2. c. 68.
Scappius
de reci-
bar. l. 5.
c. 180.

*Uso in
Medicina.*
Plin. H.
N. l. 32.
c. 4

dein post aliquot dies vespera. Comitialesbus instillatur ore diducto, his qui modicè corripiantur. Spasmo cum castoreo clystere infunditur. Quod si dentes per annos colluantur testudinum sanguine immunes dolore fiunt. Et anhelitus discutit, quasque orthopnoeas vocant: ad has in polenta datur. *Fel Testudinum* claritatem oculorum facit: cicatrices extenuat: tonsillas & anginas, & omnia oris vitia. Privatim nomas ibi: item ardentium testium. Naribus illitum, comitiales erigit, attollitque. Idem cum vernatione anguium aceto admisto, unice purulentis auribus prodest. Quidam bubulum fel admiscunt, decoctarumque carniū testudinis succum, addita æquè vernatione anguium. Sed diu in vino testudinum excoquunt. Oculorum quoque vitia omnia fel inunctum cum melle emendat: suffusiones etiam marinæ fel cum fluviatilis sanguine & lacte mulierum. Capillus mulierum inficitur felle. Salamandras & succum bibisse satis est. Apud alios invenies, *cerebrum* cum croco & sale Ægyptio benè ad aperiendum uterum supponi. *Pupillas* auro inclusas caliginem oculorum pellere. *Sanguinem* aridum cum cymino sylvestri demorsis à vipera exhiberi. *Hepar* in lacte muliebri tritum, & cum unguento irino & vino subactum: in purgamentis puerperii educendis commodari. Quidam ova in morbo epileptico exhibent.

Hippocr.
l. 1. de
morbis
mulier.

Ælian.
H. A. 1.
13. c. 38.
Diodor.
Sicul. l. 4.

Est earum & in aliis usus. Nam olim postes teguminibus exonabantur: Taprobana insulæ incolæ, iisdem culmina domorum tangebant: Chelonophagi verò, pro navigiis, vasis aquaticis, & tentoriis utebantur. Infantes recenter nati in eis lavabantur: Barbaris ad fluvium Gambrae scutorum loco inserviant. Turcæ denique ex testis pullucidis gladiatorum manubria fabricant.

Differentia.

Scalig.

Ex. 196.

Bellon.

obs. 2. c.

68.

Ælian.

H. A. 1.

13. c. 37.

Plin. H.

N. l. 9. c.

10.

Differentia à magnitudine & figurâ sumuntur. In Taprobana una centum tria pondo pependit: earum quæ in mari rubro. testa amplam alicujus ædificii januam adæquat. Apud Ælianum in India decem leguminum modios capit. *Figuram* si attendas, aliæ sunt oblongiores, quæ pelagiæ: aliæ rotundiores, quæ littorales. Troglodytæ, *verba sunt Plinii*, cornigeras habent, ut in lyra, annexis cornibus latis, sed mobilibus, quorum, in natando, remigio, se adjuvant. Costium id genus vocatur, eximie magnitudinis, sed rarum. Namque scopuli præacuti Chelonophagos terrent. Troglodytæ autem ad quos adnatant, tam quam sacras adorant. Hermolaus Barbarus *Cheletas* vocari jubet, id est, Equites quod cornibus non aliter utantur, ac isti calcaribus. Cardanus cujusdam generis meminit, quod corio veluti præparato tegitur, demptisque cum capite pedibus cheli assimilatur. Dorsum sex veluti tabellis simul

Cardan.
de Rer.
variet. 1.
7. c. 37.

junctis constar, & cauda, inquit Ambrosius, similis est illi parti citharæ, cui Collopes intrudi solent, ad tendendum & laxandum nervos. Marcgravius duas describit, quarum una *Iurucua* Brasilianis, altera *Iurura*. *Iurucua* loco pedum, inquit ille, habet quasi alas; Anteriorum quidem quamlibet sesquipedem circiter longam, posteriores vero breviores; *caudam* acutam conicam: *oculos* nigros magnos, *os* edentulum & instar rostri volucrum. Habui quarum testæ tres pedes erant longæ, duas latæ & supra. *Costis* ipsius inferuntur testæ, ad quodlibet latus octo: anteriores breviores, mediæ longiores posteriores iterum breviores. *Ova* illarum comeduntur uti & caro. Ponunt autem ova ad littus maris, foveam in arenâ facientes, & dein arena tumultantes. Sæpius inveni vestigia earum, ex mari egredientium, & terra abeuntium. Reperiuntur autem variæ magnitudinis. Habui quarum longitudo erat quattuor pedum, latitudo trium: tantæ molis ut à quatuor robustis viris vix possent moveri. Variis figuris Geometricis, testæ quasi insculptæ visuntur. Quædam testam nigram habent splendentem, flavis lineis & figuris, egregie interstinctam: aliæ aliter conformatam. *Iuruta* Cadago d'agoa Lusitanis, minor est reliquis testudinibus: *Testa* superior decem digitorum habet longitudinem, latitudinem autem novem, convexitate considerata. Inferior testa novem digitos longa, quatuor & semis lata & plana. Ellypticam autem figuram habet superior. Infra testam se abscondere potest, & collum rursus ad trium digitorum longitudinem, foras extendere. *Caput* tres digitos crassum, & paulò oblongius; *nasus* elevatus & acuminatus. *Os* amplum: *oculi* nigricantes, pupilla nigra. In pedibus quattuor *ungues* oblongi, nigri: cauda brevis acuminata; cutis rugosa & quasi squamis constaret. *Testa* superior fusca, inferior flavescens. *Ova* ponit subrotunda, dimidii gallinacei magnitudine, testa alba ut ovagallarum, boni saporis si frixentur. Comedi aliquoties. *Tantum Marcgravius.*

Marcgr.
d. 1. 6. c.
413.

APPENDIX.

De quibusdam Exoticis quadrupedibus iisque Dubiis.

CAPUT I.

De Tlacaxolotl, Cabim, & animali maripeto.

Absoluta ita, per Dei gratiam, omnium quotquot nunc nota, quadrupedum, historia: visum est hanc de quibusdam Exoticis, & quidem dubiis, Appendicem annexere.

etere. Dubiis inquam. Nam ad quod genus referri propriè, adhuc mecum delibero. Inter hæc occurrit primò *Tlacaxolotl*, f. animal abrotundæ faciei, bestiam tauro vastiorem, capite magno, prolixo rostro, latis auriculis, atrocibus dentibus, humana pænè facie, unde sumpsit nomen: crasso collo, manibus pedibusque & his taurinis unguibus, sed maioribus, magnis latisque clunibus, caudâ crassâ & proluxa, ac pelle crassâ, fulvo & hispido pilo. Rarum animal, soxarumque & solitudinum incola. Atzaceani, Tepotzonzotla, & Haquelagani, non procul à regione, quam à situ profundiore vocant De honduras. Vescitur montano cacaotli, quapachtli, & virenti haoli, vastatis passim arvis fatisque: cum horum non adfuerit copia, foliis arborum & fruticum. Caro edulis est. Humanum conspectum non reformidat, neque sagittarum ictibus occumbit, tergus n. est impenetrabile. Quamobrem defossa terra, ac desuper ramis frondibusque contexta, & subaggerata capitur, haud aliter ac apud Indos Orientis elephantes.

Nierem-
berg. Ex.
l. 9. c. 3.

Animal *Cabim* Maphæo animal *Sionium*, Antonio à S. Romano *Thabal* dicitur. Nascitur in Java. Hujus animalis unam virtutem scio, sed mirificam. Si ejus os illi extremitatem aliquis gestet, quantumvis mille transverberatus vulneribus ne guttam sanguinis dabit. Experimentis pluribus probatum est: sed illud celebre & notissimum, quod cum Naodabeguea Malacensis infensus Lusitanis, & adversus illos egregiè dimicans, tandem oppressus, multisque confusus ictibus corrueret, ex patulis vulneribus nihil omnino cruoris manaret. Mox inter spoliandum, ut primùm detracta ejus brachio est aurea armilla, (mirum dictu) tanquam vase confracto, ita sese cum anima universus repente sanguis effudit. Cujus rei stupore difixi Lusitani, cum de aliis captivis causam quæssissent, cognovere inclusum esse in armillâ os ejus animalis, cujus in sistendo sanguine tam efficax esset vis.

Nierem-
berg. hist.
Exot. l. 9.
c. 49.

Quantum ad animal *Maripetum*, scribit Aloysius Almeida eum periculo omnis fidei, & multi confirmant, apud Japones in regno Goto extare sylvam, in quâ tantum gignitur animal canis magnitudine, cruribus brevioribus, ad esum humanum per commodum, aureo colore, præmolli etiam villo. Cum senuerit hoc animal, dimissa terra, sponte mare ingredi, ibique paulatim transformari in piscem, ac per singulares corporis partes, certo quodam temporis intervallo, verè mutata quadrupedis forma, ac natura transire in piscem. Idque adeo verum esse obtestatur Auctor, ut affirmet aliquando contigisse, piscem hujusmodi captum, inventum nondum omnibus corporis quadrupedis partibus prorsus transformatis, nondum videlicet opportuno elapso tempore, quo

omnia piscis membra effici potuerunt: pars enim adhuc habebat formam quadrupedis, altera jam squamis & pennis formata videbatur. Adicit, fabulosum hoc non esse, sed compertissimum jam fuisse, veritatisque huic adstipulare indigenarum omnium consensum.

C A P U T II.

De Dante & Cappa.

SUI generis animal *danta* est (aliqui Indi-
scapam vocant, alii *tapiroussu*, alii *doueanare*, ut Lærius scribit) sed mulis similis. Mulares habet aures, vitulina labra: rostrum superius propendet per palmum super rictum: attollit, cum irascitur: pænè reliqua membra diversæ bestiae similia, sed plerumque vitulo conformiora. Cornu caret. Ungula juvat dolorem cordis, pellis loriceæ usum supplet, impenetrabilis est ictibus. Duos ventriculos habet, unus alimenta excipit, alter ignoto adhuc sacramento invenitur putrefactis lignis & virgulis plenus. Una auctoritas parsimonie naturæ excuset hinc superfluitatem. Nescitur usus & finis hujus ventriculi. Venator oportet vulneret illam ante ingressum aquæ: ibi enim morsu se defendit, & occidit canes. Didicisse phleboto-
miam fertur ex hac bestia, homines doctos, namque cum crassescit, interna crura vulnerat arundine resecta, eadem industria atque Hippopotamus.

Nierem-
berg. Hi-
stor. Ex-
ot. l. 9. c.
65.

Lærius de hac bellua sic narrat: Hanc *tapiroussu* appellant, pilo subrubescenti, atque promisso, vaccam magnitudine ac forma valdè referentem. Attam en collo auribus careat, sitque contractiore cum corniculis longioribus & pendulis, ficcioribusque tibiis ac gracilioribus, ungula continua, & asini ungulæ persimili, meritò quis eam vaccae asinique naturæ participem esse diceret. Differt nihilominus ab utroque plurimùm quod & brevissimam gerat caudam (Obiterque hic monendus est lector, permulta in America gigni animantia, quæ omnino sine cauda sint) & dentes habeat multo acutiores; nec hominibus propterea quidquam periculi ab ea potest creari, cum in fuga potius, quam in viribus salutem ponere consueverit. Eam barbari sagittis confixam, ut & alias plerasque interficiunt, aut fossa excavata, muscipulis seu alijsmodi ingeniosè fabrefactis venari solent. Cæterum fara illa magno est in pretio apud barbaros, pellis gratia, quam simul atque illi dextra-
xerint, dorsi corium in orbem circumcidentes, ad solum exsiccant, in parmasque findi mediocris cadi magnitudine conformant, quibus in bella hostium excepta repellunt. Tantam vero duritiem pellis ad solem siccata contrahit, ut nullius ictu teli, quantumvis magno impetu vibrati, transigi posse facile

cile credam. In Galliam duas hujusmodi parmas studiosè afferebam : redeuntibus verò fames ita molesta fuit, ut omni com-
 meatu absumpto, ne cercopithecis & psittacis, ejusdemque generis animantibus excep-
 ptis, quæ ex regione illa nobiscum advehe-
 bamus, parmæ illæ duæ carbonibus imposi-
 tæ, fuerint etiam ad depellendam famem co-
 medendæ: quibus reliquæ pelles, quæ, ut
 suo dicam loco, in navi erant, additæ sunt.
 Porro Tapiroussu caro ad bubulæ gustum
 ferè accedit. Appendo quæ *Franciscus Her-*
nandus de dantis scribit. Mediocrium mula-
 rum æquant magnitudinem, fulvo teguntur
 pilo, & firma impenetrabili vestiuntur pelle.
 Capiuntur in canibus, sed diligenter caven-
 dum, ne prius confugiant ad flumina, in
 quibus sese adversus illos vehementius tuen-
 tur. Carnes eorum, ac præcipuè pedum, si
 probè coquantur, gustu suaves sunt, ac bo-
 num alimentum præstant, offenduntur au-
 tem hæc animalia non una in parte conti-
 nentis.

Nierem-
 berg.
 Hist.
 Exot. l.
 9. c. 71.

Cappa dicitur animal asino grandius, ni-
 grum, villosum, ferox, canibus quoque in-
 festum. Obium quemque raptat, non fe-
 cus ac lupo pecudem. Forma pedum in-
 solens. *Ungula* similis est calceo Gallico, à
 fronte lata, rotunda non scissa: à calcaria-
 cuta. Aspectum humanum formidat. For-
 tasse hoc est anonymum animal *Francisci*
Hernandi, & ex dantarum genere, de qui-
 bus jam dixi.

CAPUT III.

De Ejulatore, Su & Peva.

Nierem-
 berg.
 Hist.
 Exot. l.
 4. c. 72.
 Nierem-

DE *Ejulatore* ita idem *Nieremberg*ius.
 Nocentior astus alterius animalis, in-
 fantilem simulantis luctum, edito sono sub
 oppida & villas in prima nocte. Statim mi-
 ferenti accurrentes, affectu quæsituos plo-
 rantem perimit. Sed jam cautè repetio pe-
 riculo oppidani, prodeunt è domibus incen-
 sis titionibus structi. Forma & moles hujus
 feræ canem leporarium imitatur.

Idem l. 9.
 c. 47.

Su, id est, aqua, quod juxta fluvios ple-
 runque degat, apud Patagones invenitur.
 Alii *succarath* vocant. Torva est: prima oris
 acie quodammodo leonem æmulatur, aut
 hominem, nam ab aure barbata, haud pro-
 missis valde pilis, pectore propendente: cir-
 ca lumbos nimis constringitur, *cauda* ampla
 & longa sciuri instar. Gigantes ejus regionis,
 quoniam cœlo non admodum calido fruun-
 tur, protegunt se hujus feræ pellibus. Cum
 urgetur pellis gratia, catulos in dorsum
 admissos cauda contegit, & fuga elabatur.
 Capitur una cum catulis scrobe effossa &

celata ramusculis. Inclusa, præ rabie aut
 generositate catulos obtruncat, & hor-
 ribili clamore venatores atterret, donec
 sagittis cæsa excorietur. Legi (licet autor
 non sit oculatæ fidei) præ charitate ad prata
 portare filios, ubi fertis floridis & odorife-
 ris, comit & coronat illos, tum filios reci-
 comare simili in parentes vetulos pietate,
 eosque portare & alere.

Peva catelli est magnitudine. Hoc ubi
 tygridem conspexit, illius insistit vestigia,
 & allatrat assiduè, ut latratu audito, tum
 feræ, tum homines latebras petant, ac sibi
 ab instanti ferâ caveant. Hinc sæpe fieri vi-
 demus, ut præ inedia, prædæque defectu,
 in agris expirent.

Nierem-
 berg. hist.
 Exot. l. 9.
 c. 76.

CAPUT IV.

*De animali fætido, Graffa
 & Coach.*

A Pud Chiribicenses animal est gestu mi-
 rabile, ait *Petrus Martyr*, strigosum,
 cubitales loco stercoreis emittit colubros. U-
 num domi suæ se nutrit, & aperto expe-
 rimento rem ita esse deprehendisse, *Fratres*
Dominicani asserunt. Quò solutæ tendant
 colubri, interrogati. Ad vicinas, dixerunt,
 sylvas, ubi vitam agunt brevem. Putet ani-
 mal plus, quam quaecunque cadaver fœti-
 dum in sterquilinia projectum: Inde putori-
 ris ejus impatientes interfici animal *Domi-*
nici jusserunt. *Vulpem rostro, pilo* lupum
 imitatur. Cum in infantum ventribus ver-
 mes passim creari, neque senes ab eâ peste
 esse immunes, atque una cum excrementis
 emitti vivos didicerim, quos mutato nomi-
 ne vulgus lumbricos appellat, cur & illud
 accidere posse non crediderim, inquit *Nie-*
rembergius, talibus præcipuè viris, ad affir-
 mantibus.

Nierem-
 berg. l. 9.
 c. 80.

Graffa in insula Zanzibar, potissimum in-
 venit. Animal est exigui capitis, & lon-
 gissimi colli: anteriora crura oppidò exce-
 dunt posteriora, colore vario albet, rubet,
 roseisque distinguitur maculis. Mitis bestia
 est.

Idem l.
 d. c. 82.

Coach animal est tres dodrantes longum,
 pilo vestitum nigro, promiscue cum can-
 denti, sed ventre fulvo. Clamans noctu,
 humanas imitatur voces. Suis instar edit
 mayzium cum viret, nec dum spicas con-
 coxit Sol.

Idem l.
 d. c. 93.

Et tantum de Quadrupedibus sufficiant.
 Siquid interum obvernerit, quod nos hæcte-
 nus latuit, in Paralipomenis, si Deus ita
 voluerit, poterit adjici.

Gratia Tibi, Domine IESU.


D E

HIÆNA ODORIFERA,

Zibethum Gignente, quæ Civetta

vulgo appellatur.

CAPUT I.



N rebus arduis inda-
gandis exacta, & se-
dula opus esse cogi-
tatione, longaue
meditatione, & quo
quisque judicio, &
ratione magis pollet,
eo facilius obstructa
referare, recondita

promere, & in accessu ascendere, satis cuique
patensest. Unde, cum in inquisitur, *an An-
tiquorum Hyæna nobis innotescant*, & vice ver-
sa, *an Zibeth ferax Animal priscis innotue-
rit*, multis valde arduum omnino videat-
ur: Necessum etit, diligenti per vestiga-
tione nos uti, & magis judicio, ac ratione,
quàm sensibus inniti, horum ut voti compo-
tes evadamus, quare à nominis (quod mul-
tiplex est) explanatione initium ducentes
Civettam, Ruellio *Sivettam*, (Animal nunc
ita dictum) ex qua Zibethum coligitur,
quamque *Catum Zibethicum*, Matthiolus,
Scaliger, Renodeus, & alii vocarunt, *Mu-
stelam* verò Historiæ insulæ Virginianæ Au-
ctor censuit, *Zapetion* à Græcis recentiori-
bus dici scripsit Renodeus, & à quibusdam
Cadoplectum appellatur, **HYÆNAM ODO-
RIFERAM** nos nuncupabimus.

Porro hujuscemodi nomen claturarum
quærendi Etymon *Zibeth* Arabicum esse no-
men respondere licebit, apud Arabes enim
hujusmodi nomen diverso quàmvis signifi-
catu, legitur. Nempe apud Serapionem
cap. 121. de *Sedervam* his verbis: *Zebet, &
est Algalia habens odorem bonum, & ingredi-
tur in Medicinis ad abscindendum fluxum san-
guinis, & ad casum capillorum*. Et addit Sa-
dervam esse dictum in lingua Persica, & est
res nigracum quatinguntur lina in Haaman, &
est herba, vel succus niger ingrediens in medi-
cinis odoriferis. Citat autem Abenmesuadi,
Bedigoram, & Rasim, non autem Græcos,
& ipse Rasis de eadem te agit lib. 3. ad Al-
mans. sub nomine *Scedram*, vel *Scedeguram*.
Et Judæus apud Januensem in Synonymis
Severam vocavit: ex quibus constat Sera-
pionis *Zebeth* aliud quid à nostro Zibetho
esse, nec quid sit, id quod proposuit Sera-
pio, imaginari queo; in mentem tantum ve-

nit Arabibus *Zebeth* significare rem odora-
tam, sicut *Galia* & *Algalia*, cum dicat hic Se-
rapio *Zebeth* esse *Algaliā*. unde extant
compositiones non paucæ *Galliæ* nomine,
ut *Galia moschata*, *Galia Alephangina*, *Ga-
lia Sebelliba*, &c. erit ergo *Galia*, & *Angalia*
odorum: unde *Zebeth* nostrum sum-
me odoratum Avorum nostrorum ætate tale
sumpsisse nomen censendum. Ita Simon Ja-
nuensis *Zebeth* esse *Avicennæ Galiam*, seu
Algaliā, & Animalis Arabici sudorem, (de
quo videtur fuisse loquutus *Avicenna*
lib. 2. c. 326.) sumpsit: sed *Avicenna* *Zebeth*, &
Algalia diversa res erit, è *Zebeth*, & *Galia*
Serapionis, quæ herbæ succus est, & à *Ze-
beth* videtur primo Animali ipsi nomen *Zi-
vette* seu *Zebetta* fuisse impositum, à quo
corrupto *Sivetta*, & *Civetta* nomenclatura
ortum duxit. Quod si *Pandectario* fides
aliqua est præstanda, quum *Zibet albahar*
spumam Maris interpretetur; *Zebet* forte
spumam significabit, & non inepte nostro
Zibetho aptabitur metaphora, siquidem
quum colligitur irato Animali, quasi spu-
mans apparet.

Qui *Catum*, vel *Mustelam* dixere, hoc
Animal inter Feles Silvestres reposuisse
reor. Verum etiam si capitis sit aliqua simi-
litudo, in cæteris tamen plurimum discre-
pant. Nos *Hyænam odoratam* nuncupare ma-
luimus, idque in sequentibus porbabile o-
stendemus.

CAPUT II.

*An Civetta sit Pardalis Anti-
quorum?*

Quærit Aristot. sect. 13. probl. 4. Cur
Animantium nullum bene oleat, præ-
ter *Pardalim*, seu *Pantheram*: hæc namque
propter suavem quem spirat odorem, ad se-
feras illicit: quod pluribus exposuit The-
ophrastus ipsius discipulus libro 6. de cau-
plant. cap. 5. hisce verbis: *Omnino inter bru-
ta, vel nullum, vel certe rarum admodum est,
quod odorem persequitur gratia suavitatis, nisi
per accidens, cum alimentum est tale. Quippe
appetitus ad ipsum pabulum, ejusque causa est.
Si quid tamen etiam istiusmodi est, haudqua-
quam hominibus constat. Nam, & Pardalim*
cate-

Quæsi-
tum.

Homi-
num enu-
meratio.

Zebet
quid.

Algalia

Avicennæ
Zebeth.

Cur ani-
malia in-
odora.

Pantheræ odoratæ.

Venatus Pantheræ.

Error. P. Gillii.

Animalium excrementa odorata.

ceteris animalibus suaviter olere quidam affirmant, & venari in senecta nimirum bestias alliciendo gratia sui odoris. At nobis nullam odoris affert suavitatem. Nisi verum etiam illud dixeris, ut certe est verum, olfactum homines habere omnium ferme deterrimum. Itaque multi odores, suavitatesque eorum, vel gravitates, latere hominem possunt. & cap. 26. Animal nullum, inquit, penitus odoratum est, nisi quis Pardalim dixerit belluis bene olere, retulit id etiam Plinius lib. 8. cap. 16. ferunt scribens odore earum mire sollicitari quadrupedes cunctas; sed capitis torvitate terreri. Quamobrem occultato eo, reliquas dulcedine invitatas corripunt. Dixerat enim Aristot. lib. 9. de Hist. An. cap. 7. Pantheram sese abscondentem venari dicunt, propterea quod suo odore belluas delectari intelligat, propius enim ita accedunt, quas corripiat, hujuscemodi autem suavem odorem, non belluæ tantum sentiunt; sed sui odoris vim ipsa quoque Pardalis sentit. Scriptum etiam reliquit. Aelianus lib. 5. de Hist. Anim. cap. 47. Admirabilem quandam, & nobis occultam odoris suavitatem olet Pardalis, quam bene olendi præstantiam divino munere donatam, cum sibi propriam plane tenet, tum verò cetera animalia hanc ejus vim præclare sentiunt. Hæc autem hoc modo venationem capit. Quum horum, quæ ad victum opus sunt, eget, sese vel in loca fructibus densis confita, vel foliis vestita, ita occultat, ut inventu difficilis, tantum respiret. Tum hinnuli, dorcades, capræ sylvestres, atque alia ejusmodi animalia quadam suavis odoris illecebra attrahuntur, & proxime accedunt, illarum, quam mox de latebra exiliens ad prædam serumpit, atque eam comprehendit. Est igitur Pardalis odorata. Addit Plinius: Panthera, & Tigris macularum varietate præpè sola bestiarum spectantur, ceteris unus, ac suus cujusque generis. Pantheris in candido breves macularum oculi. Hæc autem duo, odor nimirum, & maculæ, Petrum Gillium, & alios (ut refert Gesnerus) induxerunt, ut crederent, nostram Civettam esse Pardalim antiquorum. Quæ opinio facile refellitur. Antiquorum enim Panthera vera omnibus hoc ævo est nota, & multum differt à Civetta, immo Septalius in problematibus, Joan. Faber, & alii negant Pantheris suavem inesse odorem: sed bruta alimenti specie odorem istum insequi, hominibus autem neutiquam gratum apparere. Sed, ut verum dicam, multorum animalium excrementa hominibus suaviter odorata videntur, quæ Aristoteli, atque Theophrasto ignota fuerunt. Siquidem Plin. libro 28. de animali Cordylo Crocodilo simili verba faciens, Alter, inquit, illi similis, multum infra magnitudinem, in terra tantum, odoratissimisque floribus vivit: ob id intestina ejus diligenter exquiruntur jucundo nidore facta Crocodileam vocant: Nimirum ipsius excrementum.

Murium autem sylvestrium, qui flavo colore, & nostrorum puerorum deliciæ, (nuncupati Sorci moscaroli) stercus odore moschi præditum est, tale etiam Serpentium quorundam sentitur. Et Renodeus de mat. med. lib. 3. c. 15. Est quoddam genus Mustela majoris, quæ quod martia sit, & pugnax (Gallinas enim etiam grandiores enecat) quibusdam Martes, aliis Martiorella, vulgo Fovina dicitur, cujus excrementa Moschum redolent, ut sæpe observavi. Addit Scaliger Exerc. 211. part. 2. Cercopithecum nihilo insuavius quam quodvis Moschum fragrare, mediocriter tamen, & sine fastidio. Moschum etiam Gazelle excrementum esse notissimum est. Addam ego me observasse parva quædam Insecta vagini pennia à me picta libro de Insectis, quæ contrectata suavissimum spirabant odorem, qualis in floribus Dipcadi, seu Muschi Græci dicti percipitur. Igitur præter Pantheram, multa etiam animalium sunt genera valde odorata, & hominibus grata, inter quæ est Zibeth: quare mitto tanquam inutilem quæstionem illam inter Cardanum, & Scaligerum de odore animalium, & de naturæ conatu in ejus generatione.

Insecta odorata.

Quidam arbitrati sunt Animal Zibetti Chaum. (ut refert Dalecampius) esse Plinii Chaum, de quo talia protulit. lib. 8. cap. 19. Pompeji Magni primum ludi ostenderunt Chaum, quem Galli Raphium vocabant, effigie Lupi, Pardorum maculis. Namque hæ notæ adsunt in Civetta. Verum nulla odoris fit mentio; nomen autem, quod habet Gallicum, fortasse à Gallia patria desumpsit. Nec caput Lupi est in Civetta, quamvis adsint magnitudo, pilorumque asperitas, & color: maculæ pellis ipsum præterea distinguunt. Annotavit verò Dalecampius, fortasse Thoë pro Chao esse reponendum: vulgo Lupum Cervarium: & qui Genettam nostram esse putant verisimiliora loqui videntur. Sed de Thoë extant Philes versus Græci, qui ita latine sonant:

Thoes.

Atque pudoris eruditus dogmata,
Hominem veratur Thoë, hominem si viderit?
Quæ jura federationis mutua
Colens opem fert impiger nobis suam,
Hostilis in nos irruat si bellua?

Herodotus lib. 4. Thoës ex Hyæna, & Lupo genitos esse, testatum reliquit.

CAPUT III.

An sit Antiquorum Hyæna?

Civetram veteribus probe fuisse cognitam, & Hyænam ab ipsis fuisse nuncupatam, eorundem auctoritate demonstrare conatur Petrus Bellon. suar. observ. lib. 2. c. 20. quamvis odoratum reddere excrementum non observaverint. Ratio autem est, quia Civetta ferum est Animal, quale etiam

etiam Hyæna describitur: nec tradita figura differt; siquidem Hyæna ex Arist. colore Lupi propè est; sed hirsutior, & juba per totum dorsum prædita est. Civetta etiam magnitudinem, & colorem Lupi habet, similique modo hirsuta est, verum corpus maculis est aspersum nigris, ita ut sub oculis binæ sint nigræ maculæ, pedes nigro pilo obfiti, crura maculata, cauda oblonga, superius nigra, infima verò parte albis maculis aspersa. Præterea Civetta in cervice, & per dorsum spinam pilos habet nigros, quos surrigit, cum indignatur, non minus quam fus, inde factum, ut Glanis piscis etiam Hyæna nuncupatus sit, & talis forte erit juba illi ab Arist. tributa: accedit, quod omnes antiqui maxime ferum Animal dixerint Hyænam, adeo ut Pantheræ mirum in modum eas timeant: etenim scriptum fuit à Plinio lib. 28. cap. 8. *Præcipue Pantheris terrori esse traduntur, ut ne conentur quidem resistere, & aliquid de corio earum habentem non appeti. Mirumque dictu, si pelles utriusque contraria suspendantur, decidere pilos Pantheræ.* Hyænam Pardali inimicam esse, Ælianus etiam lib. 6. c. 22. retulit. At Civettam Cardanus X. de sub. feram adeo judicavit, ut quæ nulla temporis longitudine mitescat.

Hyæna piscis.

Genitale Hyænae.

Potissima autem ratio desumitur ex eo, quod antiqui Hyænam genitale simul & maris & foeminæ habere scripserunt, unde Ovid.

— & qua sit fœmina tergo

Passa marem, nunc esse marē miretur Hyænam.

Et Plinius lib. 8. cit. *Hyænis utramque esse naturam* (ait) & alternis annis mares, alternis fœmina fieri, parere sine mare vulgus credit; quod quamvis revera falsum sit, negetque constanter Aristoteles, tamen negligenter aspicienti vas quoddam ori vulvæ simile, fœmininus videtur sexus, quæ apparentia forsitan imposuit antiquis, ut crederent utroque sexu donatam fuisse Hyænam. Arist. 3. de Gener. Anim. cap. 6. voluit stultè, magnoque errore narrari à multis Hyænam duplex genitale habere, maris, & fœminæ, & 6. de Hist. Anim. cap. 32. commentitium id esse asserit. *Sed Hyæna virile similiter, atque in Lupis; & Canibus haberi; quod verò fœmineum esse videtur* (ὑποκρίν) *sub cauda positum est, figura simile genitali fœminæ, sed sine ullo meatu, sub hoc meatu excrementorum est. Quin etiam fœmina Hyæna præter suum illud, etiam simile, ut mas habet, sub cauda sine ullo meatu, à quo excrementorum meatu est, atque sub eo genitale verum continetur. Vulvam etiam Hyæna fœmina ut ceteræ hujuscemodi fœminæ animales habent,* & lib. de gen. citato scripsit, Hyænas, tam mares, quam fœminas habere sub cauda lineam quandam similem genitali fœminino, quæ quidem nota, quamvis communis sit, tamen in maribus potius cernitur, quia mares, quam fœminæ frequentius capiuntur,

Aristot. de genitali Hyænae.

Linea pro Genitali.

quæ, qui negligentius considerat (refert Aristot.) indictam aberrat opinionem.

Nobis diligentissime considerantibus Civettæ genitalia membra apparuit in ipsis ad amissim quodcunque Hyænae tribuit Aristot. siquidem hæc primo aspectu, & negligenter consideranti duplex videtur habere genitale, at diligenter speculanti nullo modo duplex apparebit; sed unicum tantum, & maris tantummodo in mare, (quale fuit in Cadavere à nobis secto) virile autem perinde ut Lupi, & Canes habet, nimirum osseum, in hoc tamen differt à Canibus, Lupis, & vulpibus, quod horum genitale totum in medio sit osseum, glans vero carnosa solum sine osse: contra Civettæ ossiculum est in sola glande admodum breve, reliqua pars genitalis nervosa osse carens. Vidimus etiam Cuniculum Indicum dictum Romæ *porcelletto d'India* in Genitali continere ossiculum in summo tenue, in basi quadratum, sed depressum.

Notæ ab Aristot. assignatae.

Hyænae conveniunt nostræ.

Genitale osseum.

Quod verò fœmineum esse videtur; infra caudam, & genitale positum est, immo inter virile, & testes: figura simile vulvæ fœminæ, & in mare labiis est crassioribus, quam in fœmella: verum sine ullo meatu est; sed duæ tantummodo cavitates inspiciuntur, in quibus colligitur excrementum dictum Zibeth; vocavit autè Arist. hanc particulam in libro de Gener. Anim. citato, *lineam similem genitali fœminino*: Græcè ἡμολαν γένεον τοῦ τοῦ θήλεος ἀδελφῆ nam negligentèr aspicienti fœminea apertura, quasi linea videtur; sed meatus non habet penetrantes. In fœmina porro Civetta eadem partes eodem sunt dispositæ modo, & ubi in mare est virile, in fœmina vulva est: solum modo vascula zibetti in fœmina minora sunt, & testes interius latent. Cum igitur tanta appareat Hyæna, & Civettæ genitalium partium similitudo, asserendum omnino videtur cum Bellonio, idem esse animal, quamvis Zibeth excrementum non consideraverint antiqui.

Linea Genitalium.

Opinio Bellonii.

Ex altera parte Scaliger de sub. exer. 117. part. 7. irridet Hyænam existimantes Catum Zibeticum; quam quoque opinionem refellunt etiam Gesnerus, Augerius Busbequius Ep. 1. de legatione sua Turcica; Clusius in addit. ad Bellonium; & Io. Faber Bambergensis in Romano Lyceo, meus olim Collega; Plura namque sunt ab Aristotele, Plinio, Solino, atque Æliano de Hyæna relata, quæ Civettæ nostræ aptari minimè queunt.

Hyænam non esse Catum Zibeticum.

Primo quidem callum, & jubam continuitate spinæ porrigi, flectique nisi circumactu totius corporis non posse, de Hyæna retulerunt, quod in Civetta nostra falsum vidimus, & ex ossium forma in nostro Scheleto quilibet considerare valet, collum facile verti posse.

A Colli inflexione.

Præterea quoque Solinus asseruit, in ore gingivam nullam, sed dentem unum habere,

Ab uno dente.

atque perpetuum, qui ut nunquam retundatur, naturaliter capsularum modo clauditur: in nostro autem Scheleto dentes plures.

Afermo-
ne huma-
no.

Demum scriptis mandarunt Hyænam fermonem hominum assimilare, pastorum nomina addiscere, ut eos dolo capiat. Item vomitionem hominis imitari ad sollicitans dos canes, quos invadat. Nec ullum ex his adhuc observatum est in Civetta etiam maxime cicurata. Sed hæc facile refelleret Bellonius. Namque sicut Lupo, & Leoni falsò tribuit Aristoteles hujuscemodi rigorem colli; ita falsò potuit eundem tribuisse Hyæna. Deinde Solinus non loquitur de Hyæna; sed de Crocuta, quæ genita fuit ex Hyæna, & Leæna. Quædemum afferuntur sunt potius admiranda, quam credenda, tum quia, qui ea retulit Plinius pro re mirabili proposuit. Ælianus vero lib. 7. c. 22. Crocutæ ista tribuit, dubitatque an sit fabulosum, quod confirmari videtur, quia Arist. tanquam falsa ea reticuit, nec Busbequius meminit in sua Hyæna.

Crocuta
quid sit.

Civetta
mansue-
ta.

Addit Scaliger contra Carnum Exer: 211. part. 2. tantum abesse, ut Civettæ sint implacabiles, ut eorum unam humeris suis gestaret Nicolinus ab Ancisa Marchionis Mantuæ spurius: immo Bellonius fatetur, quendam Alexandriæ, qui tunc Florentinorum Consulem agebat, Civettam habuisse adeo cicurem, ut cum hominibus colludens illis nasum, aures, & labra sine noxa morfu præhenderet. At levia quidem hæc sunt, natura enim ferum est animal, & foeminam quidem cicuratam scimus, non aurem marem.

A Juba.

Majorem vim facit Juba, quam ex Arist. 8. de Hist. Animal. c. 5. Hyæna habet, quemadmodum equus, sed seta duriore longioreque & per totum dorsum porrecta his verbis: *χάτις δὲ ἔχει ὡς αἰὼν ἰππῶν, & ἐπιτοκλήροτερας & βαρυτέρας τὰς τρίχας, & οἱ ὅλως τῆς ῥάχης*: & libro 6. c. 31. *Juba per totum dorsum prædita est*, scriptum reliquerat, & quamvis Civetta irata in dorso pilos erigat Apri modo, non tamen longior est equina juba.

Sed respondere probabiliter admodum Bellon. posset; Nequaquam esse intelligendum Hyænam habere jubam longiorem equina juba; sed cæteris sui corporis pilis; quia equi multi jubam habent ultra tres palmas longam, quod si talem, & longiorem, ac duriores, nec non per totum dorsum porrectam haberet Hyæna, quum sit Animal omnium consensu lupi magnitudine, & proinde duob. palmis non altius, proculdubio hujusmodi Juba longa per terram traheretur, quare rationi consentaneum est dicere Arist. voluisse, Jubam Hyænae per totum dorsum esse porrectam, non in collo tantum, atque constare ex seta duriore, & longiore, quam sint reliqui pili, ut videmus in suis, & in nostra Civetta.

At dices, si hoc est, cur Arist. Hyænae jubam non assimi lavit potius Aprinae Iubæ, quam equinae, quæ in solo est collo? Respond. Arist. fortasse descripsisse formam Hyænae ex aliquo Indo auctore, qui equum jubatum in collo vidit, non autem Aprum, vel suem, haud enim constat an in India nascantur sues nostris similes: unde Arist. non commutavit inditam jubæ similitudinem.

Genitalium præterea situm diversum esse Hyænae, & Civettæ, ex Arist. verbis colligunt Scaliger in libro 15. Metamorph. Ovidii, & Io. Faber hoc loco. Namque Aristoteles videtur collocare, tam in mare Hyæna, quam in foemina imperviam vulvam statim sub cauda, sub hac excrementorum exitum, sub quo genitale: ex quibus colligit Scaliger, tum à situ, tum quia impervius est meatus, non esse uterum: absurdum enim esset censere Matricem supra rectum intestinum sub dorso esse. Nam ex Arist. meatus excrementorum inter illam rimam, & veretrum est. Faber autem invenit etiam Scaligerum sibi ipse contradicentem Exerc. 217. contra Card. par. 7. *Aristotelem*, inquiens, *eam rimam, quæ sub excrementorum exitu est, imperviam introrsum esse dixisse, & dicere debuisset, ait Faber, quæ supra excrementorum exitum est, si Aristotelis mentem declarare, nec sibi ipsi contradicere voluisset. At veritas ipsa coegit Scaligerum recte loqui; eo enim modo intellecta Aristotelis verba rem impossibilem fingere videntur; omnia enim animalia caudata meatum excrementorum immediatè sub cauda habent; unde, vel deceptus fuit Aristoteles falsa relatione: vel error est in textu, & intelligendus, quod dicat, sub cauda quidem esse pseudovulvam, sed non immediatè, aut sub cauda meatum excrementorum, ex altera vero Genitale verum, ipsum vero in medio, & hæc sunt consona rationi, & positi, quem à natura observatum in Civetta videmus, illam autem situationem in nullo animali, nec etiam monstruoso, adhuc vidimus. Sed subtilius hi disputassent, si dixissent, Hyænam habere lineam tantum sine ullo penitus meatu: sed Civettam habere meatus duos, & cavitates, in quibus colligitur Zibethum, verum non ita strictè accipienda sunt Aristotelis verba; sed ut rationi, & experimentis congruant. Porro Busbequius, qui letigitimam antiquorum Hyænam se vidisse refert, lineæ dictæ situm, & formam si dilucidasset, suas egisset partes: interim dicemus Hyænam non posse habere suum pseudouterum, nisi ea positione, quia spectatur in Civetta, quæ magnitudine sua ferme naturali talis est in resupinato Animali.*

A Geni-
talium
situ,

Scaligeri
contra-
dictio.

Explica-
tio.

Busbe-
quii ne-
gligen-
tia.

Sed omnium maxime hanc refellit Bellonii opinionem ipse Busbequius, dum narrat se Hyænas duas Constantinopoli vidisse, cui fidem præstamus; describit autem Lupo aliquanto

Figura I.
Descri-
ptio Hyæ-
nae à Bus-
bequio.

quanto humiliorem, sed nihilo breviorē esse. Pellem habere Lupi similem; nisi quod pilo sit horridiore, & grandiore, maculis quoque nigris distinguatur. Atque Caput (quod maximum est) dorsi spinæ contiguum sine ullis vertebrais esse, ut cum respicere velit totam se vertere necesse habeat: plurimās esse in Galatia Hyænas, & frequentissime sepulcra suffodere, & ossa congregare ad suas speluncas, tam humanorum, quam ferinorum cadaverum, & ob id Hyænas facile inveniri, nimirum ex ossium cumulo, ante harum speluncas conspecto. Præterea Joan. Leo in nova Africæ descriptione, esse, ait, forma Lupi, habere pedes humanis similis, humanis maxime cadaveribus delectari, quæ ex sepulturis auferat. Animal esse minime astutum, & cum cantu, ac Tympani sono maxime recreetur, fieri ut interea venatores adeo ad musicam attento, fune pedes ambos innodent, atque ita è speluncis suis extrahant, occidantque. Sed adhuc dubitare licet, numne hæc sit vera Hyæna, quum nec Jubbæ, nec genitalium partium, nec morum ab antiquis Hyænae tributorum fiat mentio: sed diversorum: imo cum veteres maxime malignam, & callidam descripserint Hyænam, & Leo dictus minime astutam prædicet: dubitatio augetur; quia nec constat de nostra Hyæna, quod refert Plin. lib. 8. c. 30. *Hyæna plurimæ gignuntur in Africa, quæ & Asinorum sylvestrium multitudinem fundit. Mares in eo genere singuli foeminarum gregibus imperitant. Timent libidinis amulos, & ideo gravidas custodiunt: morsuque natos mares castrant. Contra gravis latebras petunt, & parere furta cupiunt, gaudentque copia libidinis, etiam quum liquorem timent, & latratus edunt* Tamen cum dicatur Hyæna libidinosa, & mas, & foemina, non differet à nostra, quæ ob Zibethum, non solum ad coitum prona est: Sed alios homines utriusque sexus, ob id ipsum inunctum inciat.

Huc etiam referendi erunt Philes Græci versus de Animalium proprietate, quibus quædam Anim. proprietates adnotantur, non convenientes Cato Zibethico, ut cap. 43. de Hyæna, & terrestri, & marina: qui ita latinè sunt redditī:

*Hyæna qua mas pridie videnda erat,
Nunc foemina est, initque initurque in vicem,
Maternus utque fiat avus haud dixeris.
Alvo ferens, ferensque foetum mutuo.
Si forte quenquam dormientem offenderit,
Pede strepitum non excitante subvolat,
Suamque porrigens dolosè dexteram,
Somno jacentis, admoveat eam naribus,
Soporis auctorem, quod ajunt, maxime.
Hinc eruto, quod subtus est caput, solo,
Deponit hoc, nudo, & supino gutture,
Inque illiud incumbens feris complexibus,
Somnos trahentem strangulat miserrime.
Quod si marina quispiam hyæna pinnula*

*Dextra sopare tangat oppressum, gravem
Statim rigorem huic injicit, cum somniis,
Quæ terreant dira jacentem imagine.*

*Astutia canes hyæna irretiens,
Mox pascit horum carnibus jejunia.
Fulgente namque Cynthia sub vesperam,
Umbra sui illos corporis ferit, retro
Lumen tenens vestigiorum callide.
Mutosque reddens percitos formidine,
Instar venefica increpantis carmine,
Occidit incautos dolice crudeliter.*

Idem refert Ælian. lib. 6. c. 14.

Multa quidem de Hyæna relata videntur potius fabulosa. Sic etiam Ælianus lib. 15. de Anim. cap. 14. referre videtur Hyænam esse cornib. præditam, cum ait: *Denique Hyæna, quod animal Capreis minus esse ajunt, sed Cervis animosius multo, & cornibus ferociens*: de quo Æliani loco dubitavit etiā P. Cillius; dum in sua translatione omisit, & Gesnerus adnotavit, esse absurdum, cum Lupi cognata quadrupes sit, nihil cum Capreis, aut Cervis commune habens. Sed quicquid sit de hac Bellua, certum fatemur, multas Hyænae notas adesse in Civetta, non paucas desiderari.

CAPUT IV.

Sub quo Animalium genere sit reponenda Civetta.

QUum clare ex dictis pateat, nostram Civettam, neque antiquorum Pantheram, neque Plinii Chaum, neque veram Hyænam esse, jure adhuc quæritur, ad quod animalium genus sit referenda: Multis quidem de genere Felium visa est, unde Catum appellarunt; sic Alexander Benedictus. Ruellius, Matthiolus, Scaliger, & alii non pauci Felii silvestri similem faciunt. Et quidem facies videtur Feli similis, pilos enim in barba, ut Felis, habet eodemque modo tres alios oblongos in genis: Sed præter hæc nihil aliud commune cum Cato habet: non pellem, quæ in Fele levis, in Civetta aspera, & oblongis, crassisque pilis; neque ungues quæ Feli sunt aduncæ, Civettæ obtusæ: dissimilia etiam genitalia, immo Fab. Columna Io. Fabro scribens: *Effigies, ait, ad Canum, quam Felium, aut potius Vulpium figuram accedit; quod rostrum non harum ritu obtusum; sed illorum forma oblongum habeat.* Renodeus: Animal ferum est, dentibus ferox, Feli non tam simile, ut multi scribunt. Majus enim est, sæpe Vulpem excedens, caput, collum, pedes, atque alias partes habens illi valde dissimiles. Os ei oblongum est, ut Meli, seu Taxo animali, corpus longum, maxillæ inferius albæ, ut etiam barbitium, pedes nigri, laterales ventris partes albicantes, dorsum ex obscuro cinereum, maculis nigris conspersum. Præterea dentibus canipotius, quam Cato assimilatur.

Equidem ad Hyænas refero, & has ad genus generale illud, quod continet Lupos, Canes, & Vulpes, & similia animalia carnivora. Genus autem Hyenarum multiplex

Quæsi-
tum.

An sub
genere
Felim.

Gesneri
i ter
Lupos.

Genus
generale.

cum etiam dicat Herodotus lib. 4. ex Hyæna, & Lupo gigni Thoës. unde si conjunguntur Lupis, aliqua inter ipsos est affinitas naturæ.

Hyæna-
rum divi-
sio.

Dico autem, Hyæna, vel est odorata, vel inodora. Atque Hyæna odorata; vel est Orientalis, & Arabica; vel Occidentalis, & Americana. Hyæna inodora erat antiquorum Hyæna, quæ fortasse duplex est: nam, ut mox dixi, Hyæna Busbequeii desiderat non paucas antiquæ notas, & ad Lupum silvestrem arabicum referri posset.

Hyæna autem odorata, & Zibethum ferens duplex est, Arabica, & Americana, ambo conveniunt in generatione Zibethi: sed forma aliquantulum differunt, ni pictor nos fefellerit in Americana. Namque Zibethicum Animal Americanum, quod pictum ostendit Nardus Antonius Recchius, hanc habet formam.

Figura II.

Describens ipsum Faber: Caput, inquit, non crassum, sed tenue, & acutum habere, ut rostrum Caninum potius quam Felinum esse judicares, quod cum labris suis subrubet. Orbitæ circa oculos, qui minus truces sunt; nec magni admodum albicant. Cæterum subcineritii coloris est caput, & pili in barba vix ulli. Collum quoque longius, quam in Tigre, aut Catopardo, quod pulcro quodam ordine alternis nigriusculis, & albicantibus fasciis, velut totidem torquibus arte adpictis exornatur. A capite ad dorsum per colli longitudinem supernam similibus colorum lineæ excurrunt. Dorsi medium à collo ad caudam linea nigricans pilosa valdè distinguit. Maculis in corpore cinereo minus obscuro nigricantibus, rotundis, & ovalibus ordinatim secundum lineam rectam, versus caudam productis, insigniter decoratur. Ita ut superiores, dorso quippe viciniore, sint majores, mediocres paulo inferiores, & quæ in imo sunt ventre sensim evanescant. Caudam gerit alternis similiter, ut in collo dictum, fasciis nigrescentibus, ac cineritiis distinctam, ac satis longam; sub cauda tria foramina eminenter visui se præbent, anus scilicet, locus ille, in quo Zibethum colligitur, & extrahitur, ac vulva: medium tamen cæteris duobus majus apparet.

Hyæna
Americana.

Figura
III.

Hyæna
Africana.

Hyæna autem odorata Africana, quæ nostra Civetta est, Lupum potius æmulatur, quam Felem: capite enim est oblongo, & rostrum acuminatum, non obtusum, ut Felis, hebet, item dentium formam, ut Canum, duorum palmarum altitudine erat à me sectum animal, tantundem erat corpus à scapulis ad caudam: caudæ vero longitudo quanta totius corporis: collum etiam longitudo superabat semi palmam, (corpus sine collo dupla longitudine altitudinem superare visum est Columnæ: sed vidit animal timidè, & depressè gradiens, ego vero etiam

Scheletum sum dimensus) capitis longitudo dupla erat ad latitudinem. In barba, & genis pilos habebat duos, albos & longos Felium ritu: rostrum pilis denudatum, nares nigricantes, & sub oculis maculæ nigræ: oculi splendentes, & subrubentes Bellonio: Columna autem apud Fabrum, nigriores vidit ex colore castaneo, & flavescente mixto, nec hilares; sed potius tristes, & depressos magis, quam eminentes. Verum ex ambobus oculis nostri Animalis mortui erui gemmas pisi siccati forma, & magnitudine orbiculares, & angulosas, cristallo æmulas, quas etiam nunc servo, quod facit, ut confirmem illi Hyænæ nomen. Nam scripsit Plinius ib. 37. cap. 10. & similiter Albertus de lapidibus ex Enace, & Arone: *Gemma Hyæna ex oculis Hyæna, & ob id in vase inveniri dicunt, & si credimus, linguae hominis subdita futura prædicere.* Sed haud dico veras esse gemmas, nam etiam si erutæ hæ geminæ per duos, vel tres dies manserint cristallinæ, duræ nimirum, & Diaphanæ; processu tamen temporis opacæ fiunt, & scinduntur in tres aut quatuor veluti squammas lapidibus limacum similes, certè Alexander I. probl. 6. proposuit: *Cur feles, Hyæna, & vespertilio* Aures. *acutè noctu conspiciunt? Præterea Zibethæ aures sunt parvæ, orbiculares ad Melis, seu Taxi formam, in ipsis similis pilis, nec mollis, nec asper. Corpus habet albicans, & cinereum Lupi colore, maculis aspersum nigris: crura, & pedes potius parva, quam magna; brevia, quam alta, & pilo nigro obsita. Pedum digiti, quatuor simul, & insuper parvus pollex internè situs, nec longè distinctus, ut in Fele. Ungues sunt caninæ, nigræ, breves, crassæ, & obtusæ, minimum aduncæ. Circa genitalia, dicemus, sub cauda immediatè esse excrementorum meatum, proxime collocari testes in maribus, tum vas Zibethicum, & sub hoc sexum masculinum, vel foeminum. At in resupinato animali pinximus primo verile membrum, foris exertum; licet in Animali vivo sit intus reconditum, quod in media glande officulum habet; sub hoc situata est pseudo vulva, sub hac testes, infra quos excrementorum exitus est immediate ad caudam; ut supra pag. 21.*

Gemmae
ex oculis
Hyænæ.

Aures.

Situs vesiculae
Zibethi.

Pinximus autem ea omnia sua ferme naturali magnitudine ad unguem dimensa. Vas autem Zibethi positum est inter genitalia, & testes, quos satis magnos, ac evidentes habet, istos secui, & inodoros reperi, & ab his vasa seminaria admodum crassa ferebantur, ad genitalis radicem ad latera pseudouteri sub quo vesica parva erat. Natura autem hujus particulæ paulò post considerabitur. Genitale totum occultatur in corpore Felium modo, dum vivum Animal quiescit, apparetque sola glans: at in cadavere ob relaxationem, uti pictum est, totum membrum

Explicatio.

brum foris extabat, ut à nobis tractum remanerat, nec intus iterum reductum, quiescebat. Totius præterea corporis pili sunt longi, rudes, & asperi apri modo, & in cervice, ac per dorsi spinam pili adsunt nigri, prælongi, ac duriores, quos erigit iratum animal, uti sus. Cauda est oblonga, & bene pilosa, usque ad terram pertingens, variis distincta maculis. Icones hujus animalis posita à Matthiolo, Bellonio, Clusio, & Columna inter se differunt: magis placet, quæ est in Matthiolo à Valgrisis impresso.

Hyænæ
nomen u-
niversale.

His positis concludemus, jure hac tria animalia à nobis reducta esse ad Hyænæ nomen, nimirum ob proprietatem insignem, quam hæc tria animalia habent nullis aliis animalibus communem: nimirum falsæ vulvæ formam, ob quam utrumque habere sexum ab aliquibus credita sunt: quæ proprietas, ut ab aliis animalibus hæc distinguit, ita eadem inter sese unit genericâ unitate. Communicant igitur simul Hyæna nostra, & antiquorum Hyæna, pseudovulva, genitali osseo, & oculorum gemmis. Verum quia generis nomen hæc tria animalia continentis nos latet, ab antiquiori specie nomenclaturam mutuari libuit. Fortasse sub eodem innominato Genere continetur Fiber, nam Castoreum, vesicæ sunt in inguinibus humorem apertura stillantes melleum: non autem testes ut dicemus.

Hyæna-
rum pro-
prietas.

CAPUT V.

Ubi Hyæna nascantur?

Ex Syria.

HYÆNAS, scripserunt Herodotus lib. 4. Plinius, atque Solinus, plurimas gigni in Africa. At nostra Hyæna, odorata dicta, à Francisco Alexandri Catus Syriacus vocitata fuit, & Matthiolus Venetiis vidit ex Syria delatas. Cardanus verò scripsit, Hispaniam ipsas mittere, quapropter notatur à Scalig. Clarius autem loquutus est Amatus scribens, Lusitanos eas deferre ab Indiis: sed memoria non excidit mihi, aliquot ab hinc annis à Litvano quodam pharmacopœo Romam ad Henricum Convinum transmissum fuisse vasculum Zibethi, & Ungulam Alcis, qui etiam scripsit, ista esse fructus suæ regionis: unde suspicor etiam in illis frigidis regionibus oriri Civettas.

An in Li-
tuania.

In Indiis.

De Zibethico autem animali Americano scribens Jo. Faber ex F. Gregorio de Bolivar; Hoc animal, inquit, nascitur in multis Indiæ orientalis, atque occidentalis partibus, cujusmodi in orientali sunt provinciæ Bengala, Ceilam, Sumtra, Java major, & minor, Malipur, & plures aliæ.

Nova Hi-
spania.

In nova Hispania verò sunt provinciæ de Quatemala, Campege, Nicaragua, de vera Cruce, Florida, & magna illa Insula S. Domini, aut Hispaniola, Cuba, Matalino, Guadalupa, & aliæ.

In Regno Peruano animal hoc magna copia reperitur. In Paraguay, Tucamam, Chiraguanas, Sancta Cruce de la Sierra, Yungas, Andes, Chiachiapoias, Quizos, Timana, Novo Regno, & in omnibus provinciis magno flumini Maragnone confinibus, quæ circa hoc ferme sine numero adduo Leucarum millia sunt extensæ. Multo adhuc plura ejusmodi animalia nascuntur in Brasilia, ubi mercatura Zibethi exercitatur.

Guinea.

Magna horum abundantia quoque est in Guinea, in provinciis nimirum de Loango, Congo, Manicongo, circa flumina Angolæ, usque ad Cafres, & finem bonæ spei, maxime autem in grandissimis, & extensissimis montibus, qui ibi prostant, quos Fragosas Cuspides appellare solent. Et ex parte quidem Cafres montium de Torea, aut de Luna, ubi maxima Algalix quantitas extat.

CAPUT VI.

De Vasculo Zibethico.

Zibeth, quod ab hoc animali generatur, non ex toto corpore; sed ex determinata particula colligitur, quo, qualis, quanta & ubi sit, nunc est à nobis investiganda. Turpiter autem erravit Jo. Riolanus, suæ Pathologiæ cap. 11. scribens: *Damarum stercus bene olet, & Gazella cacat Zibethum.*

At Ruellius primo de Nat. stirp. capite 27. *erui è genitalibus locis* scripsit & subjunxit, *è cujus natura sordes manant, &c.* cui assentiri videntur Matthiolus, & Francisce. Alexandri. Excrementitium genitalium humorem vocavit Dessenius. At Renodeus circum *testes & pudenda* concreescere scripsit. Itaque hi videntur censuisse testes esse vasculum Zibethi, sed rediculum est, quod Everhardus à Mepschen narravit Dessenio de Civetta Alexandri Cardinal. Farnesii, *exectis testibus aperto vulnere sudorem defatigata, & irritata fera colligi.* Nam orificia, quæ cernimus naturalia, ipse censuit arte facta exectis testibus. Columna autem Epist. 1. ad Fabrum, vocat testiculos, sive utriculos, qui medii inter anum, & pudendum prominent, tam in mare, quam in foemina. *In mare tamen duplo grandiores apparent. Hi utriculi interna sui parte, ubi pilicurti hærent, capacem satis cavitatem obtinent, in quam ingressus patet exiguus, & cartilagineus.* deinde subdit: *sub dictis utriculis, folliculis, sive testiculis (nam alii testiculi haud apparent) maris genitale situm est.* Quæ verba fecerunt, ut Faber dubitaret, quid sibi vellet Columna, ex folliculis illis, utriculis, sive testiculis Zibethum colligi. an foeminæ quoque extra prominentes Didymos habent?

Pars se-
rens Zi-
bethum.

Columna.

Clarius profecto loquutus fuit Alexander Benedictus de cur. morbis Foeminæ intragenitale, & alvum: Mari intra genitale membrum, & testes colligi Zibethum, & Columna altera Epistola ad Fabri dubi-

tionem respondens, denuo revisis, & exactius consideratis dictis animalibus: *Testes*, ait, *ex lateribus folliculorum cum manibus eversi*, tam magni eos attrectanti manifestantur, quam ab iisdem folliculis contineri possunt; & subdit: *folliculis his ad latus foraminum* (qua instrumento humorem exempturo ingressus datur) *in externa parte testes adherent. In fœmina testes illi perquisiti, non inveniuntur, molliores enim sunt illi utriculi, seu folliculi, nec ut in mare grumofitas illa, & durities oblonga testium percipitur.* Præterea Frater Gregorius de Bolivar apud eundem Fabrum, *Mares solos*, ait, *foras eduotos, & conspicuos testes, intus conclusos fœminas gestare.* Decipi autem omnes affirmabat, qui prominentias illas in fœmina ambas intra vulvam, & anum sitas, testiculos esse sibi persuaderent. Hos enim tumores, solos esse illos folliculos, & utriculos à natura eo loci fabricatos, in quibus Zibethum paulatim colligitur, & inde evacuatur. Et cum duo sint, imponere facile possent, etiam valde gnaris, & Naturæ studiorum non in expertis, ut testiculos esse ad credendum adducerentur. Et quoniam iidem utriculi in eadem regione, ubi maris testiculi hærent, positi videntur, illosque veluti investiunt, & cooperiunt, hinc fieri posset, ut crederent aliqui testes esse: hæc, si apud eruditos quidem, & oculatos auctores leguntur, quid sperandum ab iis, qui Animal non viderunt? Columna asserere videtur, testes in folliculis contineri, & adhærere in externa parte folliculis ad latus foraminum, quod jure negat Bolivar.

Nostra inspectio.

Dilucidatio.

Vas Zibethi.

Sed nos cæteris omissis dicemus in resupinato animali mortuo sub ipsis utriculis testes esse, non tactu solum; sed oculis quoque manifestissimos, ut pictura ostendit, erecto animal non ita prominent, cum interius comprimantur, ita etiam in vivo, & bene valente Animali semper testes sunt retracti, ut in homine juvene, & valido accidere dixit Galenus libro 1. de sem. capite 15. secus in fene, nisi morbosè fuerint convulsi, ideo F. Columna in animali inquietissimo, ferocissimo, erecto, & valido non potuit istos benè tangere, & considerare; adeo ut ipsi visum fuerit testes in folliculis ipsi contineri. Sunt autem testes à Zibethi vasculis omnino distincti, & sua habent vasa ferentia semen ad meatum genitalis, valde crassa, ut nos Anatomæ docuit, & servamus adhuc apud nos hujus Animalis scrotum exiccatū, in quo testes. Membrum Zibethicum primo aspectu fœminea vulva videtur: lineam enim oblongam habet, & labia crassa, quod si manibus tangatur, tactu sentitur ovi parvi magnitudine, veluti cartilagosum corpus, & duriusculum, in quo, cum parum digitis deducitur, & dilatatur, apparent duo oblonga foramina, iis, quæ sunt in naribus, similia, sub quibus cavitates quædam sunt, sedes Zibe-

thi; Hæc vascula si digitis magis pressa deducantur apertis omnino foraminibus totas cavitates demonstrant, loculique perfecte patent, quorum cavitas tanta est, quanta sufficeret ad continendum Amygdalæ nucleum, in his loculis nullus porus, nullus meatus apparet: Sed sectione facta, corpus duriusculum ovi magnitudine, quod cartilagosum tactu videbatur, agnovi distinguere in duos utriculos olivæ Hispanicæ magnitudine, & nequaquam cartilagosos, sed carnosos, & minutis, albis, duris glandulis, seu granulis infertos; duriore autem multum, quam testes, erant substantia: omnino tamen inter se distinguebantur hi folliculi, membranæ tamen uniti, & interior quidam communis erat ambobus utriculis, servo adhuc apud me hosce utriculos exiccatos, qui mire redolent Zibethum, cum testes veri exiccati cum scroto nihil oleant: sed quod mirum Animal Hydrope exanimatum putrefactis omnibus visceribus, & maximè fœtidis, vehemens ut nausea secanti excitaretur: & alioqui fœtidum totum: tamen mire olebat, & nunc etiam optimum spirat odorem, vas Zebethi.

CAPUT VII.

De Castreo.

CUM autem ad dilucidandum genus, & proprietatem Hyænæ odoratæ plurimum conferat Fibri Historia: ideo dicemus quod Fiber Animal sit, cujus & mas, & fœmina reperitur, ambo in inguinibus conceptacula quædam habent, è quibus, per sua oscula, melleus quidam liquor emanat, quem Fiber ipse delingere solet; Mares autem habent præterea suos testes sub cute intus ita coclusos, ut tangi nequeant, veluti sues, teste Dioscoride. Rondeletius similes tumores in Leporibus esse dixit, unde factum sit, ut vulgus eos, mares, & fœminas censuerit. Pariter Moscho Animal similes esse censuit, vesiculæ enim Moschi id indicant, sed Rondeletii verba digna sunt, quæ huc transferantur, hic lib. de Amphibiis cap. 8. *Fibri*, inquit, *in inguinibus geminos tumores habent, utrinque unicum membrana sua conclusum, ovi anserini magnitudine, inter hos est mentula in maribus, in fœminis pudendum. Hi tumores testes non sunt; sed folliculi membrana contexti in quorum medio singuli sunt meatus, è quibus exudat liquor pinguis, & cerosus, quem ipse Castor sæpè admoto ore lambit, & exugit, postea hoc veluti oleo, quas potest corporis partes contingere oblinat. Hos tumores testes non esse hinc maxime colligas, quod ab his nulla sit ad mentulam via, neque ductus, quo humor in mentula meatum derivetur, & foras emittatur. Præterea quod testes intus reperiuntur. Liquor ille, de quo loquimur, quum recens est, oleum refert, quum vetustior mellis liquidi colore est,*

Structura.

Rondeletius.

est, & crassitudine. Idem Leporum exemplo declarare non inutile fuerit. Iis in utroque inguine tumor est, glandula prominens modo, intus meatus est varicosus, capreoli modo intortus, è quo liquor effluit. Hos tumores cum in omnibus leporibus observasset vulgus, lepores omnes simul mares, & fœminas esse credidit. Eosdem tumores Moscho animali esse putato, à quibus odoratum illud pus emanat. Neque sunt audiendi, qui putant tuberculi, vel umbilici inflammati saniem esse. Tumorem esse glandulæ, vel testiculo similem membrana circumdatum norunt, qui adulterant. nam in testiculi formam effingunt, ac testiculum Moschi appellant. Hæc, quæ de tumoribus inguinum Castoris, & liquore inde manante à nobis prodita sunt, cum ita se habere doceat ipsa inspectio, & paulò ante dixerat Rondeletius. Testes parvi, substrictique, & adherentes spinæ, qui adimi sine vita animalis non possunt. id prius scripserat Dioscorides, licet censuerit, quod defertur, bivaſculum esse testes. pariter Plin. lib. 2. cap. 3. ex Sextio Medico diligentissimo. ex quo videtur colligi posse liquoris folliculos non esse testes, & quidem facile, quia testes non sunt liquoris forma in folliculis. Dicendum ergo adesse Animalia multa, ut Hyænas, Zibethica, Castores, Moschifera, Lepores, & alia, quæ inguinibus vascula ferant, in quibus liquores quosdam odoratos proprios deferant, ut inter pisces sepia, loligo, purpura, excrementa odorata continent in Vesiculis.

Quod autem de Moscho ferunt, non videtur verum. Concedimus quidem Animal esse exoticum, & Indicum in regno Pegu, ac potissimum in agro Tumbascorum admodum frequens, capræ non multum dissimile, ac corpore prægandi, *Dorchadem Moschi*, *Gazellam Indicam*, & *Capreolum Moschi* nominatum, ex cujus inferiore maxilla, æque dentes utrinque singuli porcorum instar exeruntur.

At quum narrant, huic cum Veneris œstro percellitur, furoris vehementia umbilici regionem intumescere, ibique congesto sanguine multo, & crasso fieri apostema: atque tum ferum illud animal potum, cibumque averſari omnem, & humi sese provolvere, atque lapidibus, & arborum truncis turgentem partem quadam voluptate confricando, disrumpere, ac vomicam aperire, ex qua saniem quandam excerni, quæ verus est Moschus, illam autem saniem (etiam referunt) super arborum truncis, aut saxi relictam, calore solis, ac Cœli bonitate coqui, & elaborari, sic virosi ipsius odorem, si quis est, dissipari, & hanc esse optimum Moschum. Alioqui capta fera venatores partem cum corio simul abscindere, cruorem effluentem exprimere, colligere, exiccare, & servare cum utriculis, aut pellibus eorundem animalium, quorum sæpe sanguinem exicca-

tum, præculæ recrementi dicti portioni commixtum pro puro Moscho ab institoribus, seu adulteratoribus vendi, &c. Nos si hæc attentè consideraverimus eandem esse naturam Moschiferi Animalis, ac Zibethici aperte cognoscemus, nonne ambobus sub umbilico vas excrementi collocatur? nonne ambo ad Venerem irritantur copia sui excrementi? nonne ambo, ut tale excrementum expurgent, se confricant lapidibus, & stirpibus? nonne utrumque excrementum eligitur potius ab Animali expurgatum, quam ab homine extractum? Quare utriusque similis est natura; & ideo si ex Arist. à notioribus nobis ad minus nota procedendum: ex nota natura Zibethi, veniemus in cognitionem Moschi minus nobis noti, & dicemus sicut Zibeth est non ex apostemate, ita neque Moschus: quare Moschiferum Animal habebit etiam particulum determinatam naturaliter ad colligendum excrementum ductum Moschus.

CAPUT VIII.

Quid sit Zibeth.

EX hoc Animali colligitur odoramentum dictum Zibeth à Scaligero, Zibetum, & Zapetion ab Hermolao, & Ruello: à nonnullis Algalia, ab aliis Civetta. Hujus in Animali ipso, quæ sit materia, non certo apud omnes constat.

Siquidem animalis semen vocavit Cardanus: unde à Scaligero reprehenditur, & iure: verum enim semen non esse, patet manifeste, quia, qui adhærent, substantque testes, non eo suos seminales ductus evacuant; sed per penem, ut in Canibus, quod sectione earum partium clarissime videmus. Nec possumus dicere, quatuor habere testes, duos proli generandæ destinatos, alteros vero apertos ad superflui seminis excretionem; quia hi utriculi exiccati, quos servo, odorem Zibethi spirant; nullum autem testes, quo patet aliam materiam contineri in testibus, aliam in istis folliculis, & verum semen neutiquam esse odo Zibethi.

Plurimi censuerunt esse Animalis sudorem, ut Scaliger, Matthiæus, Januensis, Renodeus, Jo. Leo in desc. Africæ, F. Gregorius de Bolivar, quibus subscripsit Faber, id affirmant, quia defatigato, irritato, & sudante animali plurimum colligitur, imo etiam sub coxis, brachiis, collo, & cauda ex F. Gregorio. Quibus ego assentiri nequeo: nam cum sudor per totum corpus emittatur, non in hominibus tantum, verum etiam in belluis (vidimus enim in equis sudantia dorsum, coxas, collum, & caput) etiam si copiosior à dictis partibus sudor emergat: & ideo totum corpus eodem deberet esse præditum odore. Cum verò soli utriculi, & humer solus in ipso collectus percipiantur odorata, non autem pellem, carnem, axillas, & totum corpus, odora-

Nomia.

An sit semen?

An sit sudor?

odorato sentiamus, neutiquam dicendus erit sudor: nisi fortè à modo, quo colligitur in ipsis utriculis, hoc nomen sumere voluerimus; videtur enim à corpore glanduloso, & spongioso per invisibiles poros in cavitates folliculorum resudare; unde dicetur, non simpliciter sudor; sed membri Zibethici sudor.

An sit excrementum?

Alii generalius loquentes excrementum dixere, ita Ruellius vocavit sordem odoratissimum genitalium locorum. Deffenius excrementum genitalium humorem dixit, Scaligero & Renodeo placuit etiam appellare strigmentum circa testes, & pudenda concretum. Sed hi non descendunt ad particularem hujus excrementi naturam: quare assumpto, omnium auctorum consensu, quod sit animalis excrementum, considerandum à nobis erit, quale sit excrementum.

Distinctio excrementorum.

Possimus distinguere excrementa, ut aliud sit utile excrementum, ut semen, lac; aliud inutile, ut pus, sudor, sordes, &c. Diximus, non esse semen, neque sudorem, neque erit pus; quia nec ulcus adest, nec materia corrupta, vel similis, ex qua pus gignatur. Ego censeo esse excrementum proprium substantiæ glandulosæ dictorum folliculorum; quæ tale gignat insita & propria vi, ac facultate, ut ventriculus chylum generat, Hepar sanguinem, Mammæ lac, testes semen, aures suas sordes, sepia atramentum, Vipera in dentibus Venenum, & similia, immo, & simile omnino Melleo excremento Castori, & Moschi, & similium Animalium. Sed vereor determinare, an sit excrementum utile ipsi parti, vel Animali gignenti, ut lac, & semen: vel omnino intile, ut sordes aurium. Nam quum genitum excrementum grave videatur ipsi animali; ab ejus enim acrimonia vellicatur, & cogitur se ipsum eo exonerare. fœmina autem, quæ cicur facta est, videtur delectari, dum auriscalpio Zibethum extrahitur, ex quo suspicari, inutile, & nocuum ipsi animanti esse excrementum, possumus. Contra odoris suavitas non indicat concoctionis carentiam nec putredinem, uti accidit in excrementis præter naturam; sed perfectam concoctionem, & naturæ dominium: unde superante natura, materia concocta à vi specifica membri, dicenda erit naturalis, quamvis copiose excreescens, partem propriam, veluti ad fœtum edendum, ad sui excrementationem irritet. idem enim accidit abundante in suis vasissimine, & lacte. Erit ergo excrementum utile, alioquin frustra natura tantam vim dedisset illis utriculis, qua gignerent materiam adeo odoratam, & suavem, ut multas alias superet odoratas res. Sed ad quem finem? semen inservit ad generationem animalium, lac ad eorundem nutritionem, ad quid proderit hoc excrementum? equidem

Excrementum utile.

Finis.

possem imaginari, vel ut irritentur animalia ipsa ad coitum; vel ut ad idem remedium sit homini, ejus enim gratia animalia fuerunt creata, ad hoc Castoris mellaginem destinamus, vel denique, ut iste odor inserviat animali ad venandum, & ad se allicienda alia animalia, ut de Pantheræ odore diximus. si quis meliora attulerit, laudabimus ingenium.

CAPUT IX.

De collectione, & electione Zibeth.

Quum repleti fuerint utriculi substantia Zibethi, animal ipsum inquietum est, & semet exonerare satagit: unde videtur dicendum, ab ipsius acri qualitate turgere, vexari, & pungi, atque ad excretionem proritari: delectarique videntur cicurata animalia, dum folliculi auriscalpio exinaniuntur, scribit Faber ex F. Gregorio citatio. *In hisce montibus, quos animalia hæc perrant, omni adhibita diligentia Nigrite, sive Mauri illi perquirunt veteres arborum, aridosque truncos, & ubi aliquas maculas magnas, casque oleosas observaverint, eo se conferunt, & globosam quandam materiam truncis iisdem adherescentem, nuculas, aut castaneas magnitudine æquantem inde auferunt, in aqua ebullire permittunt, id quod supernatat pingue, & oleosum remonent, mundioribus vasis infundunt, usuique reservant. Atque hæc est omnium optima, ac purissima Algalia.* repletis enim folliculis, ob acrimoniam, ut reor, vellicantur; & coguntur animalia se depurare: ideo in silvis arborum truncis se confricant, ut talis materia arboribus adhæreat.

Collectio.

Ea autem Animalia, quæ in caveis magnis domi asservantur, vel cicurata sunt, si abundaverit in eorum utriculis succus iste quasi eo molestata, velociter per caveam ambulant, nec loco stare queunt, & si non extrahatur à nobis excrementum. Animal ipsum, caveæ lateribus, & domus parietibus se confricando, Zibeth à se abstergit, quod ita perit. F. Columna apud Fabrum descripsit modum, quo famuli D. Barnardine de Corduba odoriferum hunc liquorem ex maculo detrahre parabant. *Ex famulis unum, seu catenulam, qua ligabatur, trahabat. Posteriores alius pedes tenebat: Tertius utriculos revolvebat, qui medii inter anum, ac pudendum, prominent, tam in mare, quam in fœmina, in horum cavitate scaturiginem suam liquor ille Zibethicus, consistentiæ prorsus melleæ, sumit. Hic extrahitur immisso auriscalpii majores simili instrumento, quod per cavitatem quaqua versum sapiuscule revolvitur. Hoc ubi in uno, atque altero folliculo præstitisset, gossypio utriusque pilos, qui curti sunt, abstergebat. Ab ubi sexies forsan cochleari illo*

Modus colligendi.

illo parvo utrumque utriculum emundasset, tantum ferme Zibethi collegit, quantum avellanae nucis cortici implendo satis esset. Addebat idem D. de Corduba æstate liquidiores, quam hyeme succum colligi, ita ut in caloribus illis, singulis binio diebus semuncia corraderetur: hyberno vero tempore, vix semel in septimana succum illum, nec tantam ejus quantitatem acquiri. Ex fœmina postea minus Zibethi educebat, quæ cicur facta nullatenus repugnabat.

Substantia.

Qualitates.

Zibethi substantia videtur esse pinguis, & unctiosa: nam in aqua ebulliens superiora petit, & ab heterogeneis separatur: consistentia Mellis, seu Butyri est: liquidius æstate abstractum, vel recentius, temporis processu incraassatur. ego extraxi à folliculis animalis demortui ultra drachmas duas, colore albido, & mellis liquidioris consistentia. Scaliger (& cum hoc Renodeus) dixit esse odoramentum pingue, crassum, nigri saponis facie; sed vidit in superficie, & antiquatum. A matus vero, quum recens est, inquit, tetri, & horribilis est odoris, postea vero successu temporis gratum spirat odorem. Quadramius Zibetho contrarium accidere, Ambræ, & Moschi, hæc enim quo recentiora, eo præstantiora, Zibethum autem vetustius, melius F. Donatus ab Eremita lib. 1. Antidotarii cap. 10. optimum, ait, esse leonino, ac sub pallido colore, pingue, moderate liquidum, tempore crassescens, papyro impositum, & confricatum solubile sine corpore, quo distinguitur ab adulterato. Idem Frater Evangelista Quadramius lib. de Theriaca c. 11. scripsit: Masculi Zibethum albido est colore, fœmellæ vero leonino, post hebdomadam ab Animali extractum, tempore procedente obscurum apparet, cum tamen & ipsum initio album spectetur, sed citissime fulvescat, præstans sic evadat. fœminei Zibethi uncia valet quantum Masculi unciaë quatuor. ita admista uncia una fœminini, sex masculini uncias ambò perficiuntur, cum masculinum solum absque fœminino parum valeat.

Adulteria.

Legitimum.

Adulteratur variis modis, admisto Butyro, vel pulpa passularum majorum, seu Zibibi, & aliis rebus. Frater Evangelista Quadramius l. de Theriaca cap. 1. Zibethum adulteratur Adipe rancido, vel Butyro, vel caseo. sed si hujusmodi parum impositum fuerit cochleari argenteo super prunas, adulteratum reddet suæ missionis odorem, vel casei, vel adipis, vel butyri rancidi, legitimum vero suavissimum odorem. Sed legitimumne, an adulteratum sit, ex F. Gregorio scribit Faber, cognosci, quia infusum in vas in quo aqua bullit, statim, quod heterogeneum, & Algalia admixtum fuit, fundum petit, Zibethum autem sincerum aquæ superficie in natat. Nos dicemus admixtum cum Butyro, vel alia re pingui, non posse separari dicto modo: sed percepimus etiam aliquando in ipso odorem Butyri rancidi; butyrum enim veterascens corrumpitur, & odore rancido

femetipsum manifestat. Solet etiam optimum Zibethum acquirere colorem, veluti telam quandam fuliginæam; sed in profundo albescit; quod vero adulteratum fuit, ejusdem est coloris in profundo, ac in superficie. servatur in vitro, non alibi.

CAPUT X.

De usu, & facultatibus Zibethi.

Duplicis est usus Zibethum, vel odoris gratia, vel facultatum. odorem tantum respiciunt Myropolæ, Medeci faculcates.

Cautio.

Cautè dicunt Myropolæ adhibendum esse in compositionibus aromaticis Zibethum; nam suo valido odore alios superat; unde odorata unguenta ex multis conflata Zibethum tantum redolent. Pulvis Zibethi simplex apud Alexium fit saccharo candi, & Zibetho simul in pulverem redactis, qui servatur vase vitreo optime clauso. Rosellus sumit Ovorum cortices lotos, & siccatos, in tenuissimum pulverem redigit, & cuilibet unciaë addit Karactos iij. Zibethi. Karactus autem pendet grana iij. vel recipit cortices præparatos ovorum duarum unciarum pondere, infundit in aqua rosacea Moschata. 10. vel. 12. diebus, eos exiccat, terit, & cribrat in tenuissimum pulverem, addit pulveris sacchari fini unciam unam, tunc Mortarium æneum prunis ardentibus intropositis calefacit, quantum tactu ferre manus possint, inde absterfo mortario imponit pulverem corticum, levigat pistillo, & addit Zibethi Karactos iij. paulatim miscendo inuncta pistilli summitate, sic levigat spatio unius horæ, postea in vitreo vase bene clauso servat. quo pulvere aspergemus dealbata linteamina, subuculas, & alias vestes.

Pulvis Zibethi.

Sapo odoratus fit ab iisdem auctoribus, accipiendo saponem communem optimum, secant subtiliter, & exiccant ad solem, vel in umbra per 10. dies, tundunt, & cibrant in pulverem tenuem, tunc addunt Zibethi pulverem, & aqua rosacea uniunt in solidam formam.

Sapo.

Fiunt etiam ex Zibetho olea, unguenta, & suffumigia, quæ describere supersedebo.

Odoramenta.

Quoad vires medicas; F. Gregorius de Bolivar apud Fabrum, Pellis, inquit, ventris ipsius est saluberrima in omnibus frigidis affectibus. Ventriculum præcipue roborat, si frustum ex hac eidem imponatur, & quotidie gestetur. Nigri illi Guineæ, & Brasilienses barbari hujus quoque animalis carnibus vescuntur, utcumque sit pessimi odoris, & digestionis durissime, quam ad venerem tamen præstare maximum stimulum affirmant. Sed Hyenæ pellis ad morsum canis facit ex Scribonio Largo cap. 171 Pervenit ad me opinio, inquit, esse in insula Creta barbarum quendam naufragio apulsum, majorem natu publice mercedem accipientem. Quin etiam

Vires Peilis.

etiam quum liquorem timent, & latratus edunt spasmoque vexantur: remedium brachio sinistro alligato efficere, ut & potionem accipiant, & liberentur vitio. Hoc ego cum quarerem ab hospite meo legato inde misso, nomine Zopyro, Gordiense medico, quod esset pro magno munere, accepi. dixit autem Hyana corii particulam esse panno inligatam: quod eo adhuc non sum expertus, quamvis protinus magna cura Hyanam invenerim, & pellem paratam habeam: quia non incidit ex eo quisquam, & opto quidem ne incidat: sed quia id non est in nostra potestate, si casu inciderit, remedium habere oportet ad tanta rei experimentum, & Marcellus Empiricus cap. 36. Vituli marini, aut quod melius est, Hyana pelle facta calceamenta si quis in quotidiano usu habuerit, efficaciter podagra morbo carebit. sic etiam Aëtius ferm. 2. cap. 162. Hyana pellem quidam domi repositam adservant, & usu expetente ipsam à rabioso cane commorsis circumdant. Nam poprietate quadam prohibet, ne commorsus in aqua timorem delabatur sed etiam illapsis auxiliatur. supra fidem autem est, quod refert Nonius cap. 259. de fulminib. scribens, à fulminibus dictas pelles homines tueri, & præservare, his verbis: Phoca pellis, & Hyana: Quorum animantium pelles etiam imperatorum Naves circumferunt.

Avicenna.

Zibethi autem liquorem equidem affirmare Avicennæ fuisse cognitum, & de eo egisse lib. 2. c. 326. nomine Galia, & Algalia. quo loco non potest intelligere Galliam Moschatam, quia loquitur de medicamentis simplicibus, non autem de compositis. Alia verò res est Algalia, & Sedervam Serapionis, quæ succus herbæ frigidus, & astringens est, ut Acacia, quod etiam animadvertit Lusitanus in Dioscoridem. Porto Simon Januensis Zebeth esse Avicennæ Galliam censuit, & animalis Arabici sudorem. Adde quod vires ab Avicenna Algaliæ tribuæ nulli alteri rei, quam nostro Zibetho conveniunt. scribit namque Avicenna: Galia lenit apostemata dura. Dissolvitur in Oleo Ben, aut Keiri, & destillatur in aurem dolorosam, & ejus odoramentum confert epileptico, & viviticateos, & sedat sodam frigidam, & quando datur de eo in vino, inebriat. Odor Galia confortat cor. Algalia confert doloribus matricis frigidis supposita, & apostematibus ejus duris, & phlegmaticis, & provocat menstrua, & facit matricem descendere præfocata, & inclinata, & mundificat eam, & preparat ipsam ad impregnationem. quæ omnia Zibethum peroptime præstat; non differt Galia, ab Algalia, quia al est articulus apud Arabes.

Temperamentum.

Matthiolus calidæ, & humidæ facultatis esse censuit. contra Cardanus animalium odorata excrementa valde sicca pronuntiavit. Renodeus, & Amatus Lusitanus odorem Zibethi Moschoaffinum dicunt, sic &

qualitatem, at Moschus ex Avicenna est calidus, & siccus in secundo gradu. Quod si Animalis sudor est, quum sit Animalis calidissimi, & tempore calidissimo abundans; immo in animali ira, & motu calefacto; dicendum videtur Zibethum esse substantiam biliosam, calidam, & siccam, facultate digerente præditam. sed quia sapor à nemine, quod sciam, est degustatus, ideo ex hoc nihil colligere possumus certi. Galen. 10. de fump. med. fac. agens de sudore, illi misceri interdum dixit nonnihil bilis, ita ut aliquando falsus, aliquando amarus appareat sudor, unde quum Civetta sudans, & bilescens copiosorem reddat Zibethum, huic sudori nonnihil misceri bilis opinabimur: quare succus erit facultate calidus, & siccus, & fortasse amarus, & acris. Et quum sudantium fordes facultatem habere expertus fuerit Galenus digerentem, ita ut in phlegmone uberum fuerint efficax remedium; præterea ad Bubonem iisdem usus, celeriter disparuisse tumorem, conspexerit. Hinc Avicenna Zibethum, seu Algaliā dura apostemata lenire scripsit. Sed partium genitalium videtur proprium, iisdemque dicatum pharmacum, de quo Castor Durantes ita cecinit:

Zibeth calidum, siccum.

Castor Durantes.

*Zibethi Veneris crescunt solatio odore,
Adjuvat hoc uterum ne præfocetur, &
inde*

*Est adeo vulvagratum, ut proclives ad illud
Quamvis admotum irrepat.*

Ruellius vero, si cavernula, inquit, umbilici admoveatur, tradunt conversum in alterutram partem uterum in suam resilire sedem: aut si sursum versus impulsus opprimat, subito eo devocari, tam amans hujus odoramenti vulva, ut ad id undecunque admotum irrepat. idem tradit Matthiolus, Renodeus, Amarus, qui etiam pessos adaptat. Hoc etiam utuntur ad uteri strangulationem L. Marcatus. M. Pascalius, G. Bruellius, Scenckius, Hollerius, Altimarus, & Capiavaccius. Ad uteri prævocationem malignam commendat Jo. Colle. eodem etiam utuntur Rasis, & Valescus Algaliā vocantes. Rod à Castro lib. 2. de Morb. Mul. cap. 1. ad strangulatus uteri, inungit os vulvæ oleo aliquo odorato, admisto uno, vel altero grano Zibethi; utitur etiam ejusdem suffitu ad uterum. & lib. 3. cap. 1. ad sterilitatem, ex Zibetho suffitus facit utero. item cap. 2. facit linimentum, & cap. 4. os uteri Zibetho inungit. Hæc autem vis experientia confirmata, signatura videtur esse indicata; quum enim gignatur in animalibus particula, quæ uteri, seu vulvæ quandam formam habet, videtur per id natura nobis indicare voluisse, hujusmodi succum ibi genitum habere maximam proprietatem cum animalium vulvis.

Ad uteri strangulationem.

Et quia Zibethum abundans in folliculis Animalis, irritat ipsum ad sui excretionem, vide-

Ad coirram.

videtur per id natura nobis significasse ipsius vim ad coitum incitandum, proinde, inquit Matthiolus, nec mirum est, si eo viri penicircumlito magnum mulieribus in coitu afferunt solatium. Sic Amatus Venerem incitari scripsit pudendis illitis. At Cæsalpinus lib. 8. de mor. cap. 9. ad conceptum: *Ut autem avidus* (inquit) *uterus semen suscipiat, ajunt Zibethum glandi illitum in coitu voluptatem mulieri adaugere, unde alacrius semen admittit.* Gattinaria scripsit, ad præfocationem Matricis valere Zibeth, vel Zebeth, quod applicatur inuncto digito obstetrici, & in vulvam immisso, & subdit: *De quo semel usus fui in muliere quadam patiente præfocationem, cui causavit tantum appetitum coeundi, quod quasi continuè volebat marito suo copulari; deinde rogavit me sibi vellem talem appetitum remove, dixi quod ex se removebitur post aliquot dies. Et nota, quod si vir, quando vult uti eum muliere, ponat in summitate virga de dicto Zibeth, & subito utatur, causabit in ea maximam delectationem.* utuntur etiam eo ad delectationem mulieri præstandam Capi vacceus, Fumanellus de comp. med. cap. 54. & alii.

Ad appetitum Veneris.

Ad varios morbos.

Ad impotentiam coeundi, Rod. à Fonseca consult. 10. Zibetho oleo de Ben dissoluto inungit penem, & testes. Fallopius, & Bellocatus apud Trincau. lib. 4. conf. 78. Capi vacce. ad Epilepsiam cujusdam foeminae. Salomon Albertus apud Jo. Philippi Brendelium conf. 19. cerotaria ex Tacamahaca, cum Zibetho in eorundum meditullio subligare fecit ossi sacro. unum in confinio hujus, & lumborum, & unum è regione sub umbilico. eadem Cerata etiam applicat Hystericæ, conf. 99. sed conf. 98. in suffocatione uteri. Oleum liliorum alborum cum Zibetho, & Moscho subdit mulieri gossypio. Præterea Felix Platerus apud eundem conf. 102. adjuvandam conceptionem jubet inungi pettinis regionem noctu cubitum ituræ ex quodam linimento, cui Zibethi scrupulum semis miscet, & subdit: hujus magna est utilitas affectibus uterinis, ut sint, qui credant, hoc solum sterilitatem uteri corrigere posse. & Daniel Mylius lib. 1. Antid. Medicochym. in fin. *Zibeth*, inquit, *Colicæ stercora expellit.* Sed Hollerius ad colicam ab humore frigido. *Civettæ gr. iiij. aut vj. dissolve oleo rutaceo, inungatur venter:* Greg. Horstius lib. 4. observ. 12. colico linimentum ex Theriaca cum pauxillo Zibethi ad inunctionem umbilici: Solenander sect. 3. conf. 28. in colica pituitosa, *Zibethum* inquit, *utiliter umbilico infricatur, & inungitur: vis enim ipsius penetrans calorifica promptese in interna insinuat, & quicquid nebulosum est, discutit, ac dissolvit, quod humidum est, siccatur, & mediocriter ita usurpatum calefacit.* quod repetit existo Camerar. de Mirabil. cent. 4. num. 46. Erot. de pass. mul. c. 4. ad suffocationem, *super omnia est inunctio facta ex Zibe-*

tho intus, & extra vulvam, quia menstrua attrahuntur, provocantur. & etiam Mercur. de morb. mul. lib. 4. cap. 10. Paræus de hom. gen. cap. 48. Vidius de cur. membr. lib. 11. c. 21. Capi vacce. Hystericis inungit pudenda Zibetho, vel Mariti penem.

De Catti Zibethici felle, pinguedine, & olco ex ipso incocto, nihil apud recentiores legimus; sed apud antiquos nonnulla extant de Hyæna ipsorum, ut ex Gal. 2. de comp. med. loc. cap. 7. Asclepiades in Collyrio quodam liquido Basilis habet *fellis Hyæne.* in alio Antonii Musæ, & alio Philoxeni. Sed Ælianus de Hist. Anim. lib. 6. c. 46. Ibis felle, inquit, Hyænae interimitur & 1. de comp. med. loc. cap. 1. Galenus ad Aplopeciam Hyænae adipem laudat, quia tenuium partium substantiam habet, quæ prompte in cutis profundum penetrare queat, atque ad radices usque capillorum pertingat. denique Ætius ferm. 2. cap. 164. *idem facit, & Hyæna tota oleo velut vulpes cocta.* Olei vulpini multas dotes enumerat, quæ Hyænae oleo etiam convenient. demum cap. 194. *Hyæna viva* inquit, in oleo cocta, velut de Vulpeditum est, oleum discussorium efficit, arthriticis utilissimum.

CAPUT XI.

De ossibus Civettæ.

Restat ultimo loco proponendum de Animalis ejusdem Scheleto à me parato, quod apprime utile erit istius naturam investigantibus; in hoc enim cognoscetur ossium dispositio, unde licebit conferre cum Scheleto Canis, Vulpis, Lupi, Felis, & aliorum animalium, ut percipiatur similitudo, & dissimilitudo cum dictis animalibus.

Quum in omnibus animalibus non idem sit vertebrarum spinæ numerus: in nostra Hyæna odorata 49. numerantur. at Sui, & Erinaceo 4. tantum sunt, Equo 8. Camelo 15. collum enim constat sex vertebra; ut in Canibus. hinc thorax assumit sibi duodecim, more solito, adsunt in dorso septem aliæ, ut Cani, &c. at Erinaceo 8. Cuniculo 10. demum Cauda constat viginti quatuor ossiculis. In Cane numeravi 15. tantum. In Maxillis, dentes incisorii sunt sex utrinque, admodum parvi, ut in Catopardo, & Canibus; hia proxime accedunt canini dentes magnitudine, & forma, ut in canibus. molares autem utrinque sunt sex, quorum primus prope caninos cæteris minor spectatur, ut penultimus, ex his, major omnibus est.

Effigies potius Cani, & hujus generis similibus, quam alteri generi assimilari videbatur; & hæc breviter dicta sufficiant de Anatome. Excuset autem nos lector, si nihil observavimus interiora secando; quia talis erat viscerum putridorum foetor, ut nausea excitata in meis discipulis præsentibus nempe in Doctore Dominico Panarolo, secante, & aliis adstantibus, celerrimam sectionem vix permetteret.

IN

INDEX CAPITUM
HISTORIÆ

D E

HIÆNA ODORIFERA.

Exetasis, sive Cap. I. De Hyænâ Odorifera,
Zibethum gignente, quæ Civetta vulgò ap-
pellatur.

C A P. II.

An Civitta sit Paradalis Antiquorum?

C A P. III.

An sit Antiquorum Hyæna?

C A P. IV.

*Sub quo animalium genere sit reponenda Ci-
vetta?*

C A P. V.

Ubi Hyænæ nascantur?

C A P. VI.

De Vasculo Zibethico.

C A P. VII.

De Castoreo.

C A P. VIII.

Quid sit Zibeth?

C A P. IX.

De collectione & electione Zibeth.

C A P. X.


De usu & facultatibus Zibethi.

C A P. XI. & ult.


De ossibus Civette.



Equus




Equus





Equus Frisicus



Equus Pannonicus sive Hungaricus




Fig. 1.

View of the head




View of the head




Equus



Equus Ethiopicus



Equus



Cantherins

Wallach




Zebra Indica




Equus Indicus




Equus Hirsutus




Asinus



Asinus



Mulus






Elephas



Elephas





Monoceros Unicornu



Capricornu Marini



Monoceros Unicornu





Onager Aldro



Monoceros seu Unicornus Tubatus



Monoceros seu Unicornus aliud






Capreolus capreolus




Capra montanus



Onager



Lupus Marinus



Capra Sylvestris




4/10/70



Taurus Castratus Bos





Vacca et Vitulus






Bos Domesticus



1871






Bos Iuvencus

Vitulus



Taurus





Bison




Bubalus Indicus



Vacca Indica




Bifons Magnus




Bifons Tubatus




*Locobardus
Bifons*






Bubalus Africanus




Taurus






Bonnafus alius




Urus Iubatus



*Catoblepa Vras
Lybicus*




1842



Bubalus



Alius Bubalus Taurus Syluester



Urus




15

15



15




Bos Scythicus

Tab. XXI



Bubali Invenuti





Aries



Vervex

Agnus



Ovis *Peregrina*



Vervex alius




Vervex alius Peregrinus




Ovis Arabica





Capra Strephiceros



Eale



Alicorn






Ibex



Capra Lybica




Flirus



Capra



Capra Canis



Capra Hispanica


Capra Mambrina



Capra Mambrina


Hircus

Rupicapra




*Caper Alimon
dictus Bubalus
Cerus. Aldr*

Dama Veterum



Hircus Cotilardicus


Culor







Musimona



Trais Vel Ibex





Gazella



Cervo Camelus




Capreolus Moschi




Taurus

Peonius



Alces



Alce Species





Dama Cervus



Caprea




Alce Mas



Cerva



Colopus



Rupicapra





Capreolus



*Capreolus
Marinus*




Capra







Piggargus




Tragelaphus


Piggargi Species

Hippelaphus Fœmina





Cervus



Hippelaphus mas



*Cervus
Burgundicus*



Alce



*Cervus
Mirabilis*



*Oryx Cervi
Species alijs Alce*








Rangifer



Cervus Palmatus

Species Rangiferi Tarandus



Camelo pardus seu Gierafra



Camelo -

pardalus




Camelus. Iudi.

Camelus Indicus



*Camelus Indicus
Versicolor*

Alius Camelus



Dromedary





Dromedarius




Camelus







Camelus Bactrianus seu Dromedarius



Camelus



Camelus






Dromedarius



Camelus




Ica Capra



Ovis Cretensis




Camelo Pardalis





Ovis

Peruana




Aries Guineensis




Lainus s. Tajaen Porcus silvester

Porcus Guineensis





Verres



Aper




Scrofa



Plate 1

Fig. 1




Sus Coriutus


Tab. XLVIII



Porcus pumilo Taxus porcinus



Aper




THE ART





Gryphus

Gryps



Hippopotamus


Hippopotamus



Leo.





Leæna



Leo







1847



1848



Pardus Leopardus




Pardus



Tigris



Lynx



Tigris Gesneri



Panthera






Lupus




Hyæna

Vulpes



Hyæna



Lupus Marinus

Gesneri et Bellonij



Hyaena




Gulo





Lupus Scythicus



Semivulpa



Veruex Æthiopicus





Simia 1.



Cynocephalus 1.



Cynocephalus 2



Simia 2



Cercopithecus



Cercopithecus




Cajtaia

Cagui Brasil



Cercopithecus barbatus Guin

Irya siue Cariguébeiu
Lutra Indica



Capý-bara Parcus flu.
Viatilis Bras.

Cuanthus Ourico cachiero





Cercopithecus Major seu Manticora




Papio Pavion 1



Papio. 2









Tamandua guacu 2



Ai suae Ignavus




Tatu seu Armadillo






Carigucija

Aperca Cuniculi Species



*Aguti vel Acuti Cunic
Bra. spe.*

*Cavia Cebaya Cunic.
Brasil spec*



Cuniculi Indus Gesneri.

Paca Cunic. Bras. spe



Tatu Apara

Dama





Mustela

Putorius Iltis



Martes



Martes



*Porcellus Indicus
alius*

Taxus suillus





Cuniculus porcellus Indicus





Two Rabbits at Rest



Glires

Mures



Mus avellanarius

Sciurus




Mus araneus

Talpa



M. Noricus



Sciurus Getulus

Mus alpinus Marmota



Glis Aldr.

Mus Indic.



*Ichneumon s. lutra
Egypti.*



Lutra

Vitulus Marinus



Castor

Lonx Lonza



Hystrix

Herinaceus




Canis Leporarius




Canes



Canis






Canes





Lynx




Canis Indicus . 1.

Canis Indi. . 2.



Canis Venatorius





Felis Domestica

Felis fulvestris



Felis Libetti



Genetta

Meles vel Taxus Canin,



PLATE 10

Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

Fig. 5



Hyæna Odorata Africana



Catus Zibethicus Americanus



Ilaquatzin



Cercopithecus Sagovin Clusj

Mapach



Cercopithecus Barbatq Clusj

Ignavi siue Haut Clusj



Armadillo Genus Alterum Clusj

Armadillo siue Aiatocheli





rana reptilis

rana reptilis

rana reptilis



Rana

Rana

Rana



Rana

Rana



Bufo

Bufo

Bufo




Bufo Caudatus




à Circulatoribus fietus





Lacerta



Lacerta



Lacerta



Lacerta Chalcidica flexuosa



Lacerta Biceps




Lacertus Biceps




Lacertus Viridis Liguro Bononiensis



Lacertus Viridis Cauda bifurca



Lacertus Viridis exiccatus Cauda bifida




Lacertæ et Stelliones



Lacertæ et Stelliones



Lacertus Cyprius Scincoides



Teiuhana Brasiliensis



Americima Brasiliensis



Lacertus Tarantula quibusdam



Teiuguacu et Temayara Tupinambis



Senembi Brasiliensis



Lacertus aquaticus



Lacertus Viridis



Salmandra Molch Moll



Salmandra aquatica



Salmandra alia aquatilis Minor prone



Salmandra Terrestris Veranig Maculis Luteis distincta




Salmandra Aquatica



Salmandra Aquatica prona



Stelliones ex Matthiolo




Stellio peregina


Scincus




Candulus



Lacertus Indicus Cordylo Similis



Cordylus siue Vromastix




Chamaeleon niger

Chamelon Varius





Chamaeleon Cinerens Verus



Chamaeleon




Crocodilus




Laudiuerh



Tatus




Testudo




Testudo

Aquatica




Testudo


Marina



THE HISTORY OF THE
MOUNTAIN OF THE



OF THE MOUNTAIN OF THE



THEATRI UNIVERSALIS
ANIMALIUM

PARS QUARTA.

S I V E

HISTORIÆ NATURALIS

D E

EX ANGUIBUS

AQUATICIS

LIBRI IV.

Cum Enumeratione Morborum, quibus Medicamina ex his Animalibus
petuntur, ac Notitia Animalium, ex quibus vicissim Remedia præstan-
tissima possunt capi,

C U R A

HENRICI RUYSCH,

M. D. Amstelædamensis.



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS,

Anno MDCC. XVIII.

UNIVERSITY OF CHICAGO
MULLIN

PARSONS

1871

ANNUAL REPORT

1871

EXAMINERS

REPORT

1871

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
ANNUAL REPORT
1871

REPORT




UNIVERSITY OF CHICAGO
ANNUAL REPORT
1871

1871

ENUMERATIO MORBORUM,

Quibus petuntur Remedia ex Exanguibus aquaticis.

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|
|  Bortum faciēns | Pag. 10. b. | Palpebrarum Pili | 49. a. |
| Angina | 16. a. | Parotides tollens | 35. a. |
| Calculus | 13. b. 16. a. | Pthifis | 16. a. 20. a. |
| Calculofus | 54. b. | Pilos e mamma tollens | 20. b. 35. a. |
| Cancer in mammis | 16. a. | Polypus | 6. b. |
| Canis morfus | 48. a. | Pruritus in pudendis | 56. a. |
| Canis rabidi morfus | 23. b. | in manibus | ibid. |
| Carbunculi | 19. b. 35. a. | Puerperii purgamenta | 6. b. 13. b. |
| Caro luxurians | 39. b. | Pustulæ verendorum | 33. a. |
| Conceptum juvare fœtum | 33. a. | Renes Purgantia | 48. a. |
| Dentium dolor | 8. b. | Renum Vitia | 57. a. |
| Dentifrica | 33. a. | Sanguinis grumi | 16. a. |
| Dentitio puerorum | 19. b. | Sanguinem minuētia | 48. a. |
| Fastidiis medentia | 45. a. | Scabies | 20. a. |
| Febris | 23. b. | Serpentum ietus | 19. b. |
| Febris hectica | 16. a. | Sobolem procreantia | 6. b. |
| idem | 17. a. | Stranguria | 19. b. 20. a. |
| Febris quartana | 20. a. | Stomachus | 9. b. |
| Genæ Mulierum ut dealbentur | 34. b. | Stomachum reficientia | 45. a. |
| Hydrops | 48. a. | Tabis | 12. a. |
| Humores fervidi | 12. a. | Tenesmus | 57. a. |
| Iliacus affectus | 49. a. | Tormina alvi | 9. b. |
| Inflammatiō linguæ & Gutturis | 16. a. | Tumores | 35. a. |
| Inflationes | 48. a. 51. a. | Tussis | 34. b. |
| Ischiadici dolores | 57. a. | Veneris acrimonia | 56. a. |
| Lachrymæ Oculorum | 20. a. | Veneris desiderium excitans | 17. a. |
| Lateris dolores | 57. a. | idem | 18. a. |
| Lenticulæ | 34. b. | Venerem stimulentia | 6. b. |
| Maculæ Corporum | 8. b. | Venera tollens | 23. b. 33. a. |
| Maculæ Mulierum in facie | 35. a. | Vitam servans | 24. a. |
| Morbus Regius | 48. a. | Ulcera fordida | 39. b. |
| Articularis | 48. a. | Capitis manantia | 39. b. |
| Morfus Canis rabidi | 12. a. | Ulcera maligna | 33. a. |
| idem | 16. a. | Uredo | 56. a. |
| Mulierum Morbi | 8. b. | Urinam movens | 8. b. |
| Mulierum Purgationes | 48. a. | Urinam moventia | 47. a. |
| Nervi dissectio | 19. b. | idem | 54. b. 51. a. |
| Nervi tufi | 33. a. | Urinæ retentio | 16. a. |
| Ophelidæ | 34. b. | Uteri fluxus | 23. b. |
| | | A 2 | N O, |

NOTITIA EX ANGUIM AQUATICORUM,

Ex quibus Remedia Præstantissima capiuntur.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| B Uccinus | Pag. 34. b. |
| Cammarus seu Astacus fluviatilis | 16. a. |
| Cancri parvi | 24. a. |
| Cancer marinus | 20. a. |
| Cancer fluviatilis | 23. a. |
| Conchylia | 35. b. |
| Echinus | 39. b. |
| Exanguis aquaticus crustatus | 12. a. |
| Lepus marinus | 10. b. |
| Locusta | 13. b. |
| Loligo | 9. b. |
| Murex | 35. a. |
| Mytulus | 48. a. |
| Ostrea | 45. a. |
| Pectines | 47. a. |
| Pinna | 51. a. |
| Polypus | 7. b. |
| Purpura | 33. a. |
| Sepia | 8. b. |
| Squillæ Gibbæ | 17. a. 18. a. |
| Tellina | 49. a. |
| Tethya | 57. a. |
| Urtica | 54. b. 56. a. |

HISTORIÆ NATURALIS

DE

EXANGUIBUS

AQUATICIS.

LIBER I.

De Mollibus, seu Molluscis.

TITULUS I.

De Molluscis in genere.



QUATUOR Exanguium genera Aristoteles constituit, *Mollia*, nempe seu *Mollusca*, quæ carne molli foris obducta, solidum interius modo sanguinei generis continent. *Crustacea*, quæ

crustis collis teguntur. *Testacea*, quæ testis duris fragilibus muniuntur, & *Insecta*, quæ Græci *ἰντομα* dixere, *Zoophyta*, hisce adnumerari meliori jure possunt, quàm ut inter plantas, numerentur.

Mollusca præmittimus, tum quod nobiliora sint, & partium numero ac robore longè præcellant; tum quod idem Aristoteles & Plinius fecerint. Nec malè Aquatica Piscibus subjungentur, cum & Plinio, ea, pisces nuncupare placuerit. *Mollusca* seu *μαλάκια* dicuntur, quod neque asperam, neque testaceam cutem, neque squammam habeant, Athenæus *τενδάδι*, seu *Loligini* similia dixit. Dicit & *μαλακόδερα* *Gaza* & *Rondeletio* visum: deceptos, & *Cartilaginea* Aristoteli talia dici *Salvianus* ostendit.

Naturam inter carnem & nervum mediam obtinent: fissilis hæc, in anfractum, ut ad vires commodior esse possit: loco ossium, quod piscium spinis proportionetur omnia, Polypum si excipias. *Exteriores partes* tres præcipuè habet *Caput*, *pedes* sive *brachia*, quos Aristoteles quandoque *πλακτάνες*, *Gaza* crura, barbas, cirros vocat, & *ὁ κύτος ὠδύρις*, id est, *alveum indiscretum*. *Caput* omnibus inter pedes & ventrem, seu ut Aristoteles, *ἐν μέσῳ τῶν πύδων τῶν καλεσθῆναι πλακτανῶν*. In capite *os* est & *bini dentes*, qui potius, cum immobiles sint, neque ad retinendam prædam firmè innitantur, *ῥύγχος* seu *rostrum* dicendi sunt. Est enim hæc pars, (os & dentes) adunco carnivorarum rostro per quam similis, ex duabus partibus composita, superiore & in-

feriore commissura pyxidata, ut loquitur *Rondeletius*, ita ut inferior superiori inferatur. Loco *lingue* carnosum quiddam in ore gerunt, quo esculentorum voluptatem discernunt. In capite *oculos* binos grandiusculos, quibus exigua quædam cartilago, discrimen cerebrum parvulum continens, præstat. *Pedes* habent parti priori, circum caput, infra oculos circa os & dentes vinctos, quod pars ejus posterior ad priorem adducta sit, extremaque coeant ac confundantur, hinc fit ut excrementa meatu ori vicino infra emittant. Octoni hic sed singulis eorum generibus diversi. *Acetabula* sunt quibusdam, cirramentaque, implicamentis illis quibus digitos antiqui medici indere solebant, similia fibris implexa, quibus carunculas cæteraque cedentia trahunt. Aliis breves & inutiles, binæque promuscides prælongæ, quibus veluti anchoris innituntur, seque contra æstus marinos navigii modo stabiliunt. *Fistulam*, supra caput, & brachia ante alveum, gerunt, cavam, quam modò in dextram, modò in sinistram partem transferunt, & hac, mare transmittunt. Aristoteles hæc modos, *ἀλὸς* modo *μυκτῆρ*. *Gesnerus* *φουσητήρα* legit, *Gaza* & *Plinius* *narem* transulere. *Pinnulam* quoque habent circumdantem alveum, ut natare, & se in natando dirigere possent.

Alveus à capite amplioris capacitatis propendet, cujus caro non in directum, sed in orbem fissilis & cute integitur. Cutem tamen *Salvianus* denegat, & *Plinius*, nulla, *Polypos* vestiri scribit. *Capillamenta* in toto eorum latere conspiciuntur, quorum is, qui branchiarum in aliis piscibus, usus. *Scholias* *Nicandri* *οσλήγας*, Aristoteles *πρυχάδι* vocat. *Interiora* si spectes. *Os* gula excepit angusta, quam sequitur *ingluvies*, *ἀπρόλοβος*, ampliuscula, neque avibus absimilis, cui jungitur *venter*, tanquam *ἡνυστρον* facie *buccinorum* *claviculæ*.

Intestinum ab eo tenue, partem versus repens superiorum ad os fertur, quod laxius est quàm gula. De *Cerebro*, vel quod ipsi proportionem respondet, superius diximus, *vesica* carent. *Mutis* adhuc superest,

Arist. de
part. l. 4.
c. 5.Arist. H.
A. l. 4. c.
1. l. 8. c.
2.
Plin. H.
N. l. 9. c.
12.Arist. de
part.
Anim. l.
4. c. 10.Plin. H.
N. l. 9. c.
12.

Aristot.
de partib.
l. 4. c. 5.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 29.

Locus.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 28.
Cibus.
Arist. H.
A. l. 4.
c. 1. de
Gener. l. 1
c. 1. & 3.
Sexus.

Gene-
ratio.

Arist. de
Gener. l.
I. c. 15.
& l. 3. c. 8.

Ufus.

Arist. H.
A. l. 4. c.
14.
Arist. de
Gen. l. 1.
c. 19.
Galen. l.
de boni &
mali succi
cibus.

est, quam Aristoteles, principatum sentiendi obtinere dicit; ac si hæc cordi esset *αἰσθητικόν*. Humida ea & corpulenta pars per quam gula in ventrem pertendit, adnata magis tergo. Ater humor, quem quidam *συν θόλον*, alii, ut Athenæus & Dioscorides, *τὸ μέλαν*, vocant, pro sanguine ipsis in est, si Plinio credimus: pro bile, ut Rondeletio placuit. Non solet, scilicet, natura, id quod pro sanguine servat, in quolibet metu effundere: nec ullus meatus venæ proportionem respondet, quo alendi corporis causa in universum corpus distribuitur. Secretus is ab alimento in vesica, seu tunica membranea; Aristoteles *μύκωνα*, Gaza Papaver appellavit; exitum finemque habente, qua alvi excrementa emittunt, parte quæ fistula vocatur, quæ in supinis posita est.

In falsis aquis degunt: sed in potulentioribus non inveniuntur, ideo frustra in Ponto quæras.

Vescuntur carnibus. Nec *sexus* ipsis denegatus. Aristoteles enim vulvas bifidas, ac testes geminos juxta genitale in omnibus reperiri ait.

Differunt foeminae à maribus, quod mas prona sui corporis nigriora supinis, partesque omnes asperiores habeat quàm foemina, & lineis intervenientibus varias, caudamque acutior. In mare quoque meatus quidam subditus gulæ, à Cerebro in ima alvei pertendit, idque ipsum ad quod fertur, speciem mammæ imitatur: in foemina duplex illud idem, supraque positum habetur.

Generationem quod spectat, Tergis copulari, & diu in venere, quia frigida, morari, compertum. Ore coire, & renixu atque complexu mutuo brachiorum jungi, prodidit alibi Aristoteles.

Semen per meatum emittunt, idque parte corporis supinâ, qua *putamen* distat, & mare illabitur, faciunt. Continent foeminae primò ova indiscreta, mox discreta in plura: sed quia imperfecta excluduntur, augescunt more vermium, postquam vim vitalem ab asperso maris semine acceperunt. Sic glutino uvæ instar cohererent, & quam primum vitale virus attigere, animalcula ex iis nascuntur.

De *sensibus* nullum est dubium. Dormire & somnare apud Aristotelem habemus.

Apponebantur olim mensis; & probabantur maxime gravida. Nec nunc à culina exulant, quædam Polyporum genera si excipias. Succum falsum exiguum crudum copiosum habere scripsit Galenus. Flatus parere, elixataque probiora effici, quod humor noxius eluatur, Diphilus. Ova analiquando in cibo fuerint, dubium.

TITULUS II.

De Mollibus in specie.

CAPUT I.

De Polypo.

TANTUM de Molluscis in genere sufficiat, jam in specie de iis agemus. Numerantur autem inter ea, *Polypus*, *Seppia*, *Loligo*, quibus *Leporem marinum* adjicimus.

Polypus, qui pro ratione Dialectorum, *πολύπους*, *πελύπας*, *πέλυπτος*, *πέλυπτος*, & *πώλυψ* vocatur, à multitudine pedum, nomen fortitus est. Antiphyllus Byzantius in quodam Epigrammate *πελυπέδην* dixit. Lacones *ἀνόστρον*, alii *όνον*, seu asinum marinum, infimæ ætatis Græci Octapodia, seu Octapodos vocavere.

Descriptionem quod attinet, *Ventrem* tum figura tum tactu, cum Sepiis similem habere, stomachum nimirum sive gulam ab ore prælongam, quam ingluvies excipit; tum ventrem conjungi, ac intestinum simplex ventri annecti, & usque ad exitum tendere, Aristoteles prodidit. *Cerebrum* in dissecto duplex conspici, citat ex Aristotele Athenæus, qui & *atramentum* ejus subruffum esse, & in vesica, quam *μύκωνα* vocant, quoque supra ventrem, auctoribus Æliano & Scholiaste in Aristophanem, sita est, contineri, scribit, minusque hujus quàm Sepiam, & quidem ad mutum habere, quod

brachia habeat coloremque mutet, ubi amissum est, accrescere, & nunquam ejus copia desit, Aristoteles addidit. *Caput* ei prædurum quam diu vivit, & quasi inflatum est. Alveus id in cæteris mollibus dicitur, quod brevior & rotundior conspiciatur. *Oculi*, supra duos pedes: *Os* & dentes in pedum medio. *Pedes* habet ut reliqua octonos membrana interjecta magnos, non solum ad atandum, sed & ad ambulandum utiles, quorum medii quatuor habentur maximi, ut bina sæpe cubita superent, cum acetabulorum ordine duplici, quibus ori cibum admovent; reliqui quatuor, duo superne, rotidem inferne, memini. A quibusdam brachia, ab aliis, Crura, Cirri, à Plinio barbæ, vocantur. Acetabula Aristoteles *πολεπνάς*, alii *κορυλλιδόνες*, Antiphilus Bizantius *ἐλίκας*, Antipater Thettalus *πολεχμὶς*, Ovidius flagella, dixere, *πύθμα* à Hesychio & Varino dici, nonnulli credidere, alii id capiti tribuunt. *Dorsum*, Plinius partem lævem appellat, à qua acetabulorum ordo inchoatur. *Cervicem*, habet imbecillem, cum premitur. *Pinnulam* ipse angustam, de medio ortam, quod parvum, habeat alveum, quem pedibus suis dirigere possit,

Ari-

Arist. H. A. l. 4. c. 9. Aristoteles tribuit. Plinius ob eandem causam, habere negat. Tam esse exiguum, ut minimè aut vix conspici possit, experientia didicimus. *Fistula* ipsi in dorso, cava, qua mare transmittit: eamque modo in dextram partem, modò in sinistram transfert. *Rostrum* Plutaci, si Scaligero & Bellonio, fides. *Cutis* nulla, quamvis Bellonius pedes cute contegi reliquerit. *Caro* alba, cavernosa, meatuumque plena, quod apud Galenum & Plutarchum legimus.

Scaliger Exerc. 218. In mari Adriatico sunt frequentissimi. Thasus & Caria optimos, Corcyra magnos alit. In exterioribus Carteje locis ad talenti pondus accedere, Strabo scribit. In Ponto Euxino non reperiuntur magni, si Oppianum sequimur: circa Hellespontum nulli, quod hoc mare ad Boream spectans imbribus ferè sit obnoxium. *Victus* ipsis carnes conchularum, quas complexu crinium frangunt: itaque præjacentibus testis cubilia eorum deprehenduntur, Carabi, Cancri, Paguri, Lacustæ, quarum carnes quandoque exsugunt, & succum exhauriunt; falsamenta, & pisces. Hæc omnia tanta aviditate devorant, ut ne à proprio quidem genere abstineant, & si Æliano fides est, qui minores retibus inclusi capiuntur, majorum esca fiunt. Humanas verò carnes inprimis appetit. Et refert Trebius Niger apud Plinium, ad conficiendum hominem, in aqua; nullum hoc atrocius esse animal, luctari complexu atque sorbere, & numerofo suctu detrahare, ac in naufragos urinantes impetum facere. Depasci & arborum fructus, in siccum æstivo tempore egressos, certum. Ex plantis autem olea maximè delectari ejusque truncum flagellis sæpissimè amplecti, præter Athenæum, Oppianus prodidit. Ficis ad mare natis affigi, & fructum mandere, ex Clearcho habemus. An brachia sua tempore penuriæ, sub brumam comedant, quæ rursus renascantur, dubium quidem est, à maximis tamen authoribus, Alcæo, Diphilo, Hesiodo, Oppiano, & Æliano, affirmatur, hinc *Oppian. Cyneget. l. 3.* *καὶ τῶν δεινῶν* dici Johanni Grammatico ajunt.

Arist. H. A. l. 8. c. 2. At Aristoteles, Plutarchus id falsum censent, & ille, aliquos sua brachia à congris habere, addit. Distingui *Sexu*, nullum dubium, & Marem à fœmina differre, quod ille capite esse productiore, & brachio suo gerit, quod genitalis speciem referat, in quo duo amplissima acetabula habentur. Nervo id quasi constare, porrectum ad medium usque brachium confirmant, totumque nari fœminæ annecti. Athenæus, acutius & solum albicans esse, parte sui extrema bifurcatum, dorsoque annexum tradit. Plinius forte *caudam* vocat.

Arist. H. A. l. 5. c. 12. De Coitu ipsorum hoc scimus, cum latent, (conduntur autem binis mensibus) idque hyme coire, & ovaparere. Os ori,

acetabula acetabulis componunt. Cum eo, quod vocant caput, in terram reclinato, unus invitetur, brachiaque pandat, alter, passis item flagellis, adaptat sese ita, ut acetabula continentur. Edunt ova & quidem verno tempore, fistula. De Ovis ita Aristoteles: Deponunt aut in cavernis aut in testis, aliove cavo loco simile quiddam labruscæ cirrulis, & candidæ populi fructui. Edita ova dependent ab ambientibus specuum parietibus, tanta copia, ut exempta, vas implerint longè majus, quam caput ipsius, in quo ipsa continebantur. His quinquagesimo demum die disruptis, pusilli polypi generantur: & magno agmine serpunt, phalangiorum more. Ac quanquam non omnibus membrorum singulorum natura conspicua est: tota tamen apparet forma. Multi autem propterea quod invalidi sint, pereunt. Adeò verò aliquando exigui reperti sunt, ut nihil haberent discretum; cætera discreti moverentur. Quod ita brevissimè Plinius: *Polypi vere pariunt ova tortili simulata pampino, tanta fecunditate, ut multitudinem ovorum cuncti recipiant cavo capitis, quo prægnantes tulerent. Excludunt quinquagesimo die, è quibus multa propter numerum intercidunt.* Polypus fœmina modò incubat ovis, modò cavernam cancellato brachiorum implexu claudit. Artificiosè hæc extructa, & circumjecta concharum tenuiorum & scabrarum congeries velut lorica dura erigitur. De *Ætate* hæc apud Aristotelem legimus: *Paucissima genera Polyporum biennium vivunt. Natura enim facile contabescit. Argumento est. Pressus enim aliquid semper emittit, ac tandem evanescit. Patiuntur hoc fœminæ, post partum magis, ac stupidæ fiunt, neque fluctibus agitata sentiunt. Facile quoque ab urinantibus manu capiuntur. Mucosæ quoque evadunt, neque ad venandum consistere queunt, quod autem bimatum non expleant, inde capiunt argumentum. Nam postquam polypuli orti sunt, tum in æstate, tum sub Autumno, haud fatilè invenias polypum grandem. At ante id tempus maximi sunt. Ubi igitur ova ediderint, sic consenescere atque debilitari utrumque affirmant, ut etiam à pisciculis exedantur, perfacilè quoque abstrahi à cubilibus. Ante id tempus, nihil tale.* Ælianus hoc Veneri adscribit, cui & Oppianus assentitur. Vivit tamen etiam in centum dissectus partes. Natant & pinnis & pedibus & quidem obliqui. Pedes in eam porrigunt partem, quæ capitis nomine appellata est, ita, ut cum natant, in adversum prospiciant, & caput ex adverso habeant. Sub aquis, ita in solido ingrediuntur, ut humoris beneficio suspensi fluctuent. In sicco (siccum exeunt asperum, levitatem odere) cum ambulatio cum pulsu & tractu fiat, alterum solum est in Polypi motu.

Arist. H. A. l. 5. c. 6.

Arist. H. A. l. 5. c. 18.

Plin. H. N. l. 9. c. 51.

Arist. H. A. l. 9. c. 59. Scalig.

Ælian. H. A. l. 9. c. 30. Motus.

Scaliger Exerc. 218.

Acetabulis enim jactis procul, ut, cuique applicuere id apprehensum tenent: tum brachiorum contractione corpus admovent, ita subvehunt sese in eam partem cui adhæserunt.

Ingenium. Ingenium & sagacitatem si spectes, ἀνόντων quidem Athenæus, brutum Plinius vocat, quod ad homines adnater, nec persequen-
Arist. H. tem fugiat: est nihilominus callidus & solers.
A. l. 9. c. Nam primò, omnia in domum compor-
37. tat, dein putamina erosa carne egerit, adnatantesque ad ea pisciculos venatur. Idem Conchas artificiosè discuneat, & eandem carnibus vescitur. Non sunt, inquit
Plin. H. Plinius, *prætereunda* & L. Lucullo Procons. Be-
N. l. 9. c. tica comperta de Polypis, quæ Trebius Niger è
30. Comitibus ejus prodidit, avidissimos esse Concharum; illas ad tactum comprimi, præcidentes brachia eorum, utroque escam ex prædante capere. Carent Conchæ visu, omnique sensu alio, quam cibi & periculi. Insidiantur ergo Polypi apertis, impositoque lapillo extra Corpus, ne palpitatu ejiciatur, ita securigrassantur, extrahunt quæ carnes: illa se contrahunt sed frustra, discuneata. Tanta solertia, animalium habetissimis quoque est. Colorem eum mutare, sic pisciculus imponere, vulgare; in eo non convenit: quod Theognis, Phocyllides, Jon. petrar. duntaxat mentiri colorem scribunt. Plinius verò & Antigonius ad similitudinem, ille loci; hic rerum, quibus appropinquat, quod & de arena Scaliger innuisse videtur, eandem suscipere, prodant, Causas hujus rei diversi diversas assignant. Plutarchus id astu facere & quod corpus porosum & transparens habeat, ait. Alii, ut Theophrastus scribit, metui id insignant, ut cum hominis genæ, pro varia cordis concitatione, hoc vel illo colore tinguntur. Bellonius, ob mollem pellent, quæ facile deglubi potest, id fieri credit. Cujus colorem, nunc album (hunc assumere non posse, apud quosdam invenies) mox ruffum, postea lividum, mox variis coloribus distinctum videas. Huc pertinet & illud quod apud Plinium extat. Polypum hamos appetere, brachiisque complecti, non morfu, nec prius dimittere, quam escam circumroserit, aut harundine levatum extra aquam: Monstro verò propiora sunt, quæ Trebius Niger, apud eundem prodidit. Carteje, inquit, in
Plin. H. Cetariis prodire assuetus, exire in lacus eorum è mari apertos, atque ibi salsamenta populari, convertit in se custodum indignationem, assiduitate furti immodici. Sepes errant objectæ, sed has transcendebat per arborem, nec deprehendi potuit, nisi canum sagacitate: Hi redeundem circumvasere noctu: Concitique custodes expavere novetatem. Primum omnium magnitudo inaudita erat, deinde color muria obliui, odore diri. Quis ibi Polypum ex

pectasset aut ita cognosceret? cum monstro dimicare sibi videbantur. Namque & afflatu terribili canes agebat, nunc extremis crinibus flagellatos, nunc robustioribus brachiis clavarum modò incussos, ægreque multis tridentibus confici potuit. Ostendere Lucullo caput ejus dolii magnitudine, amphorarum quindecim capax, atque (ut ipsis Trebii verbis utar) barbas, quas vix utroque brachio amplecti esset, clavarum modo rorosas, longas pedum XXX. acetabulis sive caliculis urnalibus, pelvium modo: dentes magnitudini respondententes. Reliquiæ asservatæ, miraculo pependere ponde D. C. C. Quæ de alio, mercatorum res salsamentaue Puteolis depopulante, dicuntur, apud Ælianum vide.

Quantum ad usum appositos olim mensis, nullum dubium. In convivio nuptiali Sphicratis, qui Cotys Regis Thracum filiam ducebat, erant centum. Mnesimachus in Hippotropho apud Athenæum, eosdem apparat. Apud Græcos, quoque cum Ἀμφιδρόμια celebrarentur, ab amicis mittebantur. Duræ tamen sunt carnis, & ad concoquendum difficilis. Ideo ligno contunduntur, vel ad lapidem atteruntur, ut fibrosæ carnis durities frangatur. Caput suavissimi saporis esse perhibetur. Caro, si concoquatur, copiosum alimentum, sed succo crudo scatens, suggerit. Plinius muriam ex sese emittere, scribit, & ideò non debere in coquendo addi, & arundine secari: ferro enim infici, vitiumque trahere, natura desinente. Elix magis probantur quam assi. Philoxenus Dythiramborum Poëta, quod totum excepto capite devorasset, in ægritudinem incidit, & mortuus est. Idem Diogeni Cynico accidit, quod crudum † deglutivisset. Invenere & in Medicina locum. Polypo tuso & appposito sisti sanguinem, scripsit Plinius. Myrepsus in clibano cum lignis oleæ eundem urit, donec in cinerem vertit, pulveris unciam, cum dimidia Chalcanti miscet, & naribus ad tollendum Polypum insufflat. Secundum Hippocratem, tosti puerperii purgamenta purgant & bene ad concipiendum dantur, menses in vino albo suffocati, movent. Uteros molliunt, & in dislocatione eorundem bene præscribuntur. Ad Venerem stimulare, præter Diphilum, Ægine-tam, Dioclem, Alexis & Xenarchus apud Athenæum testantur. Jovius verò, fale inveteratos Venetias ex Dalmatia & Illyrico deportari, & à senibus acetabula & extremitates cirrorum, ad sobolem procreandam expeti, scribit. Causam Mnesitheus in flatuositatem, Jovius in salsedinem Aldrovandus, in feminis copiam quam suppeditant, conjiciunt.

Inimicitias cum Locusta, Cammaro, Con-

Ælian. H.
A. l. 13.
c. 8.
Athen.
Dipnos. l.
4.
Usus.

Athen.
Dipnos. l.
9.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 10.

† Plutar. l.
An aqua
igne me-
lior.

Hippocr.
l. de inter
affect. de
Natura
muliebri
&c.

Antipa-
thia.

CAPUT II.

De Sepia.

Sepia, quæ Thebanis *Opistholia*, Arabibus *Sarathan* & *Sarthan* audit, Græcis ita dicitur, non quod sepibus interclusa facilius capiatur, ut Isidoro placet, nec quod profuso atramento se sepiat, ne capiatur: sed quod atramento, veluti putrida quadam sanie, quam Græci *σπιδόν* vocant, abundet.

Descriptionem quod attinet, multas cum Polypis, plurimas cum Lolligine, communes habet, partes quasdam etiam proprias. Cum Polypo convenit, quod pinnae exiguas habeat. Angustam esse, & per totum alveum circumductam apud Aristotelem legimus, ventrem tum figura tum tactu similem. Cum Loliginibus, sortita est alveum corporis magnum, qui tamen Sepiæ latior, Loligini longior, crura breviora; pedes supra dentes senos exiguos, eorumque novissimos duos maiores, reliquos octonorem duos infra, omnium maximos, promuscides binas longas acetabulo parte extrema bino asperiusculas, quibus veluti anchoris innituntur, seque tempestate urgente modo navigii stabiliunt, venantur, & prædam ori è longinquo admovent, pedes Plinius vocat. Vulvam quoque articulatam habent, ut bifida cernatur, cum Polypi rotundum conglobarumque uterum habeant. Proprium Sepiæ est præter fistulam inter caput & alveum prominentem atramenti copia, & vel idè quàm cæteris major, quod vitam littoralem traducat, & nihil aliud quo sibi auxilietur habeat, cum Polypis & brachia, & mutatio coloris inserviat. Continet hoc non ea quam *μύτι* vocant, quam Plutarchus vesiculam collo dependentem facit, sed infra ad alveum, qua intestinum petere incipit superiora, foramenque suum eadem obvolutum habet. Vocatur hoc Galeno *δύλον* *σπιδόν* & *ὄτερον*, Nicandro *χολή*, Æliano, *ἀποσφάγμα*. Aristoteles noctu præfulgere ut quorundam piscium capita, addit. Habet & *σύντρον*, in dorso, robustum & latum, inter spinam & os, mediam præ se ferens naturam, fungosam intra se complectens & friabilem corpulentiam. Athenæus, & Dioscorides *ὄσπριον*, Columella testum vel testam vocavit. Exemtum id è Sepiæ dorso, candidum est superiori parte, durum, ac læve: inferiore autem fungosa quadam medulla repletum, quæ & leviter aspera, & ligni modo frequentibus venis distincta visitur. Germani *Fischbein* vocant. Sæpè binum cubitorum magnitudine capiuntur.

In.

Congro; & Muræna exercet. Locusta cum in tantum pavet, ut si juxta viderit, omnino moriatur, quod & Ælianus podidit. A Congris laceratur. Muræna eidem dentium firmitate brachia abscindit. Cum apud Epidaurum easdem secaret Bellonius, ventriculos cirris Polyporum refertos comperit. Immobiles manere si quis rutam conjiciat, Ælianus auctor est.

Quantum ad *Differentias* & *Genera*, variant circa ea authores. Apud Athenæum ex Aristotele & Speusippo, Hæledonem, Polypodinem, Bolbotynen, & Osmylen, species Polyporum invenies. Apud eundem Nautili & Trepichrotis fit mentio. Aristotelis hæc sunt verba, ex Scaligeri interpretatione: *Polyporum multa sunt genera. Unum genus est frequentissime summa aqua natans, quod & maximum est. Horum littoris accolæ longe sunt majores quam qui in alto degunt. Aliud genus parvorum, ii vario sunt calore, neque esitantur. Item alia duo. Nam Eledona tum peculiari crurum longitudine: tum, quia molluscorum sola singularibus tantum acetabulis prædita est. Cum bina alii habeant. Et quam alii vocant Bolitanam, alii Olen-tiam. Postremo alii duo in conchis. Unus, à quibusdam & Nautilus & Nauticus, appellatur, ab aliis autem ovum Polypi. Ejus testa pectunculo similis est, cava: neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quare à fluctibus ejicitur in aridam, ubi elapsus de Concha, aut capitur, aut in humo perit. Hoc genus & pusillum est, & simile Bolitanis. Alter in testa tanquam limax, is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Tantum Aristoteles. Quinque itaque Polyporum genera sunt, quorum duo in conchis hærent, tria, sine conchis conspiciuntur, inter quæ levem & exiguam moderni differentiam esse putant. Eledone *ἀπὸ τοῦ ἐλεῖν*, quod comprehendat, vel *ἀπὸ τοῦ ἐαυτὴν ἑλεῖν*, quod se seipsam rodant, dicitur, *ὄζαινα*, *ὄζολ*, *ὄσούλ*, à gravi capitis odore nomen habet: Osmylus adeo benè olet, ut Gylius, nihil moscosius se fensisse, etiam tum cum mortuus esset, scribat. Pollux tamen inter cirros & caput fistulam gerere, è qua tetrum emittat odorem, prodidit.*

Bolitana, quo & *βολιτίνη*, Scaligero olen-tia, vel potius Putilia dicitur. Gyliuseam, ut & *πολυπεδίνω*, nomine ab Osmylo duntaxat differre, scribit. Epicharmus apud Athenæum, mare olere ait. Non alit eam Euripus: in Laconia frequens est. Illa Menulas Sepiolasque venatur. Ad venerem plus cæteris valet. Et siccatur à quibusdam, ut vestibus fragrantiam in aquis conciliet.

Plin. H. N. l. 9. c. 30.

† Plin. H. N. l. 9. c. 62.
† Ælia. H. A. l. 10. c. 38.
† Plin. l. c.
† Ælian. H. A. l. 1. c. 32.
† Ælia. H. A. l. 1. c. 39.
Differen-tiæ.
Athen. l. 7.
Arist. H. A. l. 4. c. 2.
Scalig. edit.

Tab. I. 2. 3. 7. 8. Nomen.

Descri-ptio.

Arist. de Part. Animal. l. 4. c. 8.

† Arist. H. A. l. 4. c. 1.

Arist. de Part. Animal. l. 4. c. 9.

Plin. H. N. l. 9. c. 28.
Arist. de gen. c. 8.

Arist. de sens. & sensat.

Locus.

In Ponto nullas *reperiri* Sepias, Plinius author est. In septentrionali Oceano degere, cum sint frigida & exangues, mirum.

Aldrov. l.

x. c. 4.

Major earundem in Gallia quam Italia copia, major in Adriatico quam Tyrrheno mari. Arcestratus, eas quæ prope Abderas & Maroniam capiuntur, laudat. Littoralem tantum vitam vivere, apud Aristotelem, cavernas maris incolere, apud Oppianum habemus.

Arist. de

part. l. 4.

c. 5.

Vitus.

Arist. H.

A. l. 9. c.

37. & l. 8.

c. 2.

Genera-

tio.

Plin. H.

N. l. 9.

c. 31.

Arist. H.

A. l. 15.

c. 17.

Scal. edit.

Vistitat pisciculis, sæpe & mugile, quem longis promuscidibus venatur. Aliquando & majores pisciculos vincit.

Generatio sic perficitur. Coeunt corpora inter se amplexæ, adaptantesque mutuo ex adverso narem (*μυστήρα*) & brachia, quod ore coire & lingua Plinius falso dixit.

Vere uterum foemina gerit, continet partum diebus quindecim: Ova statim candida specie grandinis: magnitudine myrtillorum grandiusculorum. Editis superinfundit de suo atramento. Itaque & nigra fiunt: & quasi glutino hærescunt inter se ad racemuli figuram. Mas quoque genituram suam effundit, qua illa & nigriora & duriora fiunt, atque augescunt uvæ ad acini magnitudinem: Ex candida fit Sepiola, exitque die quinto decimo cute obrupta, exitque in caput & ventre annexo, ut aves.

Quamquam nexus ille umbilici nondum satis constat. Crescente itaque Sepia, decrescit albumen, ut in avium ovis vitellus, actandem deficit: Oculi Sepiolarum ut in cæteris quoque animalibus grandissimi. Perfecta jam Sepia cum est egressura, se membranula secare occipit. Sepiola perterrita & stercus edit, & rubescit. Parit verò juxta terram inter arundines & sicubi enata alga, aut aliud quidpiam è mari ejectum, ut materia farmentorum aut lapides. Bimatum non complere Aristoteles prodidit.

Arist. l. c.

Plin. H.

N. l. 9.

c. 51.

Arist. l. c.

Sexus

Arist. H.

A. l. 4. c.

l. 5.

c. 12.

Sexus dignoscuntur facilè. Mares prona sui parte nigriores sunt, partes omnes asperiores habent, & lineis intervenientibus varias, caudam etiam acutiorem. Foemina intestina continet duo veluti mammas, quæ alvo dissecta facillime conspiciuntur.

Inge-

nium.

Plin. H.

N. l. 9. c.

29.

Arist. H.

A. l. 9.

c. 37.

Plin. l. c.

Ælian. H.

A. l. 1.

c. 34.

Philos in

Iambis.

Ad *Ingenium* pertinet, quod percussæ tridente foeminæ auxiliatur mas: at foemina iecto mare fugit: quod soli suo utitur atramento, non solum cum metuit, sed & abscondendi causa: quod ambo ubi sensere se apprehendi: effuso eodem, quod pro sanguine his est, infuscata aqua abscondantur: quod à collo acetabulum instar funiculi, quo hamus dependet, demittit, & pisciculis mordendum exhibet, eodemque retracto prædam ad se adducit: quod denique tempestate urgente, propriis scopulis devincta flagellis hæret, & nativos dura connectit cute rudentes.

Ufus.

Habent ut olim ita & nunc in *Cibis* lo-

cum. Nam & cum Amphidromia celebrabantur, mœnas cum Sepiis mollire, & plurimos cirros diligenter stringere solebant, & in Ipsicratis nuptiis, assarum fit mentio. Optimæ putantur gravidæ, mensibus inprimis Januario, Febuario, & Martio. Elixantur magna ex parte, assifque præferuntur. Majores sale conservantur in Illyride, indeque Venetias deferuntur, ut & Genua Mediolanum. Ad Venerem ciendam quidam cum nucibus adhibent. Ova in siccum ejecta nonnulli in sartagine coquunt. Sethi difficulter concoqui, parumque in se continere succi, scripsit. Est & in *Medicina* earum *Ufus*. Ad dentium dolorem, cum ovorum putaminibus & oleo miscet Galenus. Hippocrates in morbis mulierum sæpissimè præscribit. Celsus & Dioscorides atramentum alvum emollire produnt. Ova urinam movent teste Plinio. Marcellus ad tincturas & maculas corporis abolendas ex iisdem remedium facit. Dentifriciis aptissimum est os Sepiæ; quod & thoracis vitiis cum aqua potum prodesse Gesnerus scribit.

De Differentiis nihil occurrit. Rondeletius pisciculum hunc, quem ita descripsit, Sepiolam vocavit. Sepiæ, inquit, nascenti similis est, pollicis crassi magnitudinem non superat: octo pediculis constat: duas proboscides habet, nec sepium in dorso, nec gladiolum habet: utrique lateri pinula, veluti ala parva affixa est, rotunda nec figura, nec situ pinnis Sepiarum & Loliginum similis, &c. Colore est vario, parvulus enim punctis in dorso notatur. Ore, oculis, fistula, partibus internis à Sepia non differt. Carne est molliore.

Differ-
entia.

CAPUT III.

De Loligine majore & minore.

Loligo major *τεῦθεν* Græcis, Gazæ Lolium, Gallis Calamar, à thecæ scriptoriæ similitudine, sive quod in ea reperiuntur, quæ ad scribendum necessaria sunt, dicitur. Minorem *τεῦθιδά* vocaverè. Quænam cum Polypo & Sepia communia habeant, capite de Sepia explicatum est: hoc solum addimus, Loliginum promuscides, Ligulas vocari Apulejo; id verò quod durum ac solidum intus per corporis prona continetur, *εἰς* seu gladiolum dici. Differunt à Sepia, quod alveum, quem Aristoteles *νοστήαν*. Athenæus *ζωμύτιον* vocat, longiorem habeat: & bina quidem conceptacula gerat, quæ ventris ferunt speciem, sed alterum minus ingluviem imitetur & tactu discrepet, quoniam & Corpustotum carne molliore constat. Quin & præter atramentum, quod prope mutim habet, gerit

Tab. r.
4. 5.
Nomen.Apul.
Apol. 1.

gerit & succum purpurascens, ^{αἶμα} Athenæus vocat, Oppianus ^{εἰσπράσσειν} Gladiolus autem, quem Athenæus ^{ἰσπράσσειν} dixit, cartilagineus est, pellucidus, & ab uno parte cultrum, ab altera calamus referens.

^{Aldrov. de Mollib. l. 1. c. 6. Descriptio. Bellon. de Piscib. l. 2.} Aldrovandus crystalli instar splendidum depinxit. Peculiarem *descriptionem* si attendas, Teuthos, describente Bellonio ipsa quidam Loligine major est, ut cubitorum interdum quinque esse, inquit Aristoteles. Exteriore quoque corporis nota aliquantulum à Loligine discernitur. Pars enim Lolii, quæ exit in acutum, in Loligine latior est. Quin etiam pinnulæ totum Lolium ambiunt, junctæ perpetuæque, quæ alioquin in Loligine partem aliquam relinquunt. Minus autem accedit ac Polypum quàm Sepia. Nam corpus ei oblongum est, cartilagineum, duabus pellibus obductum: *gladium* arctiorem & magis cartilagosum in tergore continens, translucidum vitri modo, tenui theca inclusum: rostrum aquilinum, psittaci figura. Sed eodem modo *atramentum* quod Sepia emittit, & cirros octonos habet, breves tamen: in quibus tot *acetabula* conspicias quot in Sepiis. Ac præter illos octonos duo quoque longa flagella, seu promuscides, multis in extremo acetabulis circumfessa videbis. Hæc acetabula præter Sepiarum & Polyporum morem, tribus introrsum ossibus aculeis robustis, in gyrum munita sunt. Latas in gyrum diffundit pinnas: à cujus ore corneo gula prætenditur angusta, & usque ad stomachum longa, quem habet amplissimum, atque adeo ingluviem, quæ hunc præcedit. *Loliginis minoris* descriptionem, quæ ferè nihil ab ista differt, vide apud eundem.

^{Locus. Arist. de part. l. 4. c. 4. Athen. l. 7. Dipn. Plin. H. N. l. 9. c. 15. Idem. l. 9. c. 30. Victus. Generatio. Plin. l. 9. c. 5. Arist. de gener. l. 3. c. 8. Plin. H. N. l. 9. c. 3. Plin. H. N. l. 9. c. 29.} *Reperiuntur* in profundo † mari, etiam propè † Eubœam, quin & in Ponto, in quo nulla Sepia. In nostri mari, inquit Plinius, quin & cubitorum capiuntur. *Victitant* piscibus: nec à Cancris Paguris & Astacis abstinent; diligenterque, quicquid in stomachum dimiserint, rostro, quod robustissimum habent atterunt.

De *Coitu* idem in Loliginibus occurrit, quod in Sepiis diximus. Pariunt in alto, & conferta ova edunt. Apparent hæc gemina, quod vulva earum ita articulata sit, ut bifida cernatur. Neque his bimatu † longior vita. Mas à foemina differt, quod intus meatus duos habeat, quibus mas caret, sicuti in Sepiis evenit. Non tantum suis pinnaculis natant, † sed etiam iisdem extra aquam se efferentes volitant: & sæpè tanta multitudo, ut, quod ex Trebio Nigro Plinius prodidit, navigia quoque demergant. Dum volitant tempestatem prænunciant quod caro ipsarum nuda & glabra, frigoris quoque sit impatiens, ut Plutarchus prodidit.

Ufus Loliginum ut olim in Cibis fuit, sic nunc est. In cœna lauta appositos Phecreates apud Athenæum testatur: Scholiastes Aristophanis, & Suidas inter viles reponunt. Præferuntur gravidæ, & quas Ambracia dedit, Romæ mensibus frigidis laudantur. Et assarum, & in sartagine coctarum, Athenæus meminit. Antiphanes farcta delectatur. Deterius jus sine atramento confici opinantur. Quomodo sapidiores reddantur, vide Aldrovandum. In *Medicina*, stomachicis convenire in cibo apud Galenum legimus. Torminosi assatâ prodesset Marcellus Empiricus prodidit.

Ufus.

Galen. de Comp. sec. gen. l. 1.

CAPUT IV.

De Lepore marino.

LEPUS marinus, Græcis ^{λαγώς}, & ^{λαγώ} ^{δανήσιος}, à colore leporis terrestris, quem ^{ἐμπέριον} vocant, nomen sortitus est. Monspelienses ebrium vocant, quod vivus colore ex rubro nigricante sit, quali plerumque ebrii conspiciuntur. Mortuus ex fusco albicat.

TAB. I. 6. Nomen.

Variè à veteribus *describitur*, qui eum modò ossæ informi, ut Plinius, modò cochleæ testa exemptæ ut Ælianus; modò Loligini parvæ, carneam si respicias, ut Dioscorides: assimilarunt. Apulejus cætera ex ossæ, duodecim tamen numero ossa ad similitudinem talorum suillorum connexa & catenata gerere, reliquit.

Descriptio. Ælian. H. A. l. 2. c. 45. Apulej. in Apologet.

Rondeletius *tria genera* descripsit. *Primum genus* maximè lethale est; cochleæ nudæ admodum simile, maxime posteriore corporis parte. Os habet in dorso veluti Sepia, volutæ instar contortum, qua parte caudam spectat; in lateribus Sepiarum modo pinnas habet alveum ambientes replicatas: mox cornicula duo carnosæ, quæ sunt in cochleis, altera tantum capitis parte Zygenæ caput imitatur: altera parte foramen est per quod carnosam quandam substantiam exerit, quam etiam pro arbitrio retrahit. In harum duarum partium medio rima est pro ore, *atramento* & reliquis partibus internis loliginem refert. Idque in hoc genere est mirabile, quod cum in omnibus animantibus partes sinistræ dextris similes sint, in hoc sint valdè dissimiles, ideò ossæ informis meritò dicitur. Odore est Pisculento retroque. *Alterum genus* superiore est majus, partibusque & aliis superiori simile, sed parte priore duas latas appendices carnosas habet, in quarum medio rima est. Paulò infra cornicula duo, quæ in superiore descripta sunt, nisi quod acutiora & breviora sint. In dorso os nullum, neque posterior pars, cochleæ exenteratæ similis est.

Differencia.

b

Hujus

Hujus posterioris partis utroque latere, veluti in Sepia pinnae sunt magis replicatae & expansae. Tertiū generis prona & supina pars exhibetur. Quod in partis supinae medio conspicitur, est os: Supraposita ori pars alveus, qualis in Sepiis, ovi figura, sed in ambitu crenatus. Ori subjecta pars membrana est tenuis, carnosā, magis expansa in rotundum, cujus ora fimbriata est, fimbriae nigrae sunt. Intus cerebri nigri parum est, gulam excipit ventriculus, ex quo oritur intestinum instar capreolorum vitis convolutum. In medio substantia quaedam est fungosa, succum fuscum continens, fortassis cum atramento suo. Toto corpore est splendido: Crystal- lum vel pituitam concretam congela- tamque dixeris. Odore est ingrato & pi- sculento nauseamque movet. Hoc genus Bellonius pro communi lepore descripsisse videtur. Fulvum inquit leporis teristris colorem imitatur. Pulmonis marini more per mare divagatur tametsi pinnis careat. pellucidum habet corpus ovi anserini ma- gnitudinem non excedens, quod pro lubi- dine huc & illud transfert. Septem habet appendices innumeris promiscidibus sti- patas ex Indico in cyaneum vergentes, qui- bus sugendo corpori alimentum suggerit: appendicum autem substantia fungosa est. Ex aqua emergens naturam suam emittit, & in seipsum concidit. Linguam demorsus vellicat ut ari radix, paulo tamen remis- sius, &c.

Ælian. H. A. l. 16. c. 19. Addit Ælianus & Indicum, quod ex omni parte ad terreni leporis similitudinem accedit, præter pilos, qui spinosi & erecti. Tertium illud genus in alto mari degit, ideoque rarissime capitur. Primum in sta- gnis marinis lutulentis, & alga limo- que vescitur. Frequentes inter cycla- das insulas occurrere Bellonius prodidit. Dari in hoc genere marem & foeminam apud Plinium habemus. Cum ad Ronde- letium delatus esset qui lingula carnosā ca- reret & ore in dorso, marem esse judica- vit, primo loco descriptam foeminam, quod in ea Polyporum ovis simile quid reperi- retur.

Ufus. Galen. l. 11. de sympt. Adhibitus est in Medicina olim. Galenus & Plinius inter Psilothra referunt. Archi-

genes ad ægyloas lanæ tomentum san- guine leporis marini tinctum indit. Jubent quidam & lepore marino recenti poda- gram fricari, prodente Plinio. Venenatum esse certissimum est, eum inprimis qui in Indico mari. Eo Titus à fratre Domitia- no sublatu est, & Plinius ait. Non sunt minus mira quæ de lepore marino tradun- tur. Venenum est aliis in potu aut cibo da- tus, aliis etiam visu. Hic quaedam gravidæ si aspexerint foeminam duntaxat ex eo ge- nere, statim nausea & redundatione vi- tium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio est mas induratus sale, ut in brachialibus habeant: eadem res in mari & tactu quidem nocet. Alibi tamen, mor- tem sæpe inferre, & si nihil aliud ventrem doloribus acerbissimis torquere scribit: quod & Ælianus prodidit. Quæ de mulieri- bus dicta sunt, à Rondeletio experto con- firmantur, sed remedii non meminit. Sym- tomata quæ insequi solent, egregie vetustis- simus Poëta descripsit.

Plin. H. N. l. 32. cap. 1.

Ælian. H. A. l. 2. c. 24.

Nicand. in Alexi- phar.

Post bibitum hoc virus viridis stagnantia
fellis
Excrementa, manent, tenebroso lumina
visu,
Calligant, liquida abeunt in corpore car-
nes:
Nausea adest, tumet alta cutis, talique cale-
scunt:
Subque cavis oculis roseo fucata rubore
Apparet facies, sistensque urina moratur,
Qua nunc purpureo, nunc sanguineo esse
colore
Cernitur, & quemcunque videt contemnere
piscem
Assolet adversans, ut qualibet aquoris
ager.

Hinc patet vix pulmōni propriè infe- stum, cum tot affectus sumpto eo oborian- tur. Fatendum tamen plerumque tabem invadere. Alexipharmacorum quæ contra adhibentur haud paucus est numerus. Ex- hibetur primò helleborus niger, hinc lac- asinum inprimis: nec non decoctum mal- vae, & alia de quibus Aldrovandum vide. Rondeletius mulieri quæ nauseam ex odore conceperat, cancrorum usum præscripsit.

Aldrov. de Moll. c. ult.

HISTORIÆ NATURALIS DE EXANGUIBUS AQUATICIS.

LIBER II.

De Cruftatis.

TITULUS I.

De Cruftatis in genere.



U^æ Cruftata Plinio, illa Latinis aliis Cruftacea, quod molli crufta operta ſint, Græcis *μαλακόστρακα*, eandem ob cauſam dicuntur. Medium inter Teſtacea & Moluſca ſortita locum videntur. Nam quatenus foris cruſta, etſi fragili & tenui obteguntur, cūm teſtaceis conveniunt: quatenus molle carnoſumque intus continent, Molliſbus comparantur.

Oſſibus carent, quod oſſa juncturis indigerent, ut Cardanus ſcribit, nec ſub cruſta extendi poſſent. Communes iſſis cum cæteris exanguibus partes, Caput, Alveus, Gula, venter, & inteſtinum. *Alveus* totius corporis indiſcretus eſt: nec *caput* diſtinctum, nec aliud quicquam. Ideo ea Gale- nus capite truncare voluit: quod cave de Caudatis accipias. *κεφαλὴς* iſta dicuntur, non tam quod magnum caput habeant; exiguum enim hoc quā quod maximum inter cætera cruſtata. Et videtur Athenæus apud quem iſta leguntur *κεφαλὴν* catachreſticè pro thorace & capite ſumere. In capite *Os* eſt quod protinus ventrem in omnibus, præterquam in Locuſtis excipit, mox à ventre inteſtinum. Exiguus iſ, ſi proportionis in corporum magnitudine ratio habeatur: hoc, ſimplex uſque ad exitum excrementi de- jicitur. *Dentes* in ore habent duos priores, & quia hi ad exactam ciborum contritionem non ſatis, quod intima corporis penetrare queat, tres, in ventriculo, altrinſecus ſingulos, inferius tertium. Longi qui in ore & tegmine duplici operti, inter quæ talia quædam interjacent qualia locuſtarum dentibus annecti ſuo loco dicemus. Intra hos binos dentes carnoſum eſt illud, quod linguae proportionem ejusque effigiem gerit. Supra *os Oculi* ſiti ſunt, iique duri omnibus, apti intrò, foras, & in obliquum & quidem celeriter moveri, ideò palpebris carent:

Cardanus in latus moveri ait noſtri com- paratione, directè autem oꝝulorum ſuo- rum. Melius enim eſſe ut altero utrinque proſpiciant etſi diverſis oculis, quā utro- que ſimul nec ante nec poſt. Prominere au- tem quia à lateribus: quia aliter antè penitus proſpicerent: à lateribus autem collocari, quia ſi ſupra caput non viderent, ante verò non poterant, quia os infra reponere ne- ceſſarium fuiſſet, quia caput habent immo- bile: neque ante ſimul os & oculos eſſe, quo- niam oportuiſſet eſſe latam faciem, unde in motu etiam tardiores evaſiſſent. *Caput* etſi exiguum, appendicibus tamen & corni- bus munitur, quæ & ad pugnandum & ad prætendandum iter data ſunt. *Pedes* omni- bus octoni, omnes in obliquum flexi. *Brachia* forcipibus denticulata ſunt bina, quæ Græci *χῆλας*, Apulejus furcas, alii nomi- ne Græco ſervato Chelas nominant. Ho- rum pars ſuperior in primoribus hiſ, ut lo- quitur Plinius, movetur ſuperiore immo- bili; hiſque pro manibus utuntur, & con- tra quam pedes flectant. Omnibus magna ex parte grandior & validior dexter, quā lævus *forceps* eſt. *Caro* colore ſanguinis ru- bra & tactu lento. In alveo humor eſt palli- dus, & minuta quædam oblonga & albida, ruſſa etiam alia maculis diſperſis. *Papaver* eis parcius branchior. annexus commu- nis. *Tabellas* quidam Latini vocant quas *αλπίνας* Ariſtoteles, quibus cor cruſtæ co- agmentantur. *Lapides* ſub cruſta genitos re- fert Cardanus, de quibus in Cancris agemus.

In ſtagnis potius marinis & juxta am- nium oſtia, ſaxorum foraminibus & limo- ſis locis morari ex Ariſtotele & Athenæo habemus. Lapillis, alga, limo & ſtercore vi- ſitant: nec à carnibus abhorrent. *Coëunt* more eorum quæ in averſum mingunt, in- eunte vere, & cum ſicus matureſcunt, propè terram, & quidem quod exanguia ſint & naturæ frigida, diutiſſimè. Fœmina o- vum rubidum, membrana prætenui obvo- lutum, ventri, lateri, & utrinque inteſtino annexum, & ad carnem uſque adhærens parit. Imperfectum illud, quod foris editum, incrementum capiat. Diverſi- tas *Sexuum* ex nonnullis conoſcitur. Ma-

Plin. H. N. c. 9. c. 31.

Ariſt. H. A. l. 4. c. 2.

Locus. Ariſt. de Gener. l. 3. c. 11. & Athen. Dipno- ſoph. l. 3.

Genera- tio. Ariſt. de Gener. lib. 1. c. 11. & 14. Ariſt. H. A. l. 4. c. 2. Ariſt. H. A. l. 4. c. 2. uli.

Bellon. A.
quartil. l.
2. c. 3.
Genera-
tio.
Arist. H.
A. l. 5. c.
17.

rare, & cibos ore terere, quod oris constitutio & gulæ angustia ostendit, observavit Bellonius. *Vita* omnibus diuturnior. De *Generatione* ita Aristoteles: In genere crustatorum locusta post coitum impletur, & continet ova circiter menses tres, Majo, Junio, Quintili. Deinde edit ea sub ventre ad plicaturas: ubi crescunt, quomodo solent vermiculi. Id quod commune est & molluscis & piscibus oviparis, ut omnium ova crescant. Locustarum igitur ovum est solutile in arenæ modum, octo in classes partitum: pro numero scilicet cooperculorum, quæ lateri adhærent. Quorum singulis cartilagineum quiddam adsitum est: circum quod hærent cumulata specie rami: unumquodque enim horum cartilagineorum in plura scinditur. Quod deprehendas, si diducas: sin aliter intueare, unum corpus concretum putes. Grandissimum quodque non est ad foramen, sed ad medium: postrema autem minima. Minimis magnitudo quanta fici granulo. Neque continuo ipsi meatui hærent, sed medio. A cauda namque ad pectus, duo, singula utrinque sunt potissimum intervalla. Sic enim etiam coopercula ipsa disposita sunt, ut à latere tegere non possint. Quare extremitatibus suis imposita cooperculi modo contegunt omnia. Videtur autem parturiens producere ova ipsa ad illa cartilaginea caudæ applicatu. Comprimens enim sese atque statim curvans parit. Cartilaginea hoc tempore augescunt ita, ut ovorum ipsorum capacia esse possint. Nam ad cartilaginea pariunt sicut Sepiæ ad malleolos, aut alia quæ fluitant. Is est pariendi modus. Concoquit autem ibidem potissimum vicens diebus. Tum abjicit cuncta simul consistentia sicut cum ejecit, videntur: inde ex his locustæ oriuntur die ferè quinto decimo: capiunturque sæpè numero minores digito. Ante Arcturum pariunt; post Arcturum amittunt ova. Hucusque Aristoteles.

Arist. H.
A. l. 4. c.
2.
Sexus.

Sexus differentia in eo consistit, quod foeminæ primus pes bipartitus sit, mari continuatus uno ungue. Foemina quoque pinnulas quæ subtus sunt magnas habet, sed collum versus decrecentes. Mas omnes æque minores. Maris etiam pedibus postremis quasi calcaria quædam sunt: eaque tum magna, tum acuta, foeminæ ejusmodi pars parva & inoffensa. Rondeletius addit in caudæ supinâ parte foeminam habere appendices duplicis pinnis similes, ad contegenda & conservanda ova; mari simplices & parvas. Vulvam bifurcatam habere, Aristoteles testis est.

Arist. de
Gener. l.
3. c. 8.
Motus.
Bellon. A.
quartil.
l. 2.

De *Natatu*, pedes anteriores, in eo qui majores sunt moveri Bellonius negat, sed pinnulis quas partim sub cauda gerit, partim in extremo ejusdem, tum quaternis

reliquis pedibus natare asserit. Cum nullius rei metu afficitur anteversus progreditur non prætensis sed obliquatis ad latera cornibus, ne aqua contra natantem ruens reprimat cornua, & ulterius progredi prohibeat. Retrocedens in metu, demittit & laxat eadem, & tanquam remis altius demissis Scapham propellens, multum itineris conficit. Latent mensibus quinis, & more arietum cornibus dimicant. Lædi non posse nisi sub cauda tradit Rondeletius.

Ælian.
H. A. l.
9. c. 25.

Antipathiam si attendas, tantum Polypum pavet, ut si juxta viderit omnino moriatur. Murænam eadem aggreditur, & ex victa prandium instituit.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 30.

Antipathia.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 30.
Ufus.

Usum in Cibus si spectes, Collimædon idè Carabi accepit nomen quod hoc cibi genere impense delectaretur. Eliguntur gravidæ & tempore plenilunii. Præferuntur in Italia ab Octobri usque ad Aprilem: præferuntur & maximæ, quales capiuntur in mari Indico, & circa Africæ quoddam littus loco petroso, ut scribit Synefius. Plus carnis habent quàm Cancris, ut Diphilo Siphinio apud Athenæum visum, difficulter concoquuntur, sed admodum nutriunt falsi humoris sicci que participes, & si aqua dulci sæpius coquantur, ventrem cohibent. Condituras vide apud Aldrovandum. *Usum in Medicina* quod spectat, Hippocrates puerperæ ut melius purgetur præscribit. Simeon Sethi testas combustas ac cum meraco vino potas renes calculosos expurgare scribit.

Hippoc. l.
de morb.
mulier.

ARTICULUS II.

De *Astaco*.

PUNCTUM I.

De *Astaco marino communi*.

Astacus ex sententia Rondeletii, quasi *ἀστᾶκος*, id est; non destillans sed abundè fluens dicitur, quod tubercula plurima, tum alba tum purpurea guttarum, sive lachrymarum specie forcipibus inspersa habeant.

Tab. II.
2.
Nomen.

Est vel marinus vel fluviatilis. Ad eum Leo seu Elephantus Plinii, & istæ quem hic descripturi sumus pertinet. Est autem Astacus colore toto nitido, sed nigrizia insperso. Pedes inferiores grandes, ad octo usque habet: ab his grandes ipsos duos multò majores & mucrone latiore, quàm locusta, sed specie diversâ. Dextri namque summum latum oblongum tenue est: sinistri crassum & teres: utriusque verò bipartitum ac quasi mandibula cum dentibus infra supraque. Quanquam dextro dentes ferrati sunt omnes, alterius primores ferrati: at interiores tanquam molares. Inferiorum

Descriptio.

Arist. H.
A. l. 4. c.
2.

ordo quaternis æqualibus, superiorum terminis inæqualibus expletur. Movent partem superiorem utrique, & ad inferiorem premunt: ac valgi quidem sunt situ inferiore, tanquam à natura destinati ad protendendum & premendum. Supra hosce duo alii hispidi paulò infra os. Mox haud longè infra, branchiæ circum os multæ & hispidæ, quas assidue motat. Hi pedes qui ori præstò sunt, extantibus quibusdam tenuibus barbulis asperantur. *Dentes* duos habet ut locusta: supra hosce cornicula breviora ac tenuiora quam locusta. Tum alia quatuor eadem specie, sed breviora & tenuiora, super his oculos pusillos breves. Prominet *pars* cui subsunt oculi, acuta & aspera quasi frons, major quam locustis. Omnino facies acutior, pectus autem latius: totumque corpus carnosius ac mollius quam locustæ. Octo *pedum* quatuor bifidi, quatuor non: quod collum appellatur, quinque in partes divisum est extrinsecus. Tum est sexta pars lata quinque producta plagulis. Hactenus Aristoteles. Gesnerus Chelam faciem hominis ridiculam repræsentantem exhibet. Nam Chelæ pars minor maximum & aquilinum nasum refert: & quæ in utriusque partis confinio apparent verrucæ, oculos, si supercilia addantur. Superiorem partem quatenus seu cornicula quatuor supra nasum & frontem eminent, cæruleo aliove colore si pictor inducat, ad repræsentationem pilei auriti & ad latera descendentes, ita tamen ut aures lateant: retrò & circa tempora pili prominent nigri. Facies partim albo inducatur pigmento, partim roseo fuco niteat. Linguae instar partis chelæ majoris tubero rubicundo colore insigniantur. Quòd si cristam quoque è pennis præsertim gallinacei, capi aut pavonis nutantem, foramini summo indideris, planè Gorgoneam & terribilem habebis faciem.

Locus.

Oppian.

Halieut.

l. i.

Arist. H.

A. l. 5. c.

17.

Genera-

tio.

Ælian.

H. A. l.

8. c. 22.

Ælian.

H. A. l.

6. c. 22.

Ufus in

Cibis.

Nunquam non in Oceano frequentes: in Euxinio tamen nulli. In saxis habitare Oppianus prodidit: Aristoteles in terrenis. Circa Thasum & Hellespontum nascuntur. Coeunt eodem modo quæ cætera crustata. Mas foeminaque nulla nota insigni inter se differunt. Nam utriusvis utramlibet forcipem majorem deprehendes; quanquam utramque æqualem unquam neutri. Ore mare excipit, cum locustæ ad branchias transmittant. Sine humore longius à mari deferri nequit: & tam est loci patrii amantissimus, ut non longè deportatus, eodem adrepat. Polypum extimescit.

Quantum ad *Usum in Cibis*, optimi illi apud veteres qui in Methymna capiebantur. Omnes difficulter coquuntur, & tardè descendunt: ritè confecti & præparati non imbecilliter alunt. Mnesitheus assos elixis prætulit.

PUNCTUM II.

De Leone seu Elephanto & Astaco
parvo Rondeletii.

CRustatum quòd hic descripturi sumus, Tab. II. Nomen Leonis vel à magnitudine, ut Aldrovando videtur, vel à colore flavo, quo vivus conspicitur, ut Rondeletio placet, fortitum est: Bellonius cum Elephanto Plinii idem facit, quòd eadem sit Leonis apud Ælianum & Elephantum apud Plinium descriptio.

Corporis specie Astaco affinis est, sed brachia longiora habet, forcipes tenues & latiusculos; quorum scissura major, quam in ullo alio Crustatorum genere. *Pedes* tres qui proximè brachia sequuntur, longiores sunt, aculeati, in calcaria terminati: ultimus exiguus brevis & tenuis, neque aculeis, neque pilis munitus. Præterea ab Astaco dorso aculeis differt, quibus cum locusta convenit. Utrunque *cornua* duo longissima tenuissimaque habet, item alia in fronte brevia, inter quæ unum in fronte eminent acutum, neutrà parte ferratum: hæc sunt oculorum propugnacula, qui cornei sunt & prominent. *Corpus* totum undulatum est, instar panni ex hircorum camelorumque pilis contexti. *Cauda* perinde ac in Astacis in pinnas quinque desinit, sed lineis magis distincta. Scaliger unum vidit, cujus brachium puerilis brachii magnitudinem æquabat, quantum & ille quem Aldrovandus Brundusio sibi missum describit, habebat. Plinius Elephantum suum nigrum esse vult, id est, violacei exsaturati coloris. Nam *μαύρος* Græcè de nigro, ut de Æthiope, & cæruleo, ut de mari dicitur. *Forcipibus* adeò valent, ut observatum sit, Massiliæ vulpemper totam noctem, ab uno detentam fuisse.

Apponuntur lautis in Italia convivii. Ælianus, adipem squalidæ & infuscatæ faciei nitorem afferre, reliquit.

ASTACUS parvus marinus Rondeletii Tab. II. 6. semper est parvus. *Corpus* ei vivo rubescit, alioqui lineis cæruleis transversis variatum. *Capite* & thorace est rotundiore quam fluviatilis, in lateribus inciso. E capite eminent *Cornu* latiusculum, magnum si totum corpus spectes, utrinque ferratum, inter oculos situm, quas recondit & exerit. Cornua quatuor oculis præfixa sunt, dum & breviora cornu ferrato viciniora, alia duo multò longiora, flexibilia, articulata. Chelam utrinque unicam habet denticulatam, quaternis articulis connexam. Utrunque pedes sine forcibus. *Collum* tabellis constat, & in pinnulas desinit. Sub cauda appendices sunt ovis reponendis destinatae.

PUNCT-

PUNCTUM III.

De Cammaro seu Astaco fluviatili &

TAB. II.
TAB.
III.
Nomen,
Descri-
tio.

Astaci fluviatilis Galeno *αἰμακίδης* Athe-
næo *καμαράς*. modernis Græcis Carani-
des & Caranidia dicuntur.

Circa eorum *Descriptionem* non est quod
multum laboremus, hoc tamen poni po-
test. Venterculum mutim undique ambi-
re, quam quidam stercus esse credunt, Bel-
lonius hepar, sed falsò, quod hoc solis
sanguineis datum sit: Eundem tam miro
artificio fabricatum, ut etiam in ejus fun-
do alterum os comperias suis maxillis &
dentibus refertum. Utrunque etiam spira-
culum seu foramen sub cortice ad latera oris
videas, per quod aquam ore acceptam re-
ferunt. Branchias habere ex Aristotele
Gaza & Rondelerius prodidere. Philoso-
phus enim *βραγχιασδὴν*, hoc est, partis branchiis
similes dixit.

Gesnerus cirros potius esse judicat, ad
motum progressionis natationisque à natura
datam, vel ne aqua introrsum penetret.
De *Lapidibus* memorabilia prodidit Hel-
montus, quæ sequuntur. Per plurimas
inquit atque uniformes cancerorum discre-
tiones ista comperi. Inprimis stomachum
cancris esse in capite propè verticem. Ma-
res enim quotannis ægrotare incipiunt, à
mensis Junii medio: foemellæ dein in Julio
ante testarum exuvium. Sunt enim per
dies novem & amplius velut semiexanimis
ac immoti. Qua tempestate stomacho il-
lorum exterius obducitur membranula no-
va, inter quam & stomachum veterem, est
liquor quidam lacteus, qui sensim exterius
in globum stomachi convexum, qua parte
attingit, obducitque stomachum veterem,
contrahitur utroque latere in concavum,
statimque lapidescit. Interim ne tunc nec
multò post cancer esitat quicquam. Ideo-
que (penè incredibile) vetus sive interior
stomachus, sensim in mucilaginem alimen-
tariam absumitur: exteriorque ac novus
alter stomachus, in vicem absumpti, suc-
cedit. Siquidem isti lacti, ad stomachi
veteris convexum subnato, obtenditur sta-
tim pellicula, per modum lacti tepenti so-
litum: crescitque lac istud, inter utramque
præfatam membranam, utriusque scilicet
stomachi. Quæ cuncta ducentis fortè can-
cris dissectis, dietim observavi, jucunda
admiratione. Tandem residua pars lactis,
cancro cedit in alimentum. Nihil autem
cancer edit, aut in ejus stomacho reperitur,
quantisper isti lapides sunt in stomacho
ejus, vivitque circiter xxv i i. dies tam
ex veteri suo stomacho, sensim absumto,
quam ex usu resolutorum postea lapidum.

Helmont.
de Lithiasi
cap. 7.

Hucusque Helmont. Albertus plenilunio
crescere putat.

Reperiuntur passim in fluminibus, la-
cubus, & rivis. In Pannonia tam frequen-
tes ut Julius Alexandrinus sæpe supra tri-
ginta currus Astacis onustos, in foro Gam-
mario Viennæ numeravit. In Hispania
non haberi affirmant quidam.

Locus.

Vitant cadaveribus, & carnibus, &
quidem his adeò delectantur, ut in Danu-
bio de navibus suspensis, magna multitudo
adhæreat. Ranas quoque appetere, Al-
bertus testatur, & nos experientia compro-
batum habemus. Per tredecim dies vivum
absque cibo conservavit Gesnerus. *Sexus*
notis distinguuntur. Mares in ea parte
quâ corpus ad caudam continuatur subtus,
quatuor longas prominentes virgulas ha-
bent, quibus foeminæ destituuntur. Cau-
da etiam illius, rotundior, planior & spif-
sior; tenuis, vacua, & lata hujus, major-
que tabellarum in eadem distantia.

Vitus.

De *Generatione* hoc sciendum, Marem
in coitu primò supra dorsum foeminæ ascen-
dere, mox se istam supinam vertere: per
solam meatuum applicationem coire: mem-
bro enim quod alterius corpus ingreditur
destituuntur: Ova per anum, per quem &
excrementa reddunt, parere: & sæpe mi-
nimòs Astacos caudæ matris adhuc adhæ-
rentes conspici. Albertus ova foeminæ
primò in corpore valdè compressa esse, dein
paulatim exire & virgulis curtis sub cauda
donec complectantur adhærescere, scripsit.
Hyeme mensibus quinque *latent*, si com-
munem opinionem sequaris. Aliqui enim
tum etiam apparere ac ad litora prodire;
æstate ad optatas aquas gregatim concede-
re dicunt. Novilunio emaciantur, pleni-
lunio pinguescunt.

Genera-
tio.

De mirâ quædam inter Cancros & par-
vos *Antipathia*, sic Helmontus: In Mar-
chia Brandeburgica locupletissima est can-
crorum piscatio. Vectores autem cogun-
tur noctu excubias agere, ne fertè porcus
aliquis vel leviter subter currum transcur-
rat. Nam id si contigerit, manè quotquot
cancris, in curru fuerint inveniuntur mor-
tui. Tam exitialis est porcus cancro.

Antipaa-
thia.

Dividuntur in *Minores* & *Majores*. Illi,
quod sub saxis degant, saxatiles dicuntur,
parte supinâ albicant, pronâ nigricant, eli-
xi non undiquaque rubescunt. *Majores*,
rotundiori sunt magisque crenato in Pado
corpore, quàm in squama, cujus dexter
per sinistro tenuior est.

Diffe-
rentiæ.

Locum in *Cibis* habere, omnes norunt,
quamvis etiam difficilioris concoctionis
esse certum sit: quia & longiore in ventri-
culo morâ, mandatis frigidis & humidis in
caput vaporibus, soporem inducunt. Mar-
tio & Aprili mensibus à quibusdam com-
mendantur, lunâ inprimis accrescente. Ve-
næ

Ufus.

næ quæ in eis interdum reperiuntur, improbantur. Varias præparationes apud Aldrovandum vide. *Medicis*, contra canis rabidi morsum, phthisin, febrem hæcticam, urinæ retentionem, calculum, inflammationem linguæ & gutturis, & Cancrum in manibus inferviunt. Contra anginam sic à quibusdam præparatur: Aftacos circiter decem vivos contere, & stillatios liquores intybi rosarum & papaveris erratici affunde, inde expressus succus vinum rubellum refert. Eo linguam abluere & diligenter ac penitus gargarizare oportet, deinde etiam haustum ejus mediocrem bibere, Linguam absterfam & purgatam lardo insulso percinge, post horam & dimidiam, quicquid viscidæ pituitæ infederit, rursus absterge, & succo Aftacorum præscripto denudò lava. Reliqua in Aldrovando vide. Præparatio contra mammæ cancerum apud Hartmannum optima. *Lapides* quod spectat, rarissimum ex iis diureticum, febrifugum, & vulnerarium parari posse existimat Helmontius, si in formam pristini lactis resolverentur. Usurpantur quoque contra calculum, cum nucleis persicorum & mespilorum: Contra sanguinis grumos, cum carbonibus è tilia aceto restinctis, &c. Huc pertinet *Aftacus Caraboides*, & *Gammarus terrestris*. Ille colore est omni parte corporis cinereo, antennis quatuor, duabus longioribus, reliquis brevioribus, pedibus & chelis hirsutis. Pedes duo priores chelis proximi tabellas in extremitate circum undique ferratas habent, ad natatum faciliorem fortè utiles. Quantum ad hunc. Crustacei quoddam genus in terra latitat, maximè in India Occidentali, Cuarassas vocant, tam prope Gammarorum formam, ut cum effosum è terrâ conspexisset Julius Cæsar Scaliger, ac roganti quid esset, in sepulchris inveniri alii dictitassent, à Gammaris abstinerit diu.

ARTICULUS III.

De Squilla in genere.

TAB. IV. 3. 4. 5. 6. **C**RUSTATA, quæ Latinis Squillæ Græci *καρίδας*, *καρίδας*, & *καρίδας* vocant, seu *ἀπὸ τῆ κεφαλῆ*, capite, quod Squillis majusculum est; seu *ἀπὸ τῆ σκαρίνου* scil. initiali abjecto. Heraclydes Colybdænas adud Athenæum vocat, quo nomine Epicharmus, ut Nicander vult pudendum marinum intelligit.

Descriptio. *Descriptionem* si attendamus, *Caudam* habent, sed forcipe carent, fortè quod pluribus pedibus, in quos redundantia illa absumitur, instructi, si Aristotelem & Rondeletium sequimur: At Bellonius pedes forcipatos, habere scribit, quas etiam Ælianus, & quidem maximas Indicis in Gange fluvio attribuit. *Corpore* sunt vere nigrescente, sed postea albedinem recipiunt.

Cornua etiam habent Oppiano teste acuta, & in summo capite posita: Ælianus aculeum acutissimum triremis rostro similem, & secturas, ferræ modo habere scribit. *Oculi* sub eodem munimento præduri eminent. *Intestinum* quoque rectè in caudam veluti Locustis & Aftacis finit, quæ excrementa emittunt & ova pariunt.

Vivunt in marinis palustribus & saxosis locis. Ab illis *ælianus*, Æliano, ab his petreæ Oppiano dicuntur. Indicum mare majores alit, quæ in profundo hærent, ut minores litoribus gaudent. In diffractis saxis in mari rubro reperi, prodidit Theophrastus, quod de vivis an de figuris sumendum sit, dubitatur. Habentur & in Oceano Germanico, & Gallico, mari Tyrreno & Adriatico. Circa Jasum magnas celebrat Archestratus.

Vivunt ostreorum carnibus: Ælianus quasdam algæ vivere prodidit. De *sexu* ita Aristoteles: Distinguitur à fœmina mas duabus particulis candidis, quas ipse peculiare habet in carne pectoris, sed ab ipsa discretas tum color, tum concretione, similes sepiarum promuscidi. Vorticose hæ sunt, quemadmodum buccinians fractus, quem Græci *μυκάρια*, id est, papaver vocant: Oriuntur eæ ab acetabulis, quæ sub extremis sunt pedibus. Est etiam in pectore caro rubra, sanguinis colore, quæ tamen attrectata dilabatur, neque similis carni sit. Ab ea meatu qui in pectore buccini refert speciem, alia est sinuatio funiculi crassitudine, sub qua duo, quædam sunt appensa intestino arenacea genitali semini destinata. Atque hæc mas habet. At fœmina ova ibi, colore rubra, quæ annexa ventri, atque utrinque latus intestini, ad carnosas usque partes, membranâ tenui continentur.

Coëunt more quadrupedum retrò mingentium, scilicet, ut fœmina caudam supinam exponat, mas suas superimponat & applicet; & coëunt ineunte vere juxta terram, & cum ficus muturescunt.

Inimicitias cum Laborace exercens, & à Phycide ac Lupo comeduntur. Quo se modo ulciscantur, apud Ælianus habemus. Cum se, inquit, interceptas sentiunt, fastigium quod eminent à capite, quodque simile est acutissimo triremis rostro, atque in summa parte secturas habet, modo ferrulæ uncinatæ, hoc, inquam, animosæ illæ bestiolæ cum incurvarint, summæ lævitate saliant, & tanquam saltatorium versant orbem. Lupus ore hiant squillam lassam comprehendit, hæc in gutturis laxitate saltat, ut gula intumescat.

Usus earum & in *Cibis* est & in *Medicina*. In *Cibis* preciosam piscem Juvenalis nominat. Apicius tanti grandiusculas faciebat, ut earum gratia in Africam navigaret, cum que

Arist. H. A. l. 8. c. ult.

Locus. Oppian. Hal. l. 1.

Victus. Ælian. H. A. l. 1. c. 30. Arist. H. A. l. 4. c. 2. Sexus.

Generatio.

Antipathia.

Ælian. H. A. l. 1. c. 30.

Usus.

Inven Sa. tyr. 3.

Athen. Dipn. l. 1. que priusquam navi exiliret Minturaensibus minores animadverteret, gubernatorem, nulla excensione factâ, eâdem via Italiam repetere juberet. Hodiè elixantur & cum aceto comeduntur: friguntur etiam in sartagine cum oleo farinâ aspersâ. Olim ficus follis assatæ involvebantur. Difficulter concoquuntur, stomacho nocent, & Veneris desiderium excitant. Hoc & sibi contigisse Cardanus testatur. Hecticis eximiè prodesse nullum dubium. Ajunt tritas & particulæ impositas, cuspidem vel sagittam, si quæ infixâ, singulari atrahendi vi educere. Quidam escæ ad mugiles capiendos admiscent. Iisdem & lupus piscis inescatur.

ARTICULUS IV.

De Squilla in specie.

PUNCTUM I.

De Squilla lata sive Urfa.

TAB. IV. 3. 4. 8. 12. *Nomen. Scalig. Ex. 245.* **Q**UAM Squillam latam Rondeletius vocavit, hanc nos *Urfam* & quidem Aristotelis cum Bellonio & Scaligero dicimus. Ubi enim porrecta jacet, urli corium extensum repræsentat. A Squillis eam separavit Aristoteles, quod sub Squillarum nomine non notet. Neapolitani Messanenses in Sicilia Messacaram, quasi sit *ἡ μέγιστος*, vocant.

Descriptio. Rondeletius eam ita *descripsit*. Locustarum est magnitudine, sed latior, multo & magis depresso corpore & hirsuto, in fronte ossa duo, utrinque unicum, in ambitu ferratum, in quibusdam acutius, in aliis latius. Hic pinnae duæ alligantur. Inter hæc duo enascuntur cornua, initio articulata, circa media bifida, ut ex duabus quatuor fiant, non valdè longa. Brachia duo habet cum aculeis, veluti clavis eminentibus, pedibus majora, non bifida, quæ in os flectuntur, quibus ori cibum tanquam pedibus admovent. *Pedes* utrinque quaterni sunt. *Oculi* parum prominent. *Frons* quadrata, & latior quàm in ullo Crustatorum genere. *Tumores* multi per dorsum sparsi sunt, ex quibus extant tubercula, quorum summa pars adeò rubet, ut carbunculus in annulorum pala inclusas dicas.

Scalig. Ex. 245. In Cœnosis vivere argumento est, quòd luto obsita è mari extrahatur. Rarò in Gallia capitur; Romæ & Neapoli frequenter; in Africa frequentissimè. Circa Minturnas Campaniæ oppidum majores sunt Smyrnæis. Idem eis pariendi tempus natura statuit quod Locustis. Per hyemem & vere priusquam ova excludunt laudantur, Et hæc de Urfa, quæ *Major* dicitur, accipienda sunt. Est alia quam *Minorem* & *Celatam* vocant. Scaliger *Cangren* Aristote-

lis credit, Rondeletius *Cicadam marinam*, quòd cum Cicadis terrestribus magnam similitudinem habeat. Quinque tabellis constat, & dorso egregio naturæ artificio variè cælatis & sculptis. Tota rubet. Dodrantalem magnitudinem vix superat.

PUNCTUM II.

De Carangone & Squilla gibba.

QUAS Aristoteles *καρχήνας* aut *καρχήνας*, *He- T A B. IV. 6.* *fychius* *καρχήνας* vocat, cæ Gazæ sunt Crangines.

Descriptio. Est verò hæc Squilla, si *Descriptionem* attendas, palmi majoris longitudine. Contegitur crusta tenui, lævi, candida, nonnunquam ex albo parum rubescente, quæ cocta, tota rubescit, cornu instar pellucida. E dorso enascitur cornu in fronte ferratum, sursum recurvum, cujus denticulata asperitates in superiore & inferiore sunt parte non in lateribus. *Oculi* sunt cornei, in quibus subjecta pars cava cochlearis modo. *Cornua* sunt quatuor, ex quibus duo benè longa, tenuia & flexibilia. *Pedes* habet quinos, qui in calcar terminantur terni sunt.

Posterior pars pro reliqui corporis crassitie & magnitudine longa, septem tabellis constans, in quatuor pinnas desinit: è quarum medio extat aculeus latior quàm in Squilla gibba. Quam Gesnerus vidit, partim rubebat, partim dilutius albicabat, ad latera flavescebat.

Ufus. Sunt omnium crustatorum sapidissimi. Carne tenera dulci, bonique & multi alimenti constant. Caudæ inprimis crusta spoliata, cum pipere, sale & aceto, mensibus Februario, Martio, Aprili, Majo, laudantur.

TAB. IV. 5. 13. *Descriptio.* **SQUILLA GIBBA** *καρχή*, propter gibbum quem habere videtur dum se curvat dicitur. Alii *καρχήνας* & *καρχήνας* vocant. Græci moderni Caridas & Caranidia nuncupat. Crangonibus sunt tenuiores maxime in cauda extrema. Senos ante frontem gerunt valdè tenues cirros. Caudam contractam, in cujus extremo pinnae sunt quinæ: quarum quæ medio loco posita est, ferratam duram, atque in acutum fastigiatam formam habet. In Santonum littora maxima earum copia. Ova pariunt & generant Locustarum more. Ceterum menses circiter quatuor gerunt. Cornu frontis elatum in palatum Lupi piscis infigunt, eumque interimunt. Ubi tanguntur saltant, actangentem sæpè expavescunt, corpusque in aqua gibbosum arcuato motu promovent erucarum modo. Vendebantur olim in sportulis ex junci vimine contextis, friguntur cum oleo in sartagine: aut elixantur in aqua & comeduntur cum aceto.

Arist. H. A. lib. 5. cap. 17.
Anaxand. in Pindar.

PUNCTUM III.

De Squilla parva, & Squilla Manti
Rondeletii.

Tab. IV. **S**quilla parva nomine proprio caret.
7. *Σκίλλαρον* Aristotelis non est, ut perpe-
ram Gaza convertit. Chelas enim hoc, Alta-
sci modo habet. Quidam *ἐχιδόρας* à colo-
Arist. H. re fortasse, quem vivis Rondeletius obscu-
Al. 5. c. rum tribuit, dici volunt. Alii *μυδινοειδὲς*
15. apud Athenæum propter suavitatem in ci-
bo. Duplex istarum est *genus*. Unum *Ma-*
Differen- *jus*, duriore crusta quàm Squilla gibba quod
tia & de- vivum in aëre saltat, & noctu ut candela lu-
scriptio. cet, *Cambaretto* Romanis.

Alterum *Minimum*, ut tam exiguum,
ut mille vix libram æquent pondere, Ve-
netiis frequens. Cocis quibusdam Brava,
Vasconibus Civade, id est, avena, pu-
gillatim enim devoratur. *Caput* habet
pro Corpusculi magnitudine crassum & la-
tum, sine cornu. *Caudam* tenuem, gib-
bum parvum. Oris appendicibus & aliis
Gibbæ similes, punctis aliquot variatur.
Bellonius vivas subfulvas spectari ait, co-
ctas rufescere.

Locus. Et in mari, & in fluviis nascuntur: et si
Bellonius longè à mari provenire dicat. De
Garumna canistris excipi, Scaliger testis est.
Tarentinus fluviatiles nominat.

Ufus. Carne sunt adeò dulci, ut fastidium pa-
riant. Vix ullum aliud Cibi genus, teste
Rondeletio, dulcius degustaveris. In
aqua hordei lotæ, & in carnis jure coctæ,
hecticis maximè conveniunt. Cum crustis
adjecto pipere elixæ, venerem stimulant.
Icon quam hic damus, Gesneri squillam
parvam exprimit.

Tab. IV. **S**QUILLA MANTIS, nomen à be-
9. ftiola quadam ex Locustarum genere acce-
Aldrov. pit, nec antiquis est dicta. Occitani eam
l. 2. c. 16. Preguedicus, id est, precantem Deum
appellant, quod semper manus junctas te-
neat, & corpore sit, jejunantium instar,
gracili & macilento. Divinare eandem vul-
gus credit, & de itinere quæsitam alterum
brachium extendere.

Mathiolus *Hippocampum* appellat, Bel-
lonius *Cicadam marinam*, quam *Speusippe*
Nymphæ esse suspicatur, eandem ita de-
scripsit.

Descri- Tenuis est, inquit, hujus crusta, cru-
ptio. da ita albicat, ut ferè transpareat. Una
cum pilciculis marinis sæpe suo cortice con-
necta extrahitur, & simul cum carptionatis,
bocis, mænis, & trachuris canistris inseri-
tur. Natura incredibili ferè artificio. Cica-
dæ oblongum corpus decem *tabellis*, affa-
brè articulatis loricavit: quarum prima, quæ
caudam extremam conficit, caudam in la-
teribus expandit. Cauda porrò duabus

maculis phœniceis subrubris insignita est,
quæ duorum oculorum speciem præ se fe-
runt, estque aculeata & crenata. Prima
tabella à cauda incipiens, versus secundam,
tertiā, quartā, quintā, & sextā, pin-
nulis fimbriatis multiplicibus subtus muni-
ta est: quibus, dum in mari natat, aquam
percutit, & corpus incitat.

Tres *tallellæ*, quæ sex prædictas subse-
quuntur, ternis utrinque pedibus commu-
nitæ sunt: ad cervicis autem initium, duo
brachia majora oriuntur, quibus cibum ap-
prehensum ori suggerit: sed ea cancris,
aliter quam locustis forcipantur. Sunt enim
in longum exporrecta, atque in extremo
grandioribus crenis suffulta, quibus cum
cibum corripit, ex uno brachio, ad aliam
brachii articulationem transfert.

Horum autem extrema velut in duri-
tiem osseam abeunt dentiscalpiis conficien-
dis ob id expetita. Pars quæ capiti conti-
gua est, in exile quiddam terminatur, &
contra quam cauda se in latum diffundit.
Extra aquam prorsus immobilis & imbecillis
est.

Aculeum unum habet utrinque ori præ-
fixum, ut Phalagium & Scolopendra, quo
mordicus cibum à pedibus suggestum con-
tinet quem postea dentibus conficiat, & in
stomachum detrudat.

Dentes illi natura in oris lateribus protu-
lit, unico utrinque ossi crenato, V. litte-
ræ formam referente infixos. Cujus ante-
rioris partis officium est, ea incidere quæ
mandit: posterioris verò quæ crenas habet
conterere. Nam idem os, duos habet
dentium ordines.

Prætenturas duas in fronte breves, ur-
sinis similes, ostendit, trifariam in extre-
mo diffissas: ac rursus duas alias in lateribus
prædictis breviores. *Oculos* habet virides,
exertos, quos non alveo ut Cancrarium &
Locustarium genus condit: sed ante hos
pinnulas exporrigit eis similes quas in cauda
gerit: ex quo multi decepti caudam *caput*
esse crediderant. Strias rectas intergore,
atque in capitis tabella ductas profert. Pisce
dissecto, *dentes*, fortibus musculis movere
conspiciuntur. *Cerebrumque* adeò esse
exiguum, ut vix hordei grani magnitudi-
nem æquet: Optici tamen ad oculos per-
duci apparent. Rondeletius toto corpo-
re pellucido esse addit. Eodem modo pa-
rit & coit, quo aliæ squillæ.

Ufus. Tab. LI.
Carne est molli, dulci, delicata. Huic
affinis est *Tamarugvacii* Brasiliensium, *Ca-*
maron de Salgado Lusitanis dicta. Caput
habet triangulare. Barbam cancerinam
octuplam. Et in eo tantum à Manti differt,
quod in anteriori parte corporis pedes non
habeat, nec brachia interius serrata.

Marog.
Hist. Bra.
l. 4. c. 20.

Ca-

C A P. II.

De Crustatis rotundis.

A R T I C U L U S I.

De Cancris in genere.

CRustata quæ Latini Cancros vocant Græcis *καρκίνος*, quasi *καρκίνος*, quod *κράας*, id est, pupillas, & oculos mobiles habeant, dicuntur. Siculi *καρχαρος* vocant, Hesychius *καρχαρος*. Apud Varinum *πύλαγος* vel *πύλαρος* Cancer dicitur, quod ostrea lapillo intertestes seu valvas (*πύλας* ἢ *πύλας*) injecto, venetur. *Caudam* habent revolutam, sine *ἐκκαλυμμένη*. Aristoteles vocat, quæ ex tabellis constat, & corpus posteriore parte integit: *Caput* indiscretum. *Cerebro* carent, etsi partem quæ cerebri fungitur munere habeant. In obliquum aspiciunt inclusis crustæ fragili oculis. Pedes qui in obliquum feruntur eis deni cum forcipibus, quorum dexter in omnibus major, & in primoribus superior pars movetur inferiore immobili.

Dentes interius bini primores, & inter eos caruncula linguæ effigie. *Stomachus* ori continuo junctus exiguus.

Mollibus & petrosis locis gaudent: quin & sub terra inveniuntur. Hyeme aprica littora sectantur, æstate in opacagurgitum recedunt.

Vesuntur conchiliis. Polypum ob nimiam Venerem imbecillum devorant, nec à suo genere abstinere. Aquam quam ore excipiunt, parte oris exigua emittunt, hinc apparet circa os spuma, quod aqua & aer, qui cum ea hauritur, per attractum & rejectum agitentur.

Galenus dulci & falsâ aquâ vivere scribit. Lacte potatos sine aqua diutissimè, author de natura rerum.

Generationem si spectes, Cancris parte priore copulantur, sua opercula, loculo sa illa rugosaque, mutuâ consertione componentes. Primum Cancer minor ab aversio supervenire solet, tum major, ubi ille supervenerit. *Ova* edunt in operculo, hinc istud foeminis latius, & hirsutius, ita à maribus discernuntur.

Addit tamen Plinius, foeminæ primum pedem duplicem, mari simplicem, eundem duas inter ventrem & caudam spinas habere, quibus illa caret.

Soli è crustatorum genere non natant, sed incedunt, & quidem transverso latere quod simiis & ursis, propter posteriorum pedum latitudinem competit. Cum enim motus tractatione & pulsione fiat, & sic secundum artuum flexiones, quæ Cancris

introrsum ad pectus sunt; ideò quasi cum triremes circumaguntur, lateris unius remiges impellunt, altrinsecus inhibent, aut retrò trahunt, ita quam in partem processurus est cancer ejus lateris utitur cruribus ad carpendum solum, alterius lateris ad aspellendum. Insidias incredibili sagacitate subodorantur, & confestim se vel luto obruunt, vel inter saxa subducunt. Universi ubialiquando congregantur, os Ponte evincere non valent: quamobrem regressi circumeunt, apparetque tritum iter. Concurrent inter se ut Arietes adversis cornibus. In capiendis ostreis & conchis, summa calliditate utuntur. Calculos enim & lapillos, patulæ hiantique eorum testæ ingerunt, ita ut occludi nequeat, mox dentato forcipe pisculentam carnem abradentes devorant. Sole signum Cancris transeunt, Cancrorum cum exanimati sunt corpora in sicco transfigurari in Scorpiones Plinius author est. Ovidius, brachiis orbos, scorpiones, si sub terra occultentur producere, prodidit. Latent mensibus quinque, & veris principio senectutem anguium more exuunt renovatione tergorum, & tum mollis ad modum crusta subnascitur, & vix præ teneritate ambulare possunt.

Duræ sunt carnis, ideò difficiles concoctu, sed firmi alimenti. Id apud Galenum, Athenæum, & aliis invenies. Nec in *Medicina* spernuntur. Plinius Sole canceri signum transeunte contra serpentum ictus mederi tradit. Sues percussas hoc pabulo sibi mederi Thrasyllus author est. Apri hyosciamo devorato Cancros pro remedio quærunt. Cervi à phalangio vel quovis alio admorsis iisdem sibi medentur. Carbunculos & carcinomata in mulierum parte, præsentissimo remedio sanari, tradunt, Cancro foemina cum flore salis contuso, post plenam lunam, & aquâ illitâ, ut apud Plinium legimus. Ad stranguriam, tres, in aceti cyathis cocti, in mortario contusi & expressi propinantur. Succus cum aqua florum Cyani destillata expressus, gingivis puerorum in dentitione salubriter illinitur. Pulverem Ranzovii ad dissectionem nervi apud Aldrovandum vide. Lapis in capite repertus, & aceto acerrimo immisus, motum manifestum habere deprehenditur.

Natura, & Ingenium. Plin. H. N. l. 9. c. 38.

Ovid. Metam. l. 15. Plin. H. N. l. 9. c. 30.

Ufus.

Plin. H. N. l. 9. c. 33.

Descriptio.

Arist. H. A. l. 4. c. 10. & 3.

Plin. H. N. l. 9. c. 13. & l. 11. c. 48.

Arist. de part. 4. c. 8.

Plin. H. N. l. 9. c. 31. Loc. 1.

Visus.

Aristot. H. A. l. 4. c. 2. & l. de Respirat.

Galen. de cib. bon. & mali succi.

Generatio.

Arist. H. A. l. 5. c. 7.

Plin. H. N. l. 9. c. 31.

Motus.

ARTICULUS II.

*De Cancris in specie, & quidem de Cancris
extra conchas in falsis aquis
degentibus.*

PUNCTUM I.

De Cancro marino.

Tab. IV.
Tab. V.

Cancris degunt extra conchas, vel in
istis. Illi vel sunt in aquis falsis, vel in
dulcibus. Inter illos qui in aquis falsis sunt.
*Cancer marinus, Cancer Maja dictus, Pa-
gurus, Cancer eques, Cancer flavus, undu-
latus Rondeletii, Cancer varius, Cancer cor-
dis figura & alii Chelarum longitudine diffe-
rentes. Cancro marino generis nomen indi-
tum est, nec in ejus descriptione Rondele-
tius, Bellonius, & Gesnerus conveniunt.*

Aldrov.
de Crust.
l. 2. c. 17.
Tab. IV.
I.
Tab. V.
2.

Descri-
ptio.

Rondeletii acuminatus magis est parte
antere prope oculos, & duo habet cor-
nicula, quibus horum caret. Rotundo est
ac circinato corpore Bellonii, anteriore
parte crenis diviso, crustaceo tegmine con-
vestito. Majores trium aut quatuor digi-
torum latitudinem non excedunt. *He-
par* habent rubrum, quod Aristoteles mu-
tim nominare videtur. Intestina multipli-
cibus cirris obseffa, moventurque horum
partes solidiores albis musculis agentibus.
Aldrovandus aliam observavit speciem,
cujus per ultimus qui ab utraque parte est,
brevioribus & crassioribus constat interno-
diis, & aliis pedibus est curtior, in fine
duabus, aliis articulationibus latior. Plu-
rimi prope insulam Canibalorum, quæ ho-
die Domeneca dicitur, reperiuntur, &
quia in saxis habitant, *περπαίει* Oppian. dixit.
Et *mares & femine*. Illis color rubentior,
his ex livido in cyaneum tendit. Mares
fœminas opprimere videntur antequam
inēant. Crura in ventrem inflectunt dum
incedunt. Rondeletius fœminæ partem
inesse quandam croceam scribit quæ mares
carent. Ovorum putat esse materiam. In Bos-
phoro Thracio, vento violento ingruente,
contra fluctus nituntur: Circa promonto-
ria, ubi major vis venti, singuli in sinuoso
loco se tenent.

Ælian. H.
A. l. 7. c.
24.

Ufus.

Maximè, in *Cibis*, fœminæ cum ovis
turgent laudantur, idè majus earundem
Bononiæ pretium. In India succo dulci
cum luna parturit turgere, plenam eodem
destitui, à quibusdam proditum. In *Medi-
cina*, phthisicis carnem prodesse Rondeletius
experientiâ docuit, quod & apud Marcel-
lum invenies. Stranguriam sanant si duarum
drachmarum pondere ex lacte materno vel
nutricis infantibus porrigantur. Ad quar-
tanam, scabiem, & oculorum lachrymas

ab Avicenna; ad Carcinomata à Plinio lau-
dantur. Idem pilosè mamma tollunt.

PUNCTUM II.

De Cancro Maja dicto.

Cancer Majas dictus, nomen à magni-
tudine sumsit. Nam *μῆτις* quæ amitam
& nutricem significat, aliquando etiam pro
grandiore natu sumebatur.

Tab. V
5.
Tab. VI.
2.
Nomen.
Descri-
ptio.

Eo à Paguro differt, quòd hic parte an-
teriore latus sit, Maja se posteriore in latitu-
dinem diffundat, anteriore coarctetur, &
magis orbiculata sit.

Corpus illi tamgrave, ut ad incessum sit
ineptissima, idque vivæ livet, aut virefcit,
aut rubore phæniceo aspersum est; quam
si supinam contempleris, tria parte antero-
re brevissima specula ab ipsius crustæ tegmine
continuata cernes, inter quæ prætenturæ
duæ delitescunt. *Crura* quaternis articulis
intercepta sunt, alta & exilia. *Pedes* utro-
que latere quaterni, quinque articulis inter-
cepti, unguibus benè muniuntur. Tibiæ
multa scabritie exasperantur. *Fœmina* oper-
culum latiusculum habet, sub quo duo fo-
ramina membrana oclusa, in ipsis postero-
rum tibiæ radicibus collocata apparent.
Quatuor præterea semicirculis utitur in na-
tando, à quorum radicibus octoni prodeunt
pinnati ramuli, quibus hærent ova in fœtis.
Interanea si spectes, in capite atque adeò
ore ipso duos osseos dentes gerit: in palato,
carunculam quæ linguæ vice fungitur: ante
dentes bina denticulata ossicula, atque in
ejus ore cavitatem statim ante gulam, in qua
quod rubrum continetur, habet multiplices
flexus. Vulvam esse Bellonius putat. Ex hac
enim ova prodire compertum est. Subsequi-
tur cavitas satis capax, vacua quidem ea,
dum jejuna est piscis, ut vel os alterum, vel
ventriculum ejus esse dicas: cui etiam den-
tes adsunt numero quaterni, incisorii, & u-
nus molaris, à quibus gula incipit, in ejus
summo epiglottidem manifestè videas: ea
autem ad apophyses meatibus committitur
adeò exilibus, ut vix appareant: & quem-
admodum vulva adimplebat majorem par-
tem recessuum, sic apophyses ubique per
cavitates immittuntur, tenuibus tamen liga-
mentis adstrictæ, & maximè musculis. Nec
est aliud intestinum manifestum, quam illud
in quo desinunt apophyses, excrementi sci-
licet receptaculum. Est autem id teres, cæ-
teris partibus incumbens, ad caudam usque
protensum. Sed & vesicam utrinque unam
in ipsa alvo, robustam, magnam & membra-
nosam cernas, cujus exitus est per ea duo fo-
ramina, quæ sub operimento latent. *Eran-
chias* habet utrinque sub testa in lateribus
numero fenas: quæ certâ membranâ ab ipso
tegumento distinguuntur. Aquam enim in
ore

ore acceptam permeatus qui ad radices crurum sunt, egerit. Hæc omnia ferè Paguro suo Rondeletius ad scripsit, quem vide. Ad Mæam pertinent & aliquot sequentes.

Tab. IV. 6. *Primus Hippocarcinus* à magnitudine, cum addito *hispidus*, quod universum tergus aculeis spinosisque quibusdam operculis oblitum sit, quæ ad latera majora videntur, dicitur. Supra oculos emissitios è tabulis quibusdam ad latera protensos fronte media, duo velut cornicula acuta exeunt. *Os* infimo loco situm, duo veluti brachiola intus tota villosa muniunt. Quinque ab utroque latere pedes, si brachia annumeres, in totidem articulos distincti. Chelæ anteriori parte, brachium puerile æquant, forcipibus fusci coloris, è quibus villosa quædam prominentia stamina instar penicilli.

Alter est parte supina Hippocarcino non dissimilis. *Cauda* est ovalis ferè figuræ, & extremo in angustam, appendicem scutiformem quinque angulorum seu pentagonam definit. Insignis in eadem scutellata cavitas apparet. *Os* multis veluti brachiolis villosis, supernè & infernè circumsepitur. In *ventre* plana cavitas, ovis retinendis aptissima.

In *Tertio* senæ spinæ majusculæ latera utrinque ambiunt: & binæ maximæ frontem muniunt. Duos palmos est longus, chelis, brachiis, & supina corporis parte tuberosus, & hispidus.

Quartus ejusdem est figuræ, sed pluribus spinis ab utroque latere & in dorso horret, pedibus & brachiis hirsutus, & supina parte, variis coloribus sed præsertim rubro maculatus.

Tab. IV. 4 5. 6. *Quintus* quem Heracleoticum Rondeletius vocat, aculeos in fronte habet & in lateribus. Pars testæ prona aculeis aspera est, & hirta, coloreque fusco.

Sextus asperitatem in testa tomentosam habet, coloreque est cinereo & fusco.

Locus. Reperiunt in Ægæo, Jonio & Adriaticomari.

Ufus. Mares eliguntur autumnò, hyeme & Aprili mense *ad Cibus*, in plenilunio: fœmina verò reliquo anni tempore usque ad Septembrem. Assantur etiam in furno ano & ore clausis, ne quod intus est liquidi effluat.

PUNCTUM III.

De Paguro.

Tab. V. 13. 14. Tab. VI. 1. 3. 4. Nomen. **P**aguro; *παρά το ἄρην ὁ φυλάττωσιν ἐν πάροις*, id est, *κρημνώσκει πότοις*, quod in locis præruptis versetur, nomen indicum est. Simeon Sethi cum Carcini appellatione dignatur. A Palladio Cancer marinus dicitur. Scholiastes Aristophanis Caraburi exponit. Moderni Græci Paguri nomen adhuc retinent,

idemque in Dalmatia, teste Massario retinetur. Latior est quam longior, & ex Oceano in pedalem longitudinem abit. Visus in Angliâ decem libras pendere. Valida crustâ integitur & in lævi, eaque novem in gyrum crenis imbricis modo incisa est. Color vivorum viridiorum præ nimia rosei exhalatione veluti subnigra tergora apparent. *Crura* utrinque biæla quatuor habent, villis hirta, ternis articulationibus geniculata, in quibus ungues acuti oblongique sunt, minimè bifidi. *Brachia* bisulca parte anteriore binis articulis intercepta forcipibus crenatis munita, in extremo nigra: quibus quæ constringunt ut edant, etiam dura confringere possunt. *Branchias* utrinque in latere ostendunt dispositas, ut reliquum genus Locustarum, sub tergoris crusta senis ordinibus ad tiliarum radices insertas. In *ore* tot comperies naturæ secreta, tot adstantes appendices, tot pelliculas, ut coactus incredibile artificium necesse est fatearis. *Mutim*, quæ hepar est, habet dulcissimam, maximâ ex parte subrubram, cum infinitis propè apophysis flavis grandi stomacho adjacentibus. Reliquæ partes internæ musculis albis constant, quibus externæ moventur. Rondeletius sub nomine Cancri Majæ descripti. *Differentias* si spectes, alius est Mas, alius Fœmina. Scaliger alium orbiculatiorem, fusciorem, & majorem facit; alium quadratiorem & minorem, colore dilutiore, & penè pallida viriditate. Porcessos vocant Veneti.

Descriptio.

Tab. V. 3. 10.

Differentia.

Huc pertinet *Cancer Heracleoticus* Belonii ab urbibus Heracleis, quarum una *Ponto*, altera Propontidi adjacet, dictus. *Crusta* firmiore munitur ut Maja, *Tibias* utrinque quaternas habet, *brachia* duo admodum firma, binis articulis geniculata, forcipibus robustis bisulca, hispida, & benè armata, quorum pars superior elatis crenis vallata est. Nonnulli *Gallum marinum* vocant, quod brachia ejus in crista galli modum tornata videantur. *Dorsum* tuberculis exasperatur & coloris est miniacei.

Huic similis est *alter* pilorum densitate Ursi corium referens. Differt à priore primum chelis, quæ longiores sunt, & in extremo pars utroque, quæ forcipem facit, & instar dentium sibi invicem dum clauduntur contingunt, colore miniaceo: præterea pedibus brevibus, quorum duo posteriores utrinque brevissimi, antennis & oculis magis à se invicem distantibus. *Invenitur* in mari Tyrrheno & Adriatico: sed in Oceano maximus. Vidit Rondeletius unum, cujus latitudo palmum majorem superabat, longitudo ad semicubitum accedebat. Alexander apud *Ælium* genus quoddam Cancrorum commemorat, quorum

Ælian. H. A. l. 17 c. 1.

rum testa circumferentia undique pedis mensuram implet. Miras earum magnitudines in sinu quoque Persico Strabo refert. Suetum ipsis integumento se exuere. Hoc cum luxari & à corpore abscedere sentiunt, furiis quasi agitati huc & illuc feruntur, & pleniorē victum quærunt, ut tumore inflatis facilius crusta rumpatur. Elapsi similes mortuis in sabulo jacent, sibi restituti sabulum gustant, & postquam se abdidere, non citius ex lateribus, egrediuntur, quam pristina armatura instructi. Musicæ sunt adeo amantes, ut eadem capiuntur. Captos aliquando foramina subire, & mortuos in Scorpis mutari Nicander prodidit.

Ælian.
H. A. l.
9. c. 45.

Nicand. in
Therica.

Ufus.

Inter lautissimos numerantur cibos, sed difficillimè digeruntur. Cum coquantur parum rufescunt & parum nigrescunt.

PUNCTUM IV.

De Cancro Equite.

Cancer Eques à velocitate cursus nomen accepit. Hesychio est δρόμων Æliano δρομία Cursor, aliis Græcis ἵππος Eques. Major est Castaneâ parvâ, colore subalbido, punctis subrubris consperso, & ut Pagurus, tornato. Soli objectus totus pellucidus est, præterquam in ea corporis parte, quæ interanea continet. Oculos grano phaseoli non habet majores quibus acutissimè cernit. Tibiæ sunt villis levibus obsesæ, utrinque quinæ: quarum duæ anteriores brachia sunt forcipata, quibus cuncta complectitur: reliquæ graciles unguibus rectis & obliquis variatæ. Hujus generis fortè erit, qui Rondeletio *Cancer latipes* dicitur, nucis juglandis magnitudine aliquando paulò majore. Chelas habet denticulatas & articulatas, pedes utrinque quatuor. Postremus & minimus, quod in osseam latitudinem desinat, nomen Cancro imposuit. Testa est lævi, parte superiore albescente, quodammodo nigricante. Cum maris purgamentis in littus ejicitur. Huic similis est quem Bellonius Græcis μετὸν καρκίνον, Romæ Grancettum vocari scribit. Punctis frequentibus candidis in tergore variatur Ophitæ modo. Singulares digiti quaternis constant articulationibus. Amphibii sunt, & in maximis ardoribus meridiano tempore è mari egrediuntur, diemque sub sole, transigunt, circa vesperam mare repetunt. Tanta velocitate ferri vidit Bellonius, ut ne unum quidem unquam cursu consequi potuerit: quin nec lacertam ex abrosia sub qua delitescibat exilientem, assequi eundem potuisse. Volare potius quàm currere videbatur.

Locus.
Ælian.
H. A. l.
7. c. 30.

Dromonem Hesychii quidam in maris æstuariis capi scribunt, sagittæque modo

per aquas summum decurrere. Facit Ælianus quorundam mentionem, quos πετηλίας à volando (Gillius leget *πηλίας*) vocat, quòd per parvis alis volatum exerceant, quibus currentes non utuntur. Potest ipsis πεδανέμων titulus, qui ex Cratete Comico ab Athenæo datur, tribui. Negliguntur in cibis propter exilitatem.

PUNCTUM V.

De Cancro flavo undulato Rondeletii, Marmorato, Cordis figurâ, & aliis Chelarum longitudine differentibus.

Cancer flavus undulatus, à colore & Clineis, quæ in prona parte sunt sinuosæ undarum modo, non aliter quàm Cameloto vulgò nuncupato, nomen sortitus est. Pedes quaternos habet longos & hirsutos: Chelas duas magnas, etiam hirtas: Cornuâ duo satis longa: in fronte appendices duas, in lateribus alias. Capitur circa Antipolium & Lerinum insulam.

Tab. VI.
6. Aldrov.
l. 2. c. 21.

Cancer Marmoratus sive varius, quod testa sit lævi, ac perpolita, & maculis viridibus cæruleis, albis, nigris, cinereis, Jaspidis instar & marmoris perspersus sit. Si mortuus in sole exsiccet, totus fit flavus, maculæ verò in mortuo statim evanescunt. Forfices habet aliis breviores & crassiores. Tubercula veluti gemmæ in eis eminent, ut in Astaco. Cornicula duo è fronte extant. Post oculos, qui satis à se distant, testa est serrata. In saporum cavernulis degunt, & ita pedibus hærent, ut vix avelli possint. Crusta sunt cæteris durior. In saxis Agathensis littoris degunt.

Tab. VI.
5. Aldrov.
l. 2. c. 22.

Cancer cordis figura, Cornuâ duo è fronte prominentia habet, brachia quoque duo brevi forfice, & quaternos pedes. Pelagius est, & panagro ex alto mari cum piscibus in littus pertrahitur. In majorum Assellorum ventriculis sæpissimè reperitur.

Tab.
VII. 4.

Cancris chelarum longitudine differentes, vel sunt. Μετρίχηλοι, vel Βραχύχηλοι. Chelis vel tenuibus vel crassis. Μετρίχηλοι chelis tenuibus, sub Aranearum marinarum nomine apud Aldrovandum veniunt, & sub tribus generibus exhibentur.

Aldrov. l.
2. c. 23.

Primum est fusco & cinereo colore, parte priore quâ caput est, acutum, oculis parum à se invicem distantibus, cornibus duobus acutis.

Tab. VI.
7. 8. 9.
10. 11.

Alterum corpore est torundiore quod sub Aranei crustacei nomine venit.

Tertium magis rotundius, colore cinereo & fusco, chelis quàm priores crassioribus, cui Aranei marini crustacei alterius in Tabula nomen inditum.

Differt ab his *Aranea marina*, cujus Aristoteles in Cancelli descriptione meminit. Formâ enim similis araneis est, nisi quòd partem

partem capiti & pectori subjectam araneo majorem habeat. Brachia forcipata habere pro corporis exilitate longissima Rondeletius addit. Μακρόχῆλοι crassiss brachiis, sunt hirsuti & asperi, ut aculeati videantur. Unus est pronā parte corpore & pedibus albus, unde albicantis nomen. Chelis cæruleis, supina verò ruber. Alter priore minor colore nigricante, unde nigricantis appellatio.

Tab. VI. Βραχυχῆλοι aliquot sunt species. Ex quibus
12. 13. Rondeletii ex rubro nigricat, Chelis
14. 15. valdè brevibus ac tenuibus, pedibus proximis longissimis pro corporis ratione, crassiss, acutissimis, lanugine quādam obducta. Frequens est in Lorino insula.

Reliqui sunt tenues & læves, supina pars aculeos habet. Ex his unus ore est acuto admodum, & oculis à latere utrinque prominentibus, corpore undique aspera. Minutior dicitur.

Congener brachichelo Aldrovandi lagenam crasso ventre refert, caudam si demas. Capite est valdè acuto, corpus parte supinā aculeis horret, coloreque est cæruleo, pronè albicat, forcipes Chelarum rubent.

ARTICULUS III.

De Cancris fluviatilibus.

Tab. III. **C**ancer fluviatilis seu fluvialis καρκίνος
Aldrov. ποτάμιος Græcis dicitur. Simeon Sethus & Galenus, Pagurum fluviatilem vocare. Eo à marino differt, quod sit testā durior & crassior; tibiis asperioribus, brachiis rugosioribus, & cum marinus lividum loti corticis colorem referat, fluviatilis ex ruffo nigrescit. Marino, præterea, ungues extremam tibiarum articulationem faciunt: fluviatiles multas crenas in gyrum circa ungues habent.

Locus. Frustra eos in Gallia, & Germania quaras. In Græcia, Creta, Sicilia, & Etruria inveniuntur. Bellonius in Atho Macedoniae monte vidit, & in Ciliciæ rivulis, qui non longè ab Issò defluunt. Tanta aliquando eorum ibi copia, ut temporis momento mille capi possint. In Nilo habitare apud Ælianum habemus.

Ælian. H. N. l. 5. c. 52. Viſus. Sunt Sarcophagi, & cum invicem tangunt, pedes sibi arrodunt & vorant. Rondeletius cum ducentos Romæ emisset, denique in aquam ut sese reficerent, conjecisset, ita inter sese conflictati sunt, ut plures quinquaginta mutilatos reperiret. Eo tandem deventum est, ut omnibus necatis, unus tantum superstes fuerit. Ibi dem ligonibus effossa scrobe vel paropside capiuntur. Juxta Ephesiam metropolim serpentes, qui ex caverna quodam egressi paludem tranare conantur, forcipibus arre-

ptos interficiunt. Romæ in foro piscario, filo appensi ac trajecti, prostant.

Eduntur omnitempore, sed æstate sunt meliores, & posteaquam durum corticem exuerunt, magnatum mensis apponuntur. Lacte à quibusdam suffocantur. Avicenna in hecticis febribus cum aqua hordei valde probat.

In Medicina easdem ferè habent vires quas & alii. Tritos potosque ex aqua recentes seu cinere asservato, contra omnia venena prodesse, privatim contra Scorpionum ictus, cum lacte asinino, vel si non sit, caprino, vel quocunque, Plinius auctor est; quod & apud Dioscoridem invenies. Ad viperæ morsum bibuntur è vino per se, vel cum staphide agria, sale & polio, ut testatur Ægineta. Cinis ustorum prodest pavore potus periclitantibus ex canis rabiosi moribus Æschrion empiricus vivos in patella æris rubri tam diu urebat, donec facilè in lævorem redigi possent, lunā decimā octavā, post canis syderis exortum, cum sol leonem ingressus esset. Hujus pulverem tenuissimum cochlearii unius mensurā ex aquæ cyatho propinabat, cum recentior esset morsus; augebatur quantitas, si inveteraverat. Huic remedio tantam vim inesse scribit Galenus, ut dicat nullos perisse, quibus hoc in tempore datum esset. Id ex proprietate substantiæ fieri idem credidit. Triti in oleo & aqua peruncti, ante accessiones in febribus profunt, teste Plinio. Archigenes apud Galenum ex cancris siccis tritis, pedibus & eminentiis amputatis, drachma unā, & asari drachmā alterā, cum aqua ex eodem flumine ex quo cancri sumtā, medicamentum aquas educens componit. Hippocrates in vino suffocatos in flexu uteri propinavit.

Uſus.

Plin. H. N. l. 32. c. 5.

Plin. H. N. l. 32. c. 10.

Hippocr. de morb. mulier. l. 1.

ARTICULUS IV.

De Cancris in conchis degentibus.

PUNCTUM I.

De Cancris parvis.

PRæter ea quæ hætenus retulimus crustata, sunt & alia, quæ in alienis conchis, ut Mitulis, pinnis, pectinibus, ostreis, ac varii generis turbinatis degunt, ut Cancelli, Cancris parvi, Squili, & Scylari, figurā non usque adeò à prædictis diversā.

Cancer parvus, qui pinnis inascitur πιννοφόρος, quasi ὁ τῆς πίννης φύλαξ, ut Suidas, Hesychius, & Varinus tradunt, πιννοτάτης Cryſippo, ut Athenæus citat, ἀπὸ τοῦ τρεῖν ἢ φυλάσσειν τὰ πίννια dicitur. Sunt autem qui in ostreis reperiuntur, parvæ fabæ magnitudine, toto corpore candidi, præterquam, quòd pronæ cristæ medium rubescat.

Tab. VII. 3. 5.

Descriptio.

In

In pinnis qui degunt, majores sunt & magis rubri, alioqui chelis, pedibus, toto denique corpore aliis similes. A Cancellis eo differunt, quod parvi cancri viventium pinnarum & ostreorum hospites sint: Cancelli inanes duntaxat testas & turbinatas subeant, sintque longo corpore Locustis non Cancris simili.

Genera-
tio.

Arist. H.
H. lib. 5.
cap. 15.

De *Generatione* non conveniunt authores. Piscatores cum illis quorum testes inhabitant, quasi ex eodem semine nasci tradunt, teste Aristotele. Apud eundem ista invenies verba: Pinnæ quæ petris aut saxorem cavernis adhæserint, radices agunt, illic Margaritam generant. Vivunt autem & nutriuntur per partem carni hærentem. Hujus autem conchæ ori adnascitur animalculum chelas habens, & cibum assumens, quod cancro parvo simile est, & vocatur Pinnophylax. Rondeletius cum sæpissimè Cancros parvos in Conchis & Ostreis ovis turgentes viderit, ex Coitu maris & foeminæ & ovis provenire affirmare audet. Ut ut sit, non possunt isti in aliis procreari, ut nec vel viscum vel polypodium, nisi super aliis arboribus crescere.

Mores.
Plut. de
solertia
animal.
Oppian. l.
2. Halieut.

Quæ de eorum prudentia apud Plutarchum, Oppianum, & alios invenies, quod nempe pinnam regat, & de appropinquante præda admoneat, fabulosa sunt. Decem Pinnas aperies antequam unum pinnophylacem invenias.

Vitus.

Aqua tantum & luto eadem pascuntur, ut Mytuli. Laterè in eis crede ut vitam fervent. Molliore testa præditi, injuriis magis sunt obnoxii. Ideo & spongiarum cavernulis saxorum rimis, & in externis testarem quibus Ostrea testas sunt cavis, sæpissimè Cancros parvos se reperisse, Rondeletius affirmat.

PUNCTUM II.

De Cancellis.

TAB.
VII.
Nomen.

Qui Latinis Cancellus, Græcis est *καρ-
κινος*, Oppiano *καρκινός*; Plinius eum & Cancrum parvum sub Pinnotheris seu Pinnophylacis nomine confudisse videtur, ut Aldrovandus ostendit. Gallis Eremita, Bernard l'Eremita dicitur. Eremitam, quod alios fugiens in testa quasi in solitudine vivat. Bernardum autem, quod vulgo in Gallia Bernhardos fatuos proverbio dicunt: hunc autem fatuum, quod crusta tectus, chelas habens, quæ ad vitam tuendam satis esse possent, alienas domos in quibus latitet, quærat. Exactissimè ab Aristotele describitur.

Aldrov.
l. 2. c. 26.

Descri-
ptio.

Arist. H.
A. lib. 4.
cap. 4.

Communis ferè est, ait Philosophus Crustatorum & Testatorum socius, quippe qui specie locustis simili spectatur; nascique seorsum per se solitus est. Verum quod testam deinde petit, quam ingressus est,

hinc similis testa contactis animantibus est: quapropter is in accipiti esse, genusque sibi vindicare utrumque videtur. Formâ tamen, (quod simplicius dixerim) similis Araneis est, nisi quod partem capiti, & pectori subditam ampliorem quam Araneis habent. *Cor-nicula* duo ruffa tenuia gerit, quibus *oculi* totidem subjacent, qui nunquam intrò recedant, ut Cancrorum, sed semper eminentes appareant. *Os* sub iis est, quod veluti capillamentis pluribus circumdatur. Iis pedes subjecti duo, bifurces, quibus cibum ori admovent, Bini item utrique adhærent lateri, & tertius parvus. *Thoracis* pars inferior mollis tota est, dissectoque sine pallidum intus cernitur. Meatus ab ore ad ventrem pergit. Foramen excrementi perspicere nullum potest. Pedes ac thorax duritiem præseferunt, sed minus quam Cancris. Nexu nullo testis adhæret. Buccinarum ac Purpurarum modo solutus liberque vagatur. Omnes sinistram pedem crassiorē dextro habent. Cum enim in testa medium corporis complicati vivant, quantum dextræ parti compressæ alimenti ac proinde incrementi decedit, tantum sinistræ liberiori ac laxiori accrescit. Bellonius addit, *Oculos* instar Astaci elatos habere. quos porrigit ac contrahit, maculis albis distinctos. *Dentes* osseos. Ab oro *æfophagus* tenuis ut filum ad stomachum protendit. *Intestina* bis tantum revolvuntur: ac qui in ejus stomacho viridis humor spectabatur, is in intestinis apparet candidus.

Tres ipsorum *species* Aristoteles facit. *Oblongior* est, qui Turbinem scilicet ingreditur, quàm qui Neritim. Qui in Natice degit, dextrum bifurculatum pedem parvum habet, cum lævum grandiusculum habeat, eoque potissimum ingrediatur. Ad tertiam spectare videtur, de quibus idem ita: Sunt inter Cochleas, quæ inter se bestiolas habent Astacis parvis similes, quæ in fluminibus gignuntur. Sed eâ differentia, ut præmollem intra suam testam carunculam habeant, formâ quales nam sint ex dissectionibus contemplare. Nos hic ternas Icones damus.

Scaligero Squilla minima, Vasconibus Civada, Pugillatim enim devoratur. Reperiuntur in pisciculis, pedes novissimos latiusculos habent, ut ad nandum utiles sint. In saxosis locis, cæno, & luto versantur. Ex eodem gigni credidit Aristoteles, sed perperam. Ad latera enim adhærent tantum racemi aut globuli ova filo annexa. Et observatum est mares à foeminis apertè distingui. Nati conchulas ingrediuntur, ubi excrevere in ampliores transeunt.

Usum & in Cibis habent. Dorion enim apud Athenæum, inter hepselos refert. Gesnerus, Coctum odorem colorem & saporem fluviatilis habuisse scribit. Bellonius non esse edu-

Diffe-
rentiæ.

Arist. H.
A. lib. 5.
c. 15.

Ufus.

edulem, sed Julidibus, channis, Percis, & id genus saxatilibus gratissimum ait. Galenus eorum usu Mullos deteriores, & mali odoris evadere testatur: sed forte hoc de Cancellis, qui in spongiis, & qui ^{pedes} à foetido colore dicuntur, sumendum est. Et tantum de Crustaceis.

APPENDIX.

De quibusdam Crustaceis Brasiliensibus Cancris imprimis.

CAPUT I.

De Guaja Apara, cancro maximo.

TAB. IX. **G**UAJA APARA, cancer maximus elegantissime variegatus. Corporis figura est Lunæ bissectæ similis, in latitudine habens tres digitos, in longitudine duos & semis (quanquam & majores reperiantur) Testa, ut dixi, lunata est, in utroque latere posterius exfexta, & in acumina desinens. Anterior pars testæ ultra medietatem coloris obscurè brunni, & variegata maculis ex albo flavescens: posterior pars ex albo flavescit, striis brunnis secundum longitudinem ornata.

Pedes habet octo; singulos quatuor internodiis constantes, subrotundos, ex albo flavescens: brachia duo, quodlibet duos & semis digitos longum, & sesquidigitum latum, quodlibet parvo forcipe præditum, quibus non ita arctè comprehendere potest, ut alii cancri. Est autem quodlibet brachium superius armatum & dentatum instar cristæ galli, ita ut quando vivus brachia corpori applicatis ea componit, uti aptissimè potest, cristas duas galli sibi invicem appositas esse appareat. Tenacula repræsentat rostrum galli, brachium itaque totum rostrum galli cum sua crista. Brachia autem etiam ex albo flavescunt, & maculis brunnis sunt variegata. In aquis natans per os aquam exsufflat, quasi ex fronte exsiliret.

GUAJA alia species. Corpus rotundum, paulo oblongum, juglandem cum suo viridi cortice æquat, octo habet pedes cancrinos: duo brachia, quodlibet ferè duos & semis digitos longum, at exilia; in parte extrema corporis tres habet aculeos obtusos, & oculos planè exiles. Color totius corporis, brachiorum & pedum est albus; ac tota testa dorsi egregiis maculis

brunnis ordinatim distincta, in summitate majoribus, at in lateribus, minoribus: Brachia parvulis maculis ex ruffo purpureis sunt variegata: pedes albicant in totum, ut & venter.

GUAJA alia species quæ rarius capitur. Corpus ellyptica figuræ, latum, tres digitos & totidem longum aut paulo minus; testa recta est ellyptica, in ambitu multis corniculis prædita, superius autem convallibus: Ocelli parvuli, ut aliis: in quolibet latere pedes quatuor cum quatuor juncturis. Crura subhirsuta, & in extremitate unguem nigrum corniculi figura habentia. Anterior autem crus tres digitos longum, reliqua semper breviora unum altero. Brachiorum cum forcipibus, cujus libet longitudo trium digitorum, crassities humani digiti, forcipe sesquidigitum longa & satis crassa. Ipse extremitates forcipis paulo plus sesquidigitum longæ, rostratæ & exterius versus dentatæ, quasi denticulis humanis, & ita aptè sibi invicem quadrantes complicatæ, quasi quis rostrum dentatum clauderet, in una tenacula forcipis, quæ movetur seorsim, in medio etiam est dens albicans. Color totius cancri vivi saturate rubens, ut pruna nostratia majora esse solent, in medio corpore saturatior, reliquis partibus dilutior: extremitas tenicularum ruffi cum brunno mixti, ut cerasa nigra tingere solent. Coctus retinet colorem.

CAPUT II.

De Guaja Miri, Carara Una, Cunuru, & Ciecie Ete.

GUAJA MIRI, cancerculus in falsis fluviis degens, nunquam excedit pruni magnitudinem; testa est ellyptica, anteriore parte in multos angulos desinente: Ocelli parvi, breves: brachia duo, dextrum paulo minus sinistro: crura octo, quatuor internodiis constantia, & brevibus pilis hirta: color testæ ferrugineus: brachiorum & crurum obscurè violaceo-purpureus. Pili crurum pallidi, inferius forcipum latus albicat.

CARARA UNA Cancer parvus, cujus corpus quadratum refert, cujus singuli anguli transversim abscissi, cæterum compressum, magnitudine semidigiti. Oculi præminuli, haud longi, nigri, in angulis abscissis consistentes. Branchia breviora, forcipibus obrotundis crassiusculis: crura octo haud crassa, sed compressa. Testa cum cruribus epatici coloris, seu instar hepatis tosti: brachia itidem: forcipes brunni coloris, qualis succus

ceraforum nigrorum : Crura minutulis pilis hinc inde vestita, ejusdem cum cruribus coloris.

CUNURU, foemella est. *Uca* una, figura & colore conveniens, solum magnitudine corporis & brachiorum differt, minorem enim est, quam mas, & brachia habet parva, brachio maris sinistro vix æqualia, sinistrumque paulo grandius dextro : raros quoque habet pilos, cum *Uca* una tota sit hirsuta.

CIECIE ETE Brasiliensibus : *Crangversinho des Manges* Lusitanis : corpus ad quadratam figuram accedit, & totum vix superat majores avellanæ magnitudinem : Oculi prominentes longiusculi quos recondere potest. Crura octo : brachium sinistrum ipsi maximum, non tamen crassum, forcipis tenacula tenuia & longa, æqualia, sine dentibus : dextrum brachium tenuissimum Testa coloris hepatici : reliquum totum corpus cum cruribus obscure flavum ex pallido.

Edulis est ; & Brasiliani illo curant morbum, quem vocant *Mia*.

CAPUT III.

De Ciri Apoa, Uca Una,
Guanhumi, & Aratu
Pinima.

CIRI APOA Brasiliensibus. Cancer marinus, testa quasi ellyptica tectus, quæ in medietatis anterioris ora dentata, & in quolibet latere in acutum desinit angulum, mediocris magnitudinis. Brachia habet duo mediocria, itidem dentata : sex crura & septimi & octavi loco posterius duos remiges planos, quatuor internodiis, circum circa pilosos, quibus utitur natans. Oculi longè à se invicem distantes, parvuli, cylindracei, crassiusculi, non tamen longi & ad quemlibet cirrhulus eminent instar pili. Totius testæ color fuscus, seu nigricans, in qua diverso fusco cordis figura, aliæque depictæ. Brachia fusca, forcipes ex cærulecente albescent. Crura ad medietatem internam viridi & albo mixta : medietates exteriores cæuleæ : remigum extrema pars, quæ lata est, cærulea, reliqua viridis & albo mixta. Corpus interius etiam cæulescit. Boni sunt saporis. Ciri ordinariè in fundo aquæ falsæ ambulant, interdum tamen ad littora prodeunt cum decremento maris, sed rarius. Capiuntur maris refluxu.

UCA UNA Cancer in palustribus degens, corpus ejus ellypticum, superius convexum, juglandis cum suo cortice magnitudinem æquans vel etiam superans. Crura habet octo, quatuor juncturis :

anteriora longiora, posteriora breviora : Oculos haud longè distantes, cylindraceos, haud longos, quos erigit & recondit, coloris pallidè flavescentes, pupilla hyalina. Brachium dextrum ipsi maximum, interius multis tuberculis acuminatis præditum, ut & forceps : sinistrum parvum. Color testæ superius olivaceus, flavo in extremitate intermixto. Corpus interius pallidè flavescit. Omnia crura & brachia castanei sunt coloris, forcipes etiam superius, cætera pallidè flavescentia una cum tenaculis. Crura omnia inferius vestita sunt copiosis pilis longiusculis obscure castanei coloris. Carne sunt bona.

GUANHUMI, Cancer terrestris : corpus illi rotundum, sed paulum compressum, magnitudine Auriaci mali.

Pedes habet octo, quinque digitos longos, quatuor internodiis : crura longis pilis vestita : os magnum & ad latera oris utrimque latitudine unius digiti hirsutum, ut & corpus : Brachia duo, dextrum magnum, sinistrum parvum, magnum longum octo digitos, latum plus duobus, parvum vix quartam partem illius æquat.

Oculi bini, quos instar parvæ pilæ erigit, & iterum in longa cavitate abscondit : circa os quasi dua brachiola quæ recondere potest, & iterum depromere, & usque ad oculos deducere.

Celerrimè currit, & quidem transversim, ita ut oculos ad latus convertat & brachium majus elevatum gestet. Maximo numero in silvis paludosis oberrant. Carnem habet bonam.

ARATU & ARATU PINIMA. Cancer terrestris, quadratæ figuræ, corpore haud magno, testa multiplici colore picta, brunno, cæruleo, albo, rubro punctatim variè intermixtis.

Oculi prominentes longè distantes, nigri, in angulis rostri positi.

Crura octo, quatuor internodiis, compressa, ruffa, ac per totum maculis purpureis, nigris ac albis distincta. Chela duæ non ita magnæ, æquales, ruffæ, in extremitate ex albo flavescentes. In ventre etiam flavescit, Crura raris pilis nigris vestiuntur.

CAPUT IV.

De Maracoani, Potiquiquiya, &
Tamaru Guacu.

MARACOANI, cancer parvus, in locis ambulans, quæ refluxu maris sicca evadunt, alio enim tempore è latibulo suo non prodit : corpore est ferè quadrato, digitum longo & lato, anteriorius

rius tamen paulò latiori : *Oculi* prope sibi invicem appositi , longi plus semidigito , tenues instar aciculæ crassioris , quos erigere & aptè in rima recondere potest.

Os habet amplum & majus quam cæteri cancri : *crura* octo , quatuor internodiis. Brachium dextrum illi maximum , tres digitos longitudine superans , satis crassum , & se totum post illud potest abscondere : forceps autem brachii latior , haud crassus , referens forcipem sartorum , extuberantiis haud acutis loco dentium præditus ; superficies brachii etiam parva tubercula habet : *brachium* sinistrum minimum , minus uno è pedibus , forcipula minima instar scorpionis.

Crura raros habent pilos fuscis. Coloris est in testa fulvi , ut & in pedibus & minore forcipe , atque in inferiori corpore : extremitate pedum magis rufescunt. Brachium dextrum à fulvo obscure rufescit. Est edulis.

POTIQUIQUIYA Brasiliensibus. Locusta marina , Belgis Zee-kreeft. Longitudo corporis à frontè ad exortum caudæ septem digitorum , caudæ sex : latitudo testæ dorso septem , ventris duorum & semis : totius corporis ambitus novem digitorum & semis ; caudæ ambitus quinque , quæ constat sex tabellis , septem juncturis sibi invicem appositis , & habet cauda ad quodlibet latus inferius quatuor pinnas , sesquidigitum longas , unum latas , extremitates laterales cujusque tabellæ desinunt in cornu acutum : in quolibet latere quinque habet crura , quinque internodiis distantia ; primum par crurum sex digitos longum , alterum novem , tertium pedem , quartum septem digitos , quintum quinque : Quodlibet autem unguem habet incurvum , acutum , pilis multis flavescentibus , hirtum , instar penicilli pictorum : crus anterius crassitie digitum æquat , reliqua graciliora.

Testa corporis variè tuberculata frequentibus eminentiis instar corniculorum rectorum , acutorum , anterius scatet.

Oculi prominentes cylindræci , & post eos duo cornua surrecta antrorsum inclinata , digitum longa , ante oculos supra os quatuor cirrhi exortum sumunt , primo duo magni pollicis humani crassitie in exortu , ubi quatuor internodiis constat , longi sesquipèdem & undique spinosi , inter hos duo minores , quatuor internodiis , teretes sine spinis , ac ultra medietatem bisecti , decem in totum digitos singuli longi.

TAMARU GUACHU , Brasiliensibus : Caramon de Salgado Lusitanis. Locustæ marinæ species , novem digitos longa , vel paulo plus. Capitis longitudo duorum

digitorum ; versus caput magis magisque angustatur.

Corpus autem habet undecim quasi juncturas , quemadmodum cauda in Gammaris : in postica parte corporis ad quodlibet latus duos habet processus subhirsutos.

Totum corpus tectum est crusta cancerina , albicante , splendente instar cornu politi , ad juncturas autem subnigricat aut purpurascit ; pedes in quolibet latere tres , nimirum ad tertiam , quartam & quintam juncturam à collo numerando ; exilia , duos circiter digitos longa.

Caput triangulare , olivæ magnitudine sub testa albicante splendida later , duos digitos longa. Pone caput ad quodlibet latus habet brachium unum , septem digitos longum , quatuor juncturis constans , estque extrema pars brachii ab ultima junctura incurvata instar falcis majoris , & novem dentibus acutissimis prædita : his brachiis ferit , & qui vulnerati sunt , ægrè sanantur.

Oculos habet prominentes , oblongos : barbam cancerinam octuplam : prope oculos duas prominentias retrorsum versas , digitum longas , læves , ac in extremitatibus hirsutas , infra caput adhuc octo prominentias , duos digitos longas , quæ in extremo tubercula gerunt. Versus posticam corporis partem inferius multas latas quasi pinnas habet , quæ natationi haud dubio inserviunt , & quasi folia complicata ventri inferius adjacent. Non comeditur.

CAPUT V.

De Paranacare & Guari
crura.

PARANACARE Gammarus in concha degens , haud edulis , tres digitos longus : brachia habet duo cum forcipibus , crura quatuor longissima , nimirum tres digitos longa , & posthæc quatuor planè brevia ; caudam sesquidigitum longam instar aliorum Gammarorum ; oculos longos & prominulos : duos cirrhos pro barba.

Corpus tegitur testa , obscure castanei coloris ; ejusdem coloris est & cauda , & nigris striis secundum longitudinem variegata , corpus inferius & exortus crurum & brachiorum interius cærulescunt , uti & oculi & barba ; per totum corpus habet pilos ochræ coloris.

Concha quam inhabitat fermè quatuor digitos longa , turbinata coloris pallidè subflavescentis.

Variae autem magnitudinis reperiuntur, planè parvulae, magnitudine minoris pruni, turbinatae & variis tuberculis acuminatis praeditae, pallidae, rufescentes, nigrae, ad littus prope fluvium Paraiba.

GUARICURU Brasiliensibus; *Gammarius* vulgo *Camaran*; quatuor digitos longus: crura habet sex, tribus internodiis constantia, cum unguiculo in extremitate: antè par crurum quasi furas habet, crassius reliquis & vicem brachiorum fun-

gens; paulo plus duobus digitis longum, ultimum paulo plus uno, omnia aculeata seu spinosa.

Cirrhos prope os prodeuntes habet sex, duos longissimos, nimirum tres digitos singulos, versus posteriora reflexos; duos unum digitum, & duos semidigitum: sub ore parva tenacula quatuor crassiuscula, & quatuor tenuiora, quibus cibum tenet. Oculi similes reliquis. Color totius fuscus. Cocti eduntur.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

EX ANGUIBUS AQUATICIS.

LIBER III.

De Testaceis.

TITULUS I.

De Testaceis in genere.

Horat. l.
2. saty.
Nomen.



Estacea quæ vulgò dicuntur ea, alii Testata, Horatius testas, Cicero, belluas nativis testis adhaerentes, Palladius clausa maris animalia, Albertus testudines, plurimi Con-

Arist. H.
A. l. 1. c.
6.

chas & Conchilia dixere. Græci *ὀστράκωδες*, ac si dicas testaceæ cutis animalia, *ὄστρεα*, quod apud Philosophum invenies, *ὄστρεα*, ut Athenæus testatur, *ὀστράκωδες ὀστράκωδη & κογχωειδῆ*, quod, trabo scribit, *σκληρόδερμα*, *λιθόβρενα*, quod Empedocli tribuitur, *ὀστράκωδες*, *ὄστρεα*, *ὀστράκωδες* *ἰχθύες*, seu testaceos pisces, quod apud Suidam, ut illud apud Oppianum legimus, *λιχάδας* Hesychius & Varinus, *κυματιστάδας* idem appellavere.

Descri-
ptio.

Partes corporis si spectemus, Omnibus testis intus lævis æqualisque habetur, Caro item quàm Græcè spondylum, latinè callum dici Hermolaus author est, quam Lunæ incremento augeri prodidere quidam. Terrenum illud quod continet & conservet foris est, hoc calorem leviculum, quia sanguine carent, tanquam furnulus fovet & conservat, & testa dicitur. Non mutant, eam, tum quòd

non moveantur, tum quòd non siccentur. Oculos habere negat Aristoteles, Plinius movere etiam, scribit. Dentes ipsis primores, & *carnosum* illud quod proportionatur ad sentiendum cibum *caput* omnibus infra, plantarum modo. *Stomachus* ori continuò congruitur, isque proportionem magnitudinis exiguus. Hunc excipit *venter*, in quo quod *papaver* dicimus, (*μήλον*) situm. Mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. Excrementum illud quod papaver dicimus, continent turbinata omnia sua clavicula, univalvia fundo, bivalvia, qua nodo ligantur Laborant omnia per frigus, & æstum atque exuperantiam temporis pati nequeunt. *Nutrientur* more plantarum per poros, & quidem humore dulci, si Aristoteli credimus. Ideò eis anni pluvii posunt, Purpuras si excipias. Moventur omnia parte dextra, non ad vertiginem sive claviculum, sed in adversum.

Arist. H.
A. l. 1. c.
9.
Plin. E-
pist. 136.

Visus.
Arist. H.
A. l. 8.
c. 2.
Arist. H.
A. l. 8.
c. 20.

Differentias quod spectat, mira in ipsis naturæ ludentis varietas. Tot colorum differentiarum, tot figurarum, planis & concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe cæsis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatis, intorto, margine in mucronem emissis, foris effuso, intus replicato, jam distinctione virgulata, crinita, crispa, cuniculatis, pectinatis, imbricatis, undata, cancellatis, reticulata, in obliquum, in re-

Differen-
tiarum.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 33.

etum expansa, prædensata, porrecta, sinuata, brevi modo ligatis, toto latere connexis, ad plausum apertis; ad buccinum incurvis. Rondeletius eas brevissimè complexus est. Alia ab aliis testæ duritia superantur, ut pulmones, Holothuria. Echini, longè minus dura testa contiguntur, quàm Purpuræ & Buccina. Alii undique circumteguntur, ut nihil interioris corporis tegi possit, ut Ostrea, Tolline, Pectines. Alia altera tantum parte testam habent, alteri parti testæ loco est scopuli pars cui hæret. Chamæ & Dactyli sive Solenes utrisque extremis non integuntur, per quæ caput & posteriorem partem exerunt. Eorum quæ undique integuntur: alia turbinata sunt, ut Purpura, Buccinum, alia turbinata non sunt, ut conchæ, quæ à Gallis Porcellainos vocantur. Alia unica concha constant, ut Lapidæ. Alia duabus, & Mytuli. Testar. aliæ læves, ut Unguium, Mytulorum. Aliæ asperæ, ut Purpurarum, Buccinorum, Ostreorum, quarum rursus testarum, permagna est in asperitate varietas, quæ in singulis declarabitur, &c. Nos ea brevissimè in Turbinata, Turbines, Bivalvia & Univalvia distinguimus. *Locus* ipsis mare, quod ita amant, ut apud Ægyptios maris symbola conchyliia haberentur. In mari rubro mira quadam magnitudine augentur. Bibacta iisdem referta est, ut & maris Ægei & Laconici littora. In montibus & remotis procul à mari locis reperiri, nulum dubium. Causas alibi inquiremus. Ad *Temperiem* spectat, quod plurima eorum algore & æstu lateant. Limaces hyeme, Purpuræ & Buccinæ canis exortu tricenot circiter dies conduntur. Æstate tamen potius plures vigent, Pirenses Euripum si exceperis, in quo non minus hyeme probantur, quod tum, piscibus alio migrantibus pabulentur uberius.

De ipsorum *Generatione* accuratissimè Aristoteles in libris generationum egit, eoque res redit, ut omne genus testatum spontè oriri pronunciet. Apertum, inquit, id hinc est, quod navigiis putrescentibus, fæce spumosa adnascuntur, & locis multis ubi nihil tale aderat ante, post per inopiam humoris factò cœno, Ostreæ prodire: ut apud Rhodum insulam, cum classis applicuisset, & fœtalia projecta essent; in mare, tempore post cœno obducto testis. Ostreæ in eis reperiebantur. Nihil autem partis genitalis emitti ab iis, argumentum est, quòd cum Chii quidem ex Pyrrha Lesbi insulæ Ostreas vivas portassent, & in loca quædam maris reciproci æstus, & luto similia demississent, plures nihilo fuere temporis spacio, quanquam incremento corporis plurimum profecerunt. Quæ autem ova vocantur, nihil ad generationem con-

ferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est: quàm obrem sapore per id tempus præstant, ciboque laudantur. Quæ de Conchis Ælianus scribit, in speciali historia adferemus.

Sensus eis Plinius adimit, tribuit Aristoteles. Purpuris escas putidas Purpurari emoli acceduntque odore sine dubio illectæ ad ipsas. Ungues ad strepitum se subtrahunt, inferiusque subsidere cernuntur, quoties ferramentum sentiunt admoveri. Exiguo namque extant, reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occiduntur. Natices qui capiunt non adverso, sed secundo flato adeunt, quoties escam persequuntur, nec voce ulla sed silentio agunt.

Antipathiam cum tonitru habere creduntur, & adhærescentis tempestatis signa sunt.

Adeò olim in *Cibis* adhibebantur, ut inde conformatum sit adagium, conchyliia viduarum cupedias, & Plinius, luxuriæ matrem Conchyliorum, precia margaritis propemodum æquasse, quæritur. Commune omnibus falsum quendam in sua carne succum habere, quo alvum ciere nata sunt: quòd si probè assentur, maximè tum falsa evadunt, ut quæ succum jam habeant ab igne veluti succensum, & propè dixerim, absumptum. Mollitie tamen & duritie operationis variatur eventus. Venerem invitare certum, unde eam Concha Cyprum vectam quidam, alii è concha natam voluerunt. In *Medicina* quoque locum invenisse in specialibus dicemus.

TITULUS II.

De Testaceis in specie, & primò de Turbinatis in genere.

SUPERIORE titulo Testaceorum omne genus, in Turbinata, Turbines, conchyliia bivalvia seu διδυμα, & μονόδυμα seu univalvia distinximus: Turbinata vel in genere, vel in specie considerantur. in genere dicta Turbinata sunt illa, quæcumque in volutas & anfractus seu spiras, quales in prælis & torcularibus visuntur, Testas suas quoquo modo reflectunt. Græci σπυρίδα vocant, Gesnerus ελικουίδα quoque dici posse putat, quòd ελικος vocent, quas diximus, volutas. At Rondeletio σπυρίδα in genere pro omnibus Turbinatis sumitur. Turbo autem est id quod exemplo & lato paulatim in mucronem desinit, cujus figuræ est & Turbo lusorius. Proprium illis est testam habere continuam totam & unicam. Si externa spectemus, si interna considerentur, quodammodo similem naturam nata sunt omnia, magnitudine autem distant & aliis affectibus qui excessu comparantur. Quædam enim quæ majora sunt suas

Arist. H. A. l. 8. c. 13.

Generatio. Arist. Gen. A. l. 3. c. 11. Arist. H. A. l. 5. c. 14. Scalig.

Sensus.

Antipathia.

Ufus.

Arist. H. A. l. 4. c. 4.

suas quoque partes conspectiores habent: minora autem minus: sic etiam duriora & molliora, & ejusmodi alia alii. Nam quæ caro summa à testæ ostro exorta est, eam quædam firmiorem quædam solutiorem habent. Ex ejus medio *caput* est & corniculabina; in majoribus proceriora, in minoribus minima. Eximendi capitis eadem omnium ratio, & perterrefactis contrahendi. Habent quædam *os* & *dentes*, minutas, tenues. Quædam etiam muscarum more habent *proboscidem* linguæ specie. Hæc dura est buccinis & purpuris. Nam quemadmodum Tabani & asilus tergora quadrupedum pertundunt: ita his tanta est duritia, ut escarum testas perforent. Subest ori statim *venter* similis avium ingluvei, qualis est etiam umbilicis. Infra duo candida quædam, firma, specie *mammillari*, qualia in sepiis inveniuntur: sed hæc solidiora. A ventre *gula* duplex longa ac papaver usque, quod in fundo est. Quæ omnia perspicui possunt, in sinu vorticoso testarum. Quod gulæ jungitur *intestinum* est, à qua, continuo tractu fertur totum simplex usque ad exitum, incipi eas à vorticoso sinu quo *papaver* continetur, atque inde laxiorum. Est autem papaveris magna pars quasi excrementum in omnibus ostraceis. Inde intestinum reciprocans rursus ascendit ad carnosas partes, atque circiter caput terminatur, qua emittitur excrementum omnibus turbinatis tam terrenis quam marinis. Hucusque Aristoteles. *Crescere* ut vermes, scilicet anfractibus, qui subinde accrescentes plures efficiuntur in partem priorem, quod caput vocatur, experientia docuit. *Serpunt* parte dextra non ad claviculas, sed in adversum. De *Congressu* in speciebus dicetur.

TITULUS III.

De Turbinatis in specie.

CAPUT I.

De Turbinatis in anfractum tortis.

ARTICULUS I.

De Nautilo.

TAB. X.
Aldrov.
l. 3. c. 3.
Arist. H.
A. l. 4. c. 1.
Diffe-
rentiæ.

DUUM sunt Turbinata apud Aristotelem generum, vel enim *ἐλκλω* habent, vel sunt *σφαίροειδῆ* seu in globum circumacta. Ex illis sunt *Nautilus*, *Purpura*, *Buccinum*, & *Conchylium*.

Nautilus, quem Suidas *ναυτῶ*, alii *ναυπκὼν* & *ὠν πολυπὶδ* vocant, vulgo *ναύτιλος* dicitur, & cum *Nauplio Athenæi* idem

videtur. A modernis Græcis *ναυτῶ* vocari Robertus Constantinus author est.

Duo ipsius apud Aristotelem habemus genera. *Unum* est, cujus testa pectunculo similis est, cava, neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quare à fluctibus ejicitur in aridam, ubi delapsus de concha, aut capitur aut in humo perit. Hoc genus pusillum est & simile bolitanis: quæ Polypi species est. *Alterum* in testa tanquam limax est. Is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Illud respicit Plinius cum dicit: Inter præcipua miracula qui vocatur Nautilus, ab aliis, Pompilos (potius polypodis ovum) Scipinus (verius pronus) in summa æquorum, pervenit, ita se paulatim subrigens, ut emissâ omni per fistulam aqua, velut exoneratus sentina, facilè naviget. Postea prima duo brachia retorquens (potius attollens ex Athenæo) membranem inter illa miræ tenuitatis extendit. Qua velificante in aura cæteris subremigans brachiis, media cauda, ut gubernaculo se regit. Ita vadit alto, Liburnicarum ludens imagine, & si quid pavoris interveniat, hausta se mergens aqua. Eundem exactissimè Bellonius descripsit. Concha, inquit, tribus fragmentis constare videtur (carina scilicet & lateribus, cum tamen una & simplex sit) quarum latera utrinque ceu carinæ junctæ apparent, ea ut plurimum magnitudine, quam ambæ manus amplecti possent: latitudine autem quantum pollex cum indice comprehendat. Omnes autem non excedunt crassitudinem membranæ pergamenæ, striisque in oblongum ductis, ad oras crenis lacinia-tæ sunt, in formam rotundam abeuntes: foramen autem per quod Nautilus alitur atque exit de *Concha*, magnum est. Fragilis hæc lactei coloris, lucida, admodum polita, omnino navis rotundæ effigiem referens. Navigat enim per maris summa, elatus de imo gurgite offertque se testa inversa, ut facilius ascendere possit, & inani scapha enaviget, atque ubi inde emerferit, tum concham invertit. Cæterum Nautili brachiis interjacet membranula, qualis est inter palmipedum digitos, sed hæc magis est tenuis, in telæ aranæ modum, robusta tamen, qua etiam aura inspirante velificatur. *Cirris* quos utrinque multos habet, pro gubernaculis utitur, atque ubi metuit, tum concham protinus marino humore oppletam demergit.

Alterum Nautilum, Cochleam margaritifera Bellonius vocat, & videtur eam Fauconerius describere, cum in Epistola ad Gesnerum ait, suum Nautilum, testam habere interna parte ita nitentem, ut cum unionibus preciosissimis de coloris amoenitate certare posset. Bellonius enim suæ il-

Arist. H.
A. l. 4. c. 2.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 29.

lius cochleæ concham, in magno apud artifices Gallos, ad vasa ditioribus abacis accommoda conficienda, precio esse, & *Porcellanam* ob id vocari scribit. Fauconerius multa in sui Nautili testæ carina tabulata, eodem amœno colore nitentia, fuisse prodit. Hinc facillè colligas eundem cum eo esse, quem à Græcis *Σαρόπυλον πυνθαμίδιον*, id est, polythalamum dici scripsimus. Plinius cum de Nautilo paulò ante dixisset, mox tanquam de altera ejus specie: Navigeram similitudinem, inquit, & aliam in Propon-tide visum sibi prodidit Mutianus. Concham esse acatii modo carinatum, inflexa puppe, prora rostrata: in hanc condi Nauplium animal Sepiæ simile, ludendi societate sola: duobus hoc fieri generibus. Tranquillo enim, vectorem demissis palmulis ferire ut remis; si verò flatus invitent, eosdem in usu gubernaculi, pandique concharum sinus auræ. Hujus voluptatem esse, ut ferat, illius, ut regat: simulque eam descendere in duo sensu carentia: nisi fortè tristi (id enim constat) omine navigantium humana calamitas in causa est. Cardanus quoque cujusdam cochleæ meminit, quam India mittit. Est, inquit, forma triremis cum alta puppi, in qua vasculum aliud, diceres poculum à natura excogitatum. Nam & magnitudo tanta ejus quam vidi, ut cotylam capiat. Res profectò usus elegantissimi & pulcherrimæ formæ.

ARTICULUS II.

De Purpura.

TAB.
X. 5. 6.
c.
Nomen.

Plin. H.
N. l. 9. c.
35.

Plin. H.
N. l. 9. c.
36. & 39.

Plin. H.
N. l. 9.
c. 36.
Descriptio.

Purpura Græcis *πορφύρα*. Plinio aliquando Pelagium, Politiano concha Herculea, quòd tincturæ Hercules author creditur; Serapioni Pulpia, Brasavolo Antale dicitur. Qui cum Conchylio confundunt, à Plinio refutantur. Distinguit enim iste, & expresse apud eum legimus. Conchylium & purpuras omnis ora atterit, quibus eadem mater luxuria paria penè etiam margaritis fecit. Nec minus illi, qui Conchylium idem cum Buccino ponunt, quòd Plinius cum duo tantum genera Turbinatorum continentium florem illum tingendis vestibis adeò expetitur poluerit, alterum Purpuram, alterum Buccinum esse, necesse videatur. Eodem enim libro hæc verba extant. In Conchyliata veste cætera sine Buccino, præterque jus temperaturæ aqua pro invisio potus humani excremento. Concham ex Turbinatam genere esse Aristoteles prodidit, & aliquot ipsarum genera agnovit, ut circa finem dicemus.

Descriptionem si spectes, sæpe ovi est magnitudine, aliquando major, nisi elevata & aculeis munita esset, & canalem ad latus qua linguam exeret haberet. Rugata eadem, aspera, cinerea, aliquando fla-

vescens, aliquando ex viridi cinerea, intus luteo colore. Rostro est longo tubuli modo excavato: Cornua Limacum more attolit, atque eodem modo serpit, iisdem cornibus iter sibi præterendit. Linguam ex tubullo illo canaliculato in latere procurrentem habet, quæ callosæ huic parti adhærescit, cui caro ipsi testæ adjungitur. Est autem ea caro, musculus quidem fortis ac candidus, mediæ testæ alligatus, quo Purpura tanquam congenito quodam operculo, carni patulæ opposito, diutissimè extra aquam vivit. Marinam enim aquam haustam asservat, qua pluribus diebus refovetur ac sustentatur. *Caput* illi cartilagineum ac durum. *Os* in ea parte qua scopolis hæret, rotundo foramine pervium, quo lapides arrodit; & in stomachum exurgens demittit. *Hepar* quoque habet viscidum, tenaci quodam lentore præditum, ut penè viscum esse appareat. Sed hoc quod de hepate, branchiis, & corde, Bellonius scripsit, pro fabulosis censet Rondeletius.

Et hæc quidem recentiorum Descriptio est. Ut vero & veteres videamus, Clavatam Plinius facit Purpuram ad Turbinem usque, aculeis in orbem septenis ferè, qui non sunt buccino. Testam intortam curiculatim in crepidinem desinere, apud Aristotelem extat. *Partes* illæ quæ Dioscoridi secundum Hermolaum *κίονα*, aliis *κίονα*, quod violam significat, partes sunt interni Purpuræ corporis mediæ, fibratæ, torosæ, & firmæ, circa quas testæ volumina capreolorum ritu circumvolvi incipiunt secundum Dioscoridem: vel quibus hæret vena illa vel membrana illam floream Purpurarum continens, inter *papaver* nempe quod turbinata omnia sua clavicula continent, quod est inferiore loco, & cerviculam seu collum superiore loco.

De eo flore seu succo ita breviter Aristoteles: Inter papaver & collum florem continent, textura densa, colore candidæ membranæ, qua ablata & compressa manus flore tingitur. Hoc ipse flos videtur esse: reliqua concretio, quasi alumini. Id Plinius florem in mediis faucibus habere dixit, liquoris eum esse minimi in candida vena, unde pretiosus ille bibetur, nigrantis rosæ colore subluces, reliquum corpus sterile. Rondeletius partem succum continentem, cordi proportionem respondere existimat, florem, sanguinis loco esse. *Caro* earum penitus includitur, nec ulla ex parte, excepto capite conspicitur, ut apud Aristotelem habemus: Testa sua adhæret. *Linguam* duram habere eaque testas escarum perforare, non tantum ab Aristotele, sed & Plinio, qui longitudine digitalis facit; & Æliano proditur: Rondeletius promuscibus muscarum quæ inter cornua comparat, & firmam, torosam, quæque exeri possit,

Arist. H.
A. lib. 5.
c. 15.

Arist. H.
A. lib. 5.
cap. 15.

Plin. H.
N. l. 9. c.
36.
Ælian. H.
A. l. 7.
c. 34.

Galen l. 3.
de Medic.
secund.
loc.

possit, concedit: sed tam duram esse ut testas perforet negat, rostro id fieri verisimilius addens. Qui *κροκίδα*, seu *κροκίδα πύς* apud Galenum, pro tomento purpurarum, pro depexo & contuso in medicamentis veteres uterentur, sumunt, vehementer falluntur. Lanæ enim purpura tinctæ crassior & minus curata pars est, cuius & Dioscorides meminit. *Operculum* varia apud authores sortitum est nomina. Plinius purpurarum cavum dixit, Aristoteles *καλυμμα*, *ἐπιμάλυμμα*, Galenus *παρίς* vocavit. Alii *βλαπτον βυζάντιον*, vel *βύζαντον*, à Byzanto vel Byzantio Africæ nominant, & longè verius quàm illi, qui id nomen originarium purpuræ adscribunt, quas non habet, vel qui blattas Byzantias buccinorum & Conchyliorum permixta opercula appellant. Galenus Indici conchilii testam inter ostraca & testas purpurarum & muricum generatim comprehendit. Nec negandum fortè est, Conchylii, buccinæ & purpuræ opercula, nec substantia, nec viribus differre, nisi fortè unguis odoratus differentiam supponat. Nam blatta Byzantia dum uritur ingrati est odoris, & castoreum redolet: unguis verò, suavem odorem spirat. Potest tamen & id quod *ινάδες* Græcis dicitur, gravis apud Latinos odoris esse, & in quibusdam locis ungues odoratos, foetidos in aliis reperiri. Ut ut sit, Carni hæret operculum purpurarum ut unguis noster. Ex filis seu fibris coaguntur, & quia pinguedinis aliquid in se habet, fumum cornu modo accensum emit. Et hæc quidem de partibus sufficiant.

Flos Purpuræ.
Vitru. l. 7.

Flori, qui & succus Plinio, *το αἷμα τῶν πορφύρων* Græcis, varia indita sunt nomina. Vitruvius ostrum dixit *ἀπὸ τοῦ οὐράκου*, cui Virgilius Sarrani epitheton, à Sar urbe Phœnicæ, quæ postea Tyrus, unde purpureus color & Saranus & Tyrius, secundum Massarium addidit. Nec tamen omnis Purpura ostrum, ut tradit Gellius, quamvis omne ostrum purpura sit, quod exuberantiam splendoremque ruboris habet, hoc est, illustratur splendore, quo alia purpura caret, *Saniem* etiam præter Plinium idem Vitruvius vocavit, Pollux *κόθρον*, Fucus, pelagium, venenum Tyrium, purpurissum, *κίλκκι* ejusdem sunt apud alios nomina. *Tria* verò hujus floris, à varietate coloris sumpta, posuere genera, *πορφύριδα*, coloris violacei, saturati, & subnigricantis, quo colore *πορφύρεον κῆμα* Homerus dixit: qualis erat amethystina & quæ è Pelagiis purpuris & buccinis fieri solebat. *Φοινικίδα* puniceorum rubentem colore cocci, qualis fuit Tyria vel Tarentina. *Αλκυρίδα* denique colore glauco, irato mari simili, austero, diluto, qualis fuit conchyliata, Tyria omnium celeberrima, quæ & ostrum dicebatur quo obscurior & nigricantior eo

carior. Sed & à loco aliqua est differentia. Testature enim Vitruvius, ostrum quod legitur in Ponto & Gallia, quod hæ regiones sint proximæ ad septentrionem, esse atrum. Progredientibus inter septentrionem & occidentem, lividum: quod legitur ad æquinoctialem, orientem, & occidentem, violaceo colore inveniri: quod verò meridiana regionibus excipitur, rubrum esse. Inventum fuisse à Phœnice regnante à Tyrio Philosopho Hercule produnt. Cum enim in eam, referente Cedreno, Tyri partem ascendisset quæ ad mare pertinet, pastoris canem concham vorantem, & pastorem lana sanguinem prout ille putabat à sanguinis ore abstergentem vidit. Tinctura delectatus, lanam istam ad Regem detulit, qui lanam ita tingi, & sibi vestem parari curavit.

Quantum ad Purpurarum *locum* in pelago & littoribus ut in Differentiis dicemus degunt, nec ulla magis idonea ipsis regio quàm limosa. Si amnis in mare effluentis aquam degustarint, eodem die moriuntur. Dies tamen circiter quinquaginta extra aquas captæ vivunt, sæpe in arena latent, & canis exortu circiter tricenos dies conduntur. Sunt tamen peculiariora loca, quæ à Purpuris celebrantur. Virgilius & Petronius Assyriæ meminere, Plinius Meningis Africæ insulæ, non longè à Syrtibus sitæ, quam Lotaphagorum terram putant, & Getulici littoris: Laconica Pausania, Horatio & Valerio Flacco celebris est. Unde huic fucus Tenarius; Arriano, Muxa emporium ad mare rubrum. Teniensem purpuram apud Plinium lego, fortè quod in tæniis seu cautibus in mari candicantibus, & fasciæ instar prætensis, degit. Dialutensem seu fortè Dialutensem alibi, quasi *δία* & *λυτον*, quod per salum æquor rapit: Porphyrysa Aristoteli à frequentia Purpurarum dicta est. Fit & Melibææ apud Festum mentio. Celeberrima denique omnium est Tyria, ut Plinius de suo tempore scripserit: Tyri nobilitas nunc omnis Conchylo atque Purpura.

Vicitant pisciculis teste Aristotele: sed nec algam nec muscum rejiciunt. Ita ista in suas testas recipiunt, ut iis in orbem exercitis, quasi circularem conviventionem præbeant, una alterius alimentum depascente. Plinius pabulo & solo purpurarum genera discernit, ut sit lutense, quod putri limo; algense, quod alga; dialutense quod vario soli genere, pascitur. Istud esse vilissimum.

Ortum apud Aristotelem invenio duplicem. Vel enim ex limo existunt vel ex favillario lentore, ut Plinius prodidit, quem emittunt, de quo ita Aristoteles: Purperæ verno tempore eundem in locum congregatæ faciunt id quod vocant favaginem. Est enim favi species, sed minus expolita.

Quem-

Locus.

Vitus.
Arist. H.
A. lib. 8.
c. p. 2.

Generatio.

Arist. H.
A. lib. 5.
c. 14. dit.
Scalig.

Quemadmodum si folliculus alborum cice-
rum multis quiddam compactis. Nullus his
patet aditus, neque inde fiunt pupuræ, sed
tum illæ tum testacea alia ex putredine atq;
limo proveniunt. Sed id est quasi purgamen-
tum & ipsis & buccinis. Etenim hæc quoque fa-
vificiant. Generantur verò hæc quoque fa-
vificiantia, quemadmodum cætera testacea.
Cæterum etiam facilius, si qua subsint prin-
cipia referentia genus suum. Cum enim inci-
piunt favificare, emittunt lentorem quen-
dam mucosum, ex quo folliculi concresecunt
illi. His igitur omnibus solutis, effluit inter-
ram id quod continebant. Atque eo in loco
purpurillæ minutæ oriuntur atque concre-
scunt, quæ hærentes purpuris capiuntur, ali-
quot etiam inchoatæ tantum. Quod si ante
partus tempus capiantur, in ipsis storeis non
tenerè pariunt, sed in eundem locum con-
ventu factò quemadmodum etiam in mari:
Unde per cratium angustias quasi racemi
prodeant. Celerrime inter testacea cre-
scunt. Sex annos vivunt, & singulis annis
incrementum earum per orbes patet, qui-
bus totidem quot annos habent, testa cla-
viculati in torta in crepidinem desinit. Pa-
rum progrediuntur, & ad escas à longo ac-
cedunt, quòd odoratu valeant. *Tincture*
ratio alio spectat. *Usus in Cibis* præstant, &
hoc cum ostracodermis communes habent,
quæ falsum succum contineant, eodem-
que alvum subducant, carne autem sint
dura. Athenæus in Hicesio papaver co-
piously alere scripsit, magis tamen Scillam
sapere. Colla ægrè confici & difficulter se-
cedere excrementum facile, partes extremas
aptissimas esse, & seu elixas seu assas hu-
mori ori gratum & stomacho accommo-
dum emittere, Xenocrates prodidit. Pe-
culiare est eis quòd coctæ julsulis spissent.
Nec à *Medicina* excluduntur. Contra venena
prodesse, docuit Plinius, contra Dorycnion
Nicander. Saliva recentia vulnera aggluti-
nantur. Callus pro se operiuntur tusos gluti-
nat nervos præcisos. Testæ cinis pustulas ve-
rendorum è melle discutit, ad dentifricia
cum rosis & caryophyllis usurpatur. Cum pul-
vere glycyrrhizæ, papaverisque semine, cre-
more hordei pauco vino albo pulmonibus
auxilantur, & flexiones sistet. In pollinem
redacta ulceribus malignis competit. Cum
melle illita, pilos attenuat. Filum è purpura
quo vipera cervici circumposita suffocata
fuit, collo circumdatum tonsillarum affe-
ctus tollit. Aëtius verò purpuram hircinio
felle madefactam & mulieri umbilico die-
bus septem impositam conceptum juvare
tradit, si deinde crescente luna cum viro
congregiatur.

Differentia seu genera, si quæras, sunt
Magna, quæ ad Sigæum & Loctum Idæ pro-
montoria giguntur. *Parva*, quas Euripus
fert & Caria. *Pelagia* quæ magnæ & sca-

bræ, quarumque flos magna ex parte ni-
ger, sed nonnullis pusillum rubidus. Non-
nullæ ad pretium minæ evasisse, prodidit
Aristoteles. *Littaroles* quæ parvæ, & flore
sunt rubro. *Echinata*, quæ vel pluribus
spinis maximè in postica parte horrent: vel
rarioribus, minoribus, & brevioribus. Illæ
extra modò flavescent, modò candicant:
intus, modò violacei sua ut coloris modò
rubicundi. Istorum tota turbinata pars ru-
bicundo colore conspicitur, dorsum verò
partim rubet, partim virescit. Anterior
mucro acutus non est, sed notabili lati-
tudine spectabilis. Intus colore ferrugi-
neo, flavescente ac eleganti cæruleo va-
riant. Sunt & *Rubra*, ut in Austrinis parti-
bus *Nigra*, in Aquiloniis; *Livida*, in Oc-
cidentalibus & Orientalibus. Marmoreæ
qualis est illa longis undique tuberibus, ubi-
que ferme duplicibus at minimè acutis, sed
obtusis plena, labro latissimo, quasi canali-
culato, binæ enim id foveæ percurrunt,
tota ferè marmoreæ duritie, undique can-
dida, præterquam in extremis foraminis
oris, quæ purpurascunt. Ad hanc pertinet
tota ex cinerem candida, minor quàm
prioris omnes labro subtus spinosa, cum
alioqui nullæ in toto corpore spinæ dentur.
Ventre est plene sessili, seu non turbinato.
Pentadactyli denique qualis est illa quam
superius descripsimus, Gesneri quam ex A-
driatico mari accepit.

ARTICULUS III.

De Buccino.

Buccinum à similitudine potius buccini
quo sonus editur, rotunditate oris in
margine incisa, ut Plin. visum dicitur, quàm
quod vel buccis admodum sonos musicos e-
dat, vel buccas inflare tubicines rogat, ut
Bellonius voluit, Gillius masculino genere
extulit, quidam etiam dentale buccinum in-
terpretantur. Græcis hodiernis *φύκιον* dici
Gesn. autor est: nonnullis *σφόμβιον* & *σπίβιον* i-
dem significant. Communiter *κέρυξ*, fortè à
cera, quam mucò similem mutuo attritu sa-
livant, quod Græcis est *κνίλαξ-ιν* vocatur: quod
vocabulum ex antiquis Græcis nonnulli pro
purpura sumpserunt: Plinius nonnunquam
muricem transtulit Athenæus purpuræ fi-
lium nominat.

Testa tegitur scabra, eaque congenita
promuscidibus, ut musca instruitur, quod
membrum linguæ effigiem præ se fert. Ven-
ter os protinus excipit, similis in umbilicis
ingluviei avium. Infra duo candida quæ-
dam firma specie mammillari, qualia
in sepiis inveniuntur: sed hæc solidio-
ra. A ventre gula duplex longa ad papa-
ver usque, quod papaver in fundo est:
quæ omnia perspicui possunt in sinu verti-
coso testarum. Quod gulæ jungitur intesti-
num

Tab. X.
8.

Plin. H.
N. l. 9 c.
36.

Descri-
ptio.
Arist. H.
A. l. 4. c.
4.

Ætas.

Ufus in
Cibis.

Ufus in
Medici-
na.
Plin. H.
N. l. 32.
cap. 6.
Plin. H.
N. l. 32.
c. 10.

Arist. l. c.
Diffe-
rentiæ.

num est, à qua continuo tractu fertur totum simplex usque ad exitum, incipiens à verticoso sinu quo papaver continetur, atque inde laxior. Papaver verò pars ejus ima esculentaque est. Inter hoc & cervicem flos est, sed, ut Plinius dicit, dilutior & minus floridus. Et hæc de Buccino veteres. Bellonius Buccini concham ut plurimum minimi ovi magnitudinem non excedere, strias in tergore quinas habere, ut nerita, plerisque in gyrum tuberculis obtusis, brevibusque obseptas, multo quam in purpura frequentioribus, sed ubi in claviculum desinunt, unicum tantum eam comitari testatur. Interna parte incisam oris magnitudinem habet turbinum modo, & canalem ad latus, per quem linguam exerit, purpurarum modo: eodemque operculo contegitur, qua etiam turbinata omnia, ne in testas contracta ab externis offendantur. Color testæ intus lacteus foris fulvus, tantaque magnitudine aliquando crescit, ut ad Cartejam purpuræ & buccinæ deca cotyli, id est, decem cotylorum capaces reperiantur.

Locus.
Arist. H.
A. l. 8.
c. 13.
Arist. H.
A. l. 5.
c. 15.
Genera-
tio.

Locum si spectes, petris adhærent, circaque scopulos leguntur. Canis exortu circiter tricenos dies latere scripsit Aristoteles, quod Plinius de muricibus accepit. Annos circiter sex vivere, idem tradidit.

Idem ipsis *Gignendi* modus qui purpuris. Semen ad generationem nullum habent. Favificare in more eis positum. Ova sub lapide prona parte oblonga albaque, deinceps pendentia disponunt, quæ ita disposita favi nomen habeat ab apum similitudine. Supini autem sub lapide stabulantur, cum favificant: quo verò tempore favos extruunt, si incoquantur & abscindantur, ova intra continere comperientur: quæ saliverio lentore lapidibus & cautibus ferruminant, ut inde decidere non possint: quod tam magno artificio constituunt, ut nihil coacervatum esse videatur.

Ufus in
Cibis.

De earum in *Cibis usu*, hæc scripsit Xenocrates. Buccinæ sunt duriores purpura; & magnitudine ac loco differunt, triplicesque vires habent, testæ, colli & excrementi in testa contenti. Nam scabra substantia piscis alvum sistit, ac præcipuè si assetur: contra magis facit elixa.

Collum earum alvum sistit, difficulterque concoquitur: idcirco ex sinapi vel aceto, aut liquore, aut pipere corrigere ipsum debeat, qui eodem vescuntur. A qua denique quæ ex eis manat, calefacta, ventrem subducit: Cum eo verò excremento quod testa continetur, cocta, magis gilva fit, & piscis qualitatem præfert. Si verò totæ decoquantur, majorem sistendi vim habebunt, & sitim offerent. Quidam verò eas elixas lævigant, & æquè acurticas condiunt, fiuntque ori gratæ. Luna exoriente ple-

næ, & æstate graciles. Eadem apud Dioscoridem, Galenum & Diphilum invenire licet.

Habet & in *Medicina usum*. Cardialgia laborantibus in cibis præscribit Trallianus, purulentis etiam, si falsus humor est. Ad alocepiam, usta, trita, & in oleo veteri subacta, & ad glutinis crassitudinem redacta à Myrepso vehementer commendantur.

Galenus ad ophelidas & lenticulas, in furno assæ & ex melle trita commendat. Andernacus & succo limonum detrita ad genas mulierum dealbandas deprædicat, præsertim si aliquid argenti vivi sublimati, iisdem injeceris. In Belgio contra tussim inanem inprimis & puerorum, potus ex buccino propinatus.

Differentias quod spectat, Rondeletius duo reperiri scribit, parvum, nempe, lineis frequentibus asperiusculum, & alterum ei simile, nisi quod lineas prominentiores habeat, & transversas, ut striatum meritò dici possit. Est & testa spissiore durioreque, nec non genus magnum coloris violacei, sed cujus orbes flavescent, & in ore candicat. Gesnerus se & aliud vidisse scribit, purpuræ similis, figura & magnitudine propius, tuberculis undique dispositis, deinceps rotundis scitè omninò eleganterque *exord.* elevatum; nec in mucronem adeò exporrectum, sed capite obtusiore brevius. Miffa & Aldrovando peregrina, colore & duritie marmoris, circulis rosas æmulantibus.

Ufus in
Medici-
na.

Differen-
tiæ.

ARTICULUS IV.

De Murice.

MUrex modò Buccinum, modo Purpuram significat, taceo colorem purpureum, cui Muricis nomen imponitur. Hic pro testaceo sumitur, quod & turbinatum & longos firmosque aculeos habet, nomenque ab asperitate murorum sortitum est. Perottus inter ostrea enumerat, propter scabritiem corticis. Sed alia in Ostreis asperitas, alia in Muricibus. Illa per totam superficiem sese repandit: hæc, aculeis quibusdam per intervalla eminentibus constat, iisque longis & firmis, quod Plinius quoque firmare videtur dum ait: Firmioris jam testæ murices & Conchar. genera. Valerius Flaccus dum intortum vocat, de buccino sumendus est.

Usum in Cibis quoque habent, sed illaudatis. Xenocrates enim falsos virosos esse, & ventrem turbare, urinam ciere, ori ingratos, concoctu difficiles pituitam gignere, &c. scribit. Scribonius Largus tamen & Celsus inter Cibus stomacho gratos recensent. Apud Macrobius etiam cum aliis conchis in epulo apponuntur, quo die Lentulus flamen inauguratus est.

Tab. X.
& XI.
Nomen.

Descri-
ptio.

Ufus in
Cibis.

Largus
Compos.
104.

Usum

Ufus in
Medici-
na.

Usum in Medicina si attendimus, Car-
nes appositæ pilos in mammis tollunt: Te-
starum cinis cum oleo tumores aufert; pa-
nis resistit; Capitis ulceribus cum melle
illinitur; maculas in facie mulierum purgat,
& parotides tollit. Habetur & pro dentifri-
cio. Carbunculos de veretris extermina-
re, Marcellus Empiricus prodidit.

Diffe-
rentiæ.

Quantum ad *Differentias* & *Genera*, est
Murex Marmoreus, *Triangularis*, *Lacteus*,
Purpureus Orthocentros, *Coracoides*, & *A-*
porrhais. *Marmoreus* à candore & duritia
nomen sumpsit. Rondeletii parte interna
ex albo purpurascit. Testa gravis est: den-
sa, solida, aculeis multis horrens, figura
inter buccinum & conchylum media,
ampla, ut meritò *δεκακύνυλος* dici possit. U-
ritur facilè, & in cinerem abit, acrimoniam-
que ob empyremum acquirit. Ambustis
medetur, cicatricemque pulchram indu-
cit, postquam abluta, & cum oleo rosato
in unguentum redacta fuerint. Gesneriani
marmorei muris color forinsecus pallefcit,
intrinsecus cum pulcherrimo splendore ex
albo roseus est. Labrum exterius pro-
tendit se & dilatatur in marginem: mucro-
nes infra caput seu conum testæ duo ma-
gni, sed obtusi prominent. In ipso cono
parvi admodum & subrotundi, per spiras
deinceps non aculei sed tumores visuntur.
Huic accedit *Aldrovandi*, turbine acutissi-
mo atque longo & exili, undique strictus
aut potius undatus.

Triangularis, altera parte est planus, al-
tera ferè rotundus, sed ita ut utrinque sint
duo latera, tertium, plane pars afficiat,
à qua figura, quæ huic propria est, no-
men sumfit. Aculeos habet breves & firmos,
vario est colore, foramen duplex habet ru-
gosum, quo ob testæ amplitudinem & bre-
vitatem sonus editur gravis & tristis. Oper-
culum cum uritur fumum emittit. Pingue-
dinis aliquid habere, rectè inde colligas.
Quare in oleo amygdalino decoctum in
aurium doloribus utiliter usurpatur. *Lacteo*
color nomen imposuit. Obtusior est tur-
bine aliquando quam cæteri, aliquando
Exochas potius & tubercula habet quam
clavos. Triplicis effigies invenies apud
Aldrovandum. *Purpureos Orthocentros* to-
tus forinsecus & intrinsecus rubet, tur-
bine candicat. Mucrones habet duodecim
rectos & robustos, sex constat volutis
quæ exiguis & obtusis tuberculis respergun-
tur. *Coracoides* Rondeletio ab infirmis &
rostris corvorum similibus aculeis dicitur.

Aporrhaides quidam inter Lepades,
quòd ut istæ saxi adhæreant, ponunt; sed
malè. Faciunt enim & Neritæ idem, quæ
tamen toto genere ab iisdem differunt. Ad-
de lepades parte altera detecta & carnem
ostentante affixas; Aporrhaides verò ac-
clinato tegmine, quod iis operculum est,

ad saxa agglutinantur. Quid si illius
Muricum generis sint, quæ Græci Plinio
prodente Colycia, & Corythia vocant,
turbinatae æquè sed minora multo, effi-
cacia etiam, & oris halitum custodien-
tia. Ut ut sit, quem Aldrovandus expressit,
marmorea est duritia intus & extra candi-
cans, septem aculeis, ab uno tantum late-
re, iisque canaliculatis instructus.

Plin. H.
N. l. 32.

ARTICULUS VI.

De Conchylio.

CONCHYLII nomen ut ut universo
testaceorum generi imponatur, pri-
vatim tamen pro unica specie accipitur.
Sic apud Plinium invenimus, cum in Pon-
to conchyliæ non esse cum ostrea abundant,
scribit: sic apud Philostratum in vita Apol-
lonii, cum, in Biblo maxima conchyliæ &
murices eximie magnitudinis nasci, dicit.
Sumi & pro colore, apud Plinium in pri-
mis, tam certum est, ut demonstratione
non indigeat. Qui pro Ostracio sumunt,
nomen partis toti accommodant. Est autem
ea parte latius qua in turbinem deficit, si-
ne aculeis tuberculis veullis. Foramen quo
caro interior ostenditur, non rotundum,
ut in purpura & buccino, sed longum. O-
perculum blattam Byzantiam Serapionis
esse, quæ eadem, quod avium unguem æ-
muletur, cum ungue Dioscoridis, opina-
tur Rondeletius. Nec *ἀλδης* vocabulum o-
best. Nec enim hoc semper gratus inuitur
odor: sæpe etiam gavis. Idèò expressè
Dioscorides, *ἀμφότεροι δὲ ἐν αὐδαίς, θυμιάματα, καὶ ὀρί-
ζοντες ποσὶς τῇ ὁσμῇ*. At castoreum foetet, & u-
trumque, tam operculum, quam hæc blat-
ta Byzantia ad suffocationes uterinas adhibe-
tur. Quod autem, in Indiæ nardiferis lacu-
bus unguis inveniri, & nardi pabulo vesci
dicitur, cum conchylum marinum sit, id ex
aliorum potius quam sua sententia à Diosco-
ride scriptum opinatur Rondeletius. Simi-
lis purpuræ tegumento dicitur, non figura,
sed usu potius & substantia.

Aldrov. l.
3. c. 15.

Laudatissimus est qui à mari rubro ad-
fertur, candicans, pinguis. Babylonius ni-
grescit atque minor conspicitur, succum
ipsis & quidem purpureum inesse testatur
Plinius. Partes ejus omnes in medicamen-
tis usurpantur. Crematum idem efficit quod
purpura & buccinum. Caro interna medi-
camentis aurium dolores sedentibus à Gale-
no admiscetur.

Ufus.
Plin. H.
N. l. 21.
c. 8.

Galen. l.
3. de Med.
f. l.

CAPUT II.

De Turbinatis in orbem circum-
actis.

ARTICULUS II.

De Turbinibus.

Tab. II. **T**antum de *σπομχίδες* seu Turbinatis, & in anfractum tortis, sequuntur Turbinata, quæ in orbem circumaguntur, *Turbines* nempe, *Trochi*, *Nerite*, *Cochleæ*, *Echyni*, & *Conchylia*. *Turbinum* haud spernenda sunt genera.

Descri-
ptio. Est turben *magnus*, *auritus*, *tuberosus*, *angulosus*, *muricatus*, *pentedaetylus*: sunt & *turbines inspongiis nascentes*. *Magnus* multis voluminibus constat, margine spisso & aspero, testa alba, lineis tuberculisque multis scabra & aspera. Foramen habet rotundum, & rimam qua excrementa excernuntur. Saxis hæret turbine sursum verso. *Auriti*, tres icones habemus, quorum primus perelegantem & in mari Gallico rarum exhibet, alter, intus & in tergo ferrugineum cætera croceum, concha tuberosa, pronè & supinè pictum; tertius, tuberculosum, testa superius leucophæa, infernè crocea. *Tuberoso* tubercula nomen indidere. Varii est generis, longus, tenuis, acutior, lævis, albus, niger, varius. Aldrovandus quatuordecim Icones exhibet, ex quibus secundus, est striatus, è monte erutus. *Angulosus* exinde nomen fortitus est, quod testæ volumina ita à se discreta sint, ut in medio angulos efficiant. Ustus dentificiis conficiendis ultissimus est. *Muricato*, tubercula brevia & obtusa nomen imposuere, testa est intus purpurea, foris alba, & quasi calce illita. *Pentedaetylus* dicitur, quod quinque appendices longas & acutas, si extremum turbinis annumeres habeat. *Spongiis* quæ delectantur, multorum sunt generum, quæ omnia apud Aldrovandum videri possunt.

Conchula, quæ lactea vocatur, in succo pomi Citrii, cum aqua vitæ dissoluta, mulieres ad faciem sucandam utuntur.

ARTICULUS II.

De Trochis & Nerite.

Tab. X.
Aldrov. l.
3. c. 25. **T**rochi à similitudine instrumenti, quo pueri lusitant, appellantur. Omnes sunt leves &arii. Testa veluti crustis duabus constare videtur; externa minus nitet: quæ subjacet unionum est splendore. Alii sunt parvi, alii oblongi. Icones exhibent *Magnos*, *Pyramidales*, *Niloticos albos* & *maculosos*, *Nerita* seu ut Scaliger legit Na-

rita, Græcis *νηπτός ἀνρίπτος* & *ἀνρίπτος* apud Athenæum, Hefychio *νήριτος*, dicitur. Nomen à Nereo Deo marino fortitos videtur, quod is fortè tali concha tanquam elegantiore buccinæ loco, usus esse fingatur: sicut & Triton, quem visum auditumque in quodam specu Olyssiponensis oræ concha canentem Plinius refert. Ab illis qui Adriaticum sinum accolunt etiam nunc veteri nomine appellatur. Testa est levi, si Aristotelis descriptionem sequimur, ampla & rotunda, forma buccinis proxima, papaver tamen non nigrum ut buccina, sed rubrum habet. Corpus medium testæ firmiter annectitur. Tranquillis diebus soluti pascuntur: coortis ventis recipiunt se ad saxa cancelli, atque ibi quietem agitant. *Neritæ* autem adhærent more patellarum, & earum quas *ἀπορρίπιδες* Græci vocant, & cætera horum genera omnia. Hærent enim saxis reclinato tegumento, quod quasi tegumentum esse videantur. Quem enim usum ambæ valvæ biforibus, hunc præstat altera tandem pars turbinatis. Intus pulpa carnea, inque ea os. In rimis cavernisque saxorum generantur, celerique incremento augescunt. Et olfaciunt, & audiunt. Ideò silentium servant necesse est, qui eos capiunt.

De *Natatione* eorum ita Plinius: Navi-
gant ex his *Neritæ*, præbentesque concavam sui partem, & alteram auræ opponentes, per summa æquorum velificant. *Ælianus* & *Bellonius* diversos ab Aristotelis *Nerite* proponunt. *Illius* est magnitudine exigua. pulchritudine eximia, & in mari ubi sordium nihil, & tranquillitas viget inque saxis ad imam maris sedem adhærescentibus nascitur. *Hujus*, testam in anfractum intortam habet, qua penitus inclusa, nulla ex parte præterquam capite conspicua est. Apud *Aremoricos* tanta hujus testacei frequentia, ut abscedente æstu, magnos acervos è saxis colligant, & coquant. Quia papaver rubrum habet, pulmenta ex eo confecta, ac si minio tincta essent, conspiciuntur.

Græci crudas ejus carnes edunt, quòd appetentiam excitare, inprimis cum capis comestæ, credantur. Icones plurimas apud Aldrovandum vide. Nobis aliquot duntaxat exhibere visum.

ARTICULUS III.

De Cochleis.

Cochleæ, Aristotele *κοχλίας* & *κόχλις*, quòd *τὰ ὕσρα καὶ κοχλίας μὴ* habeant, *Spartanis* *σίμελοι* & *σίσηλοι*, Hefychio & Varino *σελάται*, aliis *παματίαι* ab operculo, *φερσίαι* & *φερούσαι*, seu *domiportæ*, *χαμαιδύτοι*, *χαμαδύλιναι*, *ἀχαδαδύλλιναι*, &c. dicuntur; quorum tamen nominum quædam terrestribus potius convenire videntur.

Descri-

Arist. H.
A. l. 4.
c. 4.Motus.
Plin. H.
N. l. 9. c.
33.Nomen.
Aldrov. l.
3. c. 29.

Descri-
ptio.

Descriptionem si attendas, Teucer animal esse sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, testaceum, oculos nunc exerens nunc retrahens, ad exemplum quæstionis ludicræ scribit. Siliceo, claviculatim intorto tegmine clauditur, quod vulgus testam, & volutam, Cochlearum testam Budæus, Cochleam synechdochicè Celsus, domum Sammonicus & Statius, calicem Plinius, *κίλυσκος* Dioscorides, *ὄστρεον* Galenus vocant. Si eam detraxeris hebetescere atque exspirare quidam ajunt, negant illi, qui circa initium Augusti exire, & novis superinduci prodidere. *Capitis* figura carere, apud Albertum M. legimus. At Plinius equorum capitibus assimilavit. Massarius bovini præ se ferre figuram scripsit. *Cornua* quidam bina attribuere, ut Plinius; quatuor nos, id est, magna duo quæ posteriora sunt, & minora totidem ferè in fronte, habere videmus. An *Oculi* dati sint disquiritur. Pro visu tentamenta proportionè puncti atrioris in summo corniculorum accepisse, tradit Scaliger. Carere iis, & corniculis in quibus arenacea durities, prætentare iter, Plinius. Habere in summitate cornuum, & cum appropinquant, oculos in cornua retrahere, cornua in caput, & caput in corpus, Albertus. *Os* eis inest. *Dentes*, acuti, tenues præduri, ejusque indicium, derosam à minimis earum vitem, dentibus carnosum quid interjacet. *Promuscidem* etiam inter aculeum & linguam habent, & ori jungitur quasi ingluvies avium; à qua stomachus est, quem excipit venter; in quo situm est, quod papaver vocatur, mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. *Saliva* quæ punctis acu vel stylo carnibus manat, myxa Græcis dicitur.

Locus. Quantum ad *Locum*; reperiuntur in mari, fluviis, & terra, quarum istæ sylvas & confita arboribus loca potissimum amant. Hyeme propter frigus nimium, æstate quod fervidum tempus reformident, in occulto delitescunt, suoque succo vivunt, nisi quid roris de cælo deciderit. Ideò Varro: *Locus* is (pro cochleis) melior, quem & non concoquit sol, & tangit ros. *Locum* mutare Ælianus prodidit, ad Propontidem calidam hyemare, ad Ægialum æstatem infumere scribens.

Victus. Rore *victitare* dixi, sed non solo. Sub noctem sæpissimè ad pastum exeunt, & tum post pluvias æstivas & autumnales accenso lumine à rusticis capiuntur. Plinius mirè caulem asphodeli in Campania prosequi & sugendo arefacere scribit. Theophrastus eandem inter ficorum genera recenset. Saginabantur apud veteres in vivariis. Instituit ea Fulvius Hirpinus in Tarquinensi paulò ante civile bellum, quod cum Pompejo M. gestum est, distinctis quidem ge-

neribus earum: quia & faginam commentus est, sapa & farre aliisque generibus, ut cochleæ quodque altilis ganeam implerent: cujus artis gloria in eam magnitudinem perductæ sunt, ut octoginta quadrantes caperent singularum calices. Macrobiani seculo hæc faginandi ratio ignorabatur.

Inimicitias cum lacertis gerere apud Plinium legimus, cum laris avibus apud Ælianum. Massarius ubi limax sit, neque suem esse, neque perdicem ait. Sale super limacem projecto, totum ferè liquefcere, & in aquam viscosam converti, Albertus M. prodidit.

De *Ortu* non convenit inter authores. Solas ex omnibus testaceis in coitu cohærentes videri, & vere ac autumno prægnantes apparere, ex Aristotele habemus. Generus quoque Limaces coire, & ova parere candida, magnitudine oculorum lucci piscis, iisque incubantes mense Majo aliquando inveniri, audivisse se scribit. Albertus, & Porta ex limo, & putrescentibus aquis vel rore oriri, & ideò brevior vita frui. Hyeme tantum oriri, quod Plinio placuit, vix verisimile cum easdem lactucis innasceretur, nos viciæ sciamus. Testa detracta hebetescere, & processu temporis in aureliam transire, ut eruca, atque immobilem vivere, sed quidnam ex eo animalis pennati oriatur, compertum nondum esse, Massarii fide addimus. Terrestres contractione & concussionem corporis moventur.

De *Usu* earum in Cibis apud Romanos constat, ex superioribus. An verò boni vel mali sint succi, inter scriptores non convenit. Celsus boni succi esse prodit, nec intus vitari, Galenus; etsi Græcis in mensa frequentes, sed concoqui pertinaces, crassioris succi, & quæ ventriculo diutissimè immorentur, solidius alimentum præstare, sed tardius & paulatim concoqui. Archigenes inter *ἀσπράς* nutrientia, & syncopis exhibenda reponit: sed mendum cum Mercuriali suspicor, quod Ætius, qui ad verbum transtulit cochleas omiserit.

Plinius nec veteres, nec recentes origines esse reliquit. Fluviatiles & albas virus habere, ut & sylvestres. Alexandrinis ideò frequentiore elephantiasin, quod crebro fassamenta, limaces, quidam & asininas carnes comedunt, si Cælio Rhodigino, & Galeno credimus. Mathiolo quæ in apricis degunt locis, & odoratis victitant herbis, iis quæ in opacis & palustribus degunt, præstant. Dioscorides terrestres stomacho utiles esse, nec facile corrumpi scribit. Optimas Sardonicas, Africanas, Astypaleicas, & quæque in Sicilia ac Chio gignuntur, quæque in Liguria Alpibus, pomatiæ, cognominantur. Ma-

Macrobiani
Saturni.l. 3. c. 13.
Plin. H.
N. l. 8. c.39.
Antipathia.Generatio.
Aristot. l.
3. de Ge-
ner. l. 11.Plin. H.
N. l. 9.
cap. 51.
Plin. l.
19. c. 10.

Usus.

Galen. l.
3. de
Alim
facult. c.
2.Mercur.
Var. lect.
l. 1. c. 5.Dioscor.
M. M. l.
2. c. 8.

rinas facile excerni: fluviatiles virus ole-
re; quæ vepribus frutetisque glutinatæ co-
hærent, quas sefilos vocant, ventrem &
stomachum turbare, addit.

Marcellus earum usum penitus impro-
bat. Apud Apilium lacte & pulte pastas
invenies. *In Medicina* frequens earum u-
sus. In capitis dolore, caput præcisum de
collo suspenditur. Earundem pinguedine
capilli multiplicantur. Integræ pro febris
amuleto, de collo suspensæ commendan-
tur. Oculis caligantibus Africanas com-
bustas & tritas, Marcellus Empiricus com-
mendat; auribus dolentibus, cum oleo
nardino aut rosaceo fervefactas Ascle-
piades; cum hordeo decoctas Villanova-
nus. Cartilagine, carnem earum, glutina-
re, Hollerius prodidit; nervos Dioscori-
des Tagautius emplastro ad maturanda
œdemata adhibet. Sanguinis è naribus flu-
xum concisæ ex aceto sistunt. Cum melle
& felle bovis mistæ, anthraces maturant &
rumpunt. Tritæ cum suis volutis hydropi-
corum aquas exsugunt.

Aqua ex Cochleis destillata, hæcticam
febrem ad uncias sex sumpta tollit; macu-
las oculorum, cum fimo lacerti, corallio
rubeo, & saccaro destillata, abolet: clavos
& verrucas, resectas, mense Majo vel O-
ctobri detracta & instillata sanat. Pollen de
testis limacum inanibus contritis fissuras
manuum pedumque inspersus tollit, &c.
Plura vide in Aldrovando.

Diffe-
rentia.

Jam de *Differentiis* dicendum est. Mul-
tiplex autem ipsarum est varietas, magni-
tudinem, figuram, colorem, regionem,
victum, vitam, & alia, si spectemus; sunt
nigræ, albæ, ruffæ, varinæ, nudæ, testæ.
Adhærent fico, lauro, asphodelo, carduis,
aut foliis gregatim.

Ælian.H.
A. l. II.
c. 21.

In mari rubro, maximam, testa purpu-
rea, cum spira in medio, mira colorum
varietate, invenire, scribit *Ælianus*. Ser-
tum, inquit, summo artificio & orna-
tu contextum, è floribus multijugis, uri-
dibus, aureis, rubicundis, per æqua inter-
valla digestis. Gyllius tantæ se unam magni-
tudinis vidisse asserit, ut tantum vini cape-
ret, quantum piscator exsiccare uno pran-
dio posset. In *Ægypti* Nilo grandissimæ fe-
runtur, vocales, ululantium expressa simili-
tudine.

In agro Romano sunt quædam lupinis pau-
lò majores, quæ autumnò quorundam car-
duorum caulibus acervatim adhærescunt, si
Mathiolo credimus. Minutæ fortè *Plinio*.
Sunt & *Echinophora* oblongæ, quibus tubæ
loco utuntur tubicines; *Pomatia*, quæ can-
cellum qui testas ingreditur, rarò excedunt,
& in Tridentinis montibus, è Terra, hye-
me, & frutetis, uncis quibusdam ferreis,
propè fruticum radices, terra circumfossa,
eruantur, præstantissimæque censentur.

Seseli, quæ sylvestribus frutetis & senti-
bus adhærent, & ex quibus quædam ope-
re vermiculato à natura elaboratæ conspi-
ciuntur: *Cavatica* in Balæaribus insulis
quæ non prorepunt è terræ cavernis, neque
herba vivunt, sed uvæ modo inter se cohæ-
rent. *Minus* denique *vulgares*, quæ adhæ-
rente operculo ejusdem testæ sese ope-
riunt, & semper terra obruuntur. Circa ma-
ritimas Alpes quondam effodiebantur, for-
tè & hodiè. *A regionibus* sunt *Illyrica*, *Plin.H.N.*
quibus magnitudo præcipua; *Africana* *l. 9. c. 56.*
quibus fœcunditas; *Solitane*, quibus no-
bilitas; *Sicula*, quæ modicæ, quoniam
magnitudo duras, facit, & sine succo, *Asty-
palaica*, quæ laudatissimæ, *Linusia*, ab a-
gro cui nomen Lina est, ita dictæ juxta Py-
tiuntem, medio inter Parianam coloniam &
Priapum spacio; *Germana*, quas *Vegetius*
in potione equi prophylactica, admiscet.
Acerata, quæ latæ & multifariam nascun-
tur. Et hæc quidem Terrestres sunt. Mari-
nis accensentur, *Sarmatica*, *Celata*, *Olearia*,
Depressa, *Rugosa*, *umbilicata*, *Echinophora*,
Cylindroides, & *lævi turbine obtuso*, addi his
umbilici possunt.

Sarmatica, in mari Sarmatico invenitur.
Dolium corporis mole æquat, cornibus ar-
boreis cervum. Extrema cornua in orbi-
culos rotundantur, unionum instar splen-
dentes. Cervice est crassa; oculis accen-
sæ candelæ modo micantibus; naso obro-
tundo, & pilis felium ad instar obvestito;
riktu oris magno, sub quo pendet promi-
netque carnea moles, aspectu subhorri-
da. Quatuor nititur cruribus totidem latis
& aduncis palmis.

In Dania se vidisse, fortè mentitur The-
vetus. *Chelata*, Caragolo demat, seu Sca-
ragolo Hispanis, testa est turbinata & satis
longa, cælaturis inæqualis & scabra, in-
tus lævi. Operculo superiore parte est non
aspero, intus tuberoso, inæquali, & rubri
coloris. Succum falsum gignit, & vene-
rem stimulat. Testa in aceto macerata, su-
periore veluti cute vel crusta spoliatur,
redditurque cochleæ margaritifæræ modo
splendens, nitida & unionis modo colorata.
Huic similis est Cochlea maculis viridibus
Aldrovandi, nec non ea, quæ inter Turbi-
nem & cochleam cælata mediam naturam
habere videtur. Quæ hic exprimitur, oper-
culo est miniaceo miniaceis tuberculis turbi-
ne violaceo infra, supernè ferrugineo. Cavi-
tas inter turbines, viridi est colore.

Olearia nomen à *Plinio* inditum quod
ea oleum decapularent, vel in usus quoti-
dianos haurirent. Rotunda est, intorta, &
adeò magna ut aquæ quatuor libras capiat.
Hujusmodi aurifices, additis ansæ & basi in
urceos efformant.

Depressa, est altera parte plana, altera
excavata in voluminibus, quæ initio par-
va pau-

Aldrov.l.
3. c. 31.

Aldrov.l.
3. c. 32.

va paulatim crescunt ad foramen usque. *Rugosa*, rugas per transversum ductas, ita elatas habet, ut & striata dici possit. Colore est intus albo foris flavescente, valde fragili. *Umbilicata*, & quidem in medio, in satis insignem magnitudinem excrescunt. Aliæ nigricant, aliæ corneo sunt colore, aliæ maculosæ. Ad cochlear. terrestrium, quæ conglomeratæ foeniculi crassioribus caulibus adhærent, formam quam proximè accedunt. *Echinophora* aculei quibus tota conspersa est, nomen indidere. Operculo, succo, substantia, à parvo buccino non differt. *Cylindroides* pyramidem refert, pyri modo turbinata, magnitudine pugni, & punctis variis subcastaneis notatur. *Levem turbine obtuso*, politam admodum Rondeletius facit. Testa est crassiore, carne minus dura. Frequentissimè circa Levinum insulam capitur. Hisce adde *Limacis marini* insolentem speciem, nec non Cochleam marinam tuberosam, quorum Icones damus. *Umbilicum marinum* Bellonius lapidi rubro per simili tegumento rugoso & scabro occludi scribit, quodque solum inter Gallici Oceani turbinata politiem admittat. Rotundiore hiat ore, edulisque est. Clavicula earum herbarum more, quæ sese arboribus alligant à dextra ad sinistram in vertitur. Papaver in clavicula testæ continetur. Rondeletio *Umbilici* vocantur, quod præter foramen illud quo cochleæ faxis inhærent quoque exeunt alterum habent umbilico admodum simile, quod profundum convolutionum veluti centrum est, vel circa quod anfractus Cochleæ convolvuntur, veluti circa *περικύβητον*.

Duos inprimis apud Rondeletium habemus, quorum prior superiore parte latior, mox in turbinem desinens, nigris, rubris & albis tuberculis, corallorum omnium colorem & naturam referentibus, distinguitur: alter ciceris magnitudine, qui in spongiis reperitur, veluti granulis rubri corallæ mulis conspersus est. Inter umbilicum & foramen quo corpus exierit, testam incisam habet, incisuræ operculi vice sunt.

ARTICULUS IV.

De Echinis.

ECHINUS: quem quidam cum Eche-
neide pisce perperam confundunt, Græcis *ἰχθὺς*, vel *ἀπὸ τοῦ ἔχειν ἑαυτὸ τῶν σαρκῶν ἀφαιρῶν*, vel *ἀπὸ τοῦ μὴ δύνασθαι ἔχειν διὰ τὰς ἀκάνθας ὅ ἐστιν ὁ ἀκανθιστός*, quod teneri ob aculeos non possit, dicitur. Quidam Carduum marinum, nec non Erinaceum vocant. Spinofus ergo est piscis. Mirum est quod de iis Aristoteles reliquit. Eorum scilicet corporis partes dissectas coire rursus & redintegrari. Idem

apud Ælianum & Philen invenies. Spinæ ipsis pro pedibus sunt: his ingrediuntur & volvuntur in orbem. Hinc eos sæpè detritis aculeis invenias, quod Aristoteles & Plinius prodidit. Agilius & celerius moveri qui sunt cibo idonei, vel exinde colligas, quod semper aliquid algæ suis implexum spinis gerant. Imminente tempestate sese affigere aut harena saburrare, ne à fluctibus excutirentur, inde procellarum nautis præsagia, ab Oppiano, Plutarcho & Plinio creditum: at Bellonius frustra hoc credi prodidit, quod multis promuscidibus instructi, à fluctibus volutari non possint.

Sunt ex illis quidam *ἀσπατοι*, seu cibo *Ufus.* inepti; sunt tamen quorum & in *Eduliis usus est.* Nullo enim tempore ovis carent, ut Aristoteles prodidit: maximè tamen pleniluniis diebusque tepidis pleniores redduntur, eos si excipias, quos Pyrrhæus fert Euripus, qui hybernis mensibus meliores censentur. Exiguum illudque humidum nutrimentum præbent, Mnesitheo authore, sed quod Galenus *Galen. l. de attenuante victu.* stomacho commodum esse existimat. Ventrem deicere, omnes ferè scriptores annotarunt; magis eos qui circa Cephale-niam, Icariam, & Hadriam nascuntur, quia amarescunt; minus, rubicundos, melinos, crassiores, & qui cum raduntur, lacteum quiddam emittunt. Plinius secundus jus eorum multis verbis commendat, quo vocabulo aquam internam esse intelligendam, Gesnerus putat. Laco apud Athenæum unum in os imissum una cum testa dentibus comminuit: nostri, inquit Dalechampius, lapide testam frangunt, & flavam sive croceam partem, id est, ova, edunt, de quibus ita Perottus: Scinditur Echinus levi percussu, hirta testudo in duas partes dividitur: abjicitur altera, altera verò leviter aqua abluitur. Decidunt sordes, quæ in iis pro visceribus sunt: remanent quinque partita ova, subruffa, ad stellæ imaginem formata. Hæc cruda sumuntur, sapore non injucundo, quamvis nescio quid amaritudinis habeant. Conditos mense Decembri olim, Palladius author est.

Quantum ad *usum Medicum*, venenatos quidam prodidere, Arcesilaumque Batti Eudemonis F. cum in lethalem morbum incidisset, marino Echino in potionem à Learcho sumpto, mortem obiisse, apud Plutarchum legimus: quod tamen apud nullum alium invenies. Testæ crematæ cinis, Dioscoride teste, *sordida ulcera* expurgat. Eadem contusæ & ex aqua illitæ *luxuriantem carnem* comprimunt, & incipientibus *panis* resistunt. Ad *capitis manantia ulcera* valere, Rondeletius author est. Ad *abortum* eundem prodesse Aëtius prodidit.

Con-

Aldrov. l. 3. c. 34. 35. 37. 38.

Tab. XIII. Aldrov. l. 3. c. 40. Nomen.

Descriptio.

Plutarch. l. de virtut. Mulier. Dioscor. l. 2. c. 1.

Contra *urina stillicidium* valere Paulus Jovius reliquit. Quippe, inquit, qui frigidityate maris præalti, in quo degunt, (sexaginta enim aut etiam amplius passuum gurgite oriuntur) ipsi quidem exigui sint, sed aculeos grandes duosque gerunt. Causa magnitudinis est, quod incrementum corporis in ipsos convertitur. Cum enim parum coloris obtineant, neque concoquere possint, multum ob eam rem habent excrementi: aculei autem & reliqua generis ejusdem excremento nascuntur. Duri verò & rigidi penè lapidis constant propter frigus. Ad *secundas expellendas*, Hippocrates tres tenuiter tritos in vino odorato propinat. *Alopeciam*, cinis cum adipe porcino vel ursino sanat, &c.

Hippocr. l.
I. de
morb.
mulier.

Differen-
tiæ.

Strabo
Geogr.
l. 16.

Differentiæ Echinorum sunt variæ. Sunt *Toronenses*, qui circa Toronem nascuntur. Candidi sunt, & spinis & testa, & ore, augenturque forma productione quàm ceteri, estque iis spina parva, nec rigida, sed mollior. *Euphratenses*, quos Eratosthenes, ut est apud Strabonem, in insulis apud Euphratem, miræ magnitudinis esse prodit, alios pileis majores, alios *δυσκοίλους*. In mari Indico facilè congiuntur, si Æliano adhibenda fides. *Balthici*, qui instar magni mali sunt, & in mari Balthico inveniuntur. Duros esse, puniceifere coloris, & spiculis ademptis maculosos, Gesnerus prodidit. Circa Daniam quoque & Norvegiam habentur. *Fluviatiles*, ut Hermolaus & Massarius ex Paulo Ægineta prodidere. *Purpurei* mixto virore, quales in scopulis quibusdam maris mediterranei aqua contactis, apud Antii reliquias, & juxta Bajas, reperiri scribit Perottus, tam grata oculis varietate, ut, si colores durarent, nulla esset cum gemmis comparatio, sed mortuo pisce colores tabescunt. *Agiles*, qui velocius moventur, nec sunt edules. *Ἀσπερος* inde dicuntur. Calidiores quidem sunt, sed quia vocares iidem, & præ copia ingestorum cruditatem colligunt, idè in cibos non veniunt. Bellonio si credimus, majores aculeos habent, sed crassitie minores sunt, vixque grandis gallinæ ovum magnitudine excedunt. Diversa in eis colorum varietas. Sunt omninò nigri, albi, vitrei, ruffi, flavi, cyanei. Quidam purpura splendent, subinde circumagentibus se igniculis, micantibus ad aculeos scintillæ modo. *Ovarius*, ut Hermolaus vocat, quem Rondeletius ita descripsit: Forma ejus in rotunditatem conglobata est, dempta una parte parum compressa, in qua os est rotundum, quinquo *dentibus* incurvis, intus cavis, & in idem punctum coeuntibus munitum: ii quinque maxillis internis connexi sunt, quæ ab ore intus erectæ, ex acuto in latum tendentes, & ambienti calyci non conti-

nuæ. Inter dentes in terna *caruncula* quædam est, quæ linguæ vice est; mox jungitur *gula*, quæ in *intestinum* desinit longum, per testam stellatim dispositam, ejus tenuibus fibris suspensum, tandem in parvum foramen terminatur. Hoc foramen ad egerenda intestina destinatum est, ex adverso oris situm, ita ut os in terram versum sit, excrementi foramen supra habeatur. Partus enim ex imo petitur, unde fit ut os ad partum sit versum, excrementum vero superius parte prona testæ contineatur. *Excrementa* rotunda sunt exiguarum pillularum instar. Qualis intestinorum talis ovorum ordo est. Nam inter nigrum id quod carnis vice est, & intestinum ova flava cerduntur quæ sola eduntur cruda.

Testa toto intrinsecus foraminibus parvis plena est, per quæ movendi facultatem *nervi* aculeis suppeditant: Extrinsecus in exigua tubercula eriguntur aculeorum cotylem excipientia, vinculo, membranula, scilicet, obligata, ut in orbem moveri possint. Talis radii cum brachio articulatio. Aculeorum igitur caput cavum est, & in aculeum illi desinunt. Hisingyrum movetur.

Spatagus & *Brissus* prout à Rondeletio describitur, vix à cordis figura recedit, aculeis parvis & raris septus. Os dentibus caret, verum maxilla inferior superiore prominentior est, ad hauriendum aquam arenamque accomodata. His enim & luto vescitur. In interiore testa intestinum est convolutum, aqua & arena plenum, neque ova, neque nigrum illud continet, quod carnis loco est. Rari sunt.

Echinometra, quam cum Plinio, spinas longissimas calycem minimum habere Gillius putavit, cum Aristotele Rondeletius & Bellon. calycis potius magnitudine alios superare, crediderunt. Ille ejus magnitudinis exhibet, ut ambabus manibus quæquæ versum extensis vix capi potuerit. Hic in Insulis mari Ægæi ita profecisse vidit, ut ad duorum pugnorum crassitudinem extuberarent. De cætero, pelagiæ sunt, minimis aculeis prælitæ, brevibus & obtusis interceptæ spiculis, colore ad extrema albicantibus, ad radices liventibus, & ex purpurea nitentibus Parte prona planæ, supina rotundæ visuntur.

Aldrovandus quatuor exhibet, *Prima* est aculeis non admodum longis, coloris tota ferruginei. *Alter*a spinis denuata, extrinsecus scabrosa, coloris ejusdem. *Tertia*, magnis longisque aculeis insignita, coloris tota amethystini. *Quarta*, omnium maxima, quæ in Thyrræno & Adriatico mari nascitur, tantæ capacitatis, ut quinque aquæ libras capiat, in superiore parte gibba & rotunda, inferiore plana. Circumferentia erat duorum dodrantum & palmi. Calyx

evidenter in parte anteriore apparebat albus, in quinque ceu ventres, ut in Melopeponibus divisus, quorum singuli tres habebant tænias, quarum media erat tanquam futura, quæ partes separat, & facillimè aperitur, aperta figuram ferræ refert. Binæ illæ aliæ teniæ sunt colore quasi castaneo, crebris foraminibus pertusæ, quæ tamen nisi expositæ aëri, non apparent, quintuplo majores ea futura. Dentes habebat quinos, concavos, figura triangulari, &c.

Est tandem Echinus *Minimus* pelagius, spinis grandibus, longis, & præduris, modo penè lapidis. Plerumque un Judeo Italis vocatur, quod perpetuò nigrescat & sordescat. Testam juglande majorem non promit, estque reliquis omnibus vividior. Nam si supinum ponas, mox suas spinas deprimit, & se in pronam partem convertit. Gignitur in alto gurgite. Bellonius ita hoc genus descripsit: Plures habet quàm alii proboscides: idcirco citius repit, firmitusque hæret. Ova non fert, sed sanguineum quiddam nigrum faniei simile, quo manus cruentat. Dentes verticilli modo habet quinos, circulari ordine dispositos, quibus algas, saxa, & conchyliorum testas arrodit. In interna ejus parte multos nervos annexos cernas: ex quo indigenæ coacervatam dentium congeriem, ita cum nervis exsiccari sinunt, ut annuli vice ad signandum panem utantur. Refert enim quinquefolium, vel quippiam simile affabrè delineatum. Ventrem in quinque partes distinctum habent, quæ ab oris verticillo testæ appensæ, ad foramen excrementi coeunt, sed disjunctæ sunt, & quasi interventu liminum discriminantur. Totidem promiscides habent Echini, quod in testis foraminulis pertusis apparent. Sunt enim ultra sex millia in quolibet.

Ad hunc referri potest, ille qui in *rubri maris* littore semipedem latus, prona parte planis, superiore gibbus, paucioribus ac minus frequentibus spiculis præditus à Bellonio visus est, nec non ille maris rubri aculeis longissimis ferrugineis, ad rubrum vergentibus, cujus pictura Castelleto Genuensi debetur.

Quem in quinto genere *Rondeletius* reposuit, saxo inhærentem, calyce quoque est parvo, spinis pro corporis ratione longis & duris, quoad urinæ destillationes felicissimè idem usus est. Idem est cum Echino Aristotelis, quem in Historia Animalium describit.

ARTICULUS V.

De Conchyliis, & quidem Bivalvibus.

PUNCTUM I.

De Conchis.

HActenus de Echinis, sequuntur Conchyla, quæ vel sunt *Bivalvia* seu *Bivalvia* vel *Univalvia*. Ad illa pertinent, *Concha*, *Chama*, *Ostrea*, *Pectines*, *Musculi*, *Mytuli*, *Tellina*, *Balani*, *Pholades*, *Solenes*, *Pinna*: & *Conchæ anatiferae*. Concharum plura sunt genera, quæ ad *Asperas* seu striatas rugosæque & *Læves* redigi possunt. Tab. XIII.

Ex *Asperis* est 1. *Margaritifera* quæ & *Indica*, quod apud Indos, apud quos *Βεργαπ*, dicitur, plurima nascatur, & Mater perlarum dicitur. *Androsthene*s apud Athenæum in *Indiæ* navigatione ita describit: *Ostreum* aspectu pectini simile, concha non striata sed plana, spissa, (hirsutam Echinorum modo malè Plinius reddidit) non utrinque aurita, pectinis modo, sed una tantum parte. In ejus carne gemina concrevit, ut in suilla grando: modò colore adeò similis auro, ut cum eo collata non facilè internoscatur, modò argentei coloris, modò omninò alba, & piscium oculis similis. Aldrov. l. 3. c. 41.

Multa earum genera Plinius recenset, cujusmodi sunt, *Pentadactyli*, *melicembates*, *echinophoræ*, &c. Interdum tam grandes in India reperiuntur, ut referant inventam in mari insulæ Borneo, cujus caro pondus septem & quadraginta librarum pendebat. Sunt quædam totæ argentæ: quædam colore rubicundo flammeo micant. Differen-
tiæ.
Plin. H.
N. l. 32.
cap. 11.

Carnes ab Indis quandoque crudæ, quandoque assæ comeduntur. Ex testis varia, ut cistæ, pocula, cochlearia, scipiones mulierum, & rabulæ lusoriæ formantur. Indæ mulieres armillas & monilia ex illis gestant. Usus.

De *Margaritis* in *Historia Naturali fossilium* agemus.

2. *Imbricata*, seu imbricatim undata, sic dicta, quod testa ad undarum sese attollentium similitudinem distincta est. Græcorum vulgus *Aganon*, Calojeri Arabiæ *Tridacnem* vocant. Aldrov. l. 3. c. 43.

Est dura, carne concoctu difficili. Quæ *Tridacna* Plinio dicitur, est pedalis longitudinis. Utraque testa libras medicas quindecim pendebat. Eo loco quo sibi invicem connectebantur, singulæ duos digitos per transversum crassæ erant. Allata erat Aldrovando ex rubro mari. *Tridacna* dicitur, quod nonnisi tribus vicibus deglutiri possit. Descri-
ptio.

3. *Striata* cui striæ percurrentes nomen dedere. Varia harum sunt genera. Albæ sunt, nigricant, flavescent, per ginglymum

42
mum colligantur. Est quædam *longa*, ovi figura, testis multum cavis, canaliculis parum profundis. Est & *pectiniformis* tota ex cinereo lutescens, fasciis tribus ochreis ornata. Est & extra ferruginea, intus albo, & purpureo violaceo varia, in qua animans luteo, cæruleo, & rubro varium.

Est & *Candida* ac admodum lucida: fasciam in medio habens latam castanei coloris, cujus medium percurrit linea castanei coloris valdè saturati.

Aldrov. l. 3. c. 45. 4. *Echinata*, quæ pectini similis est, testis admodum concavis, striatis, in ambitu incis. In striis sive exochis eminent aculei frequentes, incurvi, certis intervallis à se diffiti. Uniones in ea reperiri testatur Plinius. Plin. H. N. l. 9. c. 53. Nam & Iuba tradit, Arabicis esse concham similem pectini insecto, hirsutam Echinorum modo, ipsam unionem in carne ipsa esse grandini similem.

5. *Squammosa*, quæ striis seu lineis semicircularibus, squammarum in modum est exornata,

Aldrov. l. 3. c. 47. 6. *Longa*, cujus duas species Rondeletius ponit. Unam colore vario, in medio albescente, intus cum lævitate candido: Alteram, teste alba, aspera, lineis multis distincta, quam Plinii longam esse putat. At Aldrovandus veram Plinii longam se exhibere credit, colore extra albo fuscoque variam, intus vero roseam, animante suo prægnantem. Idem aliam exhibet, partæ quæ replicatur, foramina multa, ordine disposita habentem, quæ à natura fortè, ut aer ingrediatur facta sunt.

Aldrov. l. 3. c. 48. 7. *Pictorum*, quæ idèò ita vocabitur, quod testæ ejus pro conficiendis coloribus raderentur. Crassitudine plurimum excedit, & florem foris habet. Reperitur maximè circa Cariam. Aldrovandus unam exhibet ex Rondeletio colore Cinnabaris: aut Sandarachæ, figura Spondylorum aut minorem Ostreorum.

Aldrov. l. 3. c. 49. 8. *Corallina*, quæ quod Corallum colore imitetur ita dicitur. Externa testarum parte pectinem refert: sed lineis est aspera, tuberculis rubris inæqualis, intus lævissima, candidi marmoris colore. Carnem habet duram, odore viroso: sapore falso. Post diutinos Austri flatus, & caniculæ exortum in littus ejicitur.

Aldrov. l. 3. c. 50. c. 51. 9. *Rugata*, quæ lineis multis & elatis, per transversum ductis rugata est: testis valdè spissis, coloris intus argentei, quæ peringlymum articulantur. Ex iis Spherulæ precum & dentiscalpia conficiuntur.

Ad hanc pertinet *Conchula rugata* Rondeletii, quæ à latere ad latus multas veluti rugas sparsim & sine ordine habet. Testæ sunt depressæ, colore vario. Labra testarum crassa & tam arctè connexa, ut sine vi non aperiuntur. Diphilus carnem copiosam bonumque succum gignere tradit.

10. *Rhamboides*, quæ veteribus ignota videtur, quod testa sit musculorum marinorum testæ simili, *musculum striatum*, Rondeletius vocavit. Tota concha nigricat. Rara est, quia in alto mari degit, duramque carnem habet. Bellonius Balanum Græcis dici putat, sed falsò ut apud Rondeletium videre est.

Ex *Lævibus* est *Concha Galades*, *Nigra*, *Fasciata*, *Crassæ testæ*, & *Tenuis testæ*. Aldrov. l. 3. c. 53. *Galades* sunt maximæ & lævissimæ, intus verò candidissimæ, non admodum concavæ, caro ipsis alba, dura, concoctu difficilis, succum crassum gignens. Satis rarò capiuntur. *Nigra*, hisce est similis, nisi quod intus & foris nigricat. *Fasciata*, testa est admodum lævi, dura, & mormorea. Nomen hoc obtinuit, quod quinque veluti fascias latas à latere ad latus ductas habeat. Harum plures Aldrovandus exhibet. *Crassæ testæ*, à galadibus & Chamis asperis, non tantum testarum crassitudine, sed fasciarum ratione, quæ in illis rariores & latiores sunt, & in his plures & unica tantum linea constantes. Aldrovandus aliquot earum icones exhibet. interque has clathratam majorem & minorem. Ex ustis & in cinerem redactis præstantissimum antispodium fieri scribit Rondeletius. *Tenuis testæ*, conchæ, extra sunt colore fædo, lutulento cinereo, intus argenti modo resplendet.

PUNCTUM II.

De Chamis.

Chamarum nomen à verbo *χω*, ut Gesnero placet, derivatur, inditumque huic concharum generi, seu quod hient, seu à capacitate. *χῆμα* Varino est *χῆμα*, id est, oscitatio, unde Plinius, Conchas Margaritarum pandere se dixit quadam oscitatione. Galli flammæ & flammatas vocant, Itali Peverazas, non tam quod sapore sint piper redolente, quam quòd pipere condiantur. Spartianus Ostreas & Lithostreas cum dixit in Heliogabalo Chamas tracheas & Chamas eas intellexisse Hermolao creditur. Quidam Hiatulas dixerunt, Galenus verò Concham pro Chama usurpavit. In genere eas si spectes, vix in tanta varietate constat, quomodo à conchis & quibus notis differant, hoc unico excepto quod Chamæ id peculiare habent, quod plerumque in littore hiantes inveniuntur: unde earum nomen Ion Chius *ἀπὸ τοῦ κελύφης* derivat. De cætero ita Ælianus de iis: Chamæ marinæ & variæ & multiplices sunt: aliæ asperæ, aliæ leves: quædam digitorum compressu confringuntur, aliæ vel saxo ægrè conteruntur. Quædam ipsarum nigerimæ sunt, nonnullæ argentei coloris similitudinem gerere videntur, aliæ utroque colore mixto insignes. Ac quemadmodum earum est varium & multiplex genus, sic multas & diversas sedes habent.

Quæ-

Tab. XIV. Aldrov. l. 3. c. 58. Nomen.

Ælian. H. N. l. 15. c. 12.

Quædam enim in litoribus dispersæ jacent in arena, vel in limo quiescunt : nonnullæ sub algam subjiciuntur; aliæ saxi mordicus adherent.

Locus. Inge-
nium. Æstivo tempore cum incipit messis, in I-
strico mari gregatim natant, & leviter ferun-
tur, cum ante id tempus sua sibi mole graves
effferri non possint. Contra, ex tranquillo
mari mirifica voluptate afficiuntur, & Fa-
vonii mollibus auris afflari gaudent: eamque
ob rem in latebras abditæ, & in suis conni-
ventes testis, cum à tempestatibus mare con-
quiescere sentiunt, & Favonium flare, tum
relictis sedibus, ad summum maris natant,
& apertis testis eminent, & quiescentes ven-
tum expectant placidum ac secundum: qui
si contegerit, alteram concham substernen-
tes, alteram erigentes, hac pro velo, illa pro
navi ad navigandum utuntur, ut si eas pro-
cul videas, sic per tranquillum mare natan-
tes, classem navium existimes. Quod si ma-
vem ad se accedere sentiunt, aut belluæ im-
petu, aut valentioris piscis metu percussæ,
contractis uno impetu testis, subito delabun-
tur, Carnem alvum & urinam ciere Athe-
næus scribit: at Dioscorides urinæ non me-

Aldrov.l.
3. c. 65. *Dispersantur in Læves, & Asperas,*
Asperæ χημὰν τραχέαι Græcis nomen à testa-
rum externa parte, qua lineas multas ob-
liquas & cavas, ideoque musco oppletas
habent traxere. Bellonius valvas tornatas &
orbiculari ferè rotunditate habere dixit. Te-
stas tam duras ut nonnisi valido ictu confrin-
gi possint. Labra haud quaquam in gyrum
denticulata, sed Myrulorum more lævia.
Movetur ut limax, & quia fortibus spon-
dyliis constat, iis testas movendo per arenam
lumbricorum more, conscendunt. In arena
circa littora reperiuntur. Carnem ipsorum
Icesius duriusculam, mali succi, parum nu-
trire, facile excerni, marisque falsuginem
referre pronunciavit. Diphilus stomacho
gratam esse adidit.

Aldrov.l.
3. c. 59. *Læves Chamae, Chameleæ* Græcis dictæ,
testa duplici constant, quæ tamen digitorum
compressu facile frangitur. Conchis lævibus,
quæ Galades dicuntur similes sunt: ut tan-
tam in Oceano magnitudinem adipiscuntur,
ut quaternorum digitorum latitudinem, se-
norum verò longitudinem exsuperent. Intus
& foris candidissimæ sunt, *Caro* quoque in-
tus candida, inque ea duo foramina cernun-
tur: alterum os est, alterum excrementi mea-
tus, utrumque sinuosum, ut dilatari & con-
stringi possit: hoc ad attrahendum aquam,
illud ad reiiciendum excrementum. Habent
& μήκων, ut conchæ cæteræ. Latenter mia-
gis protuberante semper hiant. Facile à ca-
lido tanguntur: quamobrem mox hiantes
sua labra pandunt, & facilius exaniman-
tur, si longius secesserint à mari. In arena
cum Tellinis capiuntur. Moveri à se, & se-
des in littore mutare comperiet, qui eas in

vasa aqua pleno immerferit; quod Veneti ut
minus exanimis servant faciunt. Non elotæ
propter arenam respuuntur: recentes elotæ
& adhuc vivæ Tellinis non sunt posthaben-
dæ. Differentias earum varias Aldrovandus
posuit, quem in Iconibus vide.

Sub Lævi comprehenduntur, *Piperata*, Aldrov.l.
Nigra Bellonii, Nigra Rondeletii, Glycymeris 3. c. 60.
ejusdem, & Peloris.

Piperata Bellonii *Biverone* quibusdam I-
talis dicitur, non tam quod ob piperis sapo-
rem sitim excitet, quàm quod perpetuò bi-
bat, neque diu sine aqua servari possit, at-
que in forum allatæ & aquæ immersa gemi-
nam atque oblongam exerat ligulam, ut
cochleæ modo perpetuò sitiens moveri per-
cipiatur. In cœno degit, & usque adeò te-
nues testas habet ut transpareant. Cardini-
bus non junguntur invicem infarctis, sed
nervo ut ostrea. Labra habent lævia magis-
que in rotunditatis ambitum circinnantur
quàm Tellinæ.

Nigra Bellonii robore testæ cum aspe-
ra facile certat: nec crenas ita profun-
das in labris habet. Peloride quoque
major est & dulcior. Ideò glycymeridem
putat. Aldrov.l.
3. c. 61.

Nigra Rondeletii est testis oblongis, læ-
vibus, duris, spissisque ac veluti mar-
moreis. *Glycymeribus* sapor carnis dulcis no-
men imposuit, facitque earum Macrobius
mentionem. Sunt majores quam Pelorides,
testa oblonga mytulorum fluviatilium testæ
modo, sed duriorè & spissiore, rugosa, non
tamen ob id aspera, ex albo rufescente, car-
ne & succi bonitate Peloridi similes. Sunt qui
Glycyamarides vocant. Aldrovandus Pe-
lorides majores Athenæi esse credit. Frustra
verò Corycia in Plinio ad Chamas glycy-
meridas referas. Macedones enim teste Æ-
gesandro, conchas asperas κορύκας ut Athe-
nienfes κρείες, id est, arietinas vocant. Ma-
crobius in cœna adyciali Lentuli appositas
fuisse dixit. Aldrov.l.
3. c. 63.

Pelorides non tam à luto, (scribi deberet
πυλάριδες) quam vel à magnitudine: πελώριον
sive πέλαρον significat τὸ μέγα & τεράσιον, id est
magnum & prodigiosum; vel à Pelore Si-
ciliæ promontorio, juxta quod optimæ re-
periuntur, nomen sortitæ sunt. Athenæus
eas uno loco ex sententia fortasse Phililii à
Chamarum genere segregasse videtur. Dua-
bus conchis constant, ut Rondeletius reli-
quit, quæ nunquam ita junguntur, quin
semper hient seu vivo seu mortuo animali,
etiam sine calidi contactu. Ex oblongæ sunt
& læves, ex albo purpurascetes, in medio
connexæ. Caro intus alba est, quæ etiam con-
tracta, tota testa vix capi potest, extenta
longior multò est, rotunda, spissâ, puden-
do virili non absimilis, digiti medii crassitu-
dine. In extremo altero foramina duo appa-
rent, alterum oris est rotundum, alterum
excre- f 2

Bellon. de
Piscib. l. 2.

excrementi. Bellonius à calcinellis differre scribit, quòd turbinatiori & grandiori corpore constant. Calcinellæ enim, inquit, compressiore sunt forma testa translucida, ac multo quam Chemæloii teneriores. Media autem est inter asperam lævem constitutione & natura. Non enim ita horret ut aspera, neque ita glabrescit ut lævis, albo præterea ac fulvo emblemate distinguitur.

Uñus.

Ejus caro durior est, quam Tellinarum. Diphilus copiosum bonumque succum genere tradit. Labra earum, addit idem, sunt crassiuscula, & tam arctè connexa, ut nisi vi aperiuntur, & sæpe etiam rumpantur, priusquam os aperiunt. Hucusque Bellonius.

PUNCTUM III.

De Ostreis.

Tab.
XIV.
Nomen.

Testaceum quod Latini Ostreum & Ostream dicunt, Græci veteres ὄστρεον, & ὄστρεον, vel ὀστὴ τοῦ ὄστρεῖος, vel quasi ὄστρεον quod testa velut ossea tegatur; moderni ὀστρίδιον Pselus ὀστρίδιον, Hesychius ὀστρίδιον, vocant. Invenies tamen ὄστρεον pro toto testaceorum genere sumi. Unde Suidas Echinum ὀστρίδιον τὸ ὄστρεον tradit.

Descriptio.
Aldr. l. 3.
c. 66.

Formam quod spectat ita de iis Aldrovandus: Quod ad formam Ostreorum attinet, Bellonius inter bivalvium genera hoc peculiare ait esse ostreae, & pectini, ut partem habeant pronam & supinatam, quarum altera sit turbinatior ac prætumida, altera verò plana, Plinius alibi originem atque genituram conchæ, quæ Margaritas fert, esse ait, haud multum Ostrearum conchis differentem.

Alibi quoque Thethya ostreae similia esse scripsit. Et Hegesander apud Athenæum hepatum piscem in capite duos lapides habere, colore splendoreque ostreis similes. *Capita* ostreorum generi nulla eodem Plinio. Galenus ostreis pilos esse negat, sed melius Plinius oculis carere ostreas omnes dixit. Eidem præterea ostreorum præcipua *spondylo* (caro hic interior) brevi sunt, atque non carnosio, nec fibris laciniosa, ac tota in alvo. Perottus spondylum in Ostreo esse scribit, callosum illud rotundum, albicans, quod intus habeat in medio, à similitudine spondyli, quod nos verticulum dicimus appositum fusis, ut melius nendo vertantur. Nam reliqua caro circumspersa *Lacinia* dicitur. Quod *ovum* vocatur. Wottonus non semper, sed vere habere ostreas asserit: moxque procedente tempore minui demumque totum ferè aboleri.

Aristoteles illud in altera tantum parte eis fieri voluit, idemque esse quod Echinos habere alias dixerat. Eodem autore Ostreae meatum habent, quo excrementum secedat parte superiore. Idem Aristoteles *testas* eis tribuit scabras, alibi etiam labra crassa.

Et Plinius quædam silicum duritia tegi, ut ostreae & conchæ dixit.

Quantum ad *Generationem* nullum eis sexus discrimen, ut Plinius & Oppianus prodidere: ideo putrescente limo proveniunt, aut spuma circa navigia diutius stante, defixosque palos, & lignum maximè: sed & in cavernosis & petrosis aquarum dulcium adventu gignuntur. Obtinere tamen ex putri producta aliquid prolificum quamvis non coeant, apud Aristotelem habemus. Hinc & Plinius: Nuper compertum in Ostreariis humorem ostreis foetificum lactis modo effluere, & Petrus Gyllius, Bizantinos ostrea serere & eorum quasi lac seminare; à spectatae fidei se accepisse scribit. Grandescunt syderis ratione maximè, sed privatim circa initia æstatis multo lacte prægnantia, atque ubi Sol penetrat in vada. Sydus illud Luna est, quæ plena corpora humentiora reddit, adeò ut nec prudentes Chirurghi trepanotum aperiunt, quia tum cerebrum magis diffundi, & totam cranii capacitatem impleri est. Nullum eisdem sensum inesse apud Plinium legimus. Auditum esse non est verisimile, inquit idem, sed ad sonum se mergere solent, ideò & silentium in mari piscantibus. Tactus tamen omnibus. Carere & motu Aristoteles prodidit. Aqua marina & limo *pascuntur*, quin & rore, quare ἑρπύδα Ostrea, id est roscida, Oppianus dixit.

De *Loco* in differentiis agitur: hoc tamen addere placet, non tantum in pelago, dulcibusque aquis, & ubi plurimum influunt amnes reperiri: sed & in petrosis, carentibusque aquarum dulcium adventu, sicut circa Grynium & Myrinam, quod apud Plinium legimus. Mirum verò quod apud Athenæum habetur, posteaquam Appameam Phrygiæ urbem, Mithridatici belli temporibus à motu terra discessisset, lacus, qui ante ibi nulli comparuissent, repente extitisse, fluviosque & fontes novos ex iisdem locis terræ motu excitatos fuisse, veteresque multos exaruisse, ac nimirum plurimam aquam tum dulcem, tum salsam, tametsi ab eis locis mare longè abesset, ex visceribus terræ sic emanasse, ut tractum universum illum tum ostreis, tum aliis piscibus marinis refererint.

Infestos sibi Cancros marinos & stellas marinas ostrea habent. De illis author de natura rerum ita: Cum testas aperit ostrea ut clementioris auræ deliciis gloriatur, cancer insidias ei repentinas præterdit, & lapidem inter ejus testas projicit, ne illas conjungere possit, & sic carnes ostreae comedit.

Usus in Cibis habere nemo non novit, crudas, elixas, assas, omniumque testatorum nobilissimas, Bellonius prodidit. Legimus tamen apud Galenum, carnem ipsarum humidioris & tenacioris esse, est crassi succi, humoremque crassum, crudum, & frigidum gigne-

Generatio.

Arist. de
gener. l. 3.
c. 11.

Plin. H.
N. l. 2. c.
41.

Locus.

Inimicitia.

Uñus.

Galen. l. de
boni &
mali succi
l. 3.

gignere. Crudæ falsum humorem de se fundunt, idè alvum movent, & tentiginem excitant. Elixæ, humore suo destitutæ, murmura excitant, secundum Jovium, secundum Julium Alexandrinum, ob multam carnis molliem concoctu faciliores sunt, ac pituitam potius quàm crudam humorem procreant. Assæ, (assantur autem in craticula addito aromate multo ac salis momento, sed testis suis non avulsæ) minimè noxiæ sunt. Plinius crudas stomachum unicè reficere, fastidiis mederi, ac leviter alvum mollire scribit. In pontificali cœna apponebantur, teste Macrobio, echini initio & ostrea cruda. Qui modò edere eo volet, Lunæ motum observet; hoc est, ea decrescente, ea edas: senescente longè sunt deteriora.

In Medicina invenire quoque locum. Adhibentur ex mulso & pipere cocta contratenasum. Gariopontus hydropicis dedit. Usta ad labiorum ulcera & alia prodesse, apud Myrepsum habemus. Cinis dentes splendidiore efficit. Trita & optime lævigata ulcera rebellia exsiccant, quod Galeno debemus. Cinerem veteri urinæ misceri adversus eruptiones in corpore humano & ulcera manantia Plinius reliquit. Marcellus Empricius eundem, si in morem salis pane colligatur & voretur, statim ad removendam narium gravedinem proficere scribit. Rondeletius denique experientia compertit, ex testarum cinere factam aquam lixivam, ad minuendos tumores *ειδηματώδεις* pedum & genuum plurimum conferre. Exsiccant, enim, inquit, multum digerit, & calefacit, si post ustionem cinis non lavetur.

Differentiæ Ostreorum sunt variæ, quæ à loco & colore sumuntur. *Locum* si spectes, sunt 1. *λαμνόςπεια* ut Aristoteles vocat, quæ in stagnis marinis nascuntur. Rondeletius ea ex duabus testis componi ait modicè concavis, & parum in dorsum elatis, foris inæqualibus & asperis, in tenues laminas facilè sectilibus, intus lævibus & candidis. Testas parvas esse; carnem mollem, suavem, concoctu facilem.

2. *Littoralia*, quæ in littoribus (*απὸς ἡ ἑρῆς*) inveniuntur: nec non saxi limi & aquæ dulcis expertibus. Parva sunt, dura & acria.

3. *Pelagia*, seu marina, quæ in mari nascuntur, parva & rara. Grandescunt quidem syderis ratione maximè: sed privatim circa initia æstatis multo lacte prægnantia, atque ubi sol penetrat in vada. Hæc videtur causa, quare minora in aliis locis reperiantur. Opacitas enim prohibet incrementum, & tristitia minus appetunt cibos. Sunt aliquando in Mediterraneo multa simul connexa, & supra se posita. Inter hæc repunt Scolopendræ, & vermes in canaliculis inclusi vivunt. Testæ foris sordidæ & luto obductæ, & ex crustis multis sive laminis constantes,

intus læves & albæ. Caro mollis: circa eam fibræ multæ veluti fimbriam constituentes, eam aliquando ambiente purpureo crine, quæ præstantiæ nota est auctore Plinio, qui Calliblephara dixit.

4. *Britannica*, quæ omnibus præferuntur, quæque Massarius post Lucrina inventa fuisse, & Ruputina Juvenali dici putat.

Juven.
Satyr. 4.

5. *Santonica*, quæ magis falsa & acria judicantur.

6. *Burdigalensis*, inter quæ Medokina ab oppido vicino Medoë, dicta, capite nigra, suavitate præcellunt.

7. *Circea*, quæ ab Horatio commendantur.

Horat. Satyr. 4.

8. *Abydena*, quæ olim à ganeonibus celebrari solita, Clemens Alexandrinus in Pædagogo prodir.

9. *Lucrina*, à Lucrino Campaniæ lacu, in sinu Bajano, prope Puteolos ita dicta, de quibus ut de Britannicis ita Plinius: Nondum Britannica serviebant littora, cum Orata Lucrina scilicet littora nobilitabat: postea visum tanti in extrema Italia petere Brundisium ostreas: ac ne lis esset inter duos saporis, nuper excogitatum, famem longæ advectionis à Brundisio compascere in Lucrino.

10. *Brundusina*, de quibus ita idem: Gaudent peregrinatione transferrique in ignotas regiones. Atque ita Brundusina in Averno compasta, & suum retinere succum, & à Lucrino adoptari creduntur.

11. *Cumana*, quæ Strabo præstantissima facit. Nihil interim de suburbanis circa Venetias & Adriaticis, quibus Bembus teste Calcagnino palmam dedit, dicemus. Plinius paucis meminit, dum inquit: Dicemus & de nationibus, ne fraudentur gloria sua littora, sed dicemus aliena lingua, quæque peritissima hujus censuræ in nostro ævo fuit. Sunt ergo Mutiani verba quæ subjiciam: Cyzicena majora Lucrinis, dulciora Britannicis, suaviora Getulicis, acriora Lepricis, pleniora Lucensibus, sicciora Coryphanteis, teneriora Isticis, candidiora Circiensibus.

Quantum ad *Colores* ruffa sunt in Hispania, fusca in Illyrico, nigra & carne & testa Circæis, quibus palma mensarum diu tributa est. In mari rubro flammeis illustrantur Zonis, ea ut diceret varii colores temperatione ad colorem iridis accedere; adeò lineis perpetuo ductu inter se distantibus distinguuntur. *Meliora* ita descripsit Plinius: Præcipua habentur in quacunque gente spissa, nec saliva sua lubrica, crassitudine potius spectanda, quam latitudine, neque in luto capta, etsi ea Veneticæteris antecellere opinentur, neque in arenosis sed solido vado, spondylo brevi atque non carnosio, nec fibris laciniola, ac tota in alvo. Addunt peritiores notam, ambiente purpureo crine

Macr. Sat.
l. 9. c. 6.

Differentiæ.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 6.

fibras, coque argumenta generosa interpretantur, calliblephara appellantes. Jovius maximè probari tradit, quæ magnarum navium carinis adhærent, & ab urinatoribus de manu colliguntur. Præter hæc sunt adhuc *Ostrea Sylvestria* & *Gaideropoda*. Illa vulgus in Provincia Scandebec vocat, propterea quod sapore sunt acri, & ideò delicatiorum labra calefaciunt & urunt. Testa sunt pellucida, partibus quibusdam flavescente, alias purpurascente, foris crinita & crispa, intus splendida, levissima, candidissima. Carnem habent parvam, salsam, subamarā, & insuavem.

Athen. Dip. l. 3. Facit horum Athenæus mentionem, multique alimenti esse dicit, sed virus olentia, & ori ingrata. Reperiuntur in mari mediterraneo. Testa in fucis mulierum lapidis specularis vice usurpari potest, & exsiccantibus pulveribus utiliter admisceri. *Gaideropoda* quasi pes asini dicitur apud Græcos, qui daideron hodie asinum vocant. *Testa* ejus, describente Bellonio, eximio naturæ artificio, superior inferiori infarcta est, ut quibusdam veluti cardinibus annexa, nigroque nervo in ejus mediò inter tubercula & sinus coaptato, vineta ac constricta esse videatur.

Aldrov. l. 3. c. 68.

Tubercula quoque superiora duobus acetabulis inferioribus benè correspondent, ut & inferiora superioribus. Proinde apertas *Gaideropodas*, si quis attentè intuebitur, in his branchias, hoc certè ridiculum est, nullum enim ex testaceis habet) & stomachum & reliquas partes nutritorias contemplantur: imò etiam auriculas fungi crispæ figuram referentes, magnitudine grandioris acetabuli, polypi, quæ dilatari ac contrahi soleat: umbilicum vulgus esse putat. Rondeletius hæc pro spondylis, qui Athenæo *πρᾶχλοι, ἀπὸ τῆς πρᾶχλῦτης*, id est, ab asperitate dicuntur. Meminit eorum Plinius & Galenus, interque ostracoderma recenset; Macrobius etiam, qui inter cœnæ Pontificalis prima fercula numerat; sed & Columella, qui inter testacea reponit. Duplici spondylus, secundum Rondeletium *testa* constat, intus cava & lævi: foris scabra, ad ungulæ asini formam rotundata, latiore parte, quæ & inferior dici potest, tenuior est, & multò minus densa, minus concava, arcta valdè & firma articulatione connexa: utriusque enim testæ binæ apophyses sunt, sive tubercula, quæ binis acetabulis vicissim recipiunt & recipiuntur: vinculo medio nigro & valido cohærent. *Caro* interna ostreor. carni similis est: circa hanc fimbriata membrana. Intus caro, sed durior, & virus olens. Adnascuntur saxis, & ita hærent, ut non nisi malleo, aut fracta saxi parte capiantur. Rondeletius idem, in saxis Fresconiis Agathensis sinus parvos reperit. Reperiuntur in eis cancri parvi. Aldrovandus aliquot spondylo-

rum genera exhibet, interque illa elegans quoddam, plurimis extra tuberculis obtusis præditum, ab uno latere rubicundis, ab altera inter viridem & cæruleum ambigentibus, quibus tamen rubra etiam permiscuntur tubercula: summum caput seu vertex candicat. Intus circulus satis conspicuus colore viridescente totam ferè concham propè extremitatem ambit: dein color sequitur castaneorum, dein albus & subviridis. In medio velut umbilicus est, addito luteo constans.

PUNCTUM IV.

De Pectinibus.

PECTINES, si Gyllium sequimur, à rugis seu imbricaturis illis quibus signati sunt ita dicuntur. Plinius aliquando à pectunculis distinguit, nonnunquam utrumque promiscuè nominat. Græci *πτερες* nominant, ob manuum & pedum similitudinem, ut Nican dri interpreti placet.

Descriptiones exactas in differentiis dabimus, hic dicere sufficiat bivalves & clusiles esse, ut apud Aristotelem legimus, seque concludendo tueri: pectinatim eis divisas testas; ideò Athenæo *πέδιλλον, & πρᾶχλῦτα* dici: utraque parte auritas, easdemque reseratiles esse. Nam ab altero latere nodo ligantur, ovum dictum altera tantum parte eis fieri: Athenæus eis ostrea in quibus nascuntur margaritæ contulit. Sponte in arenosis & limosis locis proveniunt: in sinu verò Aquitanico & Normannia capiuntur frequentissimè. Anno autem perficiuntur. Temporibus pluviosis proveniunt plurimi, quod & aliis testatis accidit. Nam squallore pectines magis trahunt ruffum colorem. Iamque in Pyrrheo Euripo pectines aliquando defuerunt, non modò propter ferramentum; quò piscatores abradendo ubertim caperent, verum etiam propter siccitates. Quæ autem ova in iis appellantur, quamvis verè iis insint, moxque procedente tempore minuantur aboleanturque, tamen nihil ad generationem conferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est. Oculi ut ostreis nulli, Conchis dubii, sic pectines si quis digitos adversus hiantes moveat, contrahuntur ut videntes. Volare sagittæ modo, nisi fortè hoc ad Lolliginem pertineat, Plinius prodidit: sed & stridere sentiuntur, quoties per summa humoris nitibundi feruntur. Massarius per aëra volare negat. Cum enim, inquit, callo illo interiori ambæ testæ connexæ sint, ut difficile divelli queant, non possunt ita liberè aperiri, ut volare valeant &c. Tanta tamen velocitate dihiiscunt: ut ex vehementi percussione saliant, & superjacent, ut quasi volare videantur.

Usus in Cibis quod attinet, fuere olim apud antiquos celebres, nec in Cotyis convi-

Tab. XIV. Nomen.

Descriptio. Arist. H. A. l. 4. c. 7.

Athen. Dipnos. l. 3. Plin. H. N. l. 9. c. 51.

Plin. H. N. l. 9. c. 36. Plin. H. N. l. 9. c. 39.

vio omitti. Celsus & Archigenes stomacho aptos faciunt. Galenus succum alvum ducere non aliter ac serum lactis scribit. Xenocrati dulces sunt ac facilius ostreis concoquuntur. Magis assati, secundum eundem, minus succi habent & difficulter excernuntur: in testis suis si assentur, minus hujus incommodi habent, facilius alunt, & valentiores sunt. Nativam autem dulcedinem in muria conservant & urinam movent: ac candidi quidem & lati sunt dulciores atque albi duri: ruffi virosi & urinam cient: varii autem medii sunt, & eorum aliqui fucis similes, qui per se dati difficulter concoquuntur, & tamen urinam movent. Diphilo candidi molliores sunt.

Locor. varietas bonitatis differentiam in-
vexit. Methymnæos à plærisque gulæ amatoribus suis temporibus expeditos Clemens Alexandrinus testatur. Varro pectunculum Chium, inter cancrum ciborumque exquisitas delicias comprehendit. Horatius Tarentinos laudat, ideò in eorundem numismatibus frequenter occurrunt, De reliquis ita Xenocrates: Pectines, inquit, optimi sunt, qui ad justam magnitudinem pervenerunt, cavi, colore nigriore: præstant autem vere ac æstare, siquidem eo tempore ad Lunæ incrementum optimè augentur. Omnibus autem antecellunt Mytilenæi, magnitudine, natura, humoris bonitate. His similis Jonium mare juxta Illyrida, Hetruriam, Salonas, & Latium producit. Jam verò & Chios & vicinæ insulæ, item Alexandriae-jusmodi pisces ferunt. Pontus quidem etiam multos fert, sed minutos & qui ægrè augeantur.

Usus in Medicina si spectes, Trallianus in colico affectu dari jubet. Plinius urinam ciere, & quæ in vesica sunt moderatè detergere scribit. Ad Venerem ex citandam non minus valent quàm ostrea.

Differentiæ pectinum sunt variæ: sunt magni, quibus altera valvular. latior veluti tegmen superposita est; sunt & ruffi, candidi, versicolores, candidi & lati: sunt utraque parte auriti, alterutra tantum, nulla, si Bellonio fides est. Ex auritis, quidam utramque habent magnitudine, alii minores aures habent quam caput testæ; quidam tam magnas, ut ab una aure ad alteram ducta linea, caput testæ non tangat, sed potius emineant aures; alii denique una aure minores. Duos Rondeletius descripsit: Priori, testa est qua parte aurita, strictior, deinde amplificata in orbem circumagitur, altera modicè cava & in dorsum elata, altera veluti alterius operculum. Intus carnis multum habet, quæ circa medium etiam carnosum, longum, tenerum, alligata apparet. Inest in carne particula luteum ovor. colorem referens. Sectantur, *μύκων*, & os tubæ modo factum, atque intestinum tenue luteo plenum.

Tota caro in ambitu membranam habet veluti fimbriam versicolorem, ex qua fila & multa & tenuia dependent. Huic similem Aldrovandus ponit, testa ferruginei diluti coloris, fasciisque ferrugineis. Alter superiore est toto corpore longior & strictior amplioribus auribus, utraque testa pectunculorum Burdigalensium modo concava. Aldrovandus plurimas earundem figuras, auriculis & colore differentes exhibuit, interque eos versicolorem, castaneum eburneum, & croceum qui auriculam unam habet satis latam proportionem animalis, rudimentumque alterius. Eburneus in summitate macula quadam rubra condecoratur, cui alia lutei coloris insidet. Est & asper colore fusco, cujus Iconem adjicimus.

PUNCTUM V.

De Musculis.

TESTACEA, quæ vulgariter Musculi vocantur, Plinius quandoque myjas, aliquando myiscas, nonnunquam myscos, sæpè musculos appellat. Athenæus *μύσας*. Aristoteles *ἰσάδης μύσας*, vocant, moderni Græci *μύσκιον*, id est, parvum musculum dicunt: nos musculos simpliciter minores appellamus. Rondeletius ita eos describit: Sunt ex ostracodermorum genere, quæ tenui testa & duplici conteguntur, circa saxa aut ligna nascuntur pilis, & veluti lana alligantur. Testa foris nigra, ferè semper vel musco vel lanugine obducta, intus lævis & splendens, ex albo cærulea, parte acutiore crassior & spissior, reliquo ambitu rotundo tenuior. Caro intus pallida, cum non cruda est, cocta vitellis ovorum similis, in ambitu fimbriata, in eo foramen est evidens ad attrahendam aquam, neque enim per villos trahit: in media carne est particula carnosa linguæ similis: inest & mutis, & pituita quædam glutinosa, callo albo adhæret. Reperiuntur & in mari & in aqua dulci stagnante: nunquam verò ferè in rapidis fluminibus.

Ubique ferè in Cibus cedunt, sed optimi sunt Ephesii. Marini commodum præstant nutrimentum: qui in aqua sunt dulci, carne sunt dura, concoctu difficili, pravi succi. Laudatissimi qui in inferiore Germania ex Oceano Germanico capiuntur. Medicinam si spectes, ad ciendum & urinas multum præstare vult Athenæus, cui Celsus ad stipulatur. Marinum tritum ex oleo vetere talorum tum moribus & doloribus impositum mederi, Marcellus Empiricus reliquit. Aquatilis ad nebulas oculorum in jumentis adhiberi, testis est Gesnerus. Utuntur super carbonibus, & corium externum detrahatur usque ad medium, quod album apparet: additur Zingiber, & chalcanthum paribus portionibus, & ex his mistis, pollen in oculis equi inflatur.

P U N-

Tab.
XV.
Aldrov.
l. 3: c. 70.
Nomen.

Clemens
Pædag. l.
2. Varro
in Satyra.

Plin. H. N.
l. 32. c. 9.

Differentiæ.

PUNCTUM V.

De Mytulis.

Tab. XV.
Aldrov. l.
3. c. 71.
Dioscor. l.
2. c. 7.

Mytulorum nomen à Græcis mutuave-
re Latini, μυτῖλλος eos illi vocant. Dio-
scorides testam ipsam μυτῖλλα dixit: animalia
Oribasius myacas; Athenæus μυτῖς σκελῆδες,
quod scyllam quidam ex iis resipiant; Ari-
stoteles μυτῖς πτελῆδες, non foliatos à figura,
ut Gaza verit, nec latioris & amplioris
conchæ, ut Niphus, sed in imo maris, seu
gurgite nascentes, ut Rondeletius, nisi fortè
πτελῆδες, quod in limosis producantur dici
debeant, ut Gesnerus innuere videtur. Jo-
vius cum Tellinis eisdem esse censet, sed
falsò, ut in sequentibus apparebit. Dioscori-
des sanè, Galenus, & Ægineta distinxere,
ideo separatim de utrisque agunt.

Descri-
ptio.
Genera-
tio.
Arist. de
gen. H.
A. l. 3.
cap. 11.

Descriptionem inter Differentias quære.
Spontè naturæ in arenosis proveniunt, quod
ante Plinium Aristoteles prodidit: prodire
tamen & aliqua ab ipsis emissa facultate,
(buccinæ & purpuræ, quæ favare dicuntur,
id est quasi à seminali natura humores quos-
dam mucosos emittere) vel potius sobole,
quippe minores subinde juxta principium
adnascuntur, Massario ex ipso Aristotele
visum.

Ufus.

Reperere & in *Cibis* locum, tam elixi
quàm assi. Crudi virus & scyllam resipiunt.
Elix, & acrioribus quibusdam, ut sinapi,
nasturtiove conditi, illud deponunt. Assi,
sitim vehementer excitant. Deteriores sunt
qui in locis arenosis, aut inter testas figlinas
proveniunt, quàm qui in algosis gignuntur.
Autumno & ubi multa dulcis aqua miscetur
mari, bonitatem servant, procedente tem-
pore amaritudinem trahunt, & colorem ru-
brum. Optimi quoque mytuli, quando illa
sic vocata ova continent. Jus corpus augere
Plinius reliquit: eodem sues, teste Lemnio,
pinguescunt.

Uinius
H. N.
l. 32. c. 9.

Lemn. de
Nat. mi-
ra. l. 3.
c. 7.

Majores duri sunt, ideò concoctu diffici-
les: sanguinem procreant crassum, succum-
que non adeò bonum: copiosè tamen alunt,
& ventrem urinamque cient.

Plin. H.
N. l. 32.
cap. 9.

In *Medicina*, easdem cum Musculis facul-
tates habet. Carnes ad canis morsum valere
scribit Dioscorides, sed repugnat Galenus.
Juri multum Plinius tribuit Myacum jus,
inquit, traditur alvum & vesicas exinanire, &
in teranea distringere, omnia adaperire, re-
nes purgare, sanguinem adipemque minue-
re. Itaque utilissimi sunt hydropicis, mulie-
rum purgationibus, morbo regio, articulari,
inflationibus &c. Concha ad excipiendum
oleum loco cochlearis utuntur.

Diffe-
rentiæ.

Differentias aliquot apud authores inve-
nias. Sunt enim, si locum spectes, alii *Mari-
ni*, alii *Fluviatiles*. Hi marinis sunt similes,
in eo tamen differunt, quod minores sint,
subrecti appareant, atque humi pinnæ modo

infigantur. Sedem non mutant, grandi hiatu
suas testas pandunt, easque referatiles & clu-
siles, tenues, intus glabras, pictorum colo-
ribus accommodatissimas habent. Gustus
sunt ingrati. *Marini*, ut Bellonius habet, vil-
losextrorsum habent more pinnæ, ab ea te-
stæ parte qua scopulis hærent, per quos ali-
mentum exsugunt, atque arenas & marina
dejectamenta attrahunt. Cancrum pinnæ
modo in concha nutrit, orbicularem, par-
vum, suis sic membris absolutum, ut & ince-
dat & alatur, & ova excludat grandi lente
multò majora & crassiora; humi accumbant,
cum tamen glandes sive muscioli adhærendo
pendeant. Differunt & magnitudine, totun-
ditate, & gustu. In majoribus cancelli, ut
dixi, nascuntur. Salem virusque resipiunt
quidam. In eo verò à cæteris ostracodermis
differunt, teste Aristotele, quod tenuia la-
bra habeant. De magnitudine trium vel qua-
tuor heminarum, quod apud Plinium legi-
tur, nil dico. Videtur hoc Phocæ vel Lepori
marino competere, vel in genere conchis
debere abscribi.

Arist. H.
A. l. 4.
cap. 4.

Aldrovandus plura earum genera cum I-
conibus exhibuit, inter quæ est, Castaneus.
Niger cum tuberculo adnato, alter cum
striis flavis. Fluviatilium alium majorem,
aliud minorem dedit.

PUNCTUM VI.

De Tellinis.

Tellinarum nomen Athenæus Latino-
rum mytulis tribuit, Plinius pectuncu-
lis illa, quæ Tellinis à Dioscoride adscripta
sunt. Nos hic illas intelligimus, quas mo-
derni Græci ξιφύδρια, Lesbi incolæ Chinades.
Galli Narbonenses & Romani Tellinas,
ὅτι παχὺς αὐτῶν γίνεται πέλεια, quod ocyssimè perfi-
ciantur, Veneti Capparazole, sive Cappa-
role, à capparidis similitudine, appellant.

Tab. XV.
Aldrov. l.
3. c. 72.
Nomen.

Descriptio inter differentias quærat. Non tantum in mari, & portubus undis agi-
tatis degunt, sed & fluviis. Locis verò are-
nosis maximè delectantur.

Descri-
ptio.

In *Cibis* laudem præ cæteris testatis me-
ruere. Plus succi habet earum caro, quæ et-
jam reliquarum carne mollior. Recentes,
secundum Dioscoridem, stomacho sunt uti-
les, sed maximè jus earum. Elixas, dulces
esse, earumque jus alvum solvere Oribasius
prodidit. Venetiis, Genuæ, & Romæ rusti-
ci in faccis per urbem circumferunt, quas
modiolis divendunt. Cum enim exiguo cor-
pore (verba sunt Bellonii) constent, nec fa-
cilè aperiantur, gustuique gratæ sint, mirum
in modum ob id expeti bellariorumque loco
assumi solent, inprimis, si ab arena optimè,
repurgatæ fuerint. Marinæ inprimis, &
in his tenuiores, quæ Athenæo Basilicæ
commendantur; & quod Castor Durante
ventri-

Ufus.

Oribas. 2.
Coll.

Durant.
in The-
sauro sa-
nit.

ventriculo noxias esse scribit, de fluviatilibus fortè sumendum est. Sitim certè istæ excitant, calculosque gignunt: Oribasius tamen majores esse, & plus succi habere, Ægyptias imprimis, scribit. Clausæ sale sparguntur, & per testas humorem trahunt.

Galen. de simpl. med. 11. 38.
Alben. Dip. l. 3.
 In Medicina ustæ cinerem relinquunt causticum, adeò, ut is cum cedria myxtus & instillatus, evulsos radicitus palpebrarum pilos renasci prohibeat. Arotæus in Iliaco affectu jus ipsarum propinari jubet. Pueris ad sonum tubæ imitandum usui esse, Athenæus prodidit. Sopater etiam in Comædia quæ inscribitur Eubulotheombrotus scribit. Atresiste, è Tellina repente ad meas aures suaves quidem sonus illapsus est.

Differen- tia.
 Quantum ad *Differentias* & *Genera*, Athenæus alias marinas, alias Fluviatiles, seu quæ in fluviorum ostiis reperiuntur, fecit, & addit, in Canopico ostio & Nili ascensu multas esse. Illarum *λεπτοτέραις* seu tenuiores Basilicas idem vocat, & alvum subducere, beneque nutrire ait. Hæ, quia majores, Basilicarum nomen mererentur, nisi expressa Athenæi in contrarium verba essent. Bellonius Basilicas ita describit: Lævis est Tellinarum testa, candida, nequaquam striata crenulis tenuissimis denticulata, in longitudine diffusa & angusta mediocriter fortis & quodammodo teres. Rondeletius duas etiam species ponit, quarum una duplici teste constat, utraque simili, lævi, valida, & satis spissa, in ambitu ferrata, qua de causa ad unguem conjunctæ sunt, intus leviter cavæ; altera, in ostio Arariis fluminis invenitur, in sinu Agathensi, superiori similis, nisi quod testa sit majore, minusque spissa, & ex rubro flavescenti parte, qua testæ colligantur, in acutiorem angulum desinente. Addit & Tertiam, color candido, testa pellucida, ex additamentis multis conflata, intus lævissima. Tenuis admodum, & ambitu magis rotundo. Aldrovandus plures apposuit, inter quas sunt nonnullæ cum denticulis; una etiam testa diaphana & fragili; alia cinerea, lineis purpureis transversalibus.

PUNCTUM VII.

De Balanis, & Pholade.

Tab. XV. Aldrov. l. 3. c. 37. Nomen.
BAlani seu glandes, à glandium similitudine nomen obtinere Pollicipedes Bellonius vocat, quia vulgo poulsepieds dicuntur, quod pollicum in pedibus similitudinem habeant.

Descriptio.
 Descripsit eas ita Rondeletius: Idgenus

glandem esse colligimus, quod illi cum glandibus magna sit similitudo. Nam ut glandis quercus vel Ilicis pars prior levis est, & in acutum tendit, posterior aspera; sic hæc, quæ saxo exhibemus affixa, posteriore parte, qua saxi hærent, rugosa sunt, & aspera, glandiumque caliculis, posteriorem earem partem arctè retinentibus simili, Pluræ ex una radice pendentè sanorum rimis. Ex testaceorum genere sunt. Pars enim prior, longa, rotunda, & duabus testis componitur, colore & lævitate unguium, in medio rima est, ex qua capillamenta quædam veluti plumæ rubescens prodeunt. Concha una veluti ex multis acutis unguibus constant, tota in quinque digitorum longitudinem accrescit. Crassitudine sunt pollicis in Hispania; in Britannia Aremorica minores. Pars posterior quæ saxo alligatur, corio duro asperoque potius quam testa constat, ex nigro flavescit. Plura in Differentiis vide.

De *Loco* non est quod multa addamus. *Locus.*
 In Hispaniæ parte ea quo Oceano alluitur, in Normannia & Britannia frequentissimi sunt, perque vicinas urbes & pagos divenduntur. Racematim Oceani caudibus adhærent.

Laudantur in cibis, tanquam optimi saporis ab Epicharmo, & qui mirum in modum fastidia stomachi sublevent, & mulierum malaciis accomodentur. In convivio quo Lentulus Flamen Martialis inauguratus est nigros & albos appositos esse, Macrobius testatur. Elixir ex aqua salsa pulpam habent duriusculam, quam auferunt, sinistra tenentes radicem, ad quam algantur, dextra verò caput arripientes: quod posteaquam contorserint, pulpam à theca extrahunt, ut ambiens corpus relinquatur vacuum calami modo. Pulpa autem quæ inde egressa est, lumbrici modo oblonga, rubra, teres, aceto piperato maceratur ac manditur, Archigenes quoque apud Galenum stomachicis convenire scribit.

Differentia & Genera eorum recensentur aliquot. Sunt 1. *Majores*, quos ex Rondeletio superius descripsimus. 2. *Minores*, qui nascuntur in saxi & rimis navium, quæ diutius immotæ uno in loco manserint. Adnascuntur etiam mytilis. Striatæ sunt, foramen habent, è quo veluti frondem emittunt. multæ simul nascuntur. Intus parum carnis continent, & parvæ semper manent. 3. *Ægyptii*, qui ad Nili ostia capiuntur, & sunt, testæ Athenæo, dulces, teneri, origrati, copiosi nutrimenti, multi succi, diuretici, & solvunt alvum. Aldrovandus etiam quosdam exhibuit, interque hos; multos modicè rubescens, simul adnatos; à Gigante sibi communicatos, eosque striatos; Ostracum

ceum quoddam, quod meritò polyceps dici possit, quoniam veluti ex multis Balanis compactum est, læve rubescens, balanum denique sessilem, qui in parte inferna ubi insidet, maximum habet foramen.

Aldr. l. 3. c. 34. *Pholades* ἀπὸ τοῦ φολεῖν & φολέειν, quod in cavernis & latibulis condantur, suum obtinere nomen. Et rectè ita in saxis latent, ut iisdemque undique contegantur, per foramen verò exiguum & sensui vix patens aqua nutriuntur. Missum est, inquit Rondeletius, ad me alio ex littore saxum, in quo nullæ rimæ, nullæ cavernæ, sed foramina tantum apparebant tam exigua, ut vix aciem admitterent. Eo igitur ictibus multis confracto, cavitates internæ multæ erant, vario situ, & diversæ magnitudinis, in quibus conchas istas reperi. Testis constant duabus longis, non in latum extensis mytulorum modo, sed rotundis. Intus eadem ferè est caro quæ in mytulis. In saxorum cavernulis, vi vel natura factis, aquæ marinæ appulsu procreantur, atque in concham vertuntur, quæ cavitatis seu foraminis figuram servat. In portu Veneris multæ occurrunt.

Ufus. Nullus earum præter Athenæum meminit, quicquidem palato suaves, sed mali succi & virosas facit.

PUNCTUM VIII.

De Solene.

Tab. XV. Nomen.

*S*olen Eustathii ἐν τῇ σόανῃ τῇ ἐλθῇ σοολίδι & per crasin σολῶ, dicitur, Græcis vocatur αὐλῶ, à canalis sive tubi similitudine, δόναξ, à figura arundinis crassæ, concavæ, quæ Cypria arundo Dioscoridi; Dactylus, ab humanorum unguium similitudine; ὄνυξ denique seu unguis, ab extremis, tenuitate & figura unguibus simili, vel à testæ colore & substantia unguibus nostris non dissimili. Veneti Cappam longam nominant, Bononienses piscem canellam. In *Cibis* à pauperibus adhibentur. Galenus dura carne esse dicit, & ob id difficulter concoqui, propriumque hac ipsis & Purpuris, ut refert, Nicesius quod cum in iusculo coquuntur, id crassius reddunt. In ore mandentium relucere Plinius scriptum reliquit. His natura, inquit, in tenebris remoto lumine, alio fulgore clarere, & quanto magis humorem habeant, lucere in ore mandentium, lucere in manibus, atque in solo atque veste, decidentibus guttis, ut procul dubio pateat, succi illam naturam esse, quam etiam miremur in corpore. Splendoris causam glutinoso Solenis succo adscribit Rondeletius, hi quidem quæ tenacia & veluti glutino compacta sunt, ea lævia, æqualia ac perpolita esse solent, atque ob id relucetia. *Despescuntur* in *Mares* & *Fæminas*. Illos Plinius Solenes, Aulas & Donacas vocat, has Onyches. *Mas* secundum Rondeletium, ex

Concharum longarum est genere: duplici constans testâ, lævi, tenui, altera tantum parte colligata nigro vinculo, etiam si aliter scribat Aristoteles. Cum enim διδύμαν alia sunt altera parte ligata, altera soluta, ut claudi & aperiri possint; altera utroque latere connexa, in his postremis Solenes numerat, cum contra semper altera parte solutos videas. Dodrantali sunt longitudine, pollicis crassitudine, harundinis modo cavi, extremis duobus semper apertis: anteriore caput exerit, & retrahit testutinis ritu, secundum testæ longitudinem. carnem protensam habet. Testa cæruleo est colore, lineas evidentes habet per transversum ductas, qua parte colligatur, crassior est, aliis partibus in tenuem substantiam definit, ut mytuli. Aqua & arena vivit. Carni facultatem urinæ ciendæ inesse Plinio scriptum: sed quia glutinati succi est, metuo ne erret. Differt ab isto *Mas Rondeletii*. Est enim lineis miniaceis, per transversum variegatus, in altera quoque Conchæ extremitate, linea lutea apparet. De *Fæmina* ita item Rondeletius: Onychas appellat Plinius Solenes fœminas quæ colore, sapore, magnitudine, à maribus differunt, in aliis omnino similis. Testa lineis cæruleis distincta non est, ob id Plinio unicolores dicuntur.

Ufus. Caro dulcior est: sed vix comedi potest nisi ab arena repurgata. Sumuntur frixæ & elixæ, melioresque in prunistoris, quoad hient. Rondelet. deteriores existimat, quod sint ex succæ, duriores, & sicciore. In arena stare Bellonius tradidit, sed cum omnia silent sursum è profundissimo foramine emergere, & in id sese postea abdere, unde postea nisi palla ferrea in transversum supposita, & præfundissimè impacta avelli possint, id quod & Plinius & ante eum Aristot. vidit.

CAPUT IX.

De Pinnis.

*P*inna, Græcis πίννα & πίννα, quod semper sordibus obducta sit, dicitur. Her-molaus Concham Ægyptia cognomine Paralios, à Democrito Pinnam vocari scribit. A quibusdam Agnus castus vocatur. Neapolitani Pernam, Veneti Asturam, vocant.

Descriptions in Differentiis vide. Ex duabus testis componuntur, & à mytulorum figura non admodum differunt. Cancris etiam in illis hospitantur. Rondeletius tantam Romæ se vidisse scribit, ut ad cubiti magnitudinem accederet.

Locus si spectes, in Acarnania Pinna ori-ri & uniones gignere Plinius testatum reliquit. In mari an sint ambigit Bellonius, & Rondeletius in locis in quibus mare fluit ac refluit, vix reperiri scribit. Venetiis non visitur, sed in Propontide ad latera ejus

Arist. H. A. l. 4. c. 4.

Ufus.

Tab. XVI.

Descriptio.

Locus.

ejus sinus, qui Nicomediam fertur, qua terram pertingunt, frequentia magna existit. In ruinis Nicomedie civitatis reperiri, Bellonius author est.

Natura.

In Cibo comparando, Cancellum semper aut Squillam comitem habent, sua sede non dimoventur quin pereant; nisi iterum eodem statu humi defigantur. Nam cum eis natura hæc insit, ut rectas stare, & per villos arenulam attrahere necesse sit, jacentis vivere non possunt. Naturam ejus optime versibus Philes expressit, in cujus testa & uniones & byssum reperiri testatur.

Ufus.

Usum in Cibis quod attinet, Athenæus eas urinam pellere, difficileque concoqui & distribui dixit. Ovum, quod secundum Aristotelem continent, pro lunari potestate, aliquando minus, non ad generationem confert, sed melioris nutritionis indicium est.

De carnis dotibus ita Wottinus: Pinnæ, inquit, optimæ sunt, tenellæ, Plenæ, carnosæve, quæ in limosis (πενανώδεις) vadis gignuntur; & ubi mari dulcis aqua miscetur, & locis tranquillis, ac ventis carentibus: teneriores enim hic nascuntur, quàm ubi fluctibus agitantur. Grandioribus parvæ; & quæ vere & æstate capiuntur, aliis præstant. Sunt enim & suaviores & pleniores. Quæ magnitudine mediâ sunt, carnem quidem habent mollem, candidam, ac dulcem: collum durum, concoctu difficile, corruptionique renitens, Collo namque corpus reliquum facilius corrumpitur: elix assæ duriores evadunt, præsertim si vino fuerit aspersæ. Earum quæ in vino maceratæ sunt caro, mollior est, sed flatum generat.

Differentiæ.

Quantum ad Differentias, Rondeletius tres differentias agnovit, Bellonius duas, Aldrovandus quatuor posuit.

Rondeletii Prima est Minima, mytulis similis, nisi quod strictiorem partem multo magis acutam & longam habet. Testa foris aspera est, colore fusco, intus viridi, & argentei splendoris, si in arena vixerit Pinna; si in cœno, colore est magis flavescente, & minus splendente. Ab inferiore & strictiore parte in amplam latitudinem extenditur: illuc arctissimè clauduntur testæ, hic faciliè discluduntur. Intus multum est carnis, cujus omnes ferè partes indiscretæ. Alteram Pernam Plinio vocari scribit. Pernæ, inquit isti, Concharum generis, circa Pontias insulas frequentissimè stant, velut suillo crure longo in arena defixæ, hiantesque qua limpitudo pedali non minus spacio.

Cibum venantur. Dentes in circuitu marginum habent pectinatim spissatos. Intus pro spondylo (spondylus seu callus caro durior & interior ostreorum est) Ejus generis hanc esse in qua unius nascuntur, ex Theophrasto Athenæus tradit.

In Gallico mari inveri, & in ea uniones parvos author est Rondeletius. Tertia minor est, & eo differt, quòd antequam acuta & stricta parte in amplitudine extendatur, excavata sit.

In cœnosis & arenosis locis vivit defixa: & carnem intus duram habet quæ virus resipit.

Bellonio altera Major est, altera Minor. Hæc foris magis albicat, intus ad cæruleum accedit. Mollibus in gyrum spiculis obtusis hirta est; valvasque continuo cardine toto latere annexas claudit ac referat, quâ parte planior esse constat, qua autem se in latum expandit, eadem byssum est veluti capillamentum quoddam coacervatum prædurum ac nigrum quod lapillis affigitur, limumque ac spurcicias inde ad stomachum attrahit. Illam Pernam vocat, quæ pelagia est, rugis profundis caret, duriore testâ contegitur, & bipedalis sæpissimè invenitur. Pinnophylacem, ut minor, alit: ulginoso ac palustri tractu nascitur: profundiore gurgite immergitur, & multum ingrati saporis habet.

Ex Aldrovandi pinnis prima est, aculeata, coloris rubri: Aldr. l. 3. c. 70. Altera pinnæ parvæ Rondeletii similis cum capillamentis: Tertia pinnæ Pernæ genus. Quarta, parte interna & externa depicta, testa foris fusca, rubra, & aspersa; intus sanguinei, & cærulei coloris. Datur & quinta cum tubere verrucoso intus adnata.

Pinnis adde Conchas anatiferas, diversi generis. Prima tribus partibus constat cum umbilico annexo. Altera quinque partibus cum umbilico. Tertia, aperta est, eique umbilicus inseritur. Quarta, hiulca est ea parte qua primum plumulæ prorumpunt. Quinta, foetum intra vulvas situm ostendit. Sexta, foetum imperfectum è valvis exemptum. Septima, Berniclam avem adultam, ex ejusmodi Concha natam.

ARTICULUS VI.

De Conchyliis Univalvibus.

PUNCTUM I.

De Lepade seu Patella.

HActenus de Bivalvibus dictum: Univalvia sunt, Lepas, Concha Venerea, Concha Persica, & Penicillis. Ad priorem Auris marina pertinet. Lepades, Plauto nisi mendum subest Lopades, quibusdam Græcis πεμίδες, modernis Petaglides, vel quòd sint petrarum in mari quasi, πετρίδες, id est, squammæ quædam; vel quòd petræ cum eis spoliuntur veluti λεπτὴ ἀπὸ πέτρης, hoc

Tab. XVI. & XVII. Aldrov. l. 3. c. 79.

Nomen.

Descriptio.

hoc est, desquamari videantur, dicuntur. Gaza Patellas, à vasis escarii similitudine, ut Rondeletius autumat, exponit. Inter *μυρὶστυα* cenferi debere, nullum dubium. Saxi testa in dorsum data adhærent: ideo Aristoteles alteram partem superficiei detectam, carnem ostendere dixit. Os ipsius versus terram, & excrementorum exitus superius habetur: Papaver quoque in imo, siue in suo fundo habent. Bellonius scribit tanta esse magnitudine, quanta extrema ovi putaminis pars abscissa esse potest. Colorem *testarum* livere vel cinereum esse cornuaque limacis instar exerere, & os, & caput habere huic persimile. Plura in Differentia vide.

Locus.

Locum si quæris, in saxi littoris Aquitanici & Britannici, nec non Massiliensis & Agathensis sinus scopulis inveniuntur. Circa Lepadusas insulas tam frequentes, ut nomen iisdem dederint, si Athenæo credimus. A saxi solvi, pastus quæritandi gratiâ Aristoteles author est, cui & Bellonius, dum conchlearium more serpere ait, subscribit. Ad Rondeletius id negat: Nullis enim, inquit, ad natandum partibus prædita est, nisi temerè huc & illuc undis jactata feratur, neque victus illi quærendus, nam maris spuma & aqua vescitur, quâ alluuntur saxa. Quod si aquâ allui saxa desinant, ea quæ in testa relicta est absumpta, contabescere & emori tandem necesse est. Tam se fortiter attractæ saxi applicant. ut ne Milonis quidem digitis, avelli possint. Cultro igitur aut aculeato ferro opus est, inter ipsas & saxa immisso, quod ad oras Oceani Aremoricorum pueri facere solent, prodente Bellonio.

Ufus.

In *Cibis* crudæ à piscatoribus & mares accolis usurpantur. Coctæ facilius concoquantur, modò non nimium decoquantur. Jus alvum ciet. Usum earum & ad capiendos cibos esse, ex hoc Tarentini videre licet. Obsonii *κολάτοι* dicti, præparatio in mari cuius vi in unum locum statim omnes pisces conveniunt.

Ex mari *patellas* accipito, earum scilicet, quæ circa saxa nascuntur: quarum quidem contundens carnem, exprimesque ex ea in testa aliqua inscribito, quæ sequuntur: subitoque non sive magna admiratione videbis pisces in unum locum fluere confertum. Sunt verò ipsa nomina *ταὐ, σοβαὐ*, quibus sanè ichtophagi utuntur.

Differentiæ.

Dividitur in *magnam*, Maris rubri *parvam*, & *feram*. *Major Rondeletii* testam habet non exquisitè rotundam, sed inæqualem, intus lævem; foris parum asperam, cui aliquando muscus innascitur, gibbam in ambitu livescentem & striatam, intus cavam. Carnosam quoque simbriam in corporis ambitu quam expandit quum hæret,

soluta contrahit. Interius subest caro dura, quâ maximè saxo hærent, quæ scuti picti formam refert. Os superiore in loco manifestum est, inferiore ori adverso, excrementi meatus, non in testa, ut in ea quæ *ἀγρία* dicitur. Os venter sequitur, in eo est *μήκων*, in imo ventre etiam pars, quæ ovum dicitur. *Maris Rubri* lepas Bellonii, tabellis, quas in tergo gerit, corneis numero octonis, transversis, loricæ modo contegitur, atque undequaque cartilagine obsepta est, multis spinulis horrida, iis persimilibus quæ in stellis marinis visuntur: sesquidigitum lata est, ternos verò longa. Caro rubri limacis colorem ac naturam habet, esturque cocta. *Parvæ Rondeletii* testa media nucleis pinearum nucum figura similis est, & æqualis. Ex laminis parvis constat: Carnem intus habent, sed ob parvitatem partis vix discernuntur.

Fera, *λεπὰς ἀγρία*, & *auris marina*, *Σαλιν- Aldrov. l. 5. c. 81.*
ζεν &c. ob magnam cum aure nostra similitudinem, testam habet cavam, argenti vel unionum colore: foris gibbam, lineis multis depictam: parte una, cochlearum modo claviculatim contortam à qua foramina incipiunt, initio parva, quæ deinde magis ac magis augentur. Differt à majore excrementi meatu, quod ut annotavit Aristoteles, parte ima testæ excrementum egeratur, quâ foramen habetur. Bellonius majorem vocat. Quia testa pellicula & perpolita est, ideò ab aurifabris in tenues laminas diffecatur, ut inde elegantissima vasa incrustentur. Aldrovandi Cypria major striata & non striata ad majorem Rondeletii referri potest.

PUNCTUM II.

De Concha Venerea.

CONCHA Venerea nomen fortè ex eo *TAB. XVII. Nomen.*
 invenit, quòd non modò Veneri grata, sed & ob communem originem è mari cognata, crederetur; celebrisque esset ejus Deæ effigies, atque haud suo an ex hoc genere, ut Gelenii verbis utar, pede premeus. Martialis Concham simpliciter vocat, Hyle Poëtria Concham Erythræam, sine dubio, quòd circa mare rubrum frequens sit. Bellonius in vico nomine Torviginti camelos his conchiliis rotundis onustos se conspexisse prodit, & Cairi incolas iis ad lævigandam papyrum, & telas coloribus permixto gummi confectasuti. Ideò eidem Lævigatoria dicitur. An Belliculi marini, *εμπολέμοι Σαλάνοι* Myrepsi, seu ut quidam vertit, Umbilici marini rectè à Pharmacopæis nonnullis dicantur, dubito.

Putat enim interpret lapides intelligi exiguos & candidos, in littore maris repositos, umbilicum hominis referentes abstergendi facultate præditos, quos alii *bas*

bas marinas dicunt. Cordus Dentalium nominavit. Ennius fortè, citante Apulejo, *Matriculos* Mutianus apud Plinium *Muricem*. Nec aliud quid sibi *χορίων* Græcorum volunt, quamvis eas Aristoteles præterierit. Expresse enim eas Conchas marinas, quibus utebantur Athenis ante calculorum usum inductum, Scholiastes Aristophanis vocat: ne dicam, Pollucem quoque idem attestari. Galli *Porcellanas* appellavere, seu à quadam oris suilli specie, ut Gesnero placet, quam parte sui inter labra denticulata dehiscente, vel potius altero extremo testæ, nempe acutior & eminentior, rostri suilli instar, quodammodo referunt: *ἡ δὲ τῶ μορίῳ συγκατέπασαι μέλει; τῆτε μεταδὲ τῶν χειλῶν ἔλπει: ὅ τῃ ἐνδοτέρῳ κοιλότητι τῇ μητρὶ.* Sane nutrices apud Varronem maxime naturam quæ foeminae sunt, appellant Porcum, & Græci, eadem significatione Chæron sive Delphaca. Uterinos etiam calculos, qui hoc genere minores sunt vulgus Germanorum appellat. Minimam aliqui Corvinam aut Coryiolam dixerunt.

Descriptio si attendatur; Latior est, secundum Mutianum purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque se latere colligente. Testam omnibus admodum duram esse vel inde agnoscas, quod nunquam eam arrosam comperias. Tota intus candida est, foris colorum varietate insignis, in diversis conchis, politissima & æquabilis. Os ipsi est in ambitu denticulatum, inque ejus lateribus canales breves, per quos linguam egerit. Plura in Differentiis.

Usus in quibusdam concha sola invenit. In pillulis de bedellio ad alvum stringendam reperitur: quamvis Monachi Mesues interpretes matrem per larum supponi jubeant. Turcæ & Cairi incolæ quomodo eis utantur, superius diximus. Galli ad suspendendas claves & conficienda cochlearia utuntur. Æthiopibus loco monetæ inservit. Ideo in tanto apud eos precio, ut sæpe aurum pro ea permutent, & sæpe filios suos vendant. In Concha majore faciem sculptam & pulchrè expressam se vidisse, Gesner. testatur.

Differentias Concharum plurimas apud Rondeletium, Gesnerum & Aldrovandum invenies. Rondeletius quatuor habet.

Prior ovi figura, in testæ extremo utroque foramen habens, alterum cibi gratia parum prominens, alterum ad excrementa rejicienda. Remoram Mutiani esse credit.

Secunda, testa est tenuiore & magis perspicua, varia quoque, & pro maculis inspersis lineolas habente, Concha simplice utrinque sese colligente.

Tertia parte plana compressa magis est, maculis rotundis notata, durior secundo, colore candido.

Quarta, parte altera est in tumorem elata, in qua circulus aurei coloris. Alioqui tota foris est candida, intus cærulea.

Gesneri ruffa major & minor non multum à Rondeletii abeunt. Illa nusquam inniti potest nisi parte plana quæ candida est, ut intus quoque gibba, quæ hæmisphærium constituit, ruffa, maculis nigris distincta. Lævitate ita resplendet, ut imagines reddat, sed obscure. Minoris dorsum in summo varium est, albis, pallidis, & glaucis maculis. Pars interna candicat.

Aldrovandus, tredecim species, si non plures ponit, ex quibus una tota ex ruffo candicat, & maculis per totum dorsum oblongis & ferrugineis aspergitur: alia lutescebat primo & maculis purpureis ornabatur, in humido detenta pallidior evasit, postquam superioris corticis cuticulam exuisset. *Tertia* maculis per dorsum a terrimis rotundis & inæqualibus tingebatur. *Quarta* subpurpureis, amethystinis & cæruleis. *Reliquas* ibidem vide. Nos hic tres depingi curavimus. Quam Lusitani & Æthiopes Buzios dicunt, undiquaque alba est, nisi quod in dorso lineæ binæ flavent, in ovalem ferè speciem conjunctæ, & dorsum ipsum inæqualium quàm cæteris & gibbosum, ita ut illi quoque testa incumbere possit, sed obliquè. Pars interior è roseo ad cæruleum redit.

Huc *Concham Persicam* & *Penicillos* refero. Illa à loco nomen sumsit. Est majore sui parte rubicunda, cætera candida. Margaritas proferre proditur. Minor totacinericii coloris est. Tubulos testaceos *Penicillos* recentiorum nonnulli vocavere. Molli quadam & laxa substantia saxi alligantur, ita ut aquarum undiscedit & agitur. Cum id carnosum, quod nimirum intus latet, se exerit, frondem expandit, sunt & in quibus vermes delitescent, quorum sex Icones hic damus.

Aldrov. l. 3. c. 84.

HISTORIÆ NATURALIS DE EXANGUIBUS AQUATICIS.

LIBER IV.

De Zoophytis five Plant-animalibus.

CAPUT I.

De Urticis.

TAB.
XVIII.
Aldrov.
l. 4. c. 1.
Nomen.



Quartum Exanguium aquaticorum genus sunt Zoophyta, quæ Aristoteles τὰ ὑπαμφότεριζοντα φύττα & ζῷα, seu ambigentia plantæ & animali ut Budæus & Gaza vertunt, appellat.

Talia verò sunt, *Urtica*, *Pulmo marinus* *Holothuria*, *Tetbyia*, *Malum granatum*, *Fungus*, *Pyrus*, *Mentula marina*, *Penna marina*, *Uva marina*, *Malum insanum marinum*, & *Manus marina*.

Urtica, ab urendo Latinis dicuntur, quòd manum urere videantur, si ea tangantur. Græcis ἀκαλίφα, seu quam ἀπολέσσει τὴν ἀφὴν, id est, sensum corrumpentes, seu tanquam ἀπάλαι τῇ ἀφῇ id est, tactui molles ac lenes sed per antiphrasin, asperæ quippe sunt, & infestæ, dicuntur. Vocantur & κνίδας, ἀπὸ τοῦ κνίσειν, hoc est, δυνάμειν & κνησμοῦν τινὰ ἐμπούειν τῶν ἀπὸ τῶν χεῖρε, *morsum aut pruritus excitare tangentium manibus*: nec non μετρίδια, à similitudine quàm cum muliebri pudendo habent: *Colyzenæ* quoque à modernis, quòd colis, id est, pedunculis suis, *Polyporum* more firmiter adhæreant. In Italia *flamma maris*, apud *Trottulam*, *Carnes marinae* dicuntur. *Jovio urticæ* & *vertibuli* haud sine errore iidem sunt.

Descrip-
tio.

Arist. H.
A. l. 8. c. 2.
& l. 4. c. 6.
Pli. H. N.
l. 9. c. 45.

Locus.
Aristot.
H. A.
l. 8. c. 2.
Pli. H. N.
l. 9. c. 45.

Descriptionem generalem si spectes, *Os* in medio habere, quod in majoribus evidentius esset prodidit. Aristoteles. Excrementa nulla in iis cernuntur, & hac re stirpibus sunt similes. Summa tenui fistula reddi, apud Plinium legimus.

Diversa diligunt *Loca*, & in variis generantur. Quædam enim nunquam absoluntur, sed saxi semper adhærent, reliqua quæ vagantur, littoribus & planis locis gaudent. De saxo, quasi de testa vivunt, & prænatantes pisciculos excipiunt retinentque, Plinius carne vesci scripsit.

Idem *Urticis gignendi* modus qui testa inclusis: per rimas enim, & cavernas, & fauces saxorum oriuntur, ut tradit Philosophus.

De *Natura* earum ita Plinius: Contrahit ergo se quam maximè rigens, & prænatante pisciculo, frontem suam spargit, complectensque devorat. Aliàs marcenti similis, & jactari se posse fluctu algæ viæ, contactos attritaque petra scalpentes pruritum (*Dalechampsius* legit, petras scalpentes ob pruritum) invadit. Eadem nocte pectines & Echinus perquirat: dum admoventi sibi manum sentit, colorem mutat & contrahitur. Tacta uredinem mittit, paulumque si fuit intervalli, absconditur.

Comedebatur olim, ut nunc etiam: quam Pythagoras astinere discipulos jussit, vel quòd Veneris stimulos afferre diceretur: vel quòd Hecatæ sacra esset. Ab Aristotele post æquinoctium hyemale magnopere laudatur. Hoc tempore plurimas ligneo veru transfixas, & aliquantulum assatas, primum ex sale & aqua fervefaciunt: deinde farinâ conspergunt, & ex oleo vel butyro in sartagine frigunt. Secundum Xenocratem gratæ sunt ori, sed stomacho admodum insuaves: (*Diphylus* tamen ὑπομαίχης facit) sed assatæ elixis accommodatiores. Alvum cient, urinamque magis movent. Cum passo aut vino mulso facilè concoquantur & excernuntur. *Medicinam* si attendas, ajunt in vino potas calculosis prodesse, ut author est Galenus. Cum aceto scyllitico psilothrum constituit.

Differentias varias apud authores invenias. Aristoteli aliæ sunt corpore parvo, quæ cibo aptiores: aliæ majusculo duroque. Aliæ sinuosis adhærent quæ nunquam à saxi absolvuntur: aliæ plana littora amant, quæ suis abjuncta sedibus vagantur. Idem apud Athenæum habetur. Secundum Rondeletium, Aliæ saxi vel cuiuslibet rei alteri adhærent; aliæ minimè. Rursus earum quæ saxi vel alteri rei hærent, alia perpetua stabilique sede illic degunt, quæ sunt *Urtica* parva in rimis saxorum latitans:

Natura.
Plinius
H. N.
l. 9. c. 45.

Ufus.

Aristot.
H. A.
l. 4. c. 6.

Differentiæ.
Arist. H.
A. lib. 5.
cap. 16. &
l. 1. c. 1.

Ath. l. 3.

latinans : quæ Purpuris & Buccinis adnascitur ; quæ cinerea est , longisque cirris constans : Aliæ sedes mutant , & liberè per mare feruntur natantque , ut , purpurea urtica. Semper solutæ sunt , quas vulgò Potes appellant. *Parva* , juglandis magnitudinem vix superat. Tota carnosæ est , cirros breves habet , contracta recti intestini extremum refert , colore vario est. Quædam enim cærulea , alia viridis , alia subnigra , sed punctis aliquot cæruleis vel flavis vel rubris notata. Græcis *κολέκαινα* dicitur. *Cenerem* à colore nomen sortita est. Tenuis est admodum , quia frondem magnam , id est , cirros multos habet , carnis parum. In Saxorum rimis vivit : comam semper explicatam habet , nec unquam contrahit.

Utraque scopulis littoralibus , & iis potissimum marinis tractibus qui ventorum impetum minus sentiunt , tam pertinaciter inhæret , ut nisi primo impetu divellatur , vix postea nisi in frustra concisa dirimi possit , adeò suas trichas arctissimè contrahit. *Purpurea* , seu *Phoenicea* , Rosa quibusdam , aliis *Posterol* , quòd contracta recti intestini extremum cum musculo sphinctere seu podicem referat , est primæ similis , nisi quòd frondem & longiorem & copiosiore habet.

Purpuris & buccinis adnascens , partem exterioriorem habet duram & rigidiusculam , spissioreque quàm in aliis urticis , cirros brevissimos in ambitu. In exterioribus ejus partibus filum longum deducitur purpureo colore , tam jucundo , tamque fluido infectum , ut cum precioso illo Purpuræ succo certet. Ideò hanc à cane Herculis demorsam fuisse Rondeletius credit. Datur & in *Lepade nata* , de qua Ferrantes Imperatus ita scripsit : In dorso esse sex rimas stellam æmulantes : in medio dorsi foveam parvam cum figura quadam inclusa Conchæ rhomboidi simili , sustinerique à lateribus lepadis mediante membrana continua , & cavitatem , quæ est in animali non habere aliud intermedium quàm membranam. A parte anteriore conspici fructum Lepadis instar penicilli pictoris in se revoluti.

Ad priores illas referri *Bellonii* possunt , quarum quædam rubro colore suffusa est , altera magis cærulea , granulis in gyrum circumfessa. Utraque marinum tuber contracta refert , explicata Cæsariem totum corpus rotundum ambientem : nam infinitis cirris , antennarum papilionibus , aut scarabæi crassitudine constat.

Huc etiam spectat Aldrovandi *Contracta* , *Cinerea Rondeletii congener* , quæ etiam saxi adnascitur , cirris tenuibus : pilei ferè forma , colore tota coccineo , excepta summitate , quæ est viridis , cum nigra rotundaque macula : & quæ ex leporis

marini genere , coloris partim purpurei , partim albi.

Urtica soluta , seu *Potta marina* vulgi , Aldrov. l. 4. c. 2. quòd speciem quandam mulieris vulvæ re- præsentet ; Græcis *Mongi* , inhonesto etiam vocabulo , quòd , ut scribit Bellonius , partibus verendis admota , pruritus ac Venerem , imo etiam ampullas excitet , dicitur. Cum jacet , omalo similis est : cum erigitur , pulmo videtur , & adeò tanquam vitrea & lucida est , ut sine sectione interiora omnia videre possis. Suspensa , quandam Polypi imaginem gerit , nisi quod brachia tenuissima & crassissima habent. In partibus unde pedes oriuntur , quosdam meatus arenarum plenos Gyllius vidit. Formam supernè rotundam , infernè concavam refert Massarius , ut Conchæ videri possint ; Cirrose ximo emittere admodum Polypi.

Duo hujus apud Rondeletium genera. Differentiæ. Primum ita describit. Pars una veluti fungosa quædam massa , rotunda , cava , in medio perforato , purpurea veluti fasciola ambiente , pileum planè refert : altera parte Polyporum pedibus similis est. Ocho enim pedes habet crassiusculos , extremis partibus quadratos , in acutum desinentes , nullas interiores partes distinctas habet. Corpore est adeò pellucido & splendido , ut oculos offundat. Ad eam magnitudinem accrescunt , ut pileos , quibus viatores uti solent , superent.

Alterum , quatuor duntaxat pedes seu frondes habet , qui foliis acanthi comparari possunt , in altera parte lineæ stellatim disponuntur. Hujus generis illa quoque videtur , quam *Bellonius* ita descripsit : Mollis quidem & albus corpore cartilagineo , ac crystalli in morem pellucido , quod in mucorem faciliè resolvitur. Gibbam habet instar dimidiatæ sphaeræ figuram , glabram , pollicis crassitudine : cujus pars interna nervis rectis à medio incipientibus , quasi striis fulvi coloris in gyrum radiatur , quibus se diffundit & constringit : qua corporis commotione aquam concutit , & nunc in pronum , nunc in supinum effertur. Pinnarum vice pinnis tenuibus & ægrè conspicuis in orbem communitur , ut *Lepus marinus*. Cruciformes quoque cirros , striatos , crassos , in modum stellæ radiatos , numero quaternas , parte interna natationi accommodatos habet : quas ut exactè conspicias , erit in lebetem aquæ syncerioris cojiciendus : qui si supinus devolvatur , multas fissuras in radice cirrorum ostendet.

Os quoque habet parte prona situm , quo ea quæ venatur absorbet , in quem usum quatuor cirri ad ejus latera subjacent , coloris synopidis , quasi ejus branchiæ essent , vel intestina. Hinc fit , ut intuentibus pulmonem in mari pabulandi gratia divagantem , grandis videatur quasi pituitæ globus ,

qui unicum tantum colorem referret, nisi rubris illis quatuor circulis sigillaretur, & ea cruce, qua interna pars striata est, distingueretur.

Ad primum genus referenda est *Urtica* soluta *Mathioli*, quam hic damus. In frusta divisa, ac in mare coniecta, vivit nihilominus ac movetur: extra mare exanimis apparet. Emortua in alto mari, ac in littus ejecta, transparentis glaciei similis est. Omnes pruritus in pudendis & uredinem in manibus movent, & acrimonia sua Venerem extinctam & sopitam excitant.

CAPUT II.

De Pulmone marino, & Holothuriis.

Tab.
XIX. &
XX.
Aldrov. l.
4. c. 3.
Arist. H.
A. l. 5.
c. 15.

INter Testacea quidem Pulmonem marinum posuisse Aristoteles videtur: Plinius tamen inter Zoophyta recensuit, quem nos sequimur. *Pulmo marinus* dicitur ita vel à pulmonum nostrorum figura, vel ab eorundem substantia laxa, & molli, foraminulisque plena. Kiranidis interpretis Cunnus marinus exponit, & sic pro *Urtica* soluta, sed falso, sumere videtur.

Sanè decoctum pulmonis commendant Medici: at *Urticæ* substantia est nimis mollis, & pituitæ concretæ similis, qua in aquam abit; & nec in cinerem redigi, nec in aqua decoqui, corpore aliquo superstito potest.

Descriptio.
Plin. H.
N. l. 8.
c. 35.

Descriptionem ejus vix ex antiquis obtineas. Plinius per mari ferri ubi imminet tempestas, plurimumque dierum hyemem portendere scripsit: Ephesus verò non adhærere, sed absoluta esse, addidit. Commendantur ad pylos evellendos. In aceto putrefacto & mento aspersæ carnes, fugam illorum facere dicuntur. Cinis alligatus egregiè profluvia purgat. Decoctus verò in aqua, calculosis medetur. Lignum si eo confricetur, ardere videbitur, ut sua luce faculam quoque vincat. Rondeletius invenit substantiam quandam saxi hærentem, corio duro & nigro intectam, intus mollem fungosam & fistulosam aplysiarum modo. Vel, inquit, pulmo marinus dici potest, corpus quoddam rotundum, pilæ marinæ modo, virescens, foris substantia filtro simile, intus totum fistulosum, veluti sponsia aplysia. In mari aqua plenum est & grave: extra mare in se concidit, & flaccescit: in saxorum rimis delitescit & inter algas.

Aldrov. l.
4. c. 4.

Holothuriorum nomen unde veniat, nescimus. Pauca etiam de iis veteres. Saxi soluta esse, sed immobilia, asperoque corio contegi. Rondeletius duas nobis ico-

nes exhibuit, cum his descriptionibus. Id genus, inquit, quod hic proponimus, altero extremo obtusum est & planum, in quo rosæ sculptam imaginem dicas, circa quam sunt acetabula. Inde parva appendix & mollis dependet. Pisculentum odorem respicit, nec minus ingratum & insuavem ac lepus marinus: altero extremo tenuius est; intus, partes omnes sunt indiscrætæ. Altero extremo caput habere videtur rotundum, rugosum, quod aliquando dilatatur, aliquando constringitur. Sequitur corpus crassius, aculeis multis rigens: videtur in caudam deficere, ex cuius utraque parte duæ sunt appendices pedum pinarumve loco, sed differentes. Superior enim strictior est, in ambitu incisa, in acutum desinens, ad quam à cervice producta est linea; altera latior ubique. Harum beneficio motum habere videtur, cuius prorsus expers est primum genus: quod aliquando acetabulis suis saxi hæret, sed solvitur.

CAPUT III.

De Tethyis.

TEthyia seu ut Plinius vult, Tetheæ, veteribus Græcis *τῆθια*, & *τῆθια*, modernis Sphærodotes, à sphaera sine dubio; Adriatici sinus accolis spongiæ, quia cum premuntur, spongiarum instar, aquam foraminibus reddant; Tarentinis, propter formam & parvos quosdam anfractus verticilla; aliis à colore & tumore, seu quod nullis fibris, ut Tubera terrena niti crediderint, Tubera; quibusdam, quod callosa materia tegantur, Calli; nonnullis, sed falso, idque ex comparatione patere potest, *Urticæ* vocantur. Gaza cum *Holothuriis* confundit, Eustathius & Homeri scholiastes *τὰ τῆθια* ab Ostreis non distinguunt. Nicander *τὰ τῆθια*, patellas feras explicat.

Tab.
XIX. &
XX.
Nomen.

Plin. H.
N. l. 32.
c. 10.

Aristoteles ita eas descripsit. Quæ Tethya five callos speciali nomine à tegminis qualitate appellamus, naturam inter hæc genera (Testatorum) peculiarem sortiri notum est. Iis enim solis corpus toto tegumento includitur, cuius durities inter testam & corium est: quamobrem more præduri bubuli tergoris secatur. Adheret id genus saxi sua testa. Duo à se invicem distantia foramina habet, admodum exigua, & visum vix patientia, quibus humorem accipit & reddit. Excrementum enim nullum in eo spectatur, quale in cæteris Ostreis, vel Echinæum, vel quod papaver vocatur. Diffecanti ea tibi primum occurret membrana nervosa Carnaceo corpori obducta.

Descriptio.
Arist. H.
A. l. 4.
c. 2.

Hac

Hac enim, corpulentum tethyi continetur: idque à cæteris omnibus dissimile; suo in genere omnibus similisejusmodi caro. Hæret hoc duobus locis & membranæ & corio ab latere: quaque hæret utraque parte pressius est: quibus partibus tendit ad meatus ipsos, qui protinus per ipsum calicem extrorsum ducunt: atque hac emittit, atque exigit tum cibum, tum humorem, perinde atque si hic os sit, ille autem exitus excrementi. Atque horum alter crassior est, alter tenuior. Intus autem in parte utraque sinus dissepti, continua re pusilla quadam. In eorum altero humor inest. Cæterarum partium, quæ vel instrumenti nomine vel officio sensuum, ac ne excrementa quidem cujusquam modi qualia in aliis sunt, quicquam habent. Et hæc quidem Aristoteles. His addit Rondeletius; non solum petris, sed & Ostreorum testis affixa esse, & in illis veluti duros tumores cerni. Ovi, addit, figura sunt aliquantulo longiore. Testa extra fusca, inæqualis, rigida, intus argentea, lævis. Tethyor. caro membrana alia alba involuta ventriculi formam refert, rotundam scilicet & oblongam, meatus crassior & amplior gulæ proportionem respondet: alter minor podice. Colore uterque est rutilo vel rufescente, reliquum corpus croceum.

Locus.

In Ægypto nulla inveniuntur. In Smyrna præstantissima. In Oceano ad Gallicum littus sunt frequentia, Parisiisque in foro piscario sæpe Ostreorum testis adhærentia visuntur. Signantur etiam in cavernis saxorum: maximè verò in cœno & littoribus, quæ phyco algave marina abundant. Inveniuntur & in musco marino, aut aliis in herbis foliisve marinis. Unde Plinius. Tethyæ inveniuntur sugentes in foliis marinis, seu potius scopulis. Hinc Eustathius τῆς διὰ dicta conjicit à verbo δῶ, quod significat δὴλα quod & pro lactare & sugere accipitur. Fungorum verius sunt generis quàm piscium: & quia nullum viscus intus habent sed carnem uniformem, nihil de animalis natura habere videtur.

Motus.

Motum & sensum qui illis inest ab interno provenire, cum multa Conchylia & Crustacea intus habeant, à quibus motus provenit, Plinius auctor est.

Ufus.

Rubra cibo sunt idonea: pallida verò aut sublutea amarulenta Massarius prodidit. Xenocrates plurimum dareimenti tradit, coriaque maximè eorum non confici.

Medicinam si attendamus, torminibus & inflationibus succurrere, & tenesmum dissolvere renumque vitia; in cibo sumpto lateris dolores lenire, apud Plinium habemus. Conferunt etiam ischiadicis ventrique superiori una cum ruta: item cachecticis, quorum corpus macie conficitur cum ruta & melle.

Quantum ad *Differentias* & species quatuor Aldrovandus posuit. *Prima* parte externo & interno pyri formam æmuletur, & colore est cinereo: ablataque cuticula substantia apparet densa poris exiguis, vixque visibilibus referta, per quos aqua attrahitur, & per universum corpus distribuitur. Duo grandiora habet foramina, unum oblongum; alterum rotundum; hoc alvo, illud ori respondere videtur. In his quandoque conspiciuntur Scyllari, Cancelli, & alia crustacea; item trochi, turbines & Ostracoderma.

Alter est figura mali, foraminibus duobus; rotundo, quod majus est; oblongo, quod minus. In eo Scyllarus continebatur, quæ totum ferè illius foraminis continebat intervallum. Cauda erat revoluta

Tertia figura est inæquali, tuberosa: foramine uno oblongo majore, quod in opposita erat parte minore. In eo continebatur Purpura, proportionem magnitudinis Tethyi, ut etiam exterius corium penetraret.

Quarta, figura est rotunda sed inferius compressa: foramen habet tam exiguum, ut vix conspici possit: Intus, crustaceum aliquod, ut in partis superioris foramine conspicitur.

CAPUT IV.

De Mentula marina.

Mentula marina Numenio *πῆπλιν*, fortè *παρα τὸ ἀπείρειν δὲ τέχνη*; aliis fortè Holothurium, à *δορνεύειν* libidini operam dare, *δορνεύειν* genituram significat; hinc Rondeletii altera Holothuriorum species virilis genitalis speciem pro se fert; quibusdam Halesurion, quasi *ἀλὸς ὑπὸ*, marina cauda, Apuleio veretillum. dicitur. Albertus cujusdam ostrei meminit, cujus species una virgam, altera vulvam præ se ferret. Moderni Græci Psoli vocarunt.

TAB.
XX.
Aldrov.
l. 4. c. 7.
Nomen.

A Bellonio ita describitur: Exangue maris purgamentum est: solutum vagatur. Sed ea ejus natura, ut à piscibus aliis minimè tentetur, neque à quoquam in cibo expectatur. Littorale est neque alibi reperitur, quàm ubi Patellæ, Ricini, & vertibula degunt. Genitale ex hoc dicitur, quod teres sit, pedem longum, & mediocris brachii crassitudine: Distendit se & contrahit hirudinis in morem. Unde ei & nomen inditum est. Quin etiam rufi coloris est, Iners, nec nisi serpendo incedit, aspectu toroso, Nymphææ radicis similitudine. Semper ad ima fidit: nunquam natat: contractatumque in seipsum contrahitur, ac cornu duritiem habet, vixque acuta cuspidem pertundi potest: alioqui permolle dum sua sponte movetur, suas promuscides quan-

Descriptio.

quando vult, exerit, atque ita constringit, ut ex pedali longitudine vix sex digitos longum appareant. Acetabulis quæ in promuscidibus habet, lapidibus hæret; in quibus plusquam quatuor millia nonnunquam annumeres. Ex anteriore autem capitis parte rursus crinitas emittit, veluti arbusculas acetabulis plenas; quibus quicquid palpat, ad os adducit, quod tam amplum aperit, ut vel integram conchulam admittat: vescitur enim omni conchyliorum genere. Ejus recrementa viscida sunt ac lenta, albissima, copiosa, quæ tandem indurantur, ut cum fidibus de duritia nervea certare possint. Os in gyrum ossiculis, dentatum habet, præterea nullis ossibus alibi præditum. Ab ore gula in stomachum differtur, quomodo in Erinaceo marino dictum est; reliqua ut intestina circumponuntur in gyrum, quæ vix observari possunt.

Differen-
tiæ.

Rondeletius duas species facit. *Una* coria duro constat. Dum vivit intumescit & distenditur: flaccescit post mortem. Partes internæ indiscretæ sunt. *Altera* ex testa spissa, dura, cartilaginea, perspicua & rugosa constat.

Gesnerus duas quoque à Sittardo accipit. *Prior* massa quædam informis erat, retrorsum ubi crassior altiorque veluti cornu parvum, rugosum, extendebatur: opposita pars humilior, in glande, foramen rubicundi coloris ostendit. *Altera* Epiptum dictum, informis quoque, inæqualis, & tuberosa, multis acetabulis compacta, colore partim nigricans, partim rubescens & albicans alicubi erat.

C A P U T V.

De Malo Granato, Fungo, Pyro, Penna marina, Uva marina, Cucumere marino, Malo insano, & Manu marina.

Tab. XX. **M** *Alum granatum, Fungus marinus, & Pyrum à figura nomen sortita sunt.*

Illud ejusdem est cum Punico coloris. Iste cærulei; hoc ejusdem ferè.

Penna marina est pennis magnis quæ in pileis gestare solent, perquam similis. Piscatores Itali ob extremitatis alterius similitudinem *Mentulam alatam* vocant. Est enim ea pars præputio, id est, glandi similis, altera verò parte pennam refert. Pars illa crassior, quæ glandis specie est, rimas aliquot habet, quales sunt branchiarum rimæ in galeis. Quæ pennam repræsentat, festucis tenuibus constat, quæ alumini scissili similes sunt: iis, substantia alia quadam tenera innititur. Noctu maximè splendet, stellæ modo, ob candorem & lavorem. Pennam marinam *aliam* rubentem, linea per medium caulem alba, fronde simili ferè, sed parte altera, quæ fronde caret longiore, simplici; nulla cum glande dissimilitudine.

Uva marina facit & Plinius mentionem dum scribit: Rerum quidem non solum animalium simulachra mari inesse, licet intelligere intuentibus, Uvam, Gladium, Serras. Est autem oblonga quædam & informis massa, ex uno pediculo dependens. Partes internæ indiscretæ sunt, inter quas aliquando reperiuntur glandulæ parvæ. In vino putrefacta vini tædium adfert, ut Plinius prodidit.

Malum insanum marinum, & Manus marina, à similitudine quoque nomen obtinere.

Cucumis, digiti est crassitudine & longitudine, tuberculis aliquot aspersis veluti in Cucumere terrestri parvo. Partes internas indiscretas habet.

INDEX

I N

HISTORIAM DE EXAN- GIBUS AQUATICIS.

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|------|--------|
| A. | | Loligo major pag. 8. | | T. I | |
| A | Ratu pinima pag. 26. | 2. & 4 | minor 8. | | |
| | Astacus fluviatilis 15. | 2 | | | |
| | marinus communis 13. | 3 | | | |
| | major 15. | 3 | | | |
| | minor 15. | 3 | | | |
| Astacus parvus marinus Rond. 14. | | 2 | | | |
| supinus | | 3 | | | |
| B. | | | | | |
| B | Alani 49. | 15 | | | |
| | Buccinum 33. | 10 | | | |
| C. | | | | | |
| C | Ammarus f. Astacus fluviatilis 15. | 2. & 3 | | | |
| | Cancrini in genere 19. | 25 | | | |
| specie 20. | | 4. & 5. | | | |
| Cancer marinus 20. | | 4. & 5 | | | |
| Majas 20. | | 6 | | | |
| Eques 22. | | 5 | | | |
| Cordis figura 22. | | 7 | | | |
| Flavus undulatus Rondel. 22. | | 6 | | | |
| Fluviatilis 23. | | 3. & 4 | | | |
| Leo f. Elephantus Plinii dictus 14. | | 2 | | | |
| Cancer brachychelos 22. | | 6 | | | |
| Macrochylos 22. | | 6 | | | |
| Cancer maximus Guaja Apra 25. | | 9 | | | |
| Congener brachychelo 23. | | 6 | | | |
| Cancrini parvi 23. | | 7 | | | |
| Cancellus 24. | | 7 | | | |
| Chama 42. | | 14 | | | |
| Charara Una 25. | | 9 | | | |
| Cicie Ete 25. | | 9 | | | |
| Ciri Apoa 26. | | 9 | | | |
| Cochleæ 36. | | 12 | | | |
| Conchylium 35. | | 11. & 13 | | | |
| Conchæ 41. | | 13 | | | |
| Concha Venerea 52. | | 17 | | | |
| Perfica 53. | | 17 | | | |
| Cruftata 11. 19. | | | | | |
| Cucumis marinus 58. | | 20 | | | |
| Cunuru 25. | | 9. | | | |
| E. | | | | | |
| E | Chinus marinus 39. | 51 | | | |
| | | | | | |
| F. | | | | | |
| F | Ungus marinus 58. | 77 | | | |
| | | | | | |
| G. | | | | | |
| G | Uaja Apra cancer maximus 25. | 32 | | | |
| | Guaja alia species 26. | 32 | | | |
| alia species | | 32 | | | |
| Guanhum 26. | | | | | |
| Guaricuru 27. | | 36 | | | |
| H. | | | | | |
| H | Olothurium 56. | 75 | | | |
| | | | | | |
| L. | | | | | |
| L | Leo f. Elephantus Plinii 14. | 2. & 4 | | | |
| | Lepas 51. | 16. & 17 | | | |
| Lepus marinus 9. | | 1 | | | |
| Locusta 12. | | 2 | | | |
| M. | | | | | |
| M | Allum Granatum 58. | | | | 20 |
| | Insanum Marinum 58. | | | | 20 |
| Manus marina 58. | | | | | 20 |
| Maracoani 26. | | | | | 9 |
| Mentula marina 57. | | | | | 20 |
| Mollusca 3. | | | | | |
| Murex 34. | | | | | 10. 11 |
| Musculi 47. | | | | | 15 |
| Mytuli 48. | | | | | 15 |
| N. | | | | | |
| N | Autilus 30. | | | | 10 |
| | Nerita 36. | | | | 11 |
| O. | | | | | |
| O | Strea 44. | | | | 14 |
| | Ova Sepiarum | | | | 1 |
| P. | | | | | |
| P | Agurus 21. | | | | 5. 6 |
| | Paranacare 27. | | | | 9 |
| Patella 51. | | | | | 16. 17 |
| Pectines 46. | | | | | 14 |
| Penicilli 53. | | | | | 17 |
| Penna marina 58. | | | | | 20 |
| Pholades 49. | | | | | 15 |
| Pinna 50. | | | | | 16 |
| Polypus 4. | | | | | 1 |
| Potiquiquiya 26. | | | | | 9 |
| Pulmo marinus 56. | | | | | 19 |
| Purpura 31. | | | | | 10 |
| Pyrum 58. | | | | | 20 |
| S. | | | | | |
| S | Epia 7. | | | | 1 |
| | Sepiola | | | | 1 |
| Solen masc. 50. | | | | | 15 |
| foemina 50. | | | | | 15 |
| Squilla in genere 16. | | | | | 4 |
| specie 17. | | | | | 4 |
| Squilla lata 17. | | | | | 4 |
| gibba f. Crangone 17. | | | | | 4 |
| parva 18. | | | | | 4 |
| Mantis 18. | | | | | 4 |
| T. | | | | | |
| T | Amaruguacu 26. | | | | |
| | Tellinæ 48. | | | | 15 |
| Testacea 28. 29. | | | | | |
| Tethya 56. | | | | | 19 |
| Trochi 36. | | | | | 11 |
| Turbines 29. 30. 36. | | | | | 11 |
| V. | | | | | |
| U | Ca Una 26. | | | | 9 |
| | Urticæ 54. | | | | 18 |
| Uva marina 58. | | | | | 20 |
| Z. | | | | | |
| Z | ophyta 3. 54. | | | | 18 |
| | | | | | |

ADMO-

ADMONITIO

Ad Bibliopegum, quo quævis Tabula
loco suo fit inferenda.

TABULA I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Pagina 4
12
15
16
19
21
24
25
25
30
36
37
40
45
50
52
52
54
56
57



Tab. I. *Sepia*.


Polypus.




Sepia supina.



Loligo maior.



Loligo minor.




Lepus marinus.



Oua separum.



Sepiola.



Locusta Marina Carabus




Astacus Marinus com.




*Astacus similis
pediculo marino*

Astacus / cammarus. 3.



Leo seu Elephantus.




Astacus parvus Marinus.


*Astacus similis pediculo
marino.*




7




Cambarus.



Astacus Minor.




Astacus Maior.




Astacus Supinus.



Astacus fluviatilis.




Astacus flu.



Squilla lata Rondel.



Squilla lata.



Carangon seu Carangon Rondel.



Squilla parva.



Squilla gibba.



Squilla Vrsa minor.




Squilla mantis.




Squilla.



Squilla lata



Leo Rondel



Squilla gibba. alia.



Cancer marinus



Tamara Guacu




Cancer Heracleoticus Rondel

Cancer Anonij-

mus Rondel

Cancer mari.



Hippocarcinus



Cancer Heracleoticus alter



Cancer Heracleoticus




Cancer



Cancer Rondel



Pagurus mase



Pagurus firm



Cancer mas

2




Tab. VI

Pagurus
sæmina




Pagurus Supine

4



Pagurus Prone

3



Cancer flauus

sine Undulatus

6




Cancer Varius

sive

mar-

moreus

5



Araneæ marinæ Species

7


prone



Araneæ marina


8

Supine




Araneus supine e
alius

10



Araneus alius


11



Araneus Erustæ

9

prone



Cancer minut

14



Cancer minutior

13



Cancer brachyochelos Rondel

12




Cancer brachyochelos

15




Congener



Cancer Heracleoticus lursus
prone



Amphus bava marina



Cancer Heracleotus lursus - *tus supine*




Cancer promis




Cancer Supine

Testudo


marina



Crabon



Testudo marina



Stella

marina major




Stella marina minor



Stella marina


trodocim radis





Nautilus

2



Polypus

1




Nautili Structura

4



Testa Nautili

3




Purpura

5




Purpura alia

6



Testa Nautili

7



Buccina

8




Cochlea rugosa

9



Murex aculeatus

10




Strombus magnus

4



Aporrhais



Murex Orientalis




Murex marmoreus Rond Tab. XI



Murex Coracoides




Concha Longu. Rondel



Concha Altera



Concha Echionata cruda




Concha Indica polita




Turbiues



Trochus Magnus



Trochus Pyramidalis



Trochi




Trochi



Turbo Magnus



Turbo Longus



Nerita Rond



Nerites




Nerites




Nerites



Cochlea rugosa et umbilicata




Cochlea cœlata



Cochlea Sarmatica



Cochlea cœlata cum suo operculo



Cochlea olearia



Cochlea cylindroides alter



Cochlea cylindroides prior



Cochlea Echinophora Roud




Limax Marinus



*Cochleæ oper:
culmæ*



Cochleæ operculum




Cochlea depressa



Echinus Spatagus et Brissus



Echinus spohatus asuis spinis



Echinus



integer

Echinus idem in duas



Partes


dissectus



Echinometra amethystini
coloris



Echinus marinus ferrugineus



Tab

XIII

Echini quintum genus
Rond




Echinometra Aldrou



Echini species oblonga aperta




Concha imbricata Rond



Concha


Margaritifera



Concha Echinata



Concha Tridachnes




Pina Magna




Concha Squamosa

Concha Pictorum




Concha rugata


Concha corallina



Concha Faselata




Concha Longa



Concha tenuis lesta


Concha vera cum animali



Chama nigra Rond




Chama Lævis Rond



Chama aspera Bellon


Tab. XIII



Chama Peloris



Chama Glycy meridix




Ostrea gaidero yoda




Ostrea Sylvestris Rond



Ostrea marina Rond



Ostrea marius



Spondylis Aldrou




Spondylus Aldro



Pecten Minor caitanzus cum anurali




Pecten Versuotor




Pecten




Pectunculi



Pectines ali Aldrou



Pecten asper



Musculi Aldron

3




Musculi Rondel

2



Musculus

1



Mytili oblongi

5



4



Mytilus niger cum strigis flavis

6




Tellina

7



Tellina


8



Tellinae cum dentalibus

Tellinae Cohærentes

10



Tellinae congeneres

11



Balanus marina

12



Balanus alius

13



Balani rubei

14



Balani Gigantis

15



Balani siue Polycipedes

16



Pholas

Pholas Aldrovandi

19




Pholas concha alia

22




Solen femina Rond

21



Solen mascul Rond

20




Pinna alia



Pinna Perna minor




Pinna Magna Rond



Pinna alia



Pinna aculeata Aldron



Pinna s. Perna Major




Pinna parva Rond






Pinna alia cum tuberculo adnato



Patellæ diversæ



Patellæ Aldron





Patella Cypria Major striata n. 1

Patella Cypria Major non striata n. 2

Lepas sine Patella Bellon

3



Patella fere sine Auris marina


5




4





Concha Venerea Zoographi



Concha Venerea



Concharum venerearum Speciebus



Concha ven Rond


Concha Persica Major




Tubuli in quibus Vermes



Concha Persica minor



Penicillus



Penicillus alius



Vermes in Tubulis





Tubuli alii parui



3





1875



1875



Vrtica parva Rond




Vrtica Major



Vrtica cinerea



Vrtica minor



Vrtica rubra Rond




Vrtica Rond



Species daz



Vrticarum





Vrtica marina

saxo innata



Vrtica marina alia Trypsis species



Vrtica rubra Rond



Lepori marina




Congener



Vrtica Contracta Altron







Pulmo marinus Mathioli

Potta mari



et supina parte





Pulmo marinus Rond

Holothunius Rond


1

Holothunius Rond


2



Thetyorum




4



Species




5



Varix

7



Thetiorum sex species Aldron



Mentula marina Rond


Epipetrum



Malum insanum marinum Rond



Mentula marina



Vua marina



Manus marina




Penna marina Rond



Cucumis marinus



Penna marina alba




Malum granatum



Pyrum marinum Zoophyhton



Fungus



*marinus
Zoophyhton*

THEATRI UNIVERSALIS
ANIMALIUM

PARS QUINTA.

SIVE

HISTORIÆ NATURALIS

DE

INSECTIS

LIBRI III.

Cum Enumeratione Morborum, quibus Medicamina ex his Animalibus petuntur, ac Notitia Animalium, ex quibus vicissim Remedia præstantissima possunt capi.

CUR A

HENRICI RUYSCH.

M. D. Amstelædamensis.



AMSTELÆDAMI.

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS.

Anno M. DCC. XVIII.

P R Æ F A T I O

ad Libros de I N S E C T I S.

Nomen.



Partes.

Plin. H.

N. l. II.

c. 27. 36.

Arist. de

part. lib. 4.

c. 5.

Arist. de

gener. l. 4.

Plin. H.

N. l. II.

c. 4.

Arist. de

part. lib.

4. c. 6.

Arist. H.

A. l. 5. c.

20.

Plin. H.

N. l. II.

c. 3.

Sonus.

INSECTORUM nomine animalia illa exanguia intelligimus, quæ incisuras parte sui vel supina, vel etiam prona, vel etiam utraque habent, & corpore intus forisque duro constant. Aristoteles *ἑντομα* vocat, ab incisuris, quæ nunc ^{Plin. H. N. l. II. c. I.} cervicum loco, nunc pectorum, atque alvi procinctu separant membra tenui fistula cohærentia. Albertus *annulosa* dixit, quod corpora quibusdam quasi annulis distincta gerant. Imperfecta ad sanguinea si comparaveris dici possunt: nec enim tanto partium apparatu stipantur: si in se considerentur, quia nulla re ad naturam suam pertinente destituuntur, perfectissima jure dixeris. ^{Arist. H. A. l. 4. c.} *Partes* si attendamus, Antennas quædam in capite gerunt, quæ in Lucano cornua potius vel forcipes propter duritiem vocantur: nullas alia habent. *Oculi* in omnibus patent, illique duri, ut quasi per membranam vitri modo translucidam cernant; mobiles iidem, ut, cum ob duritiem hebetius videant, clarius, splendore recepto videant. Nec *genæ* ipsis, nec *palpebræ*. *Lingua* quibusdam mollis & infirma, dura & valida omnibus, quibus non in alvo aculeus est. *Dentibus* carent, quæ cibo utuntur humido; de quibus ut & aliis cibo accommodatis ita Aristoteles: *Partes quæ cibum administrant, non pariratione data omnibus, sed plurimum differunt. Quibusdam in ore est, quod aculeus appellatur, quasi compositum, ac una lingua & labiorum obtinens potestatem. Quibus autem aculeus non parte priore habetur, iis intra dentes tale sensorium continetur.* Ventrem nonnulla habere ad- ^{Arist. H. A. l. 4. c.} vertit idem, à quo reliquum intestinum vel simplex vel replicatum proficiscitur. Viscus nullum est, nullum etiam pingue: nec ossa, nec spina: naturam inter carnem & nervum mediam obtinent. *Cute* omnia circumdantur, sed admodum tenui. Brevissimè hæc Plinius. *Insecta ut intelligi potest, non videntur nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pingua, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quædam marina, & quæ jure dicatur cutis: sed mediæ cujusdam inter omnia hæc natura, corpus arenti simile, nervo mollius, in quibusdam partibus ficius verius quàm durius. Pennas* quædam habere, quædam non, in textu dicemus, de varietate in differentiis. *Εἰς τὸν* dicitur crusta quæ pennis supervenit, easque vaginæ instar condit. *Caudam* solus scorpio, si Aristotelem sequimur, habet. *Senectam* exuere sicutum illis quorum pennæ vagina continentur. *Pedes* quibus sunt in obliquum moventur: quorundam extremi longiores foris curvantur. Quæ verò saliant, vel crura posteriora habent longiora, vel gubernaculis quibusdam saltui accommodatis fulciuntur, retrò curvatis. Causam apud Aristotelem invenies. ^{Arist. H. A. l. 8. c.} *Pedes*, inquit, priores longiores nonnulla ex illis habent, ut quoniam propter oculorum duritiem non exquisitè cernunt, cruribus illis longioribus incidentem molestiam abstergant & arceant. De numero sciendum, plures habere quæ pro corporis sui longitudine plurimum frigent; pauciores, quæ volucres. Pennarum ^{Plin. H. N. l. II. c. 48.} adjumento pedum inopia compensatur. Partim sponte partim per coitum generantur. Culices & vermiculos nec coire, nec ex animalibus nasci, Aristoteles habet. Ut mas in coitu fœminæ inserat, visum paucis, nec adeò exploratum habetur: mirumque genitale oblongum fœminis, quo genitalem auram à ^{Arist. de gener. lib. 1. cap. 16.} masculo hauriant. De illis quæ vermem generant ita Aristoteles: *Generant & vermem insecta, quæ vim generant* obtinent generandi, & quæ non per coitum, sed sponte natura oriuntur, ex tali origine consistunt. Nam & *Erucas* genus esse vermes censendum est, & fœtum araneorum, quanquam propter figuræ orbiculatam speciem, similia ovo, tum eorum nonnulla & alia complura primordia esse videantur. Verum non figura, nec mollitie aut duritie ovum definiendum est. Sunt enim conceptus nonnullorum duri, quamvis ovo diversi, sed quod totum mutetur, nec ex parte animal gignatur, id vermis est. Omne autem hoc vermiculi genus, ubi suæ magnitudinis finem receperit, quasi ovum efficitur. Indurescit enim putamen eorum, & tantisper immota redduntur. Quod in vermiculis apum & vesparum atque etiam in erucis apertum est. Cujus rei causa est, quod Natura pro sui imperfectione, quasi maturans antequam tempestivum sit, ovum pariat, tanquam hic vermis ad incrementum ovi mollis adhuc pergat. Hoc eodem modo in cæteris evenit omnibus, quæ non coitu generantur, vel in lanis, vel aliis hujusmodi, atque etiam in aquis. Omnia enim post vermis naturam motu cessant, & putamine obarescunt. Mox rupto putamine exit veluti ex ovo animal, tertia perfectum generatione, idque pennatum, quod jure multi mirentur. *Eruca* enim quamprimum capiant cibum, mox non capiunt, sed motu cessant, quæ per id tempus Aureliæ à nonnullis vocantur. *Vesparum* etiam vermiculis & Apum idem accidit. Post deinde, quæ *Nymphæ* appellantur, proveniunt, quæ nihil hujusmodi habeant. Ovorum enim natura, adepta suum finem, non insuper accrescit, sed ante augetur & alitur, donec distinguatur, & fiat ovum perfectum: Vermium autem alii hoc intra se habent, unde incrementum ipsis nutriendis accedat, ut vermes apum & vesporum: alii de foris capiunt, ut *Erucæ* & cæterorum nonnulli vermium. Diu coitus durat, tardo digressu sejunguntur: brevique maxima sui parte pariunt. Emittantne semen incertum est. Quot diebus generatio absolvatur, apud Aristotelem habemus. Maximæ partis ternis septenariis aut quaternis ut in ovi- ^{Arist. H. A. l. 5. c. 20.} paris describitur. Septem ab initu concretionem & consummationem ovi sibi vendicant: reliquis tribus septenis incubant & excludunt, ea scilicet quæ suo procreant fœtu, qualis est araneus. Quoad motum nota, repere, ambulare, volare, &c. Omnia pluribus motuum quam sanguinea generibus moveri, utpote quæ in frustra divisa, multilatis corporibus satis diu vivere possunt. ^{Motus. Spiratio.} *Spirant* nec ne non convenit inter authores. Negat Aristoteles, & perfrigerari duntaxat voluit. At Plinius. ^{Arist. l. de sem. & vig.} *Non video cur non magis possint non trahere animam talia & vivere quàm spirare sine visceribus: quod etiam in marinis, (addit) docuimus, quamvis arcente spiritu densitate & altitudine humoris. Pulmone carere, nec refrigerio cum sint frigida indigere, certum. Quorsum itaque respiratio? Murmur, quod Apes & Muscæ edunt, interioris spiritus agitato accidit. Quæ canere videntur, membrana septo transverso subdita, ad quam spiritus inclusus atteritur, obstrepunt. Exanimantur sub aquis multa, in cineribus reviviscunt, non quod inspirare non poterant, sed quod interior ille spiritus ab humore suffocatus fuerit, quo per calorem discusso, sibi restituitur. Odoratus quisquis in illis, nativo spiritu ipso- ^{Odoratus.} rum corporis perficitur. Nec enim sensorio carere, si sensus adest, dicendum est. Vocem edere quis dixerit? sonum ex interioris pelliculæ attritu. Locustæ suis se atterentes gubernaculis sonant. Di-*

versus

PRÆFATIO AD LECTOREM.

versus tamen is. Murmur edunt apes: cum attritu stridorem Cicadæ. Et quia hoc genus intus sonum habere visitur, hinc *Enceladum* insecti genus appellari Grammatici adstruunt. Universum *Bombycia* à bombo dices. Tenaciorem præ sanguineis fortita vitam non est quod dubites, ea imprimis quibus longum corpus est, & pedes multi, ut in Centipeda videre est. Singulare illud quod in agro Liguriæ Augustinus observavit. Secti per medium vermis partes à vulnere tanta celeritate in contraria discessere, ac si duo diversa animalia fuissent. Causam ad multiplicem principiorum partem referre videtur Aristoteles. Subito intereunt, & vel solius olei aspersu enecantur, quod viscositate hujus angustissimis per naturam meatibus occlusis, spiritus intercipiatur.

Differentiæ sunt innumeræ: præcipuæ à loco in quo nascuntur & degunt, quantitate, qualitate, partibus, victu, generatione, coitu & gressu, sumuntur. Locis variis gaudent. In Igne oberrat pyrausta, ut Plinius vocat: in nive vermes hirti & rubidi: in aquis marinis scolopendra, pulex & alia: in dulcibus hirudines, scarabæorum quoddam genus corpore lato compressoque, quod & in fundo reptat. In terra oriuntur vermes, lumbrici, juli, &c. Sæpe etiam intra fossilia invenias. Planta imprimis diversi generis insecta ferunt. In arborum caudicibus reperies Cossos & Teredines; in ficu Cerasten; in olea plantata ubi effossa quercus, Ranam vel Raucam vermem; in sorbo, vermiculos rufos, pilosos; in vitibus Butyros, ut Tullius vocat; & Ipses, qui verno tempore, Austro spirante orti, oculos vitium erodunt; & Involvulum, qui in pampini foliis intortis se implicat: nihil de Volucella dicam, quæ in vino nascitur. Cupressum & esculum infestant Galbæ, à quibus Sulpitiorum genti cognomen: Euonymum quoddam erucarum genus, quod frondibus absuntis emoritur: vesiculam ulmi premit: coccum, bestiola Conopi similis, quæ fructu maturescnte crumpit: gramen, Croton: Dipfasi fructum, vermis, qui portatus quartanam solvere dicitur: solani folia vermis viridi & croceo colore distinctus, cornu in fronte gerens, digiti longitudine: porrum Prassocurides: brassicam Crambides: Asphodelum vermes in volucres bestiolas flosculorum specie degenerantes: malam cimices agrestes: rutam perniciosi vermiculi. In frugibus quoque peculiarioria oriuntur insecta. In tritico namque occurrunt Curculiones: in farre vermiculus teredini similis, quo cavo dentium cera incluso, vitiati cadere dicuntur: in faba, Mida: in lente & aliis alii. Nec exortia insectorum animalia. Lendes & pecudiculi caput humanum infestant: in manibus sub cute pedicellus vulgò dictus oritur. Dracunculi Ægypti & Indiæ incolas, in cruribus & brachiorum musculis infestant. In ovibus sunt Ricini: in bubus & canibus Cynomia: sub lingua littæ. Mullum piscem affligit scolichia: Cyprinum, primo nativitatis anno vermiculus quidam niger circa branchias. In percis fluviatilibus duodecim cæu uniones ervi magnitudine generantur, carnosæ, candidi, quibus singulis vermis gracilis, oblongus, & teres inest. Gobius piscis vermis, quos in ventre gestat, vitiatur. Leuciscus lumbricis candidis, latis, qui se intestinis & visceribus circumvolvunt. Nonnullis aliis minuta quædam animalcula quæ partum expellunt innascuntur. Carnes sale inveteratæ blattas gignunt. Taceo ipsa insecta, ex quibus generantur alia. In Apum sanè alveis Clerus, qui aliis Pyranias, invenitur. Obnoxia denique huic malo & artificialia. Teredines imprimis vestibis nasci Plinius affirmat. Tineæ in lanificio producuntur: in libris blattæ: ubi & bestiolam scorpionis similem, chelas brachiave forcipibus bisulcis dentata habentem, invenies. Inter Qualitates maximè Color occurrit. Alia enim simplici duntaxat tinguntur: alia vario, ut in papilionum & Erucarum imprimis generibus. Quantitatem & figuram si attendas, sunt parva, magna, rotunda, ovata, angulosa, hirta, glabra, &c. A Partibus plurimæ sumuntur, alis imprimis, pedibus, lingua, dentibus, & aculeis. Alata sunt quædam, ἀπτερες nonnulla: aliqua mutata forma alata fiunt, ut Erucarum genus, quod postea in alatos Papiliones transit. Ex illis sunt alia Coleoptera, quæ alas velut in vagina recondunt, vaginipennia Plinius dixit, ut Scarabæi, Cantharides, &c. alia semper conspicuas & apertas gerunt, ut Muscæ, Apes. ἑλυττον Philosopho crusta illa dicitur, quæ pennis supervenit. Sunt & alia bipennia, alia quadripennia. De quibus ita eleganter Plinius: Insectorum quadam binas gerunt pennas, ut Muscæ: quadam quaternas, ut Apes. Membranis & Cicada volant, quaternas habent, quæ aculeis in alvo armantur. Nullum cui telum in ore pluribus quam binis advolat pennis. Illis enim ultionis causa datum est, his aviditatis. Nullis eorum penna reviviscunt avulsæ. Nullum cui aculeus in alvo bipenne est. Quibusdam pennarum tutela crusta supervenit, ut Scarabæis, quorum tenuior fragiliorque penna. His negatus aculeus etiam. Invenias inter ea & ἰσόπτερες totipennia seu totalia; quæ alas habent non scissas ut Apes & Vespæ. Papiliones farinaceas habent. Pedum ratione Apodes sunt Lumbrici; Multipedes Centipedæ & Millepedæ. Haud pauciores sex plurima habent. Lingua aliis mollis infirmaque: aliis dura & valida, ut Tabanis, Asylis, &c. Omnibusque data quibus aculeus in alvo non est. Dentes haud pauca habent: Non habent illa quæ humido cibo vescuntur. Aculeus quibusdam in ore est, linguæ ac labiorum potestatem obtinens: quibusdam in alvo est. Nos omnia in Terrestria & Aquatica distinximus, utraque in Pedata & Apoda, prout in Historia videre est. Et hæc sunt quæ de Insectis in genere dicere volui. Usus sub singulis speciebus prosequemur. Historiam Animalium, plantarum excipiet historia, cum figuris æneis, cujus gustum ante quinquennium dederam. Tu Benevole Lector, fave, & felicem successum, cum prospera valetudine nobis apprecare, ut & hoc opusculum, bono literariæ juventutis cœptum, absolvere possimus. Dabam Lefznæ ex Musæo 10. Junii, Anno M. DC. LII.

ENUMERATIO MORBORUM

quibus petuntur Remedia

ex INSECTIS.

| | | | | | | | |
|----|------|--|---|---|----|---|--|
| A. | Pag. | 125. b. 126. b. 99. a. 65. a. 26. a. 82. b. 99. a. | Febris. Febris quartana. Flatus dissipantia. Fluor muliebris. | 87. 89. b. 65. a. 70. a. 99. a. 87. b. 106. a. | P. | Paronychia. Parotides. Parturientes. | 126. b. 15. a. 138. b. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C. | | 65. a. 87. a. 89. b. 126. b. 127. b. 47. a 138. b. 127. b. 89. b. 99. a. | Hæmorrhagia. Hæmorrhoidas tollens. Hernia. | 99. a. 106. a. 126. b. 138. b. | R. | Regius morbus. | 126. b. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| D. | | 135. b. 125. b. 29. a. 89. b. 99. a. 26. a. 65. a. | Materiam vitiosam elicientia. Morsus canis rabidi. Morsus venenosi. serpentum. aspidum. | 16. a. 147. b. 106. a. 89. b. ibid. | T. | Tuffis. | 16. a. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| E. | | 89. b. 106. a. | Oculi. Oculorum morbi. | 47. a. 126. b. | V. | Venerem concitantia. Verrucæ. Vomitum excitantia. Vulnera. Ulceres pedum. Ulcera putrida. | 147. b. 138. b. 87. a. 26. a. 138. b. 65. a. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| F. | | 65. a. | Sanguini evacuando utilia. Sanguinis per vesicam & anum excretionem prohibentia. Stranguria. Strauguria mulierum. Strauguria equorum. Surditas. | 65. a. 87. b. 87. b. | S. | Sanguini evacuando utilia. Sanguinis per vesicam & anum excretionem prohibentia. Stranguria. Strauguria mulierum. Strauguria equorum. Surditas. | 144. a. 138. b. 138. b. 62. b. 89. b. 47. a. 82. b. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTITIA INSECTORUM

ex quibus Remedia præstantissima capiuntur.

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| A. | 16. a. 99. a. | Grillus. | 65. a. | Orifodacna | 26. a. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| B. | 82. b. 125. b. | Hippocampus. Hirudo. | 147. b. 144. a. | Papiliones. | 29. a. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C. | 89. b. | Limax. Locustæ. | 138. b. 62. b. | Scarabæus. | 70. a. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| E. | 106. a. | Musca. | 47. a. | Vermis herbarius. | 135. b. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ADM ONITIO ad Bibliopegum, quo quævis
Tabula loco suo fit inferenda.

| | | | | | |
|-----------|--------|----|------------|--------|-----|
| TABULA I. | Pagina | 1 | TABULA XV. | Pagina | 74 |
| II. | | 14 | XVI. | | 83 |
| III. | | 26 | XVII. | | 89 |
| IV. | | 30 | XVIII. | | 98 |
| V. | | 37 | XIX. | | 106 |
| VI. | | 38 | XX. | | 109 |
| VII. | | 38 | XXI. | | 110 |
| VIII. | | 49 | XXII. | | 114 |
| IX. | | 52 | XXIII. | | 127 |
| X. | | 58 | XXIV. | | 130 |
| XI. | | 63 | XXV. | | 139 |
| XII. | | 65 | XXVI. | | 144 |
| XIII. | | 67 | XXVII. | | 144 |
| XIV. | | 71 | XXVIII. | | 146 |

In prima tabula omnium maxima est, quæ prima depingitur alis clausis & rursus apertis, à capite ad extremum alvi usque commensurata longitudine sex digitos explet, extentis verò pedibus digitos decem. Reperitur in nostris collibus nonnunquam inter herbas in locis ferè incultis. Capta acriter mordet, dolorem inferens haud exiguum. Ova mihi peperit innumera, quæ omnia animari non puto; nam si ita esset, inextinguibilis semper earum esset numerus, omnemque quotannis segetem absumerent. Volat magis, quàm salit, quàm obrem pedes natura dedit anteriores nescio ad quem usum, nisi adhærendum, cui involat, firmitus tenaciusque, crassiores, cum in cæteris posteriores crassitie præcellere soleant, ut iis insistentes facilius salituræ à terra eleventur. Toto corpore pedibusque colore vestitur gramineo viridi, alvus tamen nonnihil per intervalla rubet, potissimum in superiori parte. Differt ab aliis non sola magnitudine & ventris crassitie (crassus est autem pollicem) sed & partium quarundam situ & figura. Capite Perlam vulgò nominatam potius quàm locustas, quæ equinum quodammodo caput habent, exprimit. Dorsum gibbosum est, è priorum pedum regione longius, quàm aliis: pedes anteriores, quos diximus posterioribus esse crassiores, è principio ferè pectoris ortum suum habent, in extremo chelis astacorum more insignes subflavis, neutiquam ferratis, sed ipsi inter primum & secundum articulum insigniter ferrati sunt, ut minus horum exemplo Plinium miremur, qui ex Indicis Serras fieri tradidit. Medii sub alis oriuntur, anterioribus breviores, quibus ferè contigui postremi, omnium longissimi. Alæ intus argento resplendent, albo cinereoque variantes, in extremo virides, viridi includuntur tegmine sive vagina. Antennas è fronte exerit exiles, breviusculas, subflavas.

Ex minimis est tertio loco picta locusta, dorso ac vagina rubicundis, alvo nigra, luteis Zonis distincta, capite planè equum refert. Antennas habet brevissimas, brevissimosque pedes anteriores & medios postremos contrà longissimos lutescentes.

Mediocribus adscribenda est quarta, toto corpore flavescens, rariis quibusdam fuscis transversalibus, pedes ac potissimum postremi albo nigroque distinguuntur. Alvus coloris castanei diluti, respersa multis maculis, exiguis, fuscis. Alæ vaginæ inclusæ ex cæruleo diluto perpulchre admodum virescunt.

Quinto & sexto loco posita ex maximis est, medium digitum corporis crassitie æquans, palmum ferè longa, capite vi-

ridi, nec non toto capite continuato articulo, qui in dorsum deorsum excurrens triangulari cuspidè; squamaceis marginibus cuculli cujuspian speciem præbet, medio acclivi, & in acumen surgente supercilio à fronte ad alarum principium, quod ipsum integit, disseptus, in cuius lateribus utrinque lacunæ quædam, seu scrobiculi in longum excavati hinc ab ipso medio gibberæ, illinc exiguo tuberculo constitutæ uti inter montes valles mediæ jacere solent, colore nigro distinctæ spectantur. Ocelli, ut cancri, immobiles, nigri, minimè sphærici, sed longiores, quàm latiores. Inter hos medios duæ non ita longæ, nempe digitum tantummodò, antennæ extant; reliquum corpus, nempe pectus latum ac compressum, ac æquabile, alvus novenis coagmentata incisuris, quæ veluti loricarum lamellæ exterius imbricatim sese excipiunt. Petilli item quaterni, nempe antiqui, & medii coloris cinerei; postici verò longissimi, quibus tanquam remigibus nixa sese vibrans procul salit, verticillares sunt; Femur enim nigris maculis notatur, femur verò viridi & subalbido variat. Tibia ac pediculi instar ferræ dentati, dilute punicea sunt. Alæ media sui parte ultra extremam alvum in longum protendentur quaternæ. Harum binæ superiores fusco & balio maculosæ. Inferiores ex fusco argenti splendore micant, ac à volatus officio cessante infecto, minimè ut illæ simplæ sunt, sed decuplo rugarum ordine in se complicatæ, quomodo mantilia extergendis manibus dicata & puerorum illæ ex charta laternæ viæduces multiplici plicarum serie sibi mutuò incumbentium componi solent, quas, cum ad volatum explicat, in trium digitorum latitudinem distensus est intueri.

Secunda tabula duodecim habet Locustarum diversas species. Prima è majorum genere dorsum habet colore ochræ nigris minutis punctis sive guttulis consperso. Alarum tegmen viridescit, & ejusdem coloris & magnitudinis notatur. Caput, pectus & alvus, item pedes viridi ochroque variant. Alvus in aduncum aculeum ochræ colore definit, capite Perlis similis est. Antennas habet miræ longitudinis & tenuitatis, rubicundas subrutilas.

Num. 2. locusta capite & antennis Cochleam sive Domiportam æmulator; capite, nisi oculi id proderent, carere videretur. Antennæ crassæ sunt, & crassa quoque admodum femora posteriorem pedum. Alas habet corpore protensiores, undique concolor sibi, color est cinereo flavescens.

Num. 3. locusta est è genere vulgarium, unico-

unicolor, viridis, præter antennas, quæ lutescunt.

Quarta tricolor Locusta vocari, potest, vulgò Frate, hoc est, Monachus nominatur, non ob colorum diversitatem, sed quod cucullata est. Caput, & collum cucullatum est, pectus & femora posteriorum pedum sunt viridia. Tibiæ verò eorundem pedum sanguinei planè coloris, cætera omnia cinerea, antennæ exiles, sursum erectæ.

Quinta ex aculeatarum sive caudatarum genere, ubique unicolor, viridis; Num. 6. ex atro cinerea, undique sibi concolor est.

Septima *ἀπὸ τοῦ*. Bruchus dici potest factum illius maximæ, quæ primo loco in prima tabula spectatur, esse puto; Nam etiam gibbosa est, & priores pedes è pectoris initio è gibbi seu tuberculi regione producit, & viridis est tota.

Num. 8. ea videtur, cujus descriptionem suprà dedimus ex Autore de natura rerum: nam aculeum habet pro cauda, ut ille loquitur, & tota viridis est, caput equino capiti simile. Tales Hollandi, ut audio, Corenmesem vocant. Tales ego propriè legitimas Locustas esse putem, hanc cum Cyprio ostenderem, Bruchum vocabat, quod non probo.

Num. 9. ex Atteluborum genere dici potest propter alarum brevitatem. Hæ enim albo, quæ admodum crassa est, comparatæ inutiles esse videntur, impotentes scilicet eam de terra attollere. Cucullum quoque habet, eumque viridem, reliquo toto corpore ex viridi, albo, flavo & nigro varia.

Decima insigni ac notabili aculeo sursum reflexo viridi insignis ex vulgariū genere est, sed differens plurimum colore. Tota albo & dorso coloris est amethystini sive violacei, rostro viridi, fronte, cucullo & antennis, quæ proceræ sunt ac exiles, coloris ochræ, pedibus posterioribus viridibus, alis caret, Bruchus adhuc ac imperfecta Locusta.

Undecimo & postremo numero Locusta seu Attacus cinereus linea in vertice & dorso ferruginea alis exterioribus nigro & cinereo variis, cruribus postremis in femore interno & infimis tibiis phæniceo suave rubentibus, & maculis atris in rubeo colore & poplitibus distinctis.

Tertia tabula tredecim habet Locustas. Prima etiamnum Bruchus est, ejus generis locustarum, quod ceu maximum primò posuimus; nam & chelas habet in anterioribus pedibus; figura corporis, qualem figura ostendit, ubique sibi concolor, tota ex cinereo lutescens.

Num. 2. Locusta ex minimorum genere sive Attacus, sive Attelabus, ca-

pite, dorso, pectore aliisque & pedibus è viridi lutescentibus, albo miniacea, Zonis distincta atris.

Num. 3. Bruchus viridi & atro varius, alvi extremum habet bifurcatum.

Quarto numero datur Bruchus sive, *ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τοῦ* omnium minimum, totum, viride exceptis pediculis, qui flavescunt.

Num. 5. Papilionis icon est, quam suprà dedimus inter Papiliones.

Num. 6. Bruchus est corpore tenui, totus viridis.

Septimo numero ex vulgatis Locustis maximis est aculeo admodum longo, tota viridis, per dorsum verò & alvi Zonas purpurascit.

Num. 8. ex eodem genere, sed minor & alis caret, Bruchus adhuc, supino ventre flavescit, pectore candicat, cætera viridis.

Num. 9. Bruchus est inusitata planè formæ albo fermè rotunda, sive sphaerica, assulatim compacta tota ex cinereo fuscescens.

Num. 10. Attacus vel Attelabus haud dubio omnium maximæ Locustæ capite, pedibus & dorso subflavis, alarum tegmine ad ferrugineum vergente.

Undecima tota ferruginei coloris ex majoribus est.

Num. 12. Bruchus alius totus viridis.

Num. 13. Bruchus viridi, albo & atro varius.

Num. 14. Bruchus viridi, luteo & nigro distinctus.

Num. 1. in quarta tabula est omnium minimus, totus ex flavo ad ferrugineum vergit.

Num. 2. & 3. insolentis admodum formæ Bruchum F. Gregorius Capuccinus Regienus, rarioribus stirpibus investigandis intentus, in pratis collium nostrorum inventum ad me detulit, ut eum studiosis curiosisque Lectoribus communem facerem. Cum quiescit, ita sedet, quemadmodum prior icon exprimit, incedit verò, progrediturvè, ut in altera ostenditur. Capite cervum vel equum cristatum refert, item cauda, quæ multifida est, sed surrecta. Sub articulis posteriorum pedum tubercula habet sphaerica, corpore toto fusco, luteo & albo variat. Rarissimum est Insectum, & mihi alias nunquam visum vel observatum.

Num. 4. depictum Insectum locustaceum Bruchus quispiam imperfectus totus fuscus est, & exiguo admodum corpore.

Tres istæ separatim pictæ, cum præcedentes tabulæ eas non caperent, ex minimis sunt. Prior alis, corpore toto & anterioribus pedibus coloris cinerei, dorso viridis, pedibus postrema rubicundis; Altera per superna viridis, cætera cinerea.

Postrema tota purpurea.

HISTO-

HISTORIÆ NATURALIS

DE

INSECTIS:

LIBER I.

De Insectis terrestribus, pedatis & alatis.

TITULUS I.

De Anelytris, seu Detetipennibus.

CAPUT I.

De Anelytris quadripennibus.

ARTICULUS I.

De Anelytris quadripennibus membranaceis.

PUNCTUM I.

De Apibus.



IGESSIMUS in præfatione Insecta: jam secundum præmissam seriem de iisdem agemus, de *Anelytris quadripennibus membranaceis* primò dicturi; quorum alia quidem *favificant*, ut

Apis, *Fucus*, *Fur*, *Vespa* & *Crabro*: alia non *favificant*, ut *Cicada*, *Orsodacna*, *Perla*, & *Cimex sylvestris*.

Ab *APIBUS* incipimus, quibus inter omnia insecta principatus, & jure præcipua admiratio, solis ex eo genere hominum causa genitis. Mella contrahunt, succumque dulcissimum ac saluberrimum. Favos fingunt & ceras. Illæ ad usus vitæ tolerant, opera conficiunt, rempublicam habent, consilia privatim, & duces gregatim: at quod maximè mirum est, mores habent. Præterea cum sint neque mansueti generis, neque feri: tamen tanta est natura rerum, ut propè ex umbra minimi animalis incomparabile effecerit quiddam. Quos efficaciam industriæque tantæ comparemus nervos? quas vires? quos rationi medius fidius viros? hoc certè præstantioribus; quo nihil novere, nisi commune. Virgilius eis partem divinæ mentis & haustus tribuit. Scripsere de illis præter Aristomachum Solensem, qui duodecesaginta annis nihil aliud egit; & Philescum Thasium, qui quod in desertis apes coleret Agrius cognominatus est; Hyginus, & quidem diligentissi-

mè; Virgilius ornatissimè, & Cels. elegantissimè: ut in *Meno* inter Samnites nato taceam. Aristodemum, cujus Augustinus meminit, eundem cum Aristomacho Plinii esse puto.

Latinis *Apis* & *Apes*, hæc insecta dicuntur, seu quòd sine pedibus nasci videantur: seu quòd examina pedibus mutuo sibi hæreant, ac firmiter sese quasi in botro teneant. Græcis est μέλισσα & μέλιττα vel à μέλι, id est, melle, cujus opifex est; vel à Μελίσσα puella, quæ cùm favos melle plenos in Peloponeso reperisset, alias Nymphas ad degustandum invitavit: vel à μέλιτη, id est, meditatione & exercitio, quòd semper sit in opere. Hesiodo μέλιτα, παραμέττα, & ἀνθρώπων legitur; sed hanc Suidas, Aristoteles & alii, crabronem potius faciunt. Apud Rulandum, ἀπες, ῥαδαν. dicitur: apud Hesychium σάρις. Stephanus σιμελίδας quoque vocari scripsit. Unde σιμελίδω, apes alvearibus condo. Epitheta occurrunt plurima. Dicuntur enim à fingendo πλασείς; à florum depopulatione ἀνθρώδαντες; à colore ξανθοί; à natali solo βουβρῆες; ab obtusioribus aculeis σιμαί; ab alarum in aëre vibrationum sono βομβύλαι, & βομβύλοι; à loco communi ἀερίδαντες; ab aliis ὑγέμενες, ἐργόφοροι, & πλαστικές: quodcum sole & surgant & quiescant, *Solifegæ*. Theocritus λαγίαι dixit, à corporis hirsutic; Aufon, & alii *Cecropias*, quòd in Attica regione primùm conspectæ credantur: Virgilius, & Martialis ab Hybla monte Siciliæ *Hyblæas*. Callimachus, quòd omnia florum fastigia pervolitent, πανακρίδες; Varro, quòd mel conficiant, *mellis matres*.

Unicolores magis esse quàm crabrones aut vespas Aristoteles prodidit: generaliter nigras, Cardanus opinatur. Tenuem earum substantiam, quia leves, facile excoqui; excoctum & humidum velut nigrum evadere. Pennas habent quatuor, siccas, ut cuncta volatilia insecta, pellucidas, scapulis annexas, quarum postremæ minores ne remigio obessent; linguam prælongam quam foris gerunt: aculeum ventri confertum: dentes, & oculos subcorneos intus conditos; stomachum ex omnium membranarum tenuissima contextum, quo collectam mellaginem, non solum continent, sed etiam concoquunt & depu-

Nomen.

Ruland.
in Syno-
nim.Descri-
ptio.Cardan.
de Rer.
variet. l.
7. c. 28.
Mansuet.
l. 1. de In-
sect. c. 1.Arist. H.
A. l. 4.
c. 7.Ordo.
Plin. H.
N. l. II.
c. 5.Virg.
Georg. l.
4.Plin. H.
l. II. c.
9.

depurant. Plinius *Utriculum* dixit. Imis *petunculis* duo quasi digiti emergunt, quibus procellosis temporibus lapillum ad vibrandum corpusculum ferunt, ne per ventorum impetus abripiantur. Excrementum rubrum est: *ἰθύν* Græci vocant. De Ducis seu Regis aculeo non convenit. *Quærat nunc aliquis*, inquit quasi indignabundus Plinius, *unus ne Hercules fuerit, & quod Liberi patris sepulchrum, & reliqua vetustatis situ obruta? Ecce in re parva, villisque nostris annexa, cujus assidua copia est, non constat inter authores: rex nullum ne solus habeat aculeum, majestate tantum armatus: an dederit quidem eum natura, sed usum ejus illi tantum negaverit?* Aristoteles habere, sed non uti scripsit: *Ælian.* dubitavit. At Columella, qui pleraque ab experientia scripsit, sine spiculo esse prodidit, *nisi quis fortè*, inquit, *plenior quasi capillum, quem in ventre gerunt, aculeum putet.* Ut ut sit, ad unu ictum, hoc infixum, quidam eas quæ utuntur, statim emori putant. Aliqui non nisi in tantum adacto, ut intestini quippiam sequatur: sed fucos postea esse, nec mella facere velut castratis viribus, pariterque & nocere & prodesse desinere. Nullas in novæ Hispaniæ insulis reperiri scribunt quidam: nullas in Scotia Solinus, in Hibernia alii, sed falsò. De hac Polydori Virgilio testimonium habemus. In illa vidimus ipsi, & in horto hospitis nostri Andreapoli, summa cum jucunditate tractavimus interdum. In Africa paucas invenias, propter nimium sine dubio solis æstum, qui & flores depascit, & fontes absumit. In Mycono non gigni, importatas mori, *Ælianus* auctor est. Frequentiores sunt in Italia circa Paduam, in agro Nolano, in *Arcadia*, *Thracia*, *Corfica*, *Sicilia*, *Attica*, *Iucatana*, & *Goa*. Hostilia vicus alluitur Pado. Hujus inquilini pabulo circa deficiente, imponunt navibus alveos, noctibusque quina millia passuum contrario amne naves subvehunt. Egressæ luce Apes, pastæque, ad naves quotidie remeant, mutant locum, donec pondere ipso pressis navibus, pleni alvei intelligantur, reiectisq; eximantur mella. In Nolano frequentes esse, loci ipsius temperies & benignitas ostendit. Maxima ibi vis Bacchi. Oleæ nusquam generosior liquor: pomorum ut omnia genera, ita nullis secundæ æstate aura perpetua, hyeme apricitas maxima. In *Arcadia* Aristæus Arcas primus mellis usum ostendit; in *Peloponneso* Melissa virgo. *Corficæ* incolas longævus ideo Athenæus tradit, quod melle assidue vescantur. Ovidius ob taxi copiam venenatum facit. In *Sicilia*, Hyblen montem inprimis incolunt, thymi & salicum opulentissimum. Abundantia, comparationem Ovid. expressit. In *Attica* in Hymetto monte qui & Cécropius, ob pascua quæ solis Halizoniis cedunt, favificant. Hinc Hymettia & Hyblæa mella. At maximus in Septentrione earum proventus. In Podolia & Lithuania, siccarum terrarum

foveas melle repleti, scribit Olaus, in quas immanes urfi prolapsi, suffocati sint. In *Mo-scovia* pinus vacuas eodem abundare, apud scriptores habemus. Historiam in Historia Urfi habebis. Pascuorum fortè ubertas copiam facit, odoris suavitas, florum abundantia, saporque jucundus. Hoc quoque experimento compertum est, in locis montanis mari vicinis, propter solitos maris halitus, & flosculorum copiam, adeò propagari, ut vaga illarum examina, corticibus insidentia, objectis alvearibus, facile capiantur, modò ipsa alvearia sale muriave illita fuerint. Tantus illis propagandi appetitus inest, quem visalis multo uberius expleri præsentunt. De sedibus eligendis. *Columellam* consule.

Creatas in principio cum Danæo & Du-bravio dicerem: ex alterius corporis corruptione oriri, nullum dubium. Ex tauro, bove, vacca, vituloque putrefactis produci certum: modum Geoponicor. auctor ostendit. Hinc in descriptione Philonii, mel *μακάρα θυγατέραν ταύρων liquor filiarum taurorum*, dicitur. Ex cerebro Reges & Duces, ex carnis vulgus gigni scribunt. Nascuntur & ex spinali medulla illi, sed quos cerebrum dedit, pulchritudine, magnitudine, robore, & prudentia antecellunt. Primæ transformationis indicium, si parva & alba specie immobilia, & imperfecta cadaveri circumfunduntur. Augescunt mox paulatim, alisque sensim excrecentibus, proprium colorem consecutæ, Regem circumvallant; brevibusque & tremulis, propter membranarum debilitatem & volandi insuetudinem, utuntur. Fœtus quonam modo progenerent, magna inter eruditos & subtilis quæstio fuit. Apum coitus visus est nunquam. Alii eas coire & parere negant. Alii semen in floribus foliisque relictum, asportare ad alveos, ibique blanda incubatione perfici. Plinius ex flore Cerinthi colligi opinatur, Aristoteles ex calandro, Athenæus ex arundinis quidam ex oleæ, immittique osculis in favos. Prodire ideo, feracibus horum florum annis plura examina: rarioribus rariores & ipsas videri. Nonnullis ex melle, seu potiore ipsius parte proveniunt. Taxites coire existimat, & apes mares, Reges fœminas facit: hoc tempore constituto, vermiculos per examina, ut muscæ, excludere, fucos verò more serpentum incubare, & incubando, ad tempus vermiculos fovere. Hinc vermes *μακάρες* dictos melle purissimo vesci, donec in nymphas abeant: aureliarum tunc instar involutos, in cellis manere, nec vesci, nec excrementa reddere. Tandem certo die, ruptis corticibus fieri apes & ad suum quamque munus vix dum alis perfectis sese accingere. Aristoteles, nec ex allato semine, nec per coitum gigni opinatur: nec apes esse fœminas, nec fucos mares. Duces & seipsos generare, & aliud genus quod Apum est: ab apibus

Olaus
Mag. l.
22. c. 19

Colum. R.
lib. 9.
cap. 5.
Genera-
tio.

Plin. H.
A. l. 11.
cap. 16.

Arist. H.
A. l. 5. c.
21.

Cardan.
de subtil.
9. Musc.
Theatri
Insect. l.
1. cap. 3.

Aristet.
de gen.
anim. l. 3.
cap. 10.

bus prodire fucos, hos nihil producere. Hinc & proportio quædam servatur, & discrimen. Duces magnitudine fucos, aculeo apes æmulantur, & vice versa. Nec mirum à paucis Ducibus, tam numerosas prodire. Nam & Leones cum primum quinque genuerint, mox pauciores generare, postremo unum, tandem nullum. Multitudinem primò apum à Ducibus gigni, mox sese paucos: illarum fœtum minorem, auctiorem suum, &c. Plinius ita de ea. *Plurimi existimare oportere confici floribus compositis atque utiliter* (lege ex Aristotele, confici ex appor- tatis floribus Cerinthi, salicis alii, alii oleæ.)

Plin. H.
N. l. II.
c. 16.

Aliqui coitu unius Rex in quoque appellatur examine. Hunc esse solum marem præcipua magnitudine, ne fatiscat. Idcò fœtum sine eo non edit: apesque reliquas tanquam marem fœnas comitari, non tanquam Ducem: quam probabilem aliàs sententiam fucorum proventus coarguit. Quæ enim ratio, ut idem coitus, alios perfectos, imperfectos generet alios? Dum fœtificant, Culicæ & dicuntur: fœtus

Arist. H.
A. l. 5. c.
21.

*& Nympha vocatur. De incubatione, ita ex Aristotele Plinius. Quod certum est, gallinarum modo incubant. Id quod exclusum est, primò vermiculus videtur candidus, jacentis transversus: adherensque ita ut pascere videatur. (lege, deinde ita pascitur, ut adherescere videatur) Rex statim mellei coloris, ut electo flore ex omni copia factus, neque vermiculus, sed statim penniger. Cetera turba, cum formam capere capit, nymphae vocantur, ut fuci, sirenes, aut cephenes. Si quis alterutris capite demat, priusquam pennas habeant, pro gratissimo sunt pabulo matribus. Tempore procedente instillant cibos, atque incubant, maxime murmurantes, caloris, ut putant, faciendi gr. necessarij excludendis pullis, donec ruptis membranis quæ singulos cingunt, ovorum modo, universum agmen emergat. Spectatum hoc Romæ consularis cujusdam suburbano, alveis cornu laterne translucido factis. Fœtus intra XLV. diem peragitur. Fit in favis quibusdam, qui vocatur clerus, vel potius *συνδρος* (vermiculus est in alvearis pavimento nascens). amara duritia ceræ, cum fœtum inde non eduxere, morbo; aut ignavia, aut infœcunditate naturali. Hic est abortus apum. Alveus totus arena obducitur, & favus putrescit.*

Arist. H.
A. l. 6. c.
40.

*Addit Aristoteles, Duces subter ad favum pendentes oriri; separatim sex aut septem: fucos quoque seorsim si Dux superest, si ob- iit, in Apum loculamentis provenire: cæteras in concavis imisque favorum. Apum vermes dum recentes sunt, & aluntur, & ster- cus emittunt; donec lineamenta, sub quibus Nymphae dicuntur receperit. Quies- cunt tum contracti, nec ullo pacto se pa- tiuntur moveri, usque dum destinatam speciem referant. Minus fœtificant, vere ferotino, aut si squalor vel rubigo incide- rit. *γὰρ ἀνὰ* optimæ fiunt, cum mellifica-*

Arist. H.
A. l. 5. c.
19.

tur. Scaliger genitale quiddam in cellis po- nere existimat, è quo Apiculæ progi- gnantur. Creari è roribus in foliis vermicu- los; pluerè ranis: quantò commodius le- ctum rorem illum, atque calore parentis ge- nitali fœtum, tanquam ab architecto, in schadonem animari posse. Deprehensam à se cicindulam cum mare in coitu, meri- die solutum obivisse. Edita sub vesperam à fœmella ova, quæ intra viginti horas vi- vificata abiire. Visam & è grandioribus Muscis unam, quæ in vola manu aliquan- diu retenta, plusculos vermiculos candi- dos, mobilitate propria insignes edidit. Cur non Apes pauculis horis coire possent: deinde illico parere? Vossius denique ex Belgicorum apiariorum sententia ita de propagatione Apud scribit. *Rex apum singulis in cellis semen emittit. Id est, folliculus albicans, unde prodit vermiculus ejusdem colo- ris, sem. papav. assimilis. Isti folliculo circum- datur ab apibus viscidus ex rore humor itidem albicans. Nempe album hoc, albumini ovi, re- gium semen vitello respondet. Felliculo sic vis- cido rore circumdato, apicula incubat gallinæ in- star, ac suo id fovet calore. Ita folliculus tur- gescit magis & magis, donec talis fiat vermicu- lus, qualem pinguioribus in caseis nasci videmus. Porro sæpe quidem tardius, interdum tamen die nempe sereno, intra diem 10. vel 12. vermi- culi ejus pellicula perrupta, exit apis, eaque perfecta; senis quippe pedibus, alis quaternis; pallidior tamen, & paulò post adultioribus simi- lis. Hactenus Vossius.*

Vossius de
Idol. l. 4.
c. 66. p.
1511.

De Victu, de quo ex lege methodi no- stræ ante generationem agere debebamus, si quæras, nihil venantur, sed ventura hyemis memores æstate laborem Experimur, & in medium quæsitæ reponunt. Melle ergo, & si hoc nimium subtrahatur, cera- gine, cerintho, erythace, sandaraca dicta ves- cuntur. Deterior hæc & ficum dulcedine æ- mulatur. His deficientibus Apiarii ficus, saccharata, uvas passas siccatas, fucos tusos, schadonum capita, lanas passo defrutove madidas, & aquam mulsam pro foribus po- nunt. Crudas & recentes carnes apponi ju- bet Plinius. Floribus odoratis & caliculatis delectantur, ex arboribus pomorum cytisi, amygd. tamarisci, casia, ziyiphi, pyri, per- ficæ, therebinthi, lentisci, cedri, tiliæ, ilicis minoris. Rhamni: ex herbis, thymialbi & rubri, fertulæ campanæ, myrti, viticis, ge- nistæ, phlei, fabæ, serpilli, violæ, myrrhi- dis, rorismarini, conizæ cerinthæ, me- liloti, narcisci, asphodeli, citraginis, he- deræ, consiliginis, origani, satireiæ, violæ agrestis, amaraci, hyacinthi, iridis, croci, rosæ, lilii attractilis, sinap. spondilii, ba- trachii, &c. De quibus omnib. distinctè Co- lumella agit, quem vide. Bibere easdem cer- tum, & limpida, seu fluviali seu fontana de- lectari, in qua ligna & lapides injiciendi, ut

Victus.

Arist. H.
A. l. 9. c.
40. l. 4. c.
9.

Colum. R.
R. l. 9. c.
4.
Arist. H.
A. l. 9. c.
40.
Varro
R. R.

commodè & insidere, & sese abluere possint. Hac destitutæ, aliunde humore hausto sitem leniunt, de eoque intus ad Reges & operatrices aliquid deferunt.

Vita ad 6, 7. & ad summum 10. annos producitur: seu ut Plinius. *Vita eis longissima, ut profere inimica ac fortuita cadant, septenis annis universa. Alveos, nunquam intra decem annos durasse proditur. Sunt qui mortuas si intra tectum hyeme seirventur, deinde sole verno torreantur, ac ficulneo cinere toto die foveantur, putent reviviscere. In totum vero amissas, reparari ventribus bubulis recentibus cum fimo obrutis. Virgil. juvencorum corpore exanimato, sicut equor, vespas ac crabrones, sicut asinorum scarabæos, mutante natura ex aliis quedam in alia.*

Cardanus robustior: ad 12. an. pervenire posse, scripsit.

Attollunt sese atque contrahunt cum volant. Rectè non volant, quia cauda destitutæ sunt: ideo etiam parum in volatu perseverant, aut in aëre demorantur. Præstant tamen vaginipennes. Quia exiguas pennas habent, nec rectè procedere, nec diu volare possunt.

Vocem non edunt, sed sonum, *βοησιν* id Græcis Latinis bombilare, & bombissare. Sonus ipse *οὐρρος* & *βίμβος*, illis murmur & furrus his dicitur. Quidam modulari, sed ineptè, dixit. Alii, nocte ea, qua natus est Jesus, magis bombos edere, garriunt. Odoratu plurimum valere in de colligas, quod mel à longinquo sentiant. Visæ ex agris pharmacopolia & quimel venderent invisisse, revolassaque onustas. Retulit & Clutius, per longum camini tubum, cum mel domi coqueret, supernè ingressas; nec aliter quam circa candelam cicindelas & lampyrides solent, circa ahenum volitasse; plerasque in illud decedentes submersas. De instrumento non est quod solliciti simus. *ὀνόμαζα* illud est, & spiritus innatus, quo & moventur.

Auditu destitui Aquinati visum. Sono vehementi, ob ingentem aëris motem, qui & animal interimere, & lignum scindere valet, terreri & fugere. At plausu æris gaudent, & murmure excitantur ad opus, sonituque quieti sedant, ut postea dicitur. Memoria valere, apud Rhodiginum extat. Visus quod oculi duri, hebetior. Ideò facilè à merope & hirundine capiuntur.

Odere fædos odores, proculque fugiunt, sed & infectos. Itaque unguenta redolentes infestant, ipsæ plurimor. animalium injuriis obnoxie. Impugnant eas naturæ ejusdem degeneres vespæ atque crabrones, & è culicum genere qui vocantur *muliones* (*μυλιδες* Aristoteles qui onustos in via mulos æstate vexant) populantur hirundines & quedam aliæ aves. Insidiantur aquantibus ranæ, quæ maxima est earum operatio, tum, cum sobolem faciunt. Nec hæ tantum quæ stagna rivosque obsident, verum & rubeta ve-

niunt ultrò, adrepentesque foribus per eas sufflant: ad hoc provolant, confestimque abripiuntur. (alii legunt, *inflantur*, & *provolantes eas confestim abripiunt*). Nec sentire ictus apum ranæ traduntur. Inimicæ & oves, difficile se à lanis earum explicantibus. Cancrorum etiam odore, si quis juxta coquat, exanimantur. Timent quoque ab araneis, lacertis, crocodilis, upupa, merope, noctua, & aliis alvearium depopulatoribus: sed & ab Echo, fulgure, tonitru, & fragore omni.

Huc & morbi pertinent, repletio nempe, inanitio, siccitas, humiditas, frigus, calorque non naturalis. Repletionem nimia satietas infert, quando alvearia non castrantur, scabie tum sordibusque diffluunt, strumosaque redduntur. Inanitio è cibi inopia oritur: Ejusdem inopia, malaciam, diarrhæam, & tabem affert. In malacia adeò morosæ sunt, ut facilè aufugiant, nisi tintu, vel rerum gratissimaram suffitu retineantur. *Diarrhæam* ex tithymalli, hellebori, ebuli & sambuci floribus contrahunt. *Tabem* correptæ pellucescunt. De remediis & quæ huc spectant, vide Authores. De his ita Plin. *Sunt & operis morbi: cum favos non explent, cleron vocant. Item blapsigoniæ, si factum non peragant. Inimica est & echo resultanti sono, qui pavidas alterno pulsat ictu: inimica & nebula. Aranei quoque vel maximè hostiles, cum prævalere ut intexant, enecant alveos. Papilio etiam hic ignavus & inhonoratus, luminibus accensis advolitans, pestifer, nec uno modo. Nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa, quibus teredines gignuntur: filiis etiam araneosa, quacunque incesit, alarum maximè lanugine obtexit. Nascuntur & in ipso ligno teredines, quæ ceras præcipue appetunt. Infestat & aviditas pastus nimia florum satietate, verno maximè tempore alvo cita. Oleo quidem non apes tantum, sed omnia insecta exanimantur, præcipue si capite sensere eximi, mella avide vorantes. Cetero præparcæ, & quæ alioquin prodigas atque edaces, non secus ac pigras atque ignavas proturbent. Nocent & sua mella ipsis illitaque ab adversa parte moriuntur. Tot hostibus, tot casibus & quòta portione eorum commemorata? tam munificum animal expositum est.*

Singulare ingenium regiminis & operis ratio ostendit, in quibus prudentiam, fidem, obedientiam, fortitudinem, & exactæ quasi *πολιτικῆς* exemplum, observare est. Elegantur de iis Plinius. Ratio, inquit oportis hæc, interdum statio ad portas more castrorum, nocte quies in matutinum, donec und excitet gemino aut triplici bombo, ut buccino aliquo. Tunc universæ provolant, si dies mitis futurus est. Prædivinant enim ventos imbresque, & tunc se continent tectis. Itaque temperie cæli (& hoc inter præscita habent) cum agmen

Ætas
Arist. H.
A. l. 5. c.
6. Plin.
H. N. l.
11. c. 20.

Cardan. de
variet.
Rer. l. 7.
c. 22.
Volatus.

Sonus.

Odora-
tus.

Arist. H.
A. l. 4. c.
8.

Vossius de
Idololatr.
l. 4. c. 71.

Arist. de
part.
antm. l. 2.
c. 16.

Auditus.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 20.

Arist. H.
A. l. 9. c.
40.

Arist. P.
A. l. 4. c.

10.
Antipa-
thia.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 18.

Theoph.
C. P. l. 6.
c. 4.

Arist. H.
A. l. 5. c.
19.

Æli. H. A.
l. 8. c. 6.
& l. 10 c.
51.

Morbi.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 19.

Inge-
nium.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 10.

agmen ad opera processit, alia flores aggerunt pedibus, alia aquam ore, guttasque lanugine totius corporis. Quibus est earum adolescentia ad opera exeunt, & supra dicta convehunt: seniores intus operantur. Quae flores comportant, prioribus pedibus femina onerant, propter id natura scabra, pedes priores rostro: totaque onusta remeant sarcina pandata. Excipiunt eas ternae, aut quaternae atque exonerant. Sunt enim intus quoque officia divisa. Aliae struunt, aliae poliunt, aliae suggerunt, aliae cibum comparant ex eo quod allatum est. Neque enim separatim vescuntur, ne inaequalitas operis & cibi fiat & temporis. Struunt orsa ea concameratione alvei, texumque vel usque ad summa tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, ut aliis intrent, aliis exeant. Favi superiore parte affixi, & paululum etiam lateribus simul haerent & pendent una. Alveum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter poposcit alveus: aliquando & duorum generum: cum duo examina concordibus populis dissimiles habuere ritus. Ruentes ceras fulciunt, pilarum intergerinis à solo fornicatis, ne desit aditus ad sarcendum. Primi ferè tres versus inanes struuntur, ne promptum sit quod invitet furantem. Novissimè maximè implentur melle: ideoque averso alveo favi eximuntur, Gerula secundos flatus captant. Si cooriatur procella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. Quidam in humeros eum imponi tradunt. Iuxta vero terram volant in adverso flatu vepribus hebetato. Mira observatio operis. Cessantium inertiam notant, castigant mox, & puniunt morte. Mira munditia. Amoliuntur omnia è medio, nullaeque inter opera spurcitiae jacent. Quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant unum congesta in locum, turbidis diebus, & operis otio egerunt. Cum advesperascit, in alveo strepunt minus ac minus, donec una circumvolet eodem, quo excitavit, bombo, ceu quietem capere imperans: & hoc castrorum more. Tunc repente omnes conticescunt.

Prima fundamenta Commosin vocant periti, seu gummitionem, (καμνισιν vel καμνισιν alii legunt) cum alveare tectorio illinunt: secunda pissoceron, tertia propolin, inter coria cerasque magni ad medicamina usus. Commasis crusta est prima, saporis amari. Pissoceros super eam venit, pican-
 Plin. H. N. l. 11. c. 7. A. l. 5. cap. 8. El. H. A. l. 5. cap. 11. 13.

tium modo ceu dilutior: ceræ initium, plerumque è mitiore gummi. Propolis crassioris jam materiae, (è gutta quam in foliis populi ferunt hanc faciunt) additis floribus nondum tamen cera sed favor. stabilimentum, qua omnes frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur, odore & ipsa etiamnum gravi, ut qua plerique pro galbano utantur. Deoscorides ad styracem accedere putat. De Regimine sic idem.

Mira plebi circa Regem (de hoc in Differentiis) obedientia. Cum procedit una est totum examen, circaque eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur? Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhortanti, solus immunis. Circa eum satellites quidam, lictoresque, assidui custodes auctoritatis. Procedit foras nonnisi migraturo eximine. Id multò intelligitur ante, aliquot diebus murmure intus strepente, apparatus indice, diem tempestivum eligentium. Si quis alam ei detruncet, non fugiet examen. Cum processere, se quæque proximam illi cupit esse, & officio conspici gaudet. (Id Homerus βοτρυχὸν πικρὰ δὲ dixit;) Fessum humeris sublevant: validius fatigatum ex toto portant. Si qualafata deficit, aut fortè aberravit, odore persequitur. Ubique ille confedit, ibi cunctarum castra sunt. Duce prehenso totum tenetur agmen: amisso, dilabitur migratque ad alios. Esse utique sine Rege non possunt. Invitæ autem interimunt eos, cum plures fuere, potiusque nascentium domos diruunt, si proventus disponatur: tunc & fucos abigunt. Rege peste consumto, moeret plebs ignavo dolore, non cibos convehit, non procedit, tristi tantum murmure glomeratur circa corpus ejus. Subtrahitur itaque deductæ multitudinì: alias spectantes exanimem, luctum non minuunt. Tunc quoque ni subveniatur, fame moriuntur. Huc latitatio, mundicies, & alia spectant.

Quiescunt ab occasu Vergiliarum usque ad ver, & hyeme conduntur. Alii ultra exortum latere dicunt, prout ratio climatis & tempestatis tulit. Ante fabas florentes non exeunt ad opera & labores.

Stupendum quod ex Clutio Vossius narrat, mundicie & amoris simul exemplum. Repererat is in hortis suis apiculam, in olla mellis submersam: alteram item ab imbre sic afflictam, ut & ipsa quasi exanimis jaceret in herba. Utramque igitur manui imposuit: cujus calore sic fota planè sunt refocillata. Ut verò se mutuo agnovere, utraque alteram osculari & amplecti amicum in modum. Ac illa quidem mundior, quam imber sic straverat, membratim purgare cepit alteram melle sordidatam: inque opera hac propemodum horam insumsit. Tum quæ beneficium id acceperat, os admovit alteri; eique grati animi ergo, de pectore suo eduxit mellis aliquid: quod ea hausit, satiataque, in alveare revolavit. Addo de ἀνδογία & prælagiis quædam. Fructibus nullis nocetur, inquit Plinius. Mortuis ne floribus quidem, non modò corporibus insidunt. Operantur intra sexaginta passus. Et subindè consumtis in proximo floribus, speculatores ad pabula ulteriora mittunt. Notu deprehensæ in expeditione, excubant supinè, ut alas à rore protegant. Prælagia

Plin. H. N. l. 11. c. 16.

Aristot. H. A. l. 8. c. 14. Plinius l. 11. c. 6.

Clut. de Apib. 1. cap. 3. Voss. de Id. 4. cap. 72.

Plin. H. N. l. 11. cap. 1. Aelian. H. A. lib. 5. cap. 49.

ab examinibus ubi confedere fumuntur. Tunc ostenta, *inquit idem*, faciunt privata ac publica, uva dependente in domibus si-
 ve templis, sæpè expiata magnis eventibus. Sedere in ore infantis, Platonistum etiam, suavitatem illam prædulcis eloquii porten-
 dentes. Sedere in castris Drusi Imperatoris, cum prosperrimè pugnata apud Arbalo-
 nem esset; haud quaquam perpétua aruspici-
 cum conjectura, qui dirum id ostentum exi-
 stimant semper. Aliter apud Dionem Ob-
 sequentam legitur. Ille examine apum de-
 territum, ne ultra Visurgim procederet: hic infelicitè dimicasse scribit.

Plin. H.
N. l. II.
cap. 16.

Dio. Hist.
54. Obsq.
l. de prod.
c. 12. 4.

Ufus.

Inserviunt *usibus* pluribus apes. In Cibo, Medicina, bellis, præsagiis, suppliciis, etiam adhibentur. Vescébantur eis Cumanæ regionis incolæ. Contusæ & cum vino diuretico exhibitæ, hydropem potentur curant & calculos comminuunt. In melle mortuæ vomicas sanant: Ulcera labiorum emolliunt: dy-
 fenteria medentur. Favis immortalæ & cum melle tritæ pilos partibus nudatis restitunt. Sæpè ab obsessis in hostes emittuntur: harumque opera Lupus Barriga Lusitanus ab obsidione opidi Xiamaticensis in Mauritania, Anno millesimo quingentesimo duodecimo depulsus est. Apud veteres stellionatus reum, melle illitum, & ad solis radios expositum, apibus objiciebant. De præsagiis superius dixi. Adde, Pompejo aciem contra Cæsarem instructuro, & Dirrhachium egredienti, tanta apum examina occurrere, ut signa obscurarent. Victus est. Severo imperante, apes in signis militaribus, in stativis Nigri maximè, favos finxerunt. Ancipites hinc inter Severianos & Nigrianos congressus: sed illi obtinuerunt. In Consulatu L. Pauli & C. Metelli hostem imminet præsignificaverunt. Leopoldo Austriaco Sempachum cum exercitu tendente, apum examen in oppidum irruit, ut Helvetiorum Historici produnt. Palatino Regiam Pragensensem ingrediente, tegulis insedere. Mali rem ominis Anhaltinus dixit. Reliqua prætereo.

Differentiæ.

Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 40.

Plin. H.
N. lib. II.
cap. 26.

Arist. H.
A. lib. I.
cap. 40.
Plin. H.
N. l. II.
cap. 16.

Differentiæ Apum sunt variæ. Aristoteles in *urbanas* & *feras* dispescit, & ibidem, alias *gregales*, ut Apes, Reges, fucos, vespas annuas, crabrones teredinis: alias *solitarias*, ut Sirenem minorem, majorem, & bombycem. Hunc secutus Albertus, novem quoque genera facit, quæ apud Aldrovandum vide. Plinio Apes sunt & *rusticæ sylvestresque*, horridæ aspectu multò iracundiores, sed opere ac labore præstantes, *Urbanarum*, addit, duo genera, optimæ breves variæque, & in rotunditatem compactiles: deteriores longæ, & quibus similitudo vesparum: etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Optimè in *non operatrices* & *operatrices* distinguuntur. Inter illas sunt Rex, Fucus & Fur. De Rege satis superius diximus. Duo eorum secundum Aristote-

lem & Plinium genera. Melior rufus, quàm hirsutus niger variusque. Omnibus forma semper egregia, & duplo quàm cæteris major, pennæ breviores, crura recta, ingressus celsior, in fronte macula quodam diademate candicans. Multum etiam à nitore vulgò differunt. Varro nullam ruffi mentionem facit. De fucis in sequentibus agetur. Fur est nigrum quid, ventreque ampliore. *Operatricium* differentia, à corporis figura, etate, moribus, operatione, colore & aculeo fumuntur. Corporis figura. Sunt aliæ vastæ sed glomerosæ, eademque nigrae & hirsutæ: aliæ minores quidem sed æquè rotundæ, & infusci coloris, horridique pili: aliæ magis exiguae, nec tam rotundæ, sed obesæ tamen & latæ, coloris meliusculi: aliæ minimæ gracilesque, & acuti alvei, ex aureolo, variæ atque leves. Sic distinguit ex Aristotele Columella & Virgilius: Optimæ parvulae, oblongæ, leves, nitidæ, auro ardentes, & paribus lita corpora guttis, moribus denique placidis. *Etate*. Sunt quædam novellæ, vetula quædam. Illarum examen quotannis avolare solitum est, nec perinde pungunt: & si annum non excessere, nitescent, oleique similitudinem & speciem gerunt. Hæ horridulae evadunt, & rugis obscurantur: mellificandi peritissimæ. Prigora denique & pluvias præsentunt: ideo his ingruentibus non longè ab alvearibus recedunt. *Operatione*. Sunt *inutiles*, ut bombylius: ἀργόμοι, πλάσσις, ab artifice figmento fortè. Sunt & *inertes*, quæ quidem nec favos corumpunt, nec melli insidantur: id tamen non faciunt. Nonnullæ Regem cingunt: quædam mortuas ex alveo efferunt: aliæ noctu excubias agunt. Quæ mellificant, vel in alveis, arboribus excavatis, petris, tabulatis, vel sub terra id faciunt. Circa Thermodoontem fluvium (in Themiscyra) duo genera: aliarum quæ in arboribus mellificant: aliarum quæ sub terra, triplici cerarum ordine, uberrimi proventus, inquit Plinius. At Aristoteles illarum duntaxat meminit, has alibi ponit. Favus ipse, addit, levis, atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis duntaxat mensibus construunt. Copia in eo tractu hederæ, unde mel conficitur. *Colore*. In Ponto enim sunt quædam albæ, quæ bis in mense mella faciunt. *Moribus*. In Æthiopia, si Alvarezio credendum, adeò cicures, ut intra hominum cubilia examina conficiant. Apud Halizones cum hominibus papulatum exire, & opus tam concretum facere, ut mæl à cera sejungi nequeat, Pausanias author est. Destituuntur & aculeo quædam.

Arist. H.
A. lib. 9.
cap. 40.

Colum R.
R.

Alia. H.
A. l. I. c.
II.

Alia. H.
A. l. I. c.
59.

Plin. H.
N. l. II.
cap. 17.
Aristot.
H. A.
l. 5. c. 22.

Pausan. in
Atticis.

Nieremb.
H. Exot.
l. 132. c. 1.

De Novi orbis apibus ita Nierembergius. Multiplex apiarum genus in novo orbe semper admirabile, licet in mellificio diversum. Quædam in arborum cavitatibus, sed sine favo, corticem cereum prius effingunt
 ovi

ovi instar, quem imbuunt penitus liquido & suavi nectare. Hæc ova copulata simul, & racemata, usque ad viginti vel triginta inveniuntur. Indi truncum cædunt, & deferunt ad usus suos plenum melleis globulis, cera quoque utilissima. *Aliæ* glandes minores conficiunt: *aliæ* non excedentes nucem avellanam. Hoc genus apum exiguum est & mansuetissimum. *Aliæ* sub humo laborant, quædam 3. aut 2. ulnas, quædam non amplius quam dodrantem profundæ, prout oportunitum illis. Harum quædam mellificant in cereis quasi fistulis oblongis, quædam orbicularibus rotundioribus. Ex his quædam *mites* & innoxie, aliæ *majusculæ* efferæ, & suos labores acriter tuentur. *Aliæ* quoque sunt *feræ* diversi opificii, rotundum conficiunt favum instar mali citrei circulando fistulas suspenduntque ex arborum fronde, imponentes favos alium super alium: aliquando sustinet frons racemum ejusmodi trium dodrantium longum. *Exiguiores* apes suspendunt minores racemos, & tenuioribus ramis; grandiores ex firmioribus (vocant has Indi *Materas*) quarum morsus æquat dolore ictus serpentum, & viginti quatuor horis perseverat. *Alia* mitis apum natio est in terris Haimensium, quas industria Europæorum in alvearia conclusit, ubi nec pungunt, nec irritantur, nec inquietes fiunt, recluso alveare. Mirum dictu, nec cessant à labore, tam sunt officio intentæ. Hic curiositas non indigeret vitreis, nec transparentibus vasculis, ut exemplum sedulitatis disceret. Regina & Magistra plurimum à plebe distat. Est quoque apum *nigrum* & *exile* genus, quod in sylvis sine cera mellificat. Cera subterraneorum apum percommodo ceratis ad dolores ex quavis causa frigida accidentes: tumores resolvit: ad alia medicamenta etiam idonea. Albæ apes sunt in Quatemala, mel quoque album & ceram fabricantes, nec nimis noxiæ.

Nunc ex aliquibus authorib. dabo aliqua. In *Ceyba* vastæ arboris & aliar interdum cavis nidulantur apes, atque suum mel elaborant, non minus bonum quam in Hispania teste Ciæca: quarum tria sunt genera. *Unum* paulo majus culicibus. Ad favi quem probè communiunt, orificium, tubulum dimidii digiti longitudine aptant ex materia ceræ simili, per quem apes, aliseo quod è floribus decerpserunt onustis ad suas operas ingrediuntur. Acidiusculum est mel istud, cujus paulò amplius libra præbent singula alvearia. *Aliud* genus paulo majus nigrum superius tamen candidum est. Orificium, quo in arborum cavum ingrediuntur, confectum habent ex cera alteri materiæ commixta, lapide durius. Harum mel superius bonitate longè superat, illiusque tres mensuræ, sive veterum congius nonnunquam ex unico alveari eximitur.

Tertium genus Hispanicas magnitudine excedit, sed aculeis caret, impetu tamen in eos fertur, qui favos eximere volunt, mireque sese capitis & barbæ pilis implicat. Harum interdum alvearia duodenas aut plures libras mellis, multò quam reliquarum præstantioris, continent.

Americana inquit Lerus, apes nostris dissimiles, & exiguas illas muscas quæ æstate, præsertim maturis uvis, nobis infestæ sunt, potiùs referentes, suum Mel & ceram conficiunt, per sylvas in arborum cavis, unde incolæ utrumque probè eximere norunt. Favum, è quo mel nondum exemptum yrayetic appellant: yra enim illis mel est, yetic cera. More nostro melle vescuntur: ceram verò, quæ instar picis ferè nigra est, in massas convolvunt brachiali crassitudine. Sed neq; funalia neque candelas ex ea parant, (noctu enim nullo alio lumino utuntur, quàm certi ligni fragmentis accensis, quæ lucidam flammam parant) at ingentium cannarum ligneorum tubos (in quibus suas plumas, ne à certo papilionum genere, ipsis travers dicto, corrumpantur conservant) ista præsertim obturant.

Anton. Herrera in Provincia Vetræpæcis scribit reperiri *apes sine aculeo* clarum mel conficientes; quarum aliæ sint armatæ & noxiæ, quemadmodum nostræ, aliæ parvæ ut muscæ, optimè tamen mellificantes, aliæ noxii nectaris: quod dementet gustantes. Nullæ favum conficiunt, sed condunt liquorum sub humo, aut in cavis arboribus mel liquidissimum, & acescit nonnihil. Ulricus Faber scribit, *in terrâ Marchkastorum*, si quis sylvas ingressus in arbore quacunque foramen faciat, posse ex arbore quinque vel sex mensuras mellis accipere, quod instar mulsi ab exiguis apibus neminem cædentibus conficitur. Hoc mel ad comedendum optimum est, & vinum inde suavissimum præparatur.

Adjiciam hisce ab Aldrovando observatas, easque propriis ipsius verbis describam. Quæ inquit *priori loco* exhibetur, Apum regulus est ape duplò fermè procerior, sed fuco macilentior: magis etiam lutescit, & alvum habet in extremo acutior. Alæ sunt longæ, & coloris albi, flavis punctus conspersi. Caput ejusdem cum ventre coloris est. Antennæ sunt breves, sed parum benè à pictore expressæ. Apis est vulgaris, quæ *secundo loco ponitur*, color ei magis ad cinereum vergit hirta ferè tota, alvo est obtusiori, brevissima, exerit aculeum. Alæ sunt candidæ intercurrentibus lineolis flavis, breves, breviores, inquam, ipso corpore: Caput magnum; antennæ, ut in ipso regulo. Fucus, *qui tertio loco* exprimitur media est magnitudine inter Regem, & Apem; magis tamen ad regem accedit; Ape duplo major, Rege cor-

Aldrov.
Insect. lib.
I. cap. 4.

corpulentior, sed brevior, colore etiam magis fusco. Alæ fermè, ut in Rege, pedes breviores, caput majus. Alvi extremum velut in duas appendices definit.

Inter *apes sylvestres*, quarum multa sunt genera, *duæ priores*, una cum suis favis expressæ, domesticis quodammodo accenseri possint. Mel enim quod parant, non omnino spernendum videtur, propter suum dulcorem, & ex favis non contemnenda cera parari possit. Ipsarum verò apum species domesticis nostris multo est pulchrior venustiorque. Differunt autem & magnitudine inter se & colore. Quæ major est, & priori loco pingitur, favos & cellas etiam conficit majores. Has simul cum suis apibus inventas F. Gregorius Regiensis Cappucinatorum ordinis, diligentissimus Pharmacopola, & herbarum etiam apprimè peritus, cum ad montem Padernum vulgo dictum in nostro agro herbarum inspiciendarum gratia ivisset, ad me attulit, cum ut gratum mihi faceret, tum verò etiam, ut tam pulchrum naturæ arcanum posteris aliquando communicarem, cellarum aliæ erant vacuæ, aliæ plenæ; plenarum aliæ continebant mel, aliæ sobolem albam, qualem à latere favorum pictor exhibuit. An vacuis apes quiescere putaverim. Omnium figura non sexangulis terminatur, ut in communibus, sed erant rudes, & rotundæ, neque omnes ejusdem magnitudinis. Apis ipsa aspectu venusta admodum, tota hirsuta capite, antennis, & pedibus aterrimis, aterrima item, ac rotunda macula intergore insignis: alæ ferrugineæ, cætera modo rubicundo, modo atro colore variat. *Altera* quæ plures & minores favos construit, minore est ut dixi, & colore diverso. Caput enim in hac pedes & tota alvus nigricant, dorsum totum rubicundum est, alæ proceræ, angustæ nigricantes. Utraque favos suos operit quisquiliis, palea & muscone facile sit invenire. Quid si harum melle D. Joannem Baptistam in deserto vixisse dicamus.

Quæ *duæ deinceps* pinguntur, nostris rusticis *Avoni* vocantur, invicem ferè con similes. *Prior* capite antennis, & pedibus nigris; toto corpore magis, quàm præcedentes hirsuto, & lutescente, minus in dorso, magis in alvo. Sed colorem istum luteum corporis hirsuties facit, non ipsius corpus. *Altera* eadem omnino videretur, nisi candidior esset, & paulò minor. Reperiuntur in hoc genere etiam virides, & nigrae, & aliorum colorum. Hollandi, ut audio, omnes, nescio cur *Repsers*/ hoc est, Imperatores vocant, nisi dicamus propter aculeum, quo acerrimè pungunt, Re-

ges in eo vincentes, qui vel eo carent, vel si habent, non utuntur.

Nigrarum duarum hic iconem etiam dedi, *prior* major est, & brevioribus tamen alis, utraque corpulenta est admodum. *Prior* undique nigra est, præterquam in cervice & superiori alvi parte, ubi macula lutea est, & in extrema ferè, ubi candicat. *Altera* easdem habet maculas, sed multò majores, colorque est intensior. *Priori* pedes hirsutiores, & crassiores. Utrique atri. Antennæ in secunda breviores, & exiliores. Quæ *deinceps picta est*, ex earum genere est, quæ propè latrinas, & foedas cloacas bombos suos edere solent. Aspectu elegans est, alvo crassa, ex nigro, & luteo varia, in extermo acuta, capite & dorso cinereis, oculis magnis, extuberantibus, nigris, pedibus brevibus etiam cinereis, alis proceris angustis ejusdem cum dorso coloris

Est præterea alia *Apis fera*, quam *aquaticam* vocavi, seu potius amphibiam, quod, & in terra, & aqua degat. Sed rarius videtur. Hanc aliquando, ut me exerce-rem, sic descripsi. Api vulgari valdè simile. insectum amphibium, extra aquam volans, in aquis natans, quadripenne, sepes. Duos pedes oblongos habet, nimirum anticos, quibus utrinque distentis tanquam temone simul & remigibus ad natatum utitur. Cæteri breviculi, sub ventrem contracti. Caput compressum, oculis nigris, grandiusculis ac splendidis instructum. Corpus alis tectum, prorsus atrum. Alæ superiores simul, & inferiores duriusculæ, ac crustaceæ, nonnihil majori sui parte eaque superiore è luteo colore habent, & nigro maculosæ sunt, sed extrema parte aut proxima subtilissimæ, ac pelluentes, instar inferiorum alarum, quas operiunt ipsæ, appendices duæ sunt raræ observatu; imo in nullo alio Insecto, à me visæ, quarum una alteram incumbens tegit, quæ faciunt, ut laciniosæ interna parte, ac triangulo sinuatæ appareant. Sed & extremo sui erectam seu fissuram levem habent. Rostrum aculeatum est, ut Culicibus. Pedes antea, quibus natat, tribus articulis dissecti sunt. Rustici *Boñon Guardalosa* vocant, forsan quod lucente sole aquæ summa petat, velut apricari cupiens, & nebuloso coelo non conspiciatur. Aliquando coelum tuetur, sursum ex aqua exorto ore, aliàs deorsum, & vel levissimo strepitu aut umbra percepta, sagacitate mirastatim quovis telo velocius in fundum lancinans subducit, adeò ut captu difficillimum sit.

Ad Caput de Apibus.

APPENDIX I.

De Melle.

Nomen.

Athen.
Dipnos. l.
14.Descrip-
tio.

Plin. H.

N. l. II.

c. 12.

Arist. H.

A. l. 6. c.

21.

Mercur.

Var. LcEt.

l. 2. c. 24.

Columella

R. R. l. 9.

c. 14.

Galen. de

Alim. fa-

cult. l. 3.

c. 39.

Mellis apud Latinos nomen, à Græco ^{μέλι} deductum videtur, hoc autem vel à ^{μέλι} curæ est, quod cum cura colligatur: vel à ^{μηλίς} pomo, quod ex ejus fructibus, descendisse videtur. Apud Athenæum Alcman. ^{ὀπώραν κηρίων}. cereum fructum, Epicharmus, ^{πίνθον ὄρθρον}, matutinum mare, quod diluculo ex aëre fluat, appellat. Favus, quod vocabulum à ^{φαγέιν} Isidorus derivat, Perotrus, à fovendo, quod in favis fœ us suos apes foveant; Martinius ab ^{ὑφ} textum; Græcis ^{ἀνθήνιον}, ^{κήριον}, ^{κήριον}, ^{μελίδειον}, ^{μελίειον}, ^{ὑριον}, audit Cellula est apum sexangula, loculamentum, & fundamentum operis.

Quid sit, egregiè ex antiquis exposuit Plinius. *Venit hoc*, inquit, *ex aere & maximè Syderum exortu*. (^{μελίτω ἐν τῇ τῶν ἀστρον ἐπιτολῇ} Aristoteles dixit) *præcipueque ipso Sirio splendescite fit*, (benè hinc Mercurialis in Aristotele pro ^{ἡ ἵρις}, ^{Κείριον} legi debere putat) *nec omninò prius Vergiliarum exortu*, (oriuntur, octavo Calend. Aprilis, in octava parte Arietis, ut apud Columellam habetur) *sublucanis temporibus*. Itaque tum primà aurorâ folia arbor. melle roscida inveniuntur: ac si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore vestes, capillumque concretum sentiunt. Sive ille est cæli sudor, sive quædam syderum saliva, sive purgans se aeris succus. Utinamque esset & purus ac liquidus, & suæ naturæ, qualis defluit primò: nunc verò è tanta cadens altitudine, multumque dum venit, sordescens, & obvia terræ halitu infectus; præterea è fronde ac pabulis potus & in uterculas congestus apum (ore enim vomunt) adhæc succo florum corruptus, & alveis maceratus totiesque mutatus, magnam tamen naturæ cælestis voluptatem affert. Nec abire in diversa alios videbis. Nam Aristoteles, rorem qui cecidit esse, ex eo demonstrat, quod uno & altero die cellas melle tepletas invenient Apiarii, nec, autumno, postquam detractum est, reparatur, quamvis tum flores præstent Galenus in plantarum foliis oriri, & ejusdem cum rore generis esse; recordarique, æstate copiosum in iisdem repertum, postquam per æstatem, temperiem aëris calidam & siccam, benè frigida nox excepisset, scripsit. Scilicet, sublatis è terra & aquis, folis calore, halitus, ex aceteque tenuati ac cocti, à frigore subsecutæ noctis concreti coaluere. In monte Libano id persæpè quotannis accidere ait. Itaque coria extendunt, & decussum de arboribus excipiunt.

Ælianus denique mel in Media, ex arboribus stillare prodidit, eodemque in Præsiorum regione in India plueret. In herbis & palastrum arundinum comas decidens, ovillo & bubulo pecori tam suave epulum, ut suavissimum lac edant. Seneca dubitat invenientur nè ipsum in floribus, an succum tantum quendam, quem *spiritus sui proprietate*, ut loquitur, & adhibito quodam veluti fermento, in melleam substantiam densent & coagulent. Et hæc quidem veterum sententia. Ex recentioribus Senecæ Erasmus in suo Ciceroniano subscrit: *Fingunt*, inquit, *ore visceribusque suis liquorem, ac in ipsas transformatum, rursus ex se gignunt*. Moufetus. Chylum apum in ventriculis earum consummatum vocat, idque vomitione ejici, vix hoc nobis probatur. Excrementum esse quo alimur non potest: observatumque à curiosioribus, ore quidem melleum ex floribus succum colligere, sed non implere ventrem. Onerari duntaxat crura & coxas, in quibus pilorum instar eminentia quædam repagula, ne mel decidat, reduces ad alvearia, distenta crurum & onustas melle coxas habere, à quo, à destinatis huic officio apiculis, exonerentur. Deciduum ex vaporibus humorem seu rorem esse, dubito. Non colligunt summo manè, dum flores roscidi, apiculæ, fervens dies placet: nec versus cælum hiantibus insident, sed versus terram pendulis. Induere se & ad medium penetrare videbis, quoros qui summa duntaxat folia stringit, pervenire non potuit. Hærere intus melleam dulcedinem testantur, quam si leviter suxeris gustabis. Et cur, si mel deciduum: festucis quoque & stipulis non adhæret? Cur ex certis duntaxat floribus colligitur? Benè ergò Cabeus, certor. florum succum, illumque internum & medullarem, ab apibus, naturæ genio cum aëra humiditate expressum, & qui vegetabile quid potius ac terrenum, dixit. Inde sanè fit, quod pro diversarum regionum genio, diversæ sunt & mellis sortes. Diversum hæ, floribus sal subministrant. Inde quod aquam gravitate superat, & ad eam se ut 10. ad 1. habet: inde, quod arte Chymica dissolutum, maximam partem in terram facessit: inde, quod suavem quidem sed vehementem saporem, qui salinum & terrestre quid sapit, præ se fert.

De *Electio* in Differentiis agetur. Optimum est Galeno, purum, ab omnibus sordibus liberum, pellucidum, flavum, boni odoris, gustu paulum acre, sed suavissimum, & cohærens, ita, ut si attollatur, continuum defluat. Plinius, plenilunio uberior capere scribit, sereno die pinguius. In omni melle, addit, quod per se fluit, ut mustum oleumque, appellatur acetum, maximè laudabile

Ælian. H.
A. l. 15.
c. 7.Seneca E-
pist. 84.Cabeus
Meteor. l.
2. textu
50. quæst.
3.

Electio.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 15.

bile est. Aptissimum existimatur, è thymo, coloris aurei, saporis gratissimi, quod sit palam doliolis (ut mel ^{τυμωδὲς} esse monstrarent, Thymi folia miscebant) pingue, marino è rore spissum. Quod concrevit autem hoc minime laudatur, Thymosum non coit, & tactu pratenuia filamittit: quod primum gravitatis argumentum est. Acæton quid sit, inter authores non convenit. Alii ^{ἀκίτων, κρέτισον} dicunt, sua sponte fluens. Quidam ^{ἀκίτων} legunt, quod statim fluxisset, nec diu in vina ceis, fratribus, favo, jacuisset. Defœcatum & sedimenti expers dixeris. Nonnulli, ut Dalechampi, ^{ἀκίδεσον}, curioso studiosoque nullo labore confectum.

Dale-
champ. ad
Plin. H.
N. l. 11.
c. 15.
Ufus in
cibus.

Laert. in
Zenone.

Athen.
Dipnos. l.
2.

Plin. H.
N. l. 23.
c. 24.

Varro R.
l. 3. c.
16.
Tzetzes
Chiliad.
13. lib.
478.

Adul. Mi-
les. 10.

Hippocr. l.
de Affe-
ctib.

Veteribus loco saccari in opere dulciorio erat: hoc, saporis, illis quæ acriora, gratia conciliabatur. Erant qui vehementer delectabantur, & vitam credebantur protraxisse. Zeno modicè eo cum pane utebatur. Pythagoram sole sive favo, & pane eodem contentum, quidam autumant. Democritus in annum centesimum & nonum fati diem distulisse, quod eo oblectaretur, creditur. Idem mellis odore vitam per Thesmophoria produxisse putatur: sed Ficinus, vino liquefactum albo calentibus panibus infudisse opinatus est. De Pollione ita Plinius. Corpora auget. Multi senectam longam mulsi tantum nutritu toleravere, neque alio ullo cibo, celebri Pollionis Romuli exemplo. Centesimum annum excedentem, cum Divus Augustus hospes interrogavit, quam maxime ratione vigorem illum animi corporisque custodisset. At ille respondit, intus mulso, foris oleo. Apud Lacædemonios initium cœnæ fuit; sed & in secundis mensis apponebatur. Placentæ quæ ex eo parabantur, mellita, pyramuntæ & itria dicebantur. Illa in cœnis quas Nero familiaribus indicebat, quadragies fertertium constabant. Pyramuntæ extritico & melle constabant: Itria, ex eodem & farina conficiebantur. Mellita scitamenta Apulejus vocavit. Quantum alimenti corporibus largiatur, non convenit inter authores. Hippocrates, per se, attenuare magis & per urinam plus justo purgare; cum aliis sumptum, nutrire & bonum colorem conciliare dixit. Celsus inter valentissima reponit. Dulcedine illectas partes, plus ad se nutrimenti rapere, retinere, & in simile sibi convertere, verisimile. Senibus commendatur. An-nosi, Anthiochus Medicus, & Telephus Grammaticus senes: iidem Attico melle sæpius cocto pane vel alica excepto vescebantur. Acrimoniam amittit, si aqua diluatur, ac coquatur donec spumare desinat, spuma assiduò deterfa. Urinam sic paratum tollit, & sputa crassa incidit. E-dulii illud genus quod Cocetum Festus vocat, ex melle & papavere constabat.

Paratur ex eodem mulsum, medo, melomelites & vinum. Mulsi frequens apud antiquos mentio: nomen à mulcendo, quod vini austeritas ejus dulcedine molliatur. Plinius Aristæum Thracium primum invenisse tradit: quidam cum oinomelite idem censent. Sed Ulpianus dulcissimo vino idem tribuit. Ex vino & melle parabatur, ex vetere utilissimum, & quod facile cum melle concorporatur, ex austero, Massico inprimis, quod mons Gauranus, in Puteolor. Bajazarumque prospectu fundit, nobile. Crassum & turbidum olim fuisse, ex Horatio colligit Mercurialis. Duæ partes uni mellis affunduntur. Aliqui, quo celerius præberi possit, una coquunt, & transfundunt: Alii, utilitatis gratia, ad sex musti ferventis sextarios, unum mellis adjiciunt, & postquam deferbuere recondunt. Adjiciebantur & aromatica, folia malabathri, myrrha, casia, costus, nardus, de quibus authorem Geoponicor. consule. Medo Septentrionalium potus est, aliquando tam nobilis, ut non nisi lautioribus mensis apponatur. Laudatissimus Covenis. Moris & aromatibus condire. Per totam ferè Europam devehitur. Idem cum medone ^{μελίτσην}, (male apud Ethymologum ^{μελίτσην}, in vulgatis quibusdam lexicis ^{μέλιτσην} legitur) dicerem, quod ^{σκούθικον πύραλον σὺν ὕδατι ἐφύεον} Hesychius explicet, nisi & herba accederet. Cum illo convenit, quod ^{μέλι κύκεως} Athenæus vocat, quodque ex vino, melle; & herbis variis conficiebatur. Cambri nunc Metheglin; Hibernis Usbebach dicitur. Vina ex melle redolere, Illyriis quos Taulantinos vocabant, olim suctum. Favus aqua superfusa exprimebatur, ac simul ahenò ad mediam usque partem incotta; fictilibus primum infundebatur, jam tum dulcissima: dein vasis ligneis in multa tempora reservabatur. In Græcia parum differebat à vino, quod nascitur. Plinius ita de eo: Quinquennio ad hoc servari cœlestem jubet. Aliqui prudentiores statim ad tertias partes decoquunt, & tertiam veteris mellis adjiciunt, deinde quadraginta diebus. Canis ortu in sole habent. Alii diffusa ita, decima die obturant. Hoc vocato Hydromeli, & vetustate saporem vini assequitur, nunquam laudatius quàm in Phrygia Dioscorides ex duabus mensuris aquæ coctæ, & sub Caniculæ sydus insolatæ, ac melo melitis ex cotoneis facti unâ componit. Plutarchus ante vinum inventum, propinatum fuisse scribit. Melomeli quod & Cydonites quomodo fiat, apud Geoponicorum authorem qui id Hydromelum vocat, habemus; quomodo ex melle vinum, apud Porram. Est & Melitites vinum; quod adjecto ad quinque congios austeri musti mellis congio, & salis cyathò, paratur. Seculis jam fieri non arbitror hoc genus

Geopon. l.
c. 24.
Plin. H.
N. l. 22.
c. 24.

Martial. l.
2.

Mercur.
variar. l.
2 c. 17.
Dioscor.
M. M. l.
5. c. 16.

Hesychius
in Lexico.

Aristot. in
mirab. au-
scult.

Plin. H.
N. l. 14.
c. 17.

Plutarch.
Sympo. l.
4. quæst. 5.
Geopon. l.
8. c. 26.

Plin. H. *genus inflationibus obnoxium, inquit Plinius.*
 N. l. 22. Dodram quoque genus potionis apud Auso-
 c. 24. nium, à dodrante novem unciarum mensurâ
 Auson. E- ita dictam, ingrediebatur mel, cum jure, a-
 pigr. 83. qua vino, pane, pipere, herba, oleo, & sale.
 Eodem, puritas vini probatur, si cum la-
 cte infuderis.

Ad lapideam duritiem decoctum, &
 pulverizatum ex albo rubellum reddit, si
 Plaut. transuadendo misceatur. *Mellina* Plauti in
 Pseudolo Hydromeli est. Descriptiones &
 Pseudolo aet. 2. compositiones, Galeni, Æginetæ, Plinii,
 sc. 4. Dioscoridis, Angelorum, qui hordeum tor-
 refactum adjiciunt, Moscovitarum apud
 Moufet. Moufetum vide; Mauritanorum apud Al-
 de Insect. drovandum.
 l. 1. c. 5.

Ufus in Auxit & Medicorum contra morbos
 Medici- remedia. Nec hoc tantum *Mulsum Hy-*
 cina. *dromeli*, seu *melicratum*, *ὄζυλον*, apo-
 meli, *clionomeli*, *Thalassomeli*, *Omphacomeli*,
 & *Oxymeli helleboratum* in usum deduxi-
 mus: spiritum, oleum, & quintam essentiam
 Plin. H. his adde. *Mellis* quidem ipsius natura talis
 N. l. 22. c. est, ut putrescere corpora non sinat, jucun-
 24. do sapore atque non aspero, alia quàm salis
 Columella natura. Ideò Democritus melle condiri ius-
 R. R. l. sit: sicque Alexandri & Agesipolidis, nec
 12. c. non Agesilai corpora conservata; à Statio
 46. Papinio, Xenophonte, & Diodoro Siculo
 Stat. Pa- proditum. *Hyblæo* inquit ille, *perfusum necta-*
 pin. in re durat. Hippocentaurum in Thessaliâ na-
 Sylvis. tum eodemque die denatum, principatu
 Xenoph. Claudii Cæsaris in melle ex Ægypto adla-
 de reb. tum, Plinius vidit. Faucibus, tonsillis, an-
 Græcor. ginæ, omnibusquè oris desideriiis utilissi-
 l. 5. Sicu- mum est, arefcentique in febribus linguæ.
 lus l. 55. Jam verò peripneumoniciis, pleuriticis deco-
 Plin. H. ctum, item vulneribus à serpente percussis.
 N. l. 7. c. Et contra venena fungorum. Auribus so-
 3. nantibus instillatur cum rosaceo, lendes &
 foeda capitis animantia necat. Dysentericis
 Plin. H. & cæliacis medetur, in quo sint immortuæ
 N. l. 30. apes decoctum. Tale & oculis utilissimum.
 c. ult. Ufus despumati semper aptior: stoma-
 Plin. H. chum tamen inflat, bilem auget, fastidium
 N. l. 29. creat, alioqui oculorum angulos melle
 c. ult. tangi suadent. Eadem apud Dioscoridem
 Dioscor. l. invenies. Hippocrates in secunda pleuri-
 2. c. 102. tidis specie favum in aqua maceratum; in
 casu ex alto, cremorem ejus decoctum,
 præscribit: in convolvulo lingere jubet.
 Plin. H. Ex apibus quæ in tumultu ejus mellifica-
 N. l. 30. bant, collectum, *ulcusculis* oris puerorum
 c. 4. medebantur. Cum fructu etiam in denti-
 tione cum butyro gingivis inunctum; in vi-
 fus hebetudine, & albugine cum primo
 infantis stercore subactum; in faucium
 dolere, cum agresti papavere permixtum;
 in lienis, demortuis apibus appositum; in
 dysenteria & cæliaca cum apibus vel caseo
 recenti coctum; testibus frigidis, cum re-
 fina temperatum; adhibetur. Cum nitro
 & lacte bubulo *ulcera faciei* sanat: cum

corii bubuli cinere, *phagædenas* & panos
 curat: spuma cum oleo juglandium, ad-
 ustionem cutis emendat. Hollerius inter
 Diaphoretica retulit. Cum lenticula co-
 cta, & contrita, vel myrti foliis viridibus,
 vel galla, *reduvie*, manuum inprimis pro-
 dest. Id apud Oribasium, hoc apud Pri-
 scianum legitur. A Nicandro contra Opium
 laudatur: ab Ovidio, cum ovis & pineis
 nucibus ad ciendam venerem. Celsus co-
 ctum inter alvum stringentia numerat,
 quod coquendo, acrimonia alvum ciens
 detrahatur. Minui & alimenti virtutem,
 addere poteris.

Aqua mulsa duo sunt genera, *subita* ac
recentis alterum *inveterata* *οὐδυνὸς* & *ἀπὸ δέλης*,
 conditivæ, quod propriè Hydromeli dici-
 tur, *Repentina*, inquit, Plinius, *despumato*
melle præclaram utilitatem habet, in cibo agro-
antium levi, hoc est, alicæ eluta, viribus recre-
andis, ore stomachoque mulcendo, ardore refri-
gerando. Frigidam enim utilius dari ventri mol-
liendo, invenio apud auctores. Hunc potum bibe-
dum alsiosis: item animi humilis & præparci,
quos illi dixere micropsychos. (τὸ δὲ μικροψύχους
μικροψύχους, qui immodico sudore diffluunt, &
languidum, habent, intelligit,) Est & ra-
tio subtilitatis immensa à Plutone descendens:
corpusculis rerum levibus, scabris, angulo-
sis, rotundis, magis, aut minus, ad alio-
rum naturam accedentibus: Ideò non eadem
omnibus amara aut dulcia esse. Sic & in
lassitudine proniores esse ad iracundiam, & in
siti. Ergo & hac animi asperitas, seu potius
animæ, dulciore succo mitigatur. Lenit tran-
situm spiritus, & molliores facit meatus,
ne scindant euntem redeuntemque. Experi-
menta in se cuique: nullius non ira luctus-
que tristitia & omnis animi impetus cibo mol-
litur. Ideoque observanda sunt, quæ non so-
lum corporum medicinam, sed & morum
habent. Aqua mulsa & tussientibus utilis
traditur, calefacta invitat vomitiones. Con-
tra venenum psimmythij salutaris addi-
to oleo. Item contra hyoscyamum, cum la-
cte maxime asinino, & contra halicaca-
bum, ut diximus. Infunditur & auribus
& genitalium fistulis. Vulvis imponitur
cum pane molli, subitis timoribus, luxa-
tis, leniendisque omnibus. Inveterata u-
sum damnare posteri, minus innocentem
aqua, minusque vino firmum. Longâ ta-
men vetustate transit in vinum; ut constat
inter omnes stomacho inutilissimum, ner-
visque contrarium. Semper mulsum ex vè-
tere vino utilissimum, facillimequè cum mel-
le concorporatur, quod in dulci nunquam
evenit. Ex austero factum non implet sto-
machum, neque ex decocto melle, minusque
inflatur, quod ferè evenit. Appetendi quoque
revocat aviditatem cibi. Alvum mollit
frigido potu, pluribus calido sistit. Eadem
 B 2 apud

Oribas. Sy-
 nop. l. 7. c.
 18. Pr sc.
 Euporist.
 l. 1. c. 34.

Plin. H.
 N. l. 22.
 cap. 24.

apud Dioscoridem habentur. Idem & *ἑρπυλλίδης* præstat.

Plin. H.
N. l. 22.
c. 24.

Mulsum ex austero vino factum, non implet stomachum, neque ex decocto melle, minusque inflat, quod ferè evenit. Appetendi quoque revocat aviditatem cibi. Alvum molliit frigido potu, calido sistit. Corpora auget. Varro regium cognominatum morbum arquatam tradit, quoniam mulso curetur. *Apomeli*, quod ex melle ex favis niveo cadore splendentibus cum aqua fontis, prout ab Ætiotraditur, decoquebatur, deterget & digerit, urinas ciet, calidioribus naturis inimicum. Confert & ad educendum spiritum *Chionomeli* cum nive & cum melle commista fiebat, & in febribus propinabatur. De *Omphacomeli*, quod succo uvæ immaturæ & melle fit, nihil singulare occurrit. *Thalassomeli* ex æquis partibus maris, pluviae, & mellis defæcatis, & in picato vase per canis æstum insolatis paratur. Sapore & odore gratum est, clementerque purgat. *Oxymelitis* variae apud authores sunt descriptiones; quas apud Aldrovandum vide. Sumptum humores crassos attenuat; ischiade & arthritide laborantibus prodest: in angina utiliter gargarizatur. De *Scyllitico* oxymelite consule Medicos. *Helleboratum* Gesnero debemus, cujus encomia in epistola ad Occonem persequitur.

Spiritus, qui per retortam exit, & vel albus vel flavus est (aquam quoque vocant) effusiones & albugines oculorum sanat, & ad capillos producendos adhibetur. *Oleum* quod instar aquæ vitæ ardet, si cum spiritu vini circuletur, gratissimi saporis evadit, & non tantum scolopetariis vulneribus & phagedænicis ulceribus convenit: sed & dolores podagricos vehementer mitigat: maculasque faciei cum oleo Champhoræ discutit. Componitur & cum vitriolo calcinato. *Acetum* ex cocto cum aqua fluviali & semine erucæ, quod duntaxat in petra suspenditur, destillatur. Solvit silices, reliquosque lapides: nec est quod calcinationem præmittas. *Quinta essentia*, quæ sale ex fæcibus propriis incineratis acuitur, in colica, calculo renum &c. remedium creditur paratissimum. De *Elixire*, quod Doctissimus Schröderus describit, taceo.

Hartman.
in Crol.
Agric. in
Poppium
T. 2. p.
973.

Schrod.
Pharmacop.
5. p.
316.

Herodot.
in Thalia.

Plutarch.
in Me-
nandro.

Non permittere ut corpora putrescant, superius ex Plinio dictum: Babyloniosque in melle cadavera servasse dici debuit. Nunc de purpuris, antidotis, & arborum surculis aliqua adjicere placet. Purpuræ Hermonicæ, compositæ quidem ante centum nonaginta annos, sed *πρόσφατον τὸ αἶθρο ἔτι, & νεαρὸς*, recentem adhuc florem & novum servantis, quinque millia talentum, capitis ab Alexandro Susis inventa fuisse, Plutarchus author est. De purpuris hoc cum succo in

massam redactis, vel flore, qui Vitruvio ostium, cum vaginula sola, intellige: talentum de pondere potius quam precio sumendum est; Durationis causa, mel, in quo massæ punicearum immergebantur. *Theriaca* & aliis antidotis haud frustra admiscetur. Conservat ea, & excipit. Lentori, consistentia debetur, & ne ambiens aër exhauriat. Servari in melle *surculos*, nec quicquam propagationi decedere, apud Cardanum habemus: Scaliger eo multa servari, multa vitiari reponit. Ille mellis humido quod tenue, dulce, temperatum, non pingue, nec putredini obnoxium adscribit. Hic juglandis naturam in eo incorruptam, propter oleositatem servari; ficus, persica, pyra, tabo fluida fieri, asserit. Tactum à pane corrumpitur, & in formicas similiaque animalcula abit. Fugitivo denique & exanimi vino vitam reddit, suctum cœnopolis mangonium.

Cardan.
Subtil. l.
8.

Scalig.
Ex. 179.

Differentie mellis sunt variae. *Substantiam* si spectes, habetur *Aëreum*, *Terreum*, *Anthinum*, *Galbanarium*, *Thymosinum*, *Cerosum*, adulteratum. *Aëreum*. Mense enim Majo, Junio & Julio ambrosia quædam cœlestis, liquida, pura, suavissima, plantarum foliis illabatur, ut vulgò creditur: hanc collectam & imbibitam apes in alvearia deferunt. Initio dilutum est, ut aqua & primis diebus fervet, ut mustum, seque purgat: vicesimo die crassescit, mox obducitur tenui membrana, quæ fervoris ipsius spuma concrevit. *Terreum* rore abeunte ex terræ ipsius sudore, & plantarum dulci parte exugitur, densioris substantiæ, totque differentias, quod plantæ sunt, ex quibus detrahatur, sortitur. De *Anthino* inferius dicemus. *Galbanario* nomen Aphrodisiensis imposuit, à pastu apum, quem galbana vitiant. Prodest ad oculorum claritatem. *Thymosinum* non coit, & tactu prætenuia fila mittit: quod primum gravitatis argumentum est. Si planè thymum redolet, consummatum ne dicas: quanquam venditores ab injecto laudem conciliare soleant. *Cerosum* crassius est, & in quo crassitudines quædam innant. Adde hisce *Bithymum*, quod ex utroque thymo, albo & nigro, paratur, oculis & ulceribus aptissimum.

Differen-
tiæ.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 14.

Alex.
Aph. 2.
probl. 74.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 16.

Loci ratione est, *Sylvestre*, *Domesticum*, *Atticum*, *Cycladicum*, *Siculum*, *Cappadocium*, *Seythicum*, *Samogitum*, *Cephalonicum*, *Creticum*, *Cnidium*, *Mysium*, *Halizonum*, *Thracium*, *Lydium*, *Aegyptium*, *Medicum*, *Hyrca- num*, ut alias regiones taceam. De *Sylvestri* in sequentibus agetur, *Atticum*, quod & *Hymettium*, id in primis, quod in argentifodinis fit, primas inter optima obtinuit. Optima quippe ibi apum indoles, & terra thymo & aliis floribus luxuriat. Vidit Bauhinus Veronæ in phar-

ma-

macopolio, illudque in vesica elephanti valdè crassâ, pondere librarum XXI. longitudine duorum cubitorum, latitudinis sesqui cubiti invenit. Ex africa allatum fuisse verisimile est. Cycladico secundas Dioscorides tribuit. Urbanum & jucundum est. Siculo seu Hyblæo tertiæ debentur. In Cappadocia sine favis conficitur, & perinde ut oleum crassum est. In Scythia quoque & Samogitia laudatissimum habetur: seu quod flores sint meliores, perflato à septentrionali vento aëre: seu quod ibi robustiores vivant, & mel diligentius elaborent. Ex Cephalonia summæ bonitatis & saccaro suavius devehi, Cardanus auctor est; ut Aphrodesiensis in insulis & littoralibus optium esse putat. De Cretico ita Plinius. Aliud in Creta miraculum mellis: Mons est. Carina IX. millium passuum ambitu: intra quod spacium muscæ non reperiuntur: natumquæ ibi mel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamenti eligitur. E Cnido adventuri, Thasio & Hymettio proximum est. Ubi consenuit, vini conditiones assumit. De Mysio hæc apud Galenum occurrunt. Nostra, inquit, in Asia, collis quidam inter Pergamum & Eleam urbem maritimam porrigitur, thymo scatens, in quo Apes optimum mel reponunt, quod ibidem totum absumitur. In Mysia quoque, qua parte nostræ provincie finitima est, tractus occurrit, quem Britum appellant, in quo mel Attico simile penitus, magnâ cum admiratione conspexi, quanquam deteriora quoque mella ibi proveniant. Exibat ibi quoque monticulus quidam non magnus, saxosus totus, thymo atque origano plenus, ad cujus radices agri cythiso plurimo abundabant. Ex eo, collis dominus mel usque adedò dulce colligebat; ut in hac parte Atticum etiam superaret: acre tamen ut Atticum non erat: idcirco statim nauseam gustantibus excitabat. Apud Halizones ita concretum est, ut à cera seungere nequeas. Thracicum, arenosum erat. In Lydia ex arboribus colligitur. Incolæ pastillos absque cera tantâ duritie conficiunt, ut nisi vehementiore attritu nihil inde demi possit. Ægyptium dilutum est quod flores illius tractus, nimia Nili irrigatione humescant. In Hircania multo folia tinguntur. Extinguitur, nisi ortum folis colligentis præverterint, si Curtio credimus. In Medea ex arboribus stillat. Ad Amisum denique proden- te Aristotele, convehitur à superioribus locis candidum, crassumque, quod apes in arboribus sine favo, quod & in Ponto fieri notum, faciunt. Brevissimè ista complexus est Plinius. Summa quidem bonitatis natione constat, pluribus modis. Alicubi enim favi c. ra spectabiles gignuntur, ut in Pelignis, Sicilia: alicubi mellis co-

pia, ut in Creta, Cypro, Africa: alicubi magnitudine, ut in Septentrionalibus, viso jam in Germania octo pedum, favo, in cava parte nigro.

Sumptas à Tempore colligendi differentias recenset eleganter Plinius. In quocunque, inquit, tractu terna sunt mellis genera. Verum ex floribus constructo favo, quod idè vocatur anthinum. Hoc quidam attingi vetant, ut largo alimento valida exeat soboles. Alii ex nullo minus apibus relinquunt, quoniam magna sequatur ubertas, magnorum syderum, (Sirii, Caniculæ, Arcturi) exortu. Præterea solstitio cum thymum & uva florere incipiunt, præcipua cellarum materia. Alterum genus est mellis æstivi, quod idè vocatur boreum, à tempestivitate præcipua, ipso Sirio exsplendescente, post solstitium diebus XXX. ferè. Immensa circà hoc subtilitas naturæ mortalibus patefacta est, nisi fraus hominum cuncta perniciæ corrumpere. Namque ab exortu syderis cujuscunque, sed nobilium maximè, aut cælestis arcus, (de hoc loco consule Marfilium Cagnatum) si non sequantur imbres, sed ros tepe scat, solis radiis medicamenta non mella gignuntur, oculis, ulceribus internisque visceribus dona cælestia. Quod si servetur hoc, Sirio exoriente, casuque congruat in eundem diem, ut sæpe, Veneris, aut Iovis, Mercurijque exortus, non alia suavitas visque, mortalium malis à morte vocandis, quàm divini nectaris fiat. Rutilum omne tale, ut diebus confectum siccioribus. Æstivâ mellatione decimam partem Thasio Dionysio apibus relinqui placet, si pleni fuerint alvei: sin minus, pro ratâ portione: aut si inanes, omninò non attingi. Huic vindemiæ Attici signum dedere initium, Caprificalem diem Vulcano sacrum. (Incidebatis in Nonas Julii, quæ & Caprotinæ & vulgi fuga vocabantur.) Tertium genus mellis minimè probatum, sylvestre, quod ericæum vocant. Convehitur post primos autumnis imbres, cum ericæ sola floret in sylvis, ob id arenoso simile. Athenienses tetralicem appellant, Eubæa sisaram, quam putant apibus esse gratissimam, fortassis quia nullius tunc alius sit copia. Hæc mellatio fine vindemiæ & Virgiliar. occasu, Idib. Novembris ferè includitur. Relinqui ex ea duas partes apibus ratio persuadet, & semper eas partes favorum, quæ habent erithacen.

Dantur & à Qualitatibus differentia. Laudatissimum existimatur è thymo, coloris aurei, saporis gratissimi, quod fit palam doliolis, pingue, marino è tore spissum. Tale nascitur, ubi thymus, cunicula, origanum, violæ, &c. pullulare solent, ut in Achajæ montibus, Hybla, Himetto, & aliis, fieri solet. Tale odoratum, ex dulci acra, glutinosum, perlucidum, quod minimum spumæ vomit.

Æl. H. A.
l. 5. c. 42.

Cardan. de
var. Rer.
l. 6. c. 25.

Plin. H.
N. l. 21. c.
14.

Galen. I.
de Antid.
cap. 4.

Pausan. in
Atticis.

Aphrodis.
2. Probl.
74.

Mela 3. de
suo orbis.

Plin. H.
N. l. 11. c.
14.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 15.

Plin. H.
N. l. 11. c.
16.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 15.

APPENDIX II.

De Cera.

Mouf. l. I.
de Insect.
c. 1. p. 28.

Strab. Ge-
org. l. 9.

Xenoph.
de Cyri
exped. l. 4.

Strab. l.
12.

Scal. E-
xercit.
132.

Gal. de
Antidot.
l. c. 2.
Strab.
Georg. II.

Tale Cretenfibus Acramaumorion, Cy-
priis Chytrium, Cois Calaminium. Tale, si
Moufettum sequimur, pingue, lentum
glutinosum, grave (unde in fundò opti-
mum) *αἰτόχουτον*, clarissimi therebinthini li-
quoris æmulum, sui ubique simile, &
vel nullis vel saltem paucissimis fœcibus
impuratum, blandissimo calore liquefa-
ctum, & levissimo frigore quasi in lapillos
concretum. Tale denique quod Strabo in
Attica ad argentarias gigni; & *ἀκάνθων* vo-
cari scribit. *Malum* est, quod vel justo
crassius, vel justo tenuius, vel diversarum
partium est; quod thymum planè redolet;
multam spumam egerit. Tale quod quia ex
custodia computruit, male olet quia è cicuta
contagium contraxit, graviter; quia acre,
nares odore ferit: quia sub vappa vapu-
lat, nihil olet. *Venenatum* in Ponto ex
argolethro Dioscoridi, ex Rhododendri
floribus Plinio; ex Aconito Aëtio, testibus,
colligitur. In Carina, Perside, Mauri-
tania & Getulia, vel ob terræ halitus, vel
virulentos succos tale evadit: livore de-
prehenditur. Apud Macronas insaniosum
prodente Xenophonte, habetur. Nec
stare quidem poterant, qui eo vescebantur.
In Heptacometarum urbe contagio-
sum, & quod stupidos redderet, Strabo
reliquit. In Corsica ex cicuta, Ovidius:
in Trapezunto Pontica ex buxi floribus
gravis odoris, sed quod insaniam curaret,
Ælianus. Cognoscitur, si non omninò
densatur, rutilum est, alieno odore, &
ad nigredinem vergit. Duos tali melle
gustato in foro Romano obiisse, apud Ga-
lenum habemus. In Troglodyticæ parte
quæ Balgada dicitur, adeò *Candidum* est,
ut ne nivibus quidem cedat; durum quasi
lapis, solidum etiam ita, ut sportis conti-
neatur. Meminit talis & Aristoteles, id-
que ex puro thymò confectum negat. In
Tigremahon & Tagodast, Moufetus po-
nit. *Rutilum* est ericæum. *Nigrum*, *fuf-
cum*, *spadiceum* & *lividum* suspectum esse
solet. *Vinosum* apud Galenum habetur.
Amarum juxta Phasin, & in Ponto. Eva-
dit & vetustate tale. *Dulcissimum*, in My-
sia superius diximus. *Fœtidum* custodia
evadit. *Farina* milii adulteratur. *Facti-
tium*, ex nuce Indica, & vulgaribus siliquis,
quas Græci *κεράτια* vocant, paratur, qui-
Troglodyticam Arabiam incolunt, radi-
ces zingiberis recentes in eo conservant.
Mirum verò quod Eudoxus Cnidius apud
Apollonium refert, Gyzantereas Africæ su-
pra Sirtin & Carthaginem gentem, apum
more flores colligere, & mellificium exer-
cere, felicitate pari. Diodorus Siculus
mellis conficiendi rationem Curetes pri-
mos invenisse author est.

CERÆ nomen à Græcis sumptum est, Nomen.
κερός his dicitur, seu à *κεράειν*, quod
curare est, ut Isidoro placet; seu à *καίω* & *ρα-
δίος* quod favis ignis calore liquatis fiat; seu
ab Arabico *قير* quod ceram Abrabibus, ut
morum seu parietem Ebræis significat. Et
certè favorum ceræ sunt ut parietes, intra
quos *μελιστάρεις*, liquidum mel stipatur. Dici-
tur & *μέλδν* Galeno teste, quod vocabulum
quidam emollitæ tantum attribuunt. Po-
test tamen & duræ imponi.

Ex lachryma arborum ab Apibus confici, *Arist. H.
A. l. 3 c. 21.*
Aristot. prodidit. Ex omnium arbor. fato-
rumque floribus confingi Plin. rumice & e-
chinopode, seu equinopode, (quidam tribu-
lum, alii echion, nonnulli spinæ quoddam ge-
nus intelligunt) excepta. Addit. *Falso exci-
pitur & spartum*, (genesta, iisdem locis qui-
bus & juncus sterilis nascens) quippe cum in
*Hispania multa in spartariis mella herbam eam
sapiunt. Falso & oleas excipi arbitror*, (alibi ve-
rum id esse affirmat) quippe olivæ proventu plu-
rima examina gigni certum est. De Lampfana
apud Columellam habemus. Modus elabo-
randi apud Aristotelem extat. Perreptant
flores primum primis pedibus, quos leviter
affingunt; tum in medios sese abstergunt; &
affricant: tandem vero tincturam florum a-
qua vel saliva sua laborantam, & compa-
ctam, in cruscula posteriorum pedum de-
xtræ & celeriter deponunt, & magnitudine
formaque lentis collectam, onustæ ad pro-
prios lares redeunt, ut Moufetus exponit:
Quomodo exprimatur Colummella expo-
suit. *Expressæ*, inquit, *favorum reliquæ*, *Colu. R. R.
l. 9. c. 16.*
posteaquam diligenter aqua dulci perlutæ sunt;
*in vas æneum conjiciuntur: adjecta deinde
aqua liquantur ignibus, quod ubi factum ce-
ra per stramenta & juncos defusa colatur, at-
que iterum similiter de integro coquitur, & in
quas quisque voluit formas, aqua prius ad-
jecta defunditur. Brevius ita Plinius. Ce-
ra fit expressis favis, sed ante puaisicatis
aqua, & triduo in tenebris scattis, 4.
die liquatis igni in novo fictili, aqua fa-
vos tegente, tunc sporta colatis. Rursus in
eadem olla coquitur cera cum eadem aqua,
excipiturque alia frigida, vasis melle circum-
litis.*

De Loco non est quod multa dica-
mus. Habetur ubi & apes. Corsis o-
lim tam copiosa, ut Romanis tributis loco
centum millia, (ducenta posuit Livius)
pondo persolverint. Ex Russia & Mosco-
via in universam ferè Europam defertur.
Ad Mombazzæ urbem ingens ejusdem vis.
Livones olim purgamenti instar rejecisse,
à Crantzio proditum. Ejusdem usum &
flu-

*Arist. H.
A. l. 3 c. 21.
Discri-
ptio.*

*Plin. H.
N. l. 11.
c. 8.*

*Plin. H.
N. l. 21
c. 12.*

*Arist. H.
A. l. 9. c. 40.*

*Colu. R. R.
l. 9. c. 16.*

*Plin. H.
N. l. 21. c. 14.*

Locus.

*Crantz.
Vand. 16.
c. 9.*

fluvii Senegæ accolæ ignorant.

Ad Naturam spectat, quod calore Solis candefiat, cum caro nigrescat; quod coacta opaca sit, liquida pellucescat: quod facile calore emolliatur; & denique, quod cum oleo facillimè, cum vino & aqua difficulter confundatur. Causas in Aldrovando vide.

Usum nobis præstat eximium, in Medicina, scribendo, pingendo, sigillando, imaginibus, conglutinando, lucem præbendo, & aliis. In medio quodammodo est calefacientium, refrigerantium, humectantium & siccantium. Habet aliquid emplastici & crassarum partium, ut Galenus scribit. Ideo reliquorum medicamentorum materia efficitur, & ad emplastrorum, & cerarum compositionem adhibetur. Præbetur dysentericis cum pomo assato. Nervis & tendonibus denudatis applicatur. Linteo in cera intincto, & calidissime appposito, juncturar. ex frigore dolores tolluntur. In Ictero cum ovi vitello ad duritiem cocto, aliquot granis croci, & syrupo absynthii, pillulæ ex eadem laudatissimæ. Valde sitim excitant. Dat & oleum, in diuresi, & tumorum emolliatione eximium, cujus præparationem apud Chymicos vide. De Adulteratione & Coloratione alibi dicitur, sic & de aliis usibus.

Genera ceræ dantur aliquot. Est *Nativa*, est & *Factitia*. Habuit Aldrovandus *Indicam*, colore flavo, viridi, rubro, & nigro, lapideæ prorsus duritiei, quam ex lacca confici ab Acoſta discimus. *Laudatissima* est recens, subpinguis, pura, odorata, halicum melleum referens, Pontica aut Cretica. Pontica, si Galenum sequimur, ob flores absynthii amara est. Plinio optima quæ Punica dicitur, (candidissimam omnium Dalechampius facit) proxima quàm maximè fulva, odorisque mellei, (hinc Cicero, unguenta graviora esse quæ ceram quàm quæ crocum redolent, scripsit. Sic omnino legendum non terram) pura, natione Pontica, quam constare, addit, equidem miror inter venenata mella. Deinde Cretica, plurimum enim ex propoli habet. Post has Corsica, quoniam ex buxo fit, habere quandam vim medicaminis putatur. Plin. l. c. Alba, seu candida, quam quidam virginæam vocant, quomodo fiat Dioscorides & Plinius prodidere. Ventilatur, inquit hic, sub dio sæpe cera fulva. Deinde fervet in aqua marina ex alio petita, addito nitro. Inde ligulis hauriunt florem, id est, candidissima quæque, transfunduntque in vas quod exiguum frigido habeat. Et rursus marina decoquunt separatim: dein vas ipsum refrigerant. Et cum hæc ter fecere, juncea crate, sub dio siccant Sole Lunaque: hæc enim candorem facit. Siccantes, ne liquefaciant, protegunt tenui linteo. Candidissima vero fit post insolationem etiam incocta.

Scilicet Tollitur ita à cera mel, eaque partes expirant, quarum tenuitate color conflatur. *ἱζικμάζεται* mel ab igne, inquit Scalliger. Venetiis candidissima habetur. Talis & Tarentina fuit. Adulteratur therebinthina. Inalbescit & tractando. Unde *τράκτω* κηρός λευκιστάς Aëtio dicitur; & *τρακταί* ζει Phavorino inalbescere. Sed & *καρυπίδα* tracta dicuntur, quod manibus tractata albescant. Medicis utilissima est, & commendatur à Paulo ad ipsoram. Usurpatur & ad expiendos pulveres in masticatoriis, & quidem factitia, qualis Tyrrhenica fuit. Convenit renibus inflammatis. Paulus *λεωκὴ προπρίτα* meminit. Flava ob aëream ex melle naturam magis emollit, relaxat, & dolorem solvit. Frequentius liquefacta terrestrem naturam contrahit. Ideo recens & nova adhibenda, *Virginem* vocat Hollerius, à juvene Apum populo elaborata. Actuarius propolia esse dicit. Commendatur ab eodem in ceratis. *Viridis* in Ægyptiacis numerat inter medicamenta purgantia. Hollerius, vel mollita oleo imponitur. Nigrescit cera, addito chartarum cinere sicut anchusā admistā, *rubet*. Colligitur tamen & in Moluccis insulis & America naturaliter nigra. Mirum quod scribit Aristoteles tepesfacta junior. boum cornua in cera flecti: nec sentire dolorum pedum, si ea inungantur.

Addere aliquid de Propoli & Erythace placet. Illa dicitur quasi suburbana, quod præ foribus alvei ab apibus ædificetur. Græcis aliàs *σμήνιον*, *σάμυλις* & *ἀίγυρος*. Scribonius pro cera virginea accepit: pro facie alvearium Sylvaticus. Bellunensis sorditiem parietum vocat, & pro Bedellio adhiberi. Nonnulli ab arboribus stillare contendunt, alii primum esse favum: Dicerem, crassiore quandam esse materiam, inter compositam, quæ Aristoteli *Mitys*, *πικρὸν* & ceram mediam, flavescens, odoratam, styracem referentem, & in mastiches modum ductilem. Cordus apud Mousetum, lachrymam esse, arborum gemmantium oculis innascentem scribit. Collectam, circa vestibulum alveorum ab apibus suspendi, contra injurias frigoris munimentum. Quatuor ejus facit species. Prima è nigra tantum populo colligitur. Ægyrinam vocant. Tractatu est mollis, visci instar, colore flavo, odore jucundo, somnifero, & styracis æmulo: sapore populneis gemmis respondente. Secunda, ex betula, eandem redolet, colore inter flavum, cinereum & subviridem medio, ductilis. Tertia ex Alpinae populi lachrymis colligitur, eaque rara. Quarta, ex his omnibus eaque mixta. Desitum jam est ea uti. Apiarii exemptis favis confundunt: & cera, quæ Avic. *Mum nigrum*; nihi aliud est quam quoddam

Scal. Ex.
325. 12.

Holler. In-
sit. Chir.
l. 6. c. 7.
Plin. H.
N. l. 21.
c. 14.
Arist. H.
A. l. 8. c.
7.

Propolis.

Mouset.
Theatr.
Insect. l.
I. cap. 6.

Galen. de
simp. l. 7.

Differen-
tia.

Dios. M.
M. 2. c.
76.

Plin. H.
N. l. 21.
c. 14.

Plin. l. c.

dam post decoctam ceram fundum petens sedimentum. Resolvitur oleo veluti cera, sed præponderat, & fundo illabitur. Syncera & odoratissima optima. Fusione in aquam facile à cera sejungitur. *Cretica* & *Passidica*, quod major illius pars à styracis & ladanii pinguedine colligatur. *Usum* si spectes vitiosam materiam ex alto elicit. Celso inter anastomica recensetur. Aëtio calefacit, discutit, maturat, extergit. Varro propter multiplicem usum, multo carius in sacra via, quam mel ipsum venditam scribit. Inde fortè *Cera sancta* apud Largum nomen. Veteri tussi suffitu prodest. Guttam rosaceam ex aqua tollit: impetigenes illita extirpat, & ad plurima prodest.

Varro R.
R. l. 3. c.
16.

Erithaca.
Arist. de
plant. l. 2.

Erithacam Aristoteles *Sandaracham* & *Smerion*, alii *Cerinthum* vocant. Doctioribus est *Vernilago*, quibusdam à tempestate *Vernix*. Rusticis Lombardis, apud Niphum. *Carbina*. Diximus de eo ex Plinio supra. Varro gluten esse vult, quo favos extremos apes inter se compingunt. Mira ei vis eliciendi examina. Ubi volunt examen confidere, ramum erithace, addito apiastro, oblinunt. Virgilius *gluten* vocat.

CAPUT II.

De Fucis.

Nomen.
Aldr.
Hist. Inf.
l. 1. c. 5.

Fucus à fuco, seu quod sit fucata apis; seu quod fucum faciat, & prætextu alvearia calefaciendi, mellifica absumat, dictus videtur. Α φαρμα qui deducunt, audaces nimis sunt: ut & illi qui à furando, quamvis verum sit furari. Græcis est κηρήν & θρόναζ. κόβερθ epitheton est, παρὰ τὸ κέρδιον τὸν ἑαυτῶν ἔραν, quod aculeum, ut aliæ apes non exerat.

Descriptio.
Col. R. R.
l. 9. c. 15.
Plin. H.
N. l. 11. c.
11.

Columella eos genus amplioris incrementi appellat, simillimum apum; atque inter gregalia animalcula collocat. Plinio sunt sine aculeo, velut imperfectæ apes novissimæque, à fessis ac jam emeritis inchoatæ, serotinus foetus, & quasi servitia verarum. Aristoteles quartum genus apum, sed perperam, nec enim mella faciunt, facit. Vulgari ape ferè duplo major est: imò Regem crassiore & compactiore statura æquat. Ducas essent, si aculeo instruerentur. Magnitudo ex vitæ instituto obligit. Nihil superfluitatum laboribus absumitur; & interdiu & noctu sese liquore melleo ingurgitant. Colore splendente nigricant magis quam apes. Qui *Fur*, Aristoteli φάρ, Hesuchio φάριθ, dicitur, minor est. Plin. inter apes grandissimos nominat, nigros, lataque alvo, ita appellatos, quod furtim mella devorent.

Arist. H.
A. l. 9. c.
40.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 17.

Generatio.

De *Generatione*, variæ sunt opinioniones. Ex mulis putrescentibus nasci prodidit Isidorus, ex asinis Cardanus, ex equis Plu-

tarchus & Servius. Sunt qui aliunde, ex cerinthi, oleæ, vel arundinis floribus portari credunt. Alii ex apibus degeneratione quadam fieri existimant, posteaquam aculeos perdidere. Nonnulli has ex fucis originem ducere nugantur. Quidem denique in mares & foeminas distinguunt, (sane Varinus κηρήνας τὰς ἄρρενας τὰς ἀπρὶκτους τῶν μελισσῶν, explicat) & coitu propagari contendunt. Aristoteles ex apibus longioribus & porrectioribus prodire tam fucos quam fures affirmat, & quidem annis prosperis, quibus largior mellis copia speratur, abundante humore, quod & ex Plinio superius adduximus. Addit, seorsim gigni si Dux vivat: si obiit, in Apum loculamentis, & hos fieri animosiores. Minores verò ipsis cellas confingunt; nec eas sparsim per alveum, sed extimis & velut ejectitiis castris. Sic intra ternarium numerum, ratione generationis, totum Apum genus rede gisse videtur. Duces & seipsos & aliud genus gignunt: Apes fucos: fuci gignendi facultate destituuntur. Foetus autem prout Apum, candidus est: ex eo vermiculi apum vermiculis minores exsurgunt.

Arist. de
gener. lib.
3. c. 10.

Græcis quibusdam ἀσυνταλὴς, ἀπὸ τῆς ἀλειπόμενης, ἀσύνταλθ, μηδὲν ἔς τὴν κοινὴν συμφέραν, fucus est: ideo Virgilius immunem ad aliena pabula sedere dixit. At quibusdam visum magno esse usui. Vivunt quidem, si mellificium attendas perpetuò ociosæ: imò totum diem in mellariis cellulis latent; nocte, sopitis somno apibus opera invadunt & vastant alveos, ut Æliano proditum; sed si nos Bartholomæus Anglicus non fallit, regias mansiones, illasque magnificas, in apice & meditullio favi specioso cooperculo insignes, exstruunt. Tzetzes ὑδροφόρος facit: Columella feminibus, quibus apes figurantur, insidere scribit. Ad fovendam & educandam novem prolem adhiberi, exclusis proturbari: quæ omnia egregiè Plinius. Doms, inquit, primum plebeis ex ædificant, deinde regibus. Si speratur largior proventus adjiciuntur contubernia & fucis. His cellarum minime, sed ipsi majores apibus. Sunt autem fuci sine aculeo, velut imperfectæ apes, novissimæque, à fessis & jam emeritis inchoatæ, serotinus foetus, & quasi servitia verarum apum. Quamobrem imperant iis, primosque in opere expellunt, tardantes sine clementia puniunt. Neque in opere tantum, sed in factu quoque adjuvant eas, multum ad calorem conferente turba. Certè quod major fuerit multitudo, eo major fiet examinum proventus. Cum mella ceperunt maturescere, abigunt eos: multaque singulos aggressæ irucidant. Nec id genus, nisi vere conspicitur. Fucus ademptis alis in alveum reiectus, ipse ceteris adimit: Vel potius, si Aristotelem sequimur, cæteror. fucor. intus relictorum alas

Virg.
Georg. l.
4.

Ælia. H.
A. l. 1. c.
10.

Thet. z.
Chil. 8.
Hist. 227.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 11.
Colum. R.
R. l. 9. c.
11.

alas ipsæ apes comedent : ut malè Plinius ,
Arist. H. A. l. 9. c. 40. pro αὐτῶν legerit , & τῶν λοιπῶν ad apes
 retulerit. Sunt qui ex Aristotele favos in eod-
 em alveo fingere tradunt. Manent enim
 maxima temporis parte intus , cumque ex-
 eunt , efferunt sese fusim , in sublime ,
 gyroque volitant , & quasi exercitium fa-
 ciunt , quo peracto , domum redeunt , &
 epulis perfruuntur. De *Anthipatia* quæ
 occurrunt , ex jam dictis petantur. De *Fu-*
ribus hoc adjicere placet , adeo sese ali-
 quando replere , ut vix exire aut resistere
 possint : sæpè in apum cellulis parere : ne-
 que mel colligere , nec ædes erigere : in-
 gressos , verberari & pro foribus semianimes
 relinqui , sæpè morti affici.

CAPUT III.

De Vespsis.

Aldrov. de Inf. l. 1. c. 6. Nomen.
VESPA à Latinis nomen inditum esse
 puto , non tam quòd vesperi muscas
 capiat , vel vi petat & adoriatur , quàm quod
 vesca , id est , gracili sit pede. Græcis *σφή* &
σφήκιον , aut à *σφίγω* stringo & gracilem facio ,
 aut *ἀπὸ τῆς διασφαγῆς* , quòd medio ita sit disse-
 cta , ut quasi hiare appareat , dicitur. Ni-
 candri Scholiastæ sunt *λοκισσάδες* , Suidæ *δέλλιδες*
 & *δέλιδες* , Hesychio *αὐλήται* & *πασάλερες* Gazæ ,
 sed *καθὰ χηστικῶς ἀνθρήναι*. Hæ enim potius Cra-
 brones dici debent.

Descrip- tio.
 Animal est gregale , annulosum , oblon-
 gum , quatuor alis membraneis , (quarum
 primæ majores) præditum , exangue , in-
 tus aculeatum , sex pedibus instructum , co-
 lore luteo deaurato , super maculas nigras
 triangulatim positas , corpore toto transver-
 sim variegatum , unde fortè Pollioni *διὰ χυσοῦ*
 dicebatur. Corpus medio pectori tenuis-
 simo veluti filo alligatur , ut veluti elum-
 bes & hietulæ appareant. Aculeum omnes
 gerere , Moufet. existimat. Varro eo ab Ape
 distingui putat , quòd Apis sit brevior , com-
 pactior , pectore ac dorso pilosis , capite ob-
 longiore , acutiore rostro , minus colorata
 albo , annulor. lineis calore ruffis , & nigris
 ut plurimum distincta , antennas , sub ocu-
 lorum regione locatas habet : vespa verò
 longior , veluti quadam fistula medio cohæ-
 rentibus alvo & pectore , glabra tota , ro-
 tundiore & brevior capite coloratior : &
 antennas supra oculos gerit.

Locus.
 Gaudent locis asperis , in iisque magis
 multiplicantur. Quædam tamen genera qui-
 busdam in locis , ut post dicemus , non re-
 periuntur. In insula Nicæsin , Ortelio refe-
 rente , mortem ictu inferunt. In extremo po-
 lari climate frequentissimas Olaus ponit.
Olaus M. l. 22. Condunt & vespeta , cellulis & foraminibus
 plena in quibus nidificant & stabulantur.
 Reperies ea in sublimi aliquando , tectis ar-

borum truncis , montibus & quercubus : ali-
 quando sub terra , in maceriis , cavernis
 & speluncis. Aldrovandus & in leguminibus
 & in humilioribus arbusculis conspexit. Tria
 nobis idem dedit. Unum ovale sub nucis
 juglandis arbore , terra ad pedis altitudinem
 effossa : alterum , subterraneum itidem ,
 sed orbiculatum : tertium phialiforme. Prio-
 ris hæc erat constitutio. Antrum , inquit
 Aldrovand. seu foramen angustum : nem-
 pe ea amplitudine , qua singulis pateret a-
 ditus in terræ superficie conspicuum erat ,
 à quo iter erat ejusdem amplitudinis tendens
 ad Vespelum , non quidem recta , seu per-
 pendiculari linea deorsum tendens , sed ad
 latera per cuniculos quosdam duorum ,
 plus minus palmorum intervallo , à primo
 (quod in summam humum desinit) fora-
 minis vestibulo. Hic majori & ampliori
 sinu terra excavata est rotunda propè mo-
 dum , ac ipsius Vespeli ovali figuræ pro-
 portione respondens , ita tamen , ut inter
 Vespelum domicilium , & telluris cava
 latera , tantum sit spatii , quantum ingres-
 suris sua penetralia vespis sufficit , ad trans-
 eundum arcum illud ostiolum totius al-
 vearis unicum , ad latera collocatum. Hac
 fovea aperta , effossaque , vespelum ædi-
 ficiū domiciliumque apparuit , figura fe-
 rè ovali , altum ferè dodrantem , duas pal-
 mas transversas medio latum , undique
 ceu ovum testa , ita hoc membrana corti-
 cea obductum , eaque subalbida arenosa ,
 simili licheni marino , ejusdem cum favis
 substantiæ , non ut Apum cerea , sed li-
 gnosum quid habente , filiquisque tenuio-
 ribus leguminum , seu lunariæ majoris bul-
 bonaca dictæ pericarpio , aut scabiosæ simil-
 ima substantia. Hujus superna pars , tecti-
 vicem gerebat , & veluti tuguria ac mappæ
 culmine medio in conum fastigiato ab-
 imbre undiquaque (cum fortè incidit) de-
 fendeat , inque parietum lateribus om-
 nem hostilem incursum aditumque præclu-
 debat. Infima basis fundamenti vice fun-
 gebatur , denique undiquaque à sordibus
 putredine tutas reddebat. Hoc veluti
 putamine detracto seni favorum sese pro-
 dunt classes seu orbes , qui sibi mutuò ceu
 tabulata solaria , aut contignatione superpo-
 nuntur , ac imminent , justoque distat in-
 tervallo. Sed ne tabulata superiora in infe-
 riora collabantur , fœtusque premant , aut
 suffocent , singula columnis quibusdam su-
 stinentur , quæ non susque deque formatae
 sunt , & constitutæ , sed à lata basi incipiunt ,
 & ad concavam , seu pronam superioris ta-
 bulati faciem lato , ac protenso epistilio
 protenduntur , instar clavi utrinque capita-
 ti pollicis lati longitudine , ita ut fornices ,
 & hypogæa videantur , infimi ac supremi
 orbes exigui , & angusti , medii amplissi-
 mi , reliqui orbes mediæ amplitudinis.

C

Singuli

Singuli plurimis cellulis abundant sexangulis, in quarum quibusdam Vespæ adultæ, in aliis foetus juniores, attamen perfecti, & alati, aliis Vermiculi condebantur, qui omnes posteriori parte sursum siti erant, capite deorsum.

De altero nihil singulare occurrit. Phialiforme, erat collo angusto, contra ventre capacissimo, cui latus pediculus appendebat. Materia constabat subtili; membranosa, qua undique circumductum erat. Forfice per longitudinem dissectum, tres membranas, illasque inani spacio distinctas, per quas circumcirca percurrere poterant, exhibebat. Prima membrana, exterior minor, secunda amplior, tertia omnium minima conspiciebatur. In intimæ medio, septem cellæ eæque sexagonæ erant.

Vitus.

Appollonio αἰμογόροι, Aristoteli κηλογόροι, quodd crudis carnibus molisve maturis vescantur. Sed nec pyris, prunis, uvis, floribus fructibusque variis parcent; nec ulmorum succo, iacharo, aut melli. Muscas etiam grandiores venantur & amputato iis capite, reliquum corpus auferunt, ne apibus quidem parcentes. Serpentibus avidè vesci apud Plin. legimus, eoque alimento mortiferos ictus facere.

Plin. H. N. l. II. cap. 21.

Arist. H. A. l. 9. c. 41.

Plin. H. N. l. II. c. 53.

Arist. H. A. l. 9. c. 41.

Sexum agnoscit. Aristoteles. Majores & robustiores mares, instruunturque aculeo: minores imbecillioresque fœminæ, & carent eo. Matrices vocari possent, nisi eas Arist. latiores, ponderosiores, crassiores, & vespis majores poneret. Darii sexus, apud quosdam indicium, quod, si vespam ex pedibus ceperis, & bombilare siveris, quæ aculeo destituuntur advolent. Coire visas fuisse, idem ipse scribit: alii ambigunt. Vincentio, agrestes cum domesticis rem habent. De Generatione ita Aristotel. duobus locis. Primo, Crabrones vespæque favos ex ædificant pullis suis, si ducem habeant nullum, eumque palantes quarant. Ac crabrones quidem in sublimi loco: vespæ in foramine: quæ ducem habent sub terra. Horum item favi sexanguli, quemadmodum ut apum, compositi non è cera, sed ex corticea materia & araneosa. Ad cellæ latus deponunt fœtus suos guttæ magnitudine, quæ parieti hærent. Non omnibus in cellis tamen simul fœtus est: sed in quibusdam adeo grandes, ut etiam volare possint: in aliis nymphæ: in aliis vermiculi adhuc. Quibus solis subest stercus sicuti etiam in apum genere. Ac quandiu nymphæ sunt, neque moventur, & obducuntur folliculo. Altero.

Arist. H. A. l. 9. c. 65. Scal. edit. Duces ubi cepere locum conspicuum, ineunte æstate fingunt favos: & constituunt, quæ vespæta vocantur pusilla. Putà, quaternis ostiolis, aut propè modum: in quibus vespæ oriuntur, non autem matrices. Quibus adultis, de integro, præter superiores telas, alias majores construunt: atque his adultis alias. Adeo ut ad

finem Autumni plurima & maxima vesparia sint. In quibus dux quem matricem nominavimus, non amplius gignit vespas sed matricēs. Oriuntur hæ, grandiorum vermium specie in quatuor aut non multo plurium inter se continuatarum superior: cellar. labris summis. Plin. addit. Fœtum ipsum inæqualem & barbarum alium evolare, alium in nympha esse, alium in vermiculo. Et autumno non vere omnia oia. Maximo numero matrices oriuntur, si anno proximo vesparum & imbrum copia præcesserat. Vermiculi antequam in Nympham transeunt oblongi sunt, vermiculis in carne (ιὼνὰς vocat Hippocrates) & in avellanis nascentibus non dissimiles, albicantes, incisuris notabiles, extremo corpore crassiore, linea nigricante per dorsum discurrente, sine pedibus non repentes, sed huc, & illuc se volutantes & moventes. Deposito fœtu, tenui quadam pellicula cellas obvestiunt, qua, ubi ad perfectionem ducuntur perfracta, egrediuntur in lucem, & à biduo volucres circumvolant. Oriri & ex putricertum. Ex equi cerebro nasci prodidit Pachymerius, ex carnibus, Plinius, Plutarchus, & Antigonus. Nasci ex asini corio, apud Isidorum: ex Crocodili sanguine vel cadavere apud Horum; ex putredine arborum & fructuum apud Albertum legimus. Ex senis cervi, capitis sub oculo terebrato osse concrevisse, Vincentius Belluacensis, ex vetustissimo quodam authore tradidit.

Plin. H. N. l. II. c. 21.

Plutar. in Cleomene. Antigon. in Mirab. Plin. H. N. l. II. c. 20.

Vitam quod spectat, matrices bimatum non superant: Operariæ una cum autumno finiunt ætatem. Imò, inquit Moutetus, utrum matrices sive duces anni superioris, novellis jam procreatis ducibus intereant, una cum vespis, novellis, idque simili modo semper eveniat, an amplius etiam temporis possint vivere, multi dubium relinquunt. Agrestes vivaciores habentur. Vitæ brevitatem, tenacitas compensat. Nam si alvos à capite, hoc à pectore sejungas, ferient tamen, & quidem nec levius quàm antehac. Circulariter volant, quia cauda destituuntur. Cedunt tinuncialis, hirundinibus, noctuis, taxo, & vulpi in cibum. Vulpes caudam in vespem inserit: onustam, ad arbores allidit: & mortuis vespis vescitur. Pseudosphecem, quam solitariam vocant, sinistra apprehensam atque annexam, (quæ prima eo anno capitur, maximè conducit) contra quartanam laudat Plinius. Mizaldus aquæ ex vespis stillatitiæ meminit, quæ tumores absque dolore excitet. Inflativum esse necesse est. Curatur ictus si contusas vulneri imposueris, vel emplastrum ex terra furnorum, aceto, & miscarum capitibus. Alii extra succum citrulli, folia teneriora siliquæ Plinii, salviæ cum aceto,

Ætas.

Ufus.

Plin. H. N. l. 30. c. 11.

to, cretam in pulverem redactam, melissophyllon cum oleo, à sparagum tritum cum melle, finum denique bubulum laudant: *intus*, succum sampsuchi cum bolo Armeno & agresta folia tenuiora lauri cum vino; Althææ decoctum ex poscæ, rutæ vel melissophylli succum, folia ejusdem commanducata, etiam commendant. Si à *venenatis* ictus est, quod stupor, delirium etiam ostendunt, locus primò scalpello aperiatur; dilatatus sugatur, insequenti cataplasmate ex terræ in qua vespæ nidificant rasura, cum aceto subacta: Inter *preservativa*, málva & althæa palmam tenent. Quomodo capiantur vide apud Moufetum. Inserviunt & ad *presagia*. Longam portendunt hyemem, si ante finem Octobris apparuerint: pluviosam ac frigidam, si multis in locis, ante Vergiliarum exortum, subterraneos specus glomeratim ingrediantur: ingenter imbres, si multæ autumnò generantur. Scilicet, frigida cum sint animalcula, subterraneos quæ calent specus subeunt: & quia nonnisi terra hemida & vaporosa procreantur, nimiam humoris copiam, si copiose proveniant indicabunt. Capuæ, ingens earum multitudo quæ in æde Martis confederat, hostium adventum, & urbis incendium quasi præsagiebat.

Steph. de Agric. I. c. 8.

Theophrastus de sign. tempor. Aratus in Phænom. Theon. in Comment.

Differentiæ. Arist. H. A. l. 9. c. 41. Plin. H. N. l. 11. cap. 21.

Differentiæ vesparum sunt plurimæ. Aristotel. *sylvestrium*, *domesticarum*, *matricum*, seu *Ducum* & *Operariarum* meminit. Apud Plinium sunt *Ichneumones*, & *Pseudo sphæca*. Apud alios occurrunt, *parvæ*, *magnæ*, *flavæ*, *Indæ*, *spuriæ*, *venenatæ*, *solitaria*, *Laertæ*, *Aculeatæ*, *non aculeatæ*. Aldrovandus *duodecim species* quas observavit descripsit, quarum icones damus. Moufetus *duas* ex Hungaria accipit, quæ etiam hic exhibentur.

Ferum illud & *sylvestre* genus rarum est. In montibus & sylvis nascitur: & non sub terra, sed in quercu nidificat. Grandius est, porrectius, nigrius, varium, longius, fortius, aculeatum, ictuque acerbius. Authores sunt, ter novenis punctis interfici hominem. Vivit tono anno; & hyeme, cæsa arbore, evolat. Hyemem in latebra exigit. Moufetus semel in sylva Effexiensi cum vitæ periculo observavit. A toto examine obrutus fuisset, nisi aliquet genistæ ramulis sese defendisset. Varro pilosas matris facit. *Domesticæ*, quæ & *Cicures*, & *placidæ*, seu mitiores, minores sunt. Dividuntur in *Matrices* & *Operarias*; quarum illæ biennio durant, & majores sunt. Plinius clementes facit. Latior earum, addit, species: dibiumque an habeant aculeos, quia non egrediuntur. *Operariæ* in opere versantur, & matres pascunt. *Ichneumones*, minores sunt quàm aliæ, & unum genus ex araneis perimunt phalangium appel-

Moufet. de Insect. p. 45.

Varro R. l. 3. c. 16.

latum, & in nidos suos ferunt, deinde illiunt, & ex iis incubando suum genus procreant. Vocantur ita, quod *ἰχναί*, exiles nempe & graciles videantur. *Pseudosphæca* caput, fuscum, duo brèvia & gracilia in fronte cornicula; oculi magni, nigri, prominentes; os oblongum, bifurcum pectus crassum ac prominens, quibus tres utrinque pedes affixi; scapulæ densæ, gibbosæ; corpus procerum, gracili, articulatam; alæ fusæ, duæ; pedes hirsuti, & colorem alarum affecuti.

Parnopes uvas tam maturas quam immaturas exsugunt. Unde ita dicantur, nescire me fateor. Noctuarum stridularumque præda sunt. *πεμφρίδαν*, Nicand. Scholiasti, est animalculum *σφηκώδες*, minus ape, majus formica, aligerum, albo nigroque colore varium. Montes saltusque incolit, & è fruticum floribus melleos succos carpit, & in cavis quercubus stabulatur. Idem esse cum *πειθρήνη*, aut *πειθρίδαν*, non facilè dixerim. *Ἰέμελις* apud Nicandrum ex vesparum quoque genere insectum, *μέλαν κατὰ τὴν χροίαν, κέντρον χεῖρον*, coloris nigri: aculeo utens: Vocatur, ni fallor, & *βέμελις*. Nicander sylvestre & montanum facit. De *parvis* nihil singulare occurrit. *Magnarum*, quædam capita nigra, & aculeos plurimos habent. *Flavæ* Ardoyno *citri-næ*, in duas divisæ partes, in medio tenuissimi ligamenti beneficio hærent. *Indæ* sunt & domesticæ, quæ innoxie, & sylvestres, quæ virulentæ. Quas Oviedus descripsit, sunt corpore magno, colore luteo, ad album tendente, alis maculatis nigris, extremitate aliquantulum albicante. *Spuriæ* apum aut muscarum figuram obtinent. De *Venenatis* in sylvestribus & Indicis dictum. *Laertæ* huc spectant, quia mortiferam plagam, ut laertæ viperæ formicæ inferunt. *Solitariæ* in muris & aggeribus congestis nidificant. Ante ostium foraminis lutosa ponitur porticus. Longitudo ejus duos quasi transversos digitos æquat: intus lævigato luto emplastratur. In *aculeatas* & *non aculeatas* distinxit Aristoteles.

Nicand. in Theriac.

Ardoyn. l. 8 de Venen.

Moufet. lib. cap.

Aldrov. de Inf. l. I. c. 6 p. 202. edit. Bononiens.

De suis ita Aldrovandus. Quæ à me observatæ sunt vespæ.

Prior vesparum omnium, quotquot observavi maxima est toto corpore atro, præterquam in superna alvo, ubi quatuor sunt maculæ luteæ, illæ scilicet quas albas icon exprimit. Caput minus, quam in plerisque aliis à cervice distinguitur, in quo oculi nonnihil lutescunt. Antennæ sunt magnæ, & latiores, quam in aliis, nigrae, nigri quoque pedes, & hirsuti. Alæ argenteo, & aureo obscuro ad castaneum inclinate resplendent.

Secundum genus est vespar. minimarum, alis proportionè latiusculis, & oblongiusculis subflavi coloris. Corpore toto ex nigro ad castaneum vergente, sed zonis

ex albo flavis ad croceum inclinantibus distincto. Caput erat exiguum valdè, punctis duobus croceis ferè, supernè insignitum. Oculi nigricabant, antennæ nigerimæ in extremo obtusæ. Pedes exigui, colore croceo.

Tertia magnitudine Vespæ vulgari compar, vel paulò minor, sed tota atra, antennis, pedibusque longissimis, capite ovali, albo breviori, lineis exiguis transversalibus, subflavis distincta, tenui ligamento pectori annexa. Alæ vero argentæ, splendide, subrubris velut venulis percurrentibus præditæ.

Ex minimarum genere sunt *quarta* & *quinta*: quarum *prima* tota atra est, capite nimirum, pectore & albo, quæ partes ferè æquè magnæ sunt, quod in aliis non observabis: Pedes quoque nigri sunt, & leves, antennæ item nigrae & exiles: Alæ fuscæ. *Altera* capite item est nigro, rotundo. Huic antennæ breviores sunt, sed nescio quid velut tricuspidem exerit; pectore est angusto, qua capiti hæret latiore, ac lutescente, quæ albo angustiore & nigro, albo ferè rotunda, primo lutea, dein modo lutea, modo nigro varia. Alæ ad aureum colorem accedunt.

Allatam ad me eam, quæ *sexto* loco depingitur, propter miram capitis formam. Simiæ, quodammodo aspectum æmulantem, Vespam sinuformam nominavi. Tergore est crasso, rubicundo: rubicundo item vertice, oculis nigris, majusculis, infra linea semilunaris, ceu os constituit. Alvus item crassa est, sed tenui pellicula tergori adhæret; Anterior nigricat, in extremo candicat, punctis transversalibus nigris. Alæ fusca, sed perperam duos tantum pictor expressit.

Septima inter magnas & parvas ambigit, tota atra, sed maculis undique aureis, aut flavis interstincta, iis autem, quæ in expresso icone albæ apparent. Pedes non ut in aliis Vespis, tenues, sed crassi respectu corporis, quod compactius est, colore subcroceo, antennæ aterrimæ, exiles & breves, Alæ cinereo luteo.

Octava icon, Vespæ est imperfectioris, quam ut posset volare, seminympa adhuc, ut ex nympa recens orta. Corpus ex albo ad luteum vergere incipit, nondum maculis distinctum. Est ejus generis, quod decimo subinde loco depingetur, nimirum favis insidens.

Nona pectore est longissimo: albo mediocris longitudinis, ita invicem hærent, ac si duæ diversæ essent Vespæ. Tota flavo & nigro colore alternatim constat, pedes & antennæ sunt longi, sed valdè tenues, coloris ferruginei. Ferrugineæ quoque alæ sunt quatuor, quanquam trinæ tantum sint depictæ. Caput quoque luteo, & nigro colore variat.

Decima ejusdem omnino cum novissimè descripta coloris est, sed breviori pectore. Vespeta talia quali insidet, ferè ædificat, vel ad fenestras, vel ad arborum ramos, vel alicubi alio in loco.

Undecima elegans genus sylvestrium vesparum est, albo miniacei coloris, sed annulis nigris, & nigra podicis extremitate. Alas habet quatuor, oblongas, sed angustas coloris ferè cinerei. Pectus, & dorsum nigricant, & ad ferrugineum vergunt. Caput ejusdem est coloris, rotundum, exiguum: antennæ verò longiusculæ, nigrae in extremo acutæ.

Duodecima tota est coloris fusci, ad atrum vergentis, pedibus longiusculis, longis item antennis: capite, & alis nonnihil ad ferrugineum accedit.

Decimotertio, ac postremo loco depictum Vespis congener judicavi, quanquam revera nondum didicerim an favificet. Corpore ex procero, nigro, & flavo coloribus vario, tenui. Alas pictor duas expressit, sed nunquid vel duas, vel quatuor habeat, ut quod res est dicam, ignoro. Capite interim Vespas potius, quam Muscas refert. Antennæ in extremo obtusæ sunt. Pedes sublutei. Moufeti Hungaricæ, quas Vienna accepit, dorsis erant luteo atroque variè pictis; Corniculis huic pilosis, illi glabris; tertia penè parte vespis vulgaribus majores.

CAPUT IV.

De Crabronibus.

DIVERSUM à Vespis Crabrones genus pono; quod in corpore tantum discriminis appareat. Nec placet ab Aristotele & aliis abire, qui diversis capitibus de iisdem egere. *Nomen* ipsi apud Latinos vel à Crabra in agro Tusculano, ubi perfrequentes sunt; vel à cabo, seu caballo, ex quo creantur, ut Isidoro visum, *Isid. l. 12.* obvenit. Scaliger à craceo deducit, à quo Craber & Crabro: alii à κρέας caro & βόρα cibis, quod carnibus vescantur. Græcis est ἀνθρῶν, fortè quod ictu carbunculum excitet.

Duplo vespis sunt majores forma proximè ad easdem accedunt. *Alis* instruuntur quatuor, quarum externæ internis duplo minores, & humeris obscure fuscis & castaneo colore tinctis, affiguntur. *Pedes* habent sex, ejusdem cum pectore & humeris coloris. *Caput* oblongum, croceum. *Oculi* sunt propenduli *σέλινος δὲ*, inter quos antennæ duæ oriuntur, falcis æmulæ, ejusdem cum pedibus coloris. *Venter* tenui quasi filo humeris annectitur: cujus

Nomen.

Isid. l. 12.

Descriptio.

Moufeti. de Insect. l. 1. c. 9.

cujus anterior pars media, fusco colore, & cingulo croceo notatur: posterior, tota crocea videtur, acto fuscis punctulis notata, una cum triangulo parvo, incisuris præterea quibusdam in utraque parte existentibus, quibus se extendere & contrahere pro lubitu possit. Juxta ventrem maculas utrinque quatuor nigras habet, & in *cauda*, aculeo longo, robusto & maximè venenato armatur. Hoc inter crabrones & vespas intercurrit discriminis, quòd vespis sint majores, alvum minus gracilem habeant, ejusque pars, quæ tenui ligamento thoraci annectitur, multò sit latior; thoraxque compactior.

Locus. Favos (*αὐθρία* Suidæ) sub terra, quam formicarum instar egerunt, faciunt: duce ab alveis aberrante, sublimia & arborescunt. Ideo Plinius in cavernis arborum degere scripsit. Nidos ad amussim omnes ferè sexangulares ædificant. Exterior facies candidis ferrugineisque segmentis distinguitur: materia membranacea est, & betulacei corticis per æstum in laminulas fatiscentis peræmula. Lenta quadam saliva, & gummosis foliis, pluribus ob prolem tabulatis adaucti eleganter poliuntur: Duos Aldrovandus observavit, de quibus ita scribit. Inveniuntur quinis aut senis, & ut plurimum sex ordinibus, seu tabulatis constricti, cujusmodi is erat, quam agricolamæum, cum quercum per medium ferra divideret, offendit: cujus cacumen in super trunci cavi parte situm, tecti loco fungebatur, substantia membranea betulæ mediano cortici simili, quam ex populi nigræ & salicis ligno putrilaginoso, ac pulverulento ab excedente carie, humore glutinoso iis peculiari, compingere dicuntur: nec ea contigua, & solida est, unica veluti membrana constans; sed pluribus: ita ut lancellæ plures sibi mutuo adhærentes videantur, in eo, quod inter ipsas intercedebat interstitio, rotundos quosdam ductus canalium modo seu fistularum continuo ad fundum, seu ultimum orbem via, effinxerant, per quos supernæ deorsum ferri possent, in fundo autem cortex, quo totus alveus circumvestitur, patulo aditu dehiscebat, utpote per quem alvei penetrabilia subeuntes, ad singula tabulata ascendant, inerant enim, & singulis tabulatis sua foramina satis ampla, per quæ in singulas cellas singulæ se recipere poterant. Observavimus quoque alveum tam prudenter ab his fuisse conditum, quam ab aliis quibuscvis, aut apibus aut vespis, nam superna arboris cavæ parte uno latere, in quod nonnihil parte superiore reclinabat, suspensus erat, eo situ, ut cellularum oscula deorsum propendentia fundum antri arborci spectarent, & crabrones ac eorum Nymphæ, & vermiculi capite deorsum

tanquam ruituræ conderentur, nec id aliam ob causam quam ut ab omni aëris injuria, & quæ desuper in ea arbore incidere poterant, pluvia, aliisque utpote adrepentibus tutiores essent. nam si cellulæ ea parte, qua patent, cælum spectassent, magnis certe incommodis obnoxii fuissent, singula autem tabulata ejusdem erant materiæ, cujus cortex exterior versicoloribus lineis albis dico & ferrugineis, tanquam segmentis interstinctæ. Reperiuntur nonnulli quoque alvei Crabronum majores multò, quam prædicti, & septem tabulatis exornati ejusmodi rure meo in tuto reperi trahi appensum, altitudine duorum dodrantum circumferentia, quinque iidem lineis aut cum superiori eminentibus albis & ferrugineis, tabulatis rotundis tanquam orbibus cellulis plenis, digitum transversum altis, quæ digitorum duorum latitudine à se invicem distabant, ad facilem singulis ingressum; hæc columnis optimè erant fulta, in superiore hujus nidi parte foramina erant majora, in quibus parentes degebant, in inferiori minora, in quibus filii.

Quia Cibus in favis per hyemem non recondunt, ideò jejuni tum latent, & plurimi moriuntur. Vescuntur muscis majoribus. Captis caput abscindunt. Uvas corrodere vel inde constat, quod autumnis tempore frequentes vites circumvolitent. Carne quia magna ex parte, Aristotele teste vivunt: ideo in stercorebus sæpissimè versantur. Aves ubi cæperint, accipitrum ritu, caput primo vulnerant, deinde abscindunt. Pennius in Petropoli, in publico urbis vico, passeri accidisse vidit. In India oleum, butyrum & reliquos cibos infestant, ut nihil intactum ferè relinquant.

Ex equorum cadaveribus oriri, plærique cum Ovidio, sentiunt: ex asini cerebro Landus; ex durioris carniū equi parte, ut vespas ex teneriore Moufetus. De Coitu ita ex Aristotele & Plinio Aldrovandus. Quod (verba sunt Aristotelis) ad generationem, cognatorum iis (Apibus) animalium pertinet, ut Crabronum, Vespærumque, similis quodammodo ratio est: sed defuit his locuples naturæ dotatio merito. Nihil enim apum genus habent divinitatis. Generant quippe matrices vocatas, primosque favos confingunt. Generatione verò coeundo inter se finguntur. Visus est enim sæpè eorum coitus. Fæturam autem Apum modo instillant ad latus cellularum favi, & parietibus admovent. Sed quemadmodum Vespærum fætus, ita quoque Crabronum haud est æqualis, nam aliis cellis grandiusculus inest, ut quæcat volare, aliis Nympha, aliis adhuc vermiculus. Excrementorum vermiculis tantum ut & in Apum genere est. Nam ut ait Aristoteles, Apum & Crabronum &

Vitis.

Arist. H. A. l. 9. c. 42. Moufet. lib. cap.

Generatio. Ovid. Metam. l. 5. Landus de Num. vet. Arist. de Gener. l. 3. c. 10.

Vesparum vermes, quamdiu recentes sunt: tantisper & sterus emittere videntur: at cum formæ lineamenta receperint, sub qua facie Nymphæ appellantur; Jam neque cibum præterea coquunt, neque ullum reddunt alvi excrementum, sed coerciti, & contracti quiescunt, nec ullo pacto movere se patiuntur, usque dum species destinata perficiatur, quo pacto evolat proles rupto quo continebatur folliculo. Cæterum quod foetus inæqualis sit, Plinio quoque traditur. Foetus (inquit tam de Crabronibus quam de Vespis) ipsæ inæqualis est & Barbarus (alii legunt ut Barbaris) alius evolat, alius in Nympha est, alius in vermiculo. Et autumnus, non Vere omnia ea. Plenilunio maxime crescunt. Mellis quoque paululum quantum gutta, in cellis Crabronum è regione parari scribit Aristoteles, Schadonesque hujus generis non vere, sed autumnus fieri, crescereque plurimum plenilunio.

Antipathia.
Palla. R.
R. l. 8.
tit. 7.

Vespis amici sunt. Ideò percussi à Scorpionibus, nec à Vespis, nec à Crabronibus feriuntur. Muscis inimicos esse de victu dictum. Inter Caniculæ & Arcturi ortum, apibus prodeuntibus antè alvearia plærumque obsidiantur. Juvencis quoque sunt infestissimi. Melis plenio illorum antra ingreditur, totamque familiam destruit.

Natura.

De *Natura & Moribus* pauca occurrunt. Ducem unum habent, magnitudine corporis majorem, eumque impensè amant. In singulis hiecorum alveariis oritur, contra hostes foris pugnacissimus; facillimus domi erga subditos. Nulla fit examinis, ut inter apes emissio; novella profapia sinu parentum favetur, & ad illius conservationem plures contignationes superstruuntur. Amplificant, inquit Moufetus, majorum in modum favos, & jam ex valentiore quodam grege, quales tres aut quatuor favorum plenos excepimus. In cellis parum mellis quantum gutta è regione prolis paratur. Majorem quam Vespæ inter volandum sonum edunt. Cicurationem non admittunt: & tantæ sunt malignitatis, ut Syrio præfertim orto, ter novenis ictibus, hominem, imò & Equum interficiant. Haud temerè sine febre esse, dixit Plinius. Remedia in Vesparum historia posuimus. Majore duntaxat quantitate, hic exhiberi debent.

Avien. in
Carmin.

Si luce crepera, sæpius nidos intraverint, quasi se occultaturi; pluviam & ventos expecta: serenitatem proximæ diei, si vesperi numerosiores obvolitavere. Jejunos per hyemem latere, superius dixi.

Ufus.

De *Ufu* nihil habeo quod dicam, nisi quod Mizaldus prodit, aqua destillationis eorum, cutim attractam, in tumorem attolli. Mentiri sic imprægnationem coram amas meretriculas.

Nec de Differentiis quicquam occurrit. Quæ hic de Tenthredine, Tenthrene, & Pemphredine Moufetus habet, in capite de Vespis allata sunt.

Differentia.

CAPUT V.

De Cicada.

HActenus de Anelytris quadripennibus membranaceis, favificis dictum: jam de illis quæ non favificant agemus, & primum de *Cicada*. Nomen apud Latinos seu quod cito quasi cadat & evanescat; seu quasi invenit *κίκα* & *αδαν*. Apud Græcos pro regionum, sexus, ætatis, & magnitudinis ratione, varia obtinuit. Generaliter vocatur *τίτλις*. Eleis *βαβακ*, Sidetis *σειγέρ*, Ponticis *βάτραχ*, Cretensibus *σύμφυρον*. Suidæ popularibus *έρση*, quod rorem exugendo vivat. Fœmina non vocalis Æliano est *κεκώπη* & *καλαμαία*: Athenæus tamen simile cicadæ animal credit. Novella, *κίκα* & *κίλλ*, parva *καλαμαία*, *καλαμίδας* & *κεκωήτας* alii dicunt. *Τίτλιγνια* etiam Cicadastræ significant, ut apud Cælium legimus. Epitheta apud authores plurima invenies. Dicuntur *πελαγίδες* à volando: *τετραπτελιδες*, quod quatuor pennis in aere remigent: *αμήτροι*, quod nimio cantu se oblectent: *φίλομεροι*, quod tempestate pluvia plurimæ nascantur; *ήλιομανές*, quod infano solis amore capiantur: *αΐθαλινες*, *παρά τὸ αἰδεσθαι ὑπὸ τὸν ἥλιον*, quod à sole comburantur: *κυανόπτεροι*, quod alas cyaneas habeant. Virgilius *querulas & argutas* dixit Nemesianus *æstivas*: quidam *graciles* dixere. Pontanus *Choralistriam* vocavit, quod alternatim & chori instar canat.

Aldrov.
de Ins. l. 2.
cap. 13.

Nomen.

Athen.
Dipnos.
lib. 4.
Hesych. in
Lexic.

Virg. in
Culic.
Nemes. in
Eclog.

Vulgares ita Moufetus descripsit. *Vulgarium caput pronum, magnum videtur; & pentagonum imitatur, lateribus inæqualibus finitum. Colore est viridi nigricante; (Aldrovandus superiorem corporis partem nigram ponit, inferiorem ad nigrum vergentem: unde & Martialis nigram fecit.) Utrunque tumulos duos obtinens, ejusdem coloris, sed ovalis figuræ, & margine quadam fusca circumseptos; fusca item linea tumulos secant medios; mediumque caput jota litera nigerrima dividit. Oculos habet ex fusco non multum viridantes, prominentes quidem & magnos pro corporis ratione: (immobiles adde & lucidos, ut mirer Nigidium; qui cicadis oculis negavit, eos non vidisse) Supinum caput sive facies, diluto ex albo viridiusculum apparet. Inter insecta omnino in hoc animalium genere una, ore caret: habet tamen prolixum quid, compactum, indivisumque, intus plerumque conditum, quod veluti promuscis, tum oris, tum lingue usum supplet; denis striis transversis affa-*

Descriptio.

Mart. l. 1.
Epig. 116.

Arist. H.
A. l. 4. c.
30.
Plin. H.
N. l. 11.
cap. 37.

affabrè canaliculatum. (Plinius linguam fortè appellavit : figuræ est triangularis ; coloris castanei.) *Corpus capiti brevissimo collo, vel potius nullo annectitur : Scapula, ex viridi & nigro maculata ; pectus viride magis albicat, (durum hoc, ideò Martialis vetulas, pectus Cicadæ habere dixit.) è quo tres utrinque pedes tibiæque erumpunt præsini coloris.* (Aldrovandus subtilissimos, & in fine asperos, ut arbores conscendere possent, addidit) *Venter, in majoribus duos digitos transversos aequat, latitudine unum : interna ventris pars, peltam refert in apicem desinentem, & limbo duodecem tredecemve articulis constante cingitur : intus incisura aliquot apparent concolores ventri, caudamque extremam mares, id est, minores, fissam habent ; foeminæ contrà integram. Dorsum nigricat, septem vel octo lineis & incisuris virentibus, transversim ductis ornatum. Alæ pulcherrimæ, argento illitæ, navisque fuscis & maculis cum ornatu pictæ, externa internis duplo longiores sunt, magisque variegatæ. Membranæ quia sunt, ideò* *ὑμεροπτεροι* *vocantur. Pennarum illis natura quæ apibus, sed pro corpore amplior, dixit Plinius.*

Plin. H. N. lib. 11. c. 16. 18.

Locus. Arist. H. A. lib. 5. cap. 30.

Plin. H. N. lib. 21. cap. 27.

Aldrov. de Inf. lib. 2. cap. 13. Nol. lib. 1. cap. 1.

Vitus. Arist. H. A. lib. 5. cap. 30. Virg. Ecl. 5.

Altom. 1. de Man-na.

Arist. H. A. lib. 4. c. 7.

Non visuntur in septentrionalibus regionibus : quod frigus averfentur. Nec apud Cyrenam in campo ullæ, cum circa oppidum multæ proveniant. In nemoribus umbrosis frustra quæras. Ideò oleas, quia minus opacæ ambiunt. Nullas in Gecalia agri Nolani monte, nullas Neapoli proditum : seu Maronis magia id factum, ut Nipho placet ; seu incolarum industria qui arcere norunt, seu terræ ipsius genio. Scio quid signis & scripturis, quæ *σοιχέα*, adscribatur. Copiosas Italia, Narbonensis Gallia, & Ægyptus ferunt. Mirum verò, in Milesia regione paucis esse locis. In Cephalenia amnem quendam penuriam earum & copiam dirimere. In Dulichio maris Jonii insula idem observatum. Vesuvium, qui agrum Nolanum à meridie claudit eas nescire ; Abellam, quo monte idem ab Arcto sepitur, plurimas producere. De mutis & vocalibus in Differentiis agemus.

Rore vesci, præter Aristotelem, Theocritus & Virgilius prodidere. Excitatæ, cum subvolant, inquit Plinius, humorem reddunt, quod solum argumentum est, rore easdem ali. Quia verò ore carent, quiddam aculeatum linguis simile pro eo habent, & hoc in pectore est, quo rorem lambunt, Antonius ab Altomari ex fraxini & Orni præcipuè ramis cortisibusque lachrymam fugere dixit. Ex herbis vel de herbis more papilionum id facere, probabile est ; tum quod jejunæ semper & inanes reperiantur, quòd nihil excernere conspiciantur ; nisi fortè ubi plusculum roris

absorpsere, superfluum ejus partem, ut rustici notarunt, removendo ejiciant. Aristoteles tamen alimentum Cicadarum, in ipsa corporis humiditate situm esse, opinari videtur : foramenque se conspexisse dicit, per quem aquosum, qui in ventre cotinetur, humorem, ejiciunt.

Arist. de part. anim. lib. 4. c. 5.

Ex Cuculorum sputo nasci fabulatur Isidorus. Provenire & ex putri, verisimile est. Vidit Baldus Angelus sub quercubus rarioribus, imperfectas, forma solita, albas, & sine alis effossas, cum terra non culta, & ad Orientem obversa fodere. Novimus & Anguillas ex limo nasci, quæ postea more cæterorum animalium generant : & circa Ægyptias Thebas post vehementes in æstibus pluvias, universa arva foricibus impleri, Basilii prodidit. Sed & lutum, si non debito tempore proscindatur, Cicadas proferre, testatur Paracelsus, & ante eum Hesychius. Ordinariè per coitum generant, Coitus supinis : masque inserit in foeminam, quæ genitali reciso, recipit quod à mare injicitur. Asperitate quæ in dorso, excavant foeturæ locum in terra. Quapropter magna Cicadarum, in agro Cyrenensi copia est. Pariunt & in squillæ caulibus : & in arundinibus quibus vites eriguntur, nidos foeturæ cavant. Ova alva deponunt. Fit primò vermiculus : dein ex eo, quæ vocatur, Tettigometra, (theca est, aureliæ papilionum similis,) cujus cortice rupto, circa solstitia evolvant, noctu semper : primum nigræ atque duræ. Tettigometra in eo à Chrysalide differt, quod in hac nulla sit partim distinctio : in illa, caput, oculi, pedes, cæteræque partes exceptis alis, apertissimè conspiciantur. Color ei subalbidus, sed qui multis lineis subferrugineis respergitur. Quomodo exeat, Aldrovandi verbis visum exprimere. Cum è Tettigometra egredi cupit, inquit ille, ascendit primum arborem, & illico alicui ramo adheret, (quamvis scribat Aristoteles, ubi Cicada cruperint, oleis & arundinibus insidere) deinde exit parte superiore, in qua rima primum apparet ; rupto autem operculo, ut rectè scripsit Philosophus, parum in eo relinquunt humoris ; nam hoc operculum cum manibus contrectarem, humore aliquo aquoso digitos illevis. Iam tum simul atque Cicada emerfit, toto ferè corpore viridis est, dein superiore parte aliquantum ad castaneum vergit, quæ spacio unius diei subnigro fit colore, insidet tam diu huic exuvio, donec volare incipiat. Imbecillis enim primum sunt alæ pedesque, ut difficulter incedere queat. Exuvium hoc *τράπιν* dici Hesychius reliquit : aliis est *λεβυρίς* & *γύρας*. Lucretius modo tunicam ; modo folliculos nominat. Æstate deponi addit.

Generatio. Isidor. iii. Origin.

Basil. in Hexam.

Plin. H. N. l. 11. cap. 26.

Plin. H. N. l. 11. cap. 26.

Lucret. l. 4. c. 4.

Hyeme, imò in autumnno perire, apud Ari-

Ætas.

Aristotelem & Plinium habetur : in montium antris aut terra se condere , ex Aristophano quidam evincere conantur. Temperamentum in causa, quod quam aliis insectis frigidius.

Cantus. Cuculo infestas esse, eumque audita voce invadere, creditum quibusdam. Ideo sub exortum caniculæ cuculare desinunt.

Quia sonoram vocem edunt inter insecta *ἐν τῇ ἀδᾷ* numerantur, *τετλιζεν* id Græcis, *frittinnire* Latinis. Theocrito à sono *τέτλιζες* *καλαζάντες* dicuntur. Ambrosius *dulcem in exiguo gutture Cicada cantilenam* dixit. Platonis eloquentiam Simon Sillographus, Cicadarum cantilenis comparavit : eundemque sonum & citharæ & harum veteres *τῶν περὶ τὸ ματὶ* nomine vocabant.

Ambros.
Hex. c.
22.

Incipiunt autem æstate canere ; minores citius, quod citius è Tettigometra exeunt. Achetas sub Syrio astro canere, cum capræ & vinum optima sunt, apud Hesiodum habemus. Plinius cantus acerrimi facit, quo tempore Scolymus floret : floret autem serò, diu, & æstate. Alibi solstitium, æstivum scilicet, ponit. Aliquot post auroram horis, cum sol validius ferit, canere, vel ex Poëtis colligi potest. Hinc Vergilius.

Virg.
Ecl. 2.

Sole sub ardenti resonant arbuta Cicada.

Quam diu canant sciri non potest : autumno filere cognitum.

Bas. Hex.
Hom.
8.
Cardan.
de variet.
Rev. l. 7.
c. 28.

De modo non convenit. Ægyptii per aculeum emodulari, & motu suo stridorem ciere, veluti plectrum quo citharæ pulsantur, opinati sunt. Basilio, aëris respiratione id fieri visum. At quia & pulmonibus carent ; & capite, cui illa fistula inhæret orbæ, canunt, nihil horum est. Multo minus verum, vel dentes inter se atterendo, quos in commissura Scapularum haberent, id facere, vel alarum attritu, (hæc Procli Diadochi sententia) quod locustis fuetum. Membranulæ sub flabellis (sic vocant operimenta illa duo, post postrema crura ventri adhærentia) reverberationi id adscribendum. Sonant quippe, ut brevissimè Aristoteles, alliso ad membranam septo transverso subditam spiritu. Nam dum illa eo pacto distenditur ac remittitur, sursumque ac deorsum impellitur, sonus erumpit stridules, non secus quàm in puerorum arundineis fistulis pellicula tenui constantibus ; qua depressa, intenta, vel vibrata, sonitum fieri necesse est. Ælianus *κατὰ τὴν ἕξιν καλεσάτων* esse dixit. Pierius Valerianus, colliso, attrito, agitatoque cavo utero. Quia verò hæ partes subalis, haud improprie veteres Poëtæ Cicadas subalis canere dixerunt.

Arist. H.
A. l. 1. c.
20.
Pier. Hierogl. l. 26.
Natura.
Moufer.
de Insect.
l. 1. c.
17.

Hominum ita gaudent consortio, ut agros messoribus vacuos si viderint, submissius & rarius canant : si concinentes hos

audiverint, maximo laterum cantu, *πολύφωνοι καὶ ὁξύφωνοι* adstrideant. Æstatem certo præfagiunt, nec unquam post Cicadæ adventum frigus rediisse visum est. Quod si citius solito aliqua die cecinerint, æstum majorem expecta. Tempestuosum tempus, si ab austro venerint : morbidum & pestilentem annum, si frequentes appareant. Raræ tamen Anno. MDLXXV. grassente in Italia peste visæ, quòd rore destituerentur.

Vescebantur Athenienses assis, quales & in Cotiis convivio appositæ Athænæus author est. Ante coitum Parthi mares præferunt ; à coitu fœminas, ovis earum correpti, quæ candida, suavissima eadem antequam cortex cadit, si Aristoteli credimus. Carabi Americæ juxta sinum Darienem populi, siccas vel salitas apponunt. Pro aliis mercibus commutari, Oviedus prodidit. Cedunt & canibus in escam : idque canis Aldrovandi exemplo.

Habent & in Medicina locum. Trallianus exsiccatas, & contritas alis ac pedibus abjectis, in balneo cum mulso, contra calculum exhibere jubet. Galenus à quibusdam, tres, quinque aut septem cum paribus piperis granis, in Colica laudari scribit. Apud Æginetam, compositio *diatettigon* occurrit : quam & apud Myrepsum invenies. Quidam ad urinam ciendam cantharidibus substituunt. Ætius, tres ex vino exhibet. Utilissimum eadem apud Aretæum contra vesicæ laxamentum remedium. Aridæ & tritæ cum aqua & radicis nardi pauxillo elixantur. In iisdem æger, loco balnei, ad vesicæ laxamentum, desiderare jubetur. Lanfrancus ad frangendum calculum Cicadarum spodium, ex aqua raphani vel cicer. decocto magni facit. Merum an aqua dilutum vinum sit, Cicada cognoscitur. Natat si illud : si hoc mergitur, si Gaudentio Merulæ fides.

Cicadarum plura sunt genera ; quorum quædam, quod solo nomine ab antiquis prodita sint, difficulter cognoscuntur. Ælianus ; *Membracis*, *Lachetarum*, *Cercopis*, *Acheto*, & *Acanthiæ* meminit. Quid sibi per priores velit, non intelligo. *Cercopæ* Dalechampio, fœminæ, mutæ, pusillæ, oblongæ. *Acanthias* epitheton potius est quàm generis nomen, seu ab acantho seu spina in qua habitare solent ; vel ab Acantho Athamantum urbe in Ætolia, ut Stephanus prodidit, quæ quoniam ferè consulescunt, inde receptum, ut qui non loquuntur, eo insigniantur nomine. *Acheta* major est Cicada. Apud Aristotelem, quoque & Plinium, *Achetarum*, *Tettigoniarum*, *Minorum*, *Majorum*, *Subulariarum*, *Frumentariarum*, & *Avenariarum* mentio. *Acheta* sunt, ut dixi majores, quorum corpus, sub septo transverso

Mercuria.
de peste
cap. 6.
Ulus.
Aristoph.
in Horis
Athen.
Dipnos. l.
4. c. 2.
Plin. H.
N. l. 11.
cap. 26.
Arist. H.
A. l. 5. c.
30.

Differen-
tiæ.

Arist. H.
A. l. 10.
c. 44.

Arist. H.
A. l. 5. c.
36. & l.
4. c. 7.

verso præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex Hesychii *καλας*, quam *μεγαλὴ κίτλη* exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, ideo Aristoteles *ἀφάρτοι* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ peræunt. Gaza Cicadadastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arescentibus appareant. *Avenarie* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*; *Fæminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio.

Mares vocales sunt, nisi natura soli impediat; fæminæ mutæ, quod *διζωµα* illud cuius figura fructui. *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translatae garriunt. Uterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si aliò transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro silere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita. 2. 5. Cicada lienis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra.

Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire coepit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involuero egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

verfo præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex Hesychii *καλας*, quam *μεγαλὴ κίτλη* exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, ideo Aristoteles *ἀφάρτοι* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ peræunt. Gaza Cicadadastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arescentibus appareant. *Avenarie* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*; *Fæminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio.

Mares vocales sunt, nisi natura soli impediat; fæminæ mutæ, quod *διζωµα* illud cuius figura fructui. *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translatae garriunt. Uterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si aliò transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro silere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita. 2. 5. Cicada lienis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra.

Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire coepit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involuero egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

verfo præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex Hesychii *καλας*, quam *μεγαλὴ κίτλη* exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, ideo Aristoteles *ἀφάρτοι* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ peræunt. Gaza Cicadadastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arescentibus appareant. *Avenarie* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*; *Fæminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio.

Mares vocales sunt, nisi natura soli impediat; fæminæ mutæ, quod *διζωµα* illud cuius figura fructui. *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translatae garriunt. Uterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si aliò transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro silere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita. 2. 5. Cicada lienis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra.

Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire coepit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involuero egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

verfo præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex Hesychii *καλας*, quam *μεγαλὴ κίτλη* exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, ideo Aristoteles *ἀφάρτοι* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ peræunt. Gaza Cicadadastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arescentibus appareant. *Avenarie* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*; *Fæminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio.

Mares vocales sunt, nisi natura soli impediat; fæminæ mutæ, quod *διζωµα* illud cuius figura fructui. *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translatae garriunt. Uterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si aliò transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro silere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita. 2. 5. Cicada lienis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra.

Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire coepit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involuero egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

CAPUT VI.

De Orsodacna, & Cimicibus sylvestribus.

ORSODACNA, Gazæ *Mordolla* est, quasi ad mordendum concitetur. Constat 4. pennis, ore largo, & penè denticulato pustulasque puerorum appetit. Nasctur secundum Aristotelem ex vermiculis immutatis, qui in brassicæ caule generantur.

Ex alatis sunt & *Cimices sylvestres*, iisque quadripennibus & membranaceis. Lectulariis sunt majores septuploque eos superant, æque ac illi foetidi. In malvis sæpius, in aliis plantis arboribusque coniferis, in ulmo & salice quandoque, reperiuntur. In Dariene quoque provincia reperiri, Cardanus scripsit. Coeunt mense maio averfis caudis, & finem Veneri per diem integrum vix faciunt. Mas minor, fæmina major & latior. Volant sole exæstuante satis celeriter, sed nec diu, nec longè.

Genera sunt variâ. Moufetus tres supinos & pronos, quos inter vaginipennes ponit, repræsentat. *Primæ*: inquit, dorium, collum, antennulæ, atque elytra porrum referunt; alæ elytris longiores ex viridi flavescunt, uti etiam oculi & pedes. *Secundus* undique infuscatur. *Tertio* corpus nigro rubroque varium, antennæ pedesque anthracini. Omnes aureo fulgore hic illinc micant. Quicklebergius ex agro Viennensi duas alias species ad Pennium miserat, aureo nigroque undulatas. De suis ita Aldrovandus: II, quos ego diversis temporibus observavi, differunt invicem colore magnitudineque & latitudine, sed pictor. deceptus nominis vicinitate exiguum quendam silicem, in quo humana facies expressa est, pro Cimice *primo* & *secundo* loco dipinxit. *Numer.* 3. Cantharidis potius quam Cimicis species. Pedibus enim est longioribus, quam Cimices habere solent. Undiquaque colori est miniaceo, sed maculis nonnullis atris respergitur. *Num.* 4. Cimex lectularius, nulli non notus. *Num.* 5. Cimex sylvestris non fœtens; undique subflavus, lineis fuscis. *Num.* 6. Colore flavo. Aliter versus caudam albescens. *Num.* 7. 8. 9. etiam flavescunt; sed veluti humanam ferè faciem per alas expressam gerunt. *Num.* 10. Colore ferme est castaneo, & alterius fermè generis, vel Cantharides vel Scarabæorum. *Num.* 11. Cimex sylvestris minor undique cinereus. *Num.* 12. Ex Scarabæis videtur, aut Ricino congener, si alati vultus, quod nondum observavi, ex cinereo ad castaneum vergit. *Num.* 13. Totus est coloris Castanei, lincis nigris in longum sectis. *Num.* 14. Cimex

verfo præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex Hesychii *καλας*, quam *μεγαλὴ κίτλη* exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, ideo Aristoteles *ἀφάρτοι* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ peræunt. Gaza Cicadadastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arescentibus appareant. *Avenarie* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*; *Fæminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio.

Mares vocales sunt, nisi natura soli impediat; fæminæ mutæ, quod *διζωµα* illud cuius figura fructui. *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translatae garriunt. Uterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si aliò transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro silere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita. 2. 5. Cicada lienis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra.

Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire coepit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involuero egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

verfo præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex Hesychii *καλας*, quam *μεγαλὴ κίτλη* exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, ideo Aristoteles *ἀφάρτοι* dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ peræunt. Gaza Cicadadastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Frumentariis* nomen, quod simul cum frumentis arescentibus appareant. *Avenarie* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*; *Fæminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio.

Mares vocales sunt, nisi natura soli impediat; fæminæ mutæ, quod *διζωµα* illud cuius figura fructui. *Thlaspi* parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeant. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translatae garriunt. Uterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*, Ptolomæo *Locanus*, modernis *Alessio* dicitur. Idem de Seripho insula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, si aliò transferantur, strident. Idem dixit in Rhegino agro silere omnes; ultra flumen in Locrensi canere: quod & Pausaniæ placuit. Umbrosa ibi opacaque regio in causa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Arescunt eadem in Locrensi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde stridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem scribunt. Ex *Guinea* delata *fusca* est, eamque Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarum sex alia genera observavit, de quibus ipse ita. 2. 5. Cicada lienis in alvo rufescentibus, cum ejusdem tettigometra.

Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis diriusculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire coepit; posteriores pedes quatuor in extremitates asperi sunt, quibus & ascendit & se sustinet, ne in eundem locum recidat: sunt & hi aliquantulum hirsuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera insecta pedes adipiscitur, habet & mediocres antennis *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto vicinior est ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involuero egressa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* prona, & supina.

atro cœruleus propè caudam tribus notis albis respersus. *Num.* 15. Colore est castaneo, macula in extremis alis cinerea. *Num.* 16. Luteus nigro & albo conspersus. *Num.* 17. Cinereus macula argentea. *Num.* 18. Cimex oleraceus atrorubeus, macula circa anum cinerea, Mordella vulgò. *Num.* 19. Mordella sive Orfodacne alia oblonga. *Num.* 20. Cimici & Ramptrenò simile insectum. *Num.* 21. Cimex Cinnabrinus cruciger. *Num.* 22. Cimex viridis. *Num.* 23. Cimex non foetens, atroviridis, guttis albis plurimis ornatus. *N.* 24. Cimici simile insectum cinereum ferè anelytrum. *Num.* 25. Cimici simile anelytrum aliud pedibus longis locustæ. *Num.* 26. Cimex ruber lineis nigris in longum insignitus.

De *Usu* si quæras, Matrhilus iis omnes vires demit. Plinius, hortenses in cinerem redactos, & cum oleo rosaceo infusos, contra dolores aurium variè commendat. Palladius, cum amurca, felle bubulo, foliis hederæ, & oleo, ad sanguisugarum virulentarum vulnera inungit. Arnoldus Villanovanus, contra disuriam, caput virgæ in oleum camomillæ calidum, in quo Cimices bullierint, mitti, & mox cum alio pistato innungi jubet.

Villanov.
Breviarium
4. c. firan-
gur.

C A P U T VII.

De Perlis vulgò dictis.

Aldrov.
Hist. In-
sect. 2. c.
10.

Moufet. de
Insect. 1.
c. 11. p.
65.

PERLARUM apud Italos nomen, huic quod descripturi sumus insecto, vel à rotunditate capitis, quæ perlam seu unionem æmulatur, vel à splendore inditum est. Quatuor omnes *alas* habent longas, robustas, cartilagineas. *Alvum* admodum proceram, quæ in volatu non incurvatur. Moufetus; qui *Libellas* vocat, ita describit. Corporis forma aut nihil discrepant, sed tantum coloribus. Corpora enim habent duas nonnullæ uncias oblonga & teretia, quæ in tres præcipuè partes dividuntur, caput, pectus, & reliquum corpus, quod caudæ vicem supplet. Caput cum oculis magnis emissitiis, ejusdem cum reliquo corpore coloris, collo est affixum brevissimo, cui priores duo pedes adherent, reliquis pectori annexis. Pedes item posteriores longissimi sunt, ut sese melius erigant, atque sustentent. Omnibus bifurcæ caudæ, quibus adversis coeunt, ac in coitu diutissime hærent. Maxima rusticorum pars ex majoris junci aquatici putrescentibus vermibus oriri autumant: quod ut verum esse concederem, coitum tamen non tollit, & vermium ex seipsis depositionem; ut hoc modo & medio æternum crescentes, sobolem propagarent. Tarde admodum volant minores, majores celerrimè, æstate concalescente solum conspicuæ. *Coeunt* more-muscarum. Mas

foeminæ insidet, ejusdemque sursum immittentis membrum recipit. Tenacissimè in congressu cohærent, & hærentes per agros volare visæ. Æstate & autumno cernuntur, hyeme latent. Volant velocissimè sæpè solæ, plærumque gregatim, rarò altè. Meridie stipiti alicui insidentes quiescunt. Unde proverbium prandendi tempus indicans, *la perla va à sticchi*.

Differunt variè. *Antennas* quædam habent, quædam non. *Caudam* bifurcatam quædam, obtusam & bifurcatione carentem aliæ. Propè aquas quæ occurrunt, cœruleo ferè sunt corpore. Aldrovandus viginti & ultra descripsit.

Prima ex mediocribus est, capite & toto corpore rufis, alis candidis, extremò macula nigra notatis, pedibus nigris.

Secunda capite perlam, sive unionem nequaquam refert, non enim rotundum est, sed acutum. Oculos habet enormis magnitudinis, subcœruleos. Pectus admodum crassum: alvum proceram, tènue, totà lutescit, nigroque ut pictura expressit, maculatur, alæ sunt subcœruleæ.

Tertia alas habet breves, ad subcœruleum inclinantes, alvum longissimam, tam subtilem ut mirum sit, quomodo eam regere possit. Oculi quoque ut in proximo, maximi, sed caput orbiculatum, infra candidat, per dorsum superne ad latera lutescit, in medio ferrugineo colore est. *Antennas* habet admodum breve subflavas.

Quarta ex mediocrium genere est corpore toto purpureo, aureis zonis undique interstincto, alis planè argenteis, nigro maculatis.

Quinta alas quoque habet argenteas, sed non tam resplendentes. Maculam in extremo singulæ habent nigricantem. Corpus totum aurei fere coloris est, nigricantibus zonis interstinctum. Pedes sunt atri.

Ex maximis est, quæ *Sexta* in hoc ordine depingitur speciosa ac elegans Perla, capite, pectore, ac dorso viridis, alvo tota cœrulea, per quam linea fertur à dorso ad extremum usque aterrima. Alæ cinereæ sunt, pedes nigri.

Septima oculos habet virides, tota lutea, nigro maculosa.

Minimarum generis est *Octava* alas habens argenteas, corpus viridescens.

Nona ex maximis est, capite dorsoque viridis, alvo dilutè flava primum crassa, dein tenui, alis sine maculis.

Decima toto corpore est flavo, nigro interstincto, pedibus etiam flavis, alis cinereis splendidis.

Undecima alas habet subflavas, & corpore toto flavo est, exceptis zonis, quæ sunt ferrugineæ.

Duodecima tota viridis est, maculis quatuor candidis, in alarum extremitatibus.

Deci-

Differen-
tiæ.

Decima tertia Alas habet breves, & latus, primum virides, deinde cœruleas, cuius coloris quoque totum est corpus à capite ad anum usque præter oculos & pedes, qui atrii sunt. Oculos autem habet enormiter magnos, ac prominentes. Alvus in exilem acutiem velut acum definit.

Decima quarta, etiam aquas prosequitur, toto corpore viridi, nigris, exiguis zonis distincto. Oculi protuberant. Alæ quæ corpori hærent argenteo colore, & splendore micant, dein cœruleæ sunt, argenteis venis refertæ.

Decima quinta minimarum generis pedes habes longissimos. Araneorum pedibus non dissimiles, sed admodum exiles. Corpore, alisque ex luteo subalbidis est, cauda simplici.

Decima sexta ex minimis est, tota fere viridis, sed à lateribus tergoris lutea. Oculi candicant, pedes nigri sunt.

Decima septima cum decima quarta admodum similis, pariter aquas petit, alvo cœrulea, pectore viridi, alis primum argenteis, deinde cœruleis.

Decima octava, ex maximis, capite & pectore viridibus, dorsi lateribus, ubi alæ nascuntur, nigris, alvo longa, cœrulea, quam nigra linea lata coloris aterrimi mediam dissecat. Pedes atrii sunt.

Decima nona mediocrium generis toto corpore viridi, aurum resplendente. In dorso nigricat: alæ cineræ sunt, & argenteo micant.

Vigesima alvum habet obtusam, ac minimè bifurcatam, toto corpore ferrugineo, alis candidis, à latere ferrugineis.

Vigesima prima, ac pestrema alvo est crassa, & brevi, lutea, nigris circumdata zonis, capite, pedibus, dorso, & alarum principiis ferrugineis. Alarum cætera candicant.

Moufetus in *Maximas Medioxumas*, & *Minimas* dividit. De quibus idem ita. *Libellas maximas*, Angli quidam Brises appellant. Cuius generis octo tantum vidimus.

Primam virescentem; maculæ item in collo summisque lateribus ex fusco virides ornabant, alæ argenteæ, veloces & motu impetum permagnum facientes. Septem illi nigræ lineæ transversim in dorso erant protractæ; muscis exilioribus inter volandum vespitur, hirundinum more.

Secunda huic est similis, sed obscuro magis colore.

Tertia oculos margaritis similes obtinet, alas item argentas, quarum extremam fimbriam macula fusca inficit; corpus luteo, nigroque colore varium, cauda bifurca nigra, duabus quasi plumis ornata.

Quarta, luteo est colore, latera habens quasi divisa in sex partes: juxta alarum ar-

gentearum exortum macula lata nigra conspicitur; medio lineis luteis distincta: in caudæ extremitate quatuor vel quinque spinulæ apparent.

Quinta, corpore & capite cæcio, ore nigro, alis argenteis una macula notatis: in caudâ ultima tres spinulæ tridentem referentes conspiciuntur.

Sexta alæ adnascuntur argenteæ, medio ipsarum nigrâ insignitæ: totum corpus nigrum, sed rarius, item in dorso atque ventre lutescens: Pectus scapulæque ex nigro flavoque æque mixtæ. Subter caudam duas spinulas recurvas trahit: in fine ejus quinque apparent, sed admodum exiguæ.

Septima caput collum & scapulæ fusco sunt colore; reliquum corpus rubet: in Musæo Pennii procreata fuit, ex vermiculo plane illi mihi ignoto.

Octava adhuc brevior, oculis margaritis similibus, toto corpore luteo, nisi ubi lineis transversim ductis notatur. Cauda illi quasi abscissa, in fine latiuscula & obtusa: argenteorum alarum summitas nigra maculâ infuscatur. inter segetes plerumque reperiuntur.

Libellæ mediæ maximam naturæ elegantiam commendant, omni arte majorem.

Prima colore est elegantissimo, corpore cœruleo, alis violaceo colore saturato: Inter scapulare spatium gemmis quatuor aureis, ceu in nigricante pala fixis ornatur.

Secunda corpore capite cæcio apparet: alæ albescentes, cæciis item lineis in longum ductis ornantur, medio purpurascetes.

Tertia corpus atque caput subviride; alarum lineæ sanguinis veluti striis notatæ, versus extremitates obscuram purpuram imitantes.

Quarta ejusdem ubique coloris videtur, fusci nimirum fatifcente viriditate commixti.

Quinta oculi cœrulei in capite virescenti: corpus totum viridi cœruleo mixtum; demptis alis argento nigrefacto accuratissimè laboratis, & medio obscuratâ purpurâ obfuscatis.

Sexta viridi est omnino corpore: imo & alæ illi virescunt, sed leviter.

Libellas minimas, quatuor vidimus.

Prima corpore toto Cyaneo.

Secunda rubro, alæ utrique pares, colore argenteo.

Tertia corpus totum croceum colorem æmulatur. Sed cauda magis protuberat, & sanguinea macula alarum extremitates, uti & omnes fibræ, rubescunt.

Quarta quæ omnium minima, caudam longam habet exilem, caput magnum,

oculos cœruleos prominentes duabus antennulis præmunitos: corpus oblongum tenue, subtus virens, supra nigricans; in dorso duas lineas virentes à capite ad alarum exortum protractas, habet: caudam quinque juncturis colligatam, in, cujus extremitate annulus subcœruleus. Ex harum numero una est, quæ quasdam ex majoribus citissimè interficit. Corpore gracili & griseo, alis item politis; nam ne vestigium quidem foraminis ullius apparet, per quod intrare possit. Pomo ipso ac seminibus vescitur. Hanc muscam Guilielmus Bruerus, vir doctissimus & rerum naturalium indagator acerrimus, ad Pennium misit.

ARTICULUS II.

De *Anelytris quadripennibus farinaceis.*

PUNCTUM I.

De *Papilionibus vulgaribus in genere.*

Tantum de *Anelytris quadripennibus* membranaceis, sequuntur *farinacea* seu *Papiliones*, qui vel *vulgares*, vel *Bombycum*. Nomen videntur à pappo, seu fugo, quod ceras & olera exsugat & comedat, sortiti: nisi fortè, quasi papyriones dici malis, quòd similitudinem papyri habeant. Græci genetaliter *φύχην*, seu *oxytonas*, seu *paroxytonas*, vocant, *ἀπὸ τῆς φύχης* sine dubio, seu vento. Dicuntur & *σηπεδόκιδες*, *πυρρίδες*, *πομφόλιδες*, *Καύρες*, *Ψάλλιδες*. Invenies & *πάφω* dici. In Glossario Benedicti Abbatis Floriacensis *ισπινίη*, exponitur *Papilio*.

Descriptio.

Habent pedes sex, oculos prominentes duos, ante quos totidem cornicula ignava, ut Plinius vocat, enascuntur, rostrum bifurcum; rostellum longum intra furcas absconditum, quo rorem, aliæ diurnum, aliæ nocturnum sugunt. Colorem erucarum, ex quibus ortæ sunt, servant.

Locus.

Amænis & apertis locis gaudent, qui levissimo volatu feruntur: qui gravius corpus gerunt, arborum truncis, parietibus & fenestris adhærent. Ex malvæ floribus succum sugunt. Ideò florentibus illis maximè abundant. Sed si de sylvestribus malis id accipiendum est, de nocturnis quoque papilionibus sumendum hoc erit: quod & Isidorus innuit.

Vitus. Columella R. R. 9. c. 12.

Isidor. Origin. 15. c. 10. Generatio.

Mensibus Majo, Junio, & Julio coeunt, averfis caudis, reflexis quandoque, & in coitu diu hærent. Author de Natura rerum, post Augustum congregi scripsit. Vermiculos deponere falsò Aristoteles cre-

didit. Ova edunt, tam supra quàm subtus, illaque magna, parva, nigricantia, alba, viridia, cœrulea, flava: quædam seminibus milii minora, quædam duplo majora, nonnulla æqualia. Reponuntur sæpè in corticum arborum cavitatibus, sæpissimè in foliis. Aldrovandus Chamæ fici observavit: rusticia feminibus papilionum grava cum ferrum vomere scinderent, se invenisse dixerunt. In brassica nasci, apud Aristotelem leges, ita eam plicant, ut quasi tecto includantur, ne ipsis aliquod ab imbribus damnum. Quæ Aldrovandus observavit, tenui lanugine involuta erant. Ex ovis loco tepido, repositis, vel solariis radiis vegetatis, aliquando post quadriduum, aliquando decimo quarto die, erucæ excluduntur. Ideò malè Albertus, alios ex iis papiliones, longis & flexuosis promuscidibus instructos, hyeme prodire scripsit. Ex erucis Chrysalides, seu aureliæ fiunt, quæ in papiliones abeunt. Observatum, Erucam primò parere ovalutea, tenax lanugine involuta, iisque editis, in Chrysalidem abivisse, coloris lutei, viridis & nigri. Ex ovis erupere tam exigua quadripennia volucra, ut visum ferè subterfugerent qualia in ulmorum vesicis reperiuntur. Errat ergò in quibusdam Plinius cum scribit. *Multa insecta & aliter nascuntur, atque inprimis ex rore. Insidet hic raphani folio primo vere & spissatus sole in magnitudinem milii cogitur. Inde porrigitur vermiculus parvus, & triduo eruca, quæ adjectis diebus accrescit; immobilis duro cortice, ad tactum tantum movetur Aranei. Hæc Eruca, quam Chrysalidem appellant, rupto deinde cortice volat Papilio. Infestant sæpè brassicam simul & erucæ & vermes: nec id præter raphanum apud Aristotelem, sed brassicam significat. Non negaverim tamen quasdam & ex vermibus nasci. Frumentum certè humidius vermes producit, hi Chrysalides, ex quibus Papiliones prodeunt. Exire vidi Papiliones, inquit Aldrovandus, ex arborum, maximè salicum cavis, suo spolio denudatos. Papiliones, addit, ejusmodi cum cavitatibus crassitie, in quibus sanè ova fuisse nemo dixerit. Ex singulis enim cavis, singuli exeunt Papiliones, cum qui semen in quodam loco edunt, id nonnisi admodum numerosè pariant. Sunt id genus Papiliones corpore admodum crasso, alis plurima lanugine obsitis, colore plerumque fusco ad castaneum vergente. Sed & visa eruca, à qua, cum expectaretur Papilio, ova quadraginta, grani tritici magnitudine, luteo colore, tenui obducta lanugine, in quorum singulo vermiculus prodire. Licet quoque sentire ex putredine nasci. Bis terve erucis Bononiæ pluit, quæ in Chrysalides & Papiliones abivere. Unde*

Arist. H. A. 5. c. 19.

Aldrov. de Insectis 2. c. 1.

Arist. H. A. 5. c. 19.

Plin. H. N. 11. c. 32.

Aldrov. l. c.

Plin. H. N. 27. c. 24.

de hoc malum in Milëto tempore humido & lento nasci, Plinius reliquit.

Natura.

Post coitum sensim tabescentes vivunt, ad hyemem usque, quidam ad hybernium solstitium. Sæpè in domibus per hyemem quasi torpentes conspiciuntur: plærumque intenso gelu pereunt. *Sunt qui certissimum veris indicium arbitrentur, ob infirmitatem animalis, Papilionis proventum. In ipso anno, cum commentaremur hæc, (verba sunt Plinii) notatum est, proventum eorum, ter repetito frigore extinctum, advenasque velucres, ad VI. Calend. Februarii speim veris attulisse, mox sævissimâ hyeme confictas.* In Anglia novum eorundem bis Autumno exortum, memorat Pennius. Observatum & Pestis præfagia tradidisse, quod apud Gemmam habemus. Volabant Anno M. D. L X I I. circa 15. Augusti ad aquas tantâ copiâ, ut fluminis cursum obscurarent: sub noctem, velut instructis copiis, per vicos vagabantur. Anno M C. I V. turbavere aciem, intercepto etiam solis lumine. Anno M. D. X L I I I. omnem melleum succum absumsere; gramin ipsum, arido stercore ubique torrefactum, exustum est. An. M. D. L I I I. cruentis in Germania guttis, herbas, recta, vestes, & homines aspergebant, & ingens tum eorundem copiâ.

Ufus.

Urinas movere creduntur, & minore cum periculo. Tinunculis & aliis aviculis in cibum cedunt: sed & morsulorum compositionem, quibus pisces allici creduntur, ingrediuntur.

Differentiæ.

Differentias speciales frequentibus punctis apponemus. Nunc eas in Diurnas & Nocturnas distinguere placet. Nocturnæ dicuntur φαλάιναι phalænæ παρὰ τὸ εἶναι φῶς ἀλλεῖναι, quod ad lucernas advolent, Lycophroni & Nicolao καυδολοσβέσαι sunt, quod candelas alarum motu sæpè extinguant: φάροι aliis, quod scabritie & fursure quodam distant.

Quia verò aliquando lucis amore in ignem se præcipitant, pyraustarum apud nonnullos Zenodetum nempe & Æschylum obtinere nomen.

Aristoteles ἡμίτερον dixit: quidem πυραυσταί: distinguique debent à Papilionibus qui apibus in alveis obsunt. Harum ova Aldrovandus, in tecto alvearis, in unam veluti massam conglomeratâ, tenui quadam lanugine vestita; obruta invenit. Subnigra, splendida, dura, & numerosa fuisse. Erucas etiam, addit idem, albicantes exiguas, quæ mihi in sequenti nocte folliculos fecerunt, quales in alveo quoque observaveram, magnitudine pistachii invicem numerosè admodum coherentes, & in singulis suas Chrysalides, quæ denique mihi dissectæ, Papiliones pepererunt, quales quoque in alveis videram, Papilioni-

Aldrov.
de Inf. I.
c. 2.

bus qui in trico oriuntur non dissimiles. Hirsuto sunt corpore, & alis veluti cinere quodam conspersæ.

Rarò aut nunquam, nisi erectis in dorsum alis provolant. Interdiu subter folia vel obscuro quodam in loco latitant. Antennas maxima ex parte vel hirtas & latiores, vel exiguas admodum & breves habent. Ex crucarum thecis terra obrutis proveniunt.

Et quia puiverulentæ sunt, diurno tempore ante advenientem vesperam, ne pulvis solis calore arefactus excutiat, apparent. Diurnæ, quæ ἡμερόσται, antennis longioribus & in extremo tuberosis gaudent.

Semper juxta latera expansis alis provolant. Ex aureliis pendulis, vel arborum ramis affixis proveniunt. Planæ sunt, læves, plabræ, duriusculæ. Noctu volare nequeunt, ne ros nocturnus medullas madefaciat. Differentias earum speciales inferius vide.

Nierembergii meminit ex Indicis Hoitzitzil Papalotl, seu papilionis similis Hoitzitzillin; unde nomen meruit. Oblongo, inquit, est corpore desinente in tenuitatem, & transversis quibusdam lineis, aurei coloris distincto, sed maculis nigris intersertis alarum superiora eodem colore distincta sunt, sed inferiora rubescunt; lineis haud absimiliter per transversum discurrentibus. Cætera papilionum relinquo generi consona. Sunt & aliæ innumeræ apud novam Hispaniam differentiae admirandis variatæ coloribus pulcherrimæ. Illud hic obiter monebo, in quibusdam papilionibus magnis hujus novi mundi pro lingua esse filum sanguineum oblongum excedens reliquum corpus, quod convolvit ut in bucca recipiatur, quam habet, ut illud commodius extrahere possit, sectam à superiore parte capitis usque ad inferiorem, ut pæne totum caput scissum sit.

Mouf. de
Inf. I. c.
14. p. 88.

Nieremb.
H. E. 13.
c. 29.

PUNCTUM II.

De Papilionibus in specie, & primò de
Papilionibus Aldrovandi primæ
tabule.

Papiliones in specie, partim ab Aldrovando, partim à Moufeto descriptas habemus: Coincidere hujus & illius aliquas, concedi potest facilè: maluimus tamen in tanta varietate omnes ponere, ne quicquam desideretur. Aldrovandus suos indecem tabulas dispecuit, quarum prima quinque habet, qui à nobis ipsius Aldrovandi verbis describentur.

Primus, inquit ille, non incongruè ἡμίτερον dicitur. Est enim Papilionum

Aldrov.
de Inf. 2.
c. 1.

maximus. Vespere potissimum cernitur, interdiu latet. Latus est palmum, & amplius. Alæ singulæ rotundam habent ac notabilem maculam, oculum diceris nigrum, sed primo miniaceo, dein candido circulo obductum, cætero subnigræ, aut fuscæ, molles, lanuginosæ, farinacæ, in extremo candicant; corpus pronum ad castaneum vergit, supinum non-nihil albicat, corniculæ sive antennæ plumarum instar molles, satis proceræ; femora quoque mollia, sed tibiæ duræ, oculi nigricant.

Quartus in hoc ordine similis ferè proximo, sed corniculis latioribus, & filicis ramulum figura quodammodo æmulantibus, luteis: corpore etiam magis lutescente, denique oculis longè pulchrioribus: miniaceus enim circulus longè in hoc major est, minorque niger, qui velut pupillam constituit.

Secundus totus erat viridis, annulis candidis. Alæ etiam lineas habebant roseas deorsum descendentes, item maculas transversales albas; rostrum erat longum, trigonum, oculi magni, nigri: corpus procerum admodum, crassumque, in extremo acutum. Alæ pro cuius portione sunt exiguæ. Ex hoc genere alium mihi describendum ac depingendum tradidit F. Gregorius Regiensis Capuccinus, illius insolenti forma ac colore captus, sed in quo annuli essent lutei, alæque maculis subflavis, castaneis, subcœruleis & nigricantibus destingerentur. Longitudo huic papilioni palmaris est. Quid si sexu distinguamus, priorem fœminam esse ex editis mihi ovis comperi.

Tertium ex Eruca nasci observavi sub finem Augusti anno superiori, eaque caudata & immensæ magnitudinis suo postmodum loco depingenda. Folliculum non textit, sed in Aureliam mutata: Papilionem hunc generavit decem ferè dierum intervallo, corpore crasso ejusdem cum alis coloris, nimirum ex luteo & fusco variantis. In tergore notabilis macula est candicans, humanum quodammodo caput antèrius exprimens. Caput totum nigricat, pedesque & antennæ; quæ latiusculæ sunt. Alæ internæ totæ ferè lutescunt.

Postremum in hoc ordine depictum pro-na & supina parte anno 1592. mense verò Julio, hujusque die vigesima sexta gigni adverti ex parva quadam Eruca, hirsuta, colore ex rubro, albo & nigro variante. Hanc enim cum cepissem in tamarisco sive myrica sub meridiem, subsequenti nocte versa erat in Aureliam viridem, quæ filo sese capsulæ, cui inclusa erat, ex alvi extremitate edito appenderat, atque ita quindecim diebus continuis adhærens in eodem colore perseveraverat, deinde mutato eo lutea partim, partim nigra facta erat; qua-

re jam jam in Papilionem abituram conjecti, cujus scilicet colores per fenestram, quam mutando relinquunt exeuntes, transplenderent. Quod cum viperinis fœtibus commune hisce Papilionibus fuerit; eos enim supernè in ovo conspici testatur Aristoteles. Cum itaque erupisset Papilio, alis se fecit conspicuum iis, quos diximus, coloribus pronè & supinè. Color niger luteusque in primis alis intensior est, in supinis remissior. Alæ internæ, quæ aliàs minores esse solent, in hoc animali proceriores sunt. infrâque serrata ferris eisdem coloribus distinctis, ex quibus ferè media ceu cauda quædam dependet. Corpus totum pronum atrum est, ad latera & supinè luteum, estque pro alarum longitudine admodum exile. Oculi magni nigerrimi, nigerrimæ item antennæ, quæ in extremo obtusæ sunt, totæ subtilissimæ. In alarum internarum externis lateribus macula rubra sive rosea conspicitur, rotunda internè, semi-circularis externè. In summa, elegans est Papilio, conspicitur passim per agros & hortos.

PUNCTUM III.

*De Papilionibus Aldrovandineis
tabula secunda.*

IN secunda tabella sex Papiliones posuit Aldrovandus, eosdemque ita descripsit.

Primo & secundo loco supinè nimirum & pronè depictus Papilio, expansis alis, coloribus quatuor potissimum variat, miniaceo, nigro, albo & cinereo ad cœruleum non-nihil vergente. Suntque colores in extimis alis intensiores, ut remissiores in intimis. Capite, dorso, alvoque est cinereis, sed albis striis subtilissimis deorsum rectà tendentibus color ille cinereus insignis est. Corpus obtinet crassum, latumque, parte supina candicans, annulli coloris sunt, castanei, oculi ejusdem coloris, magni & prominentes. Alæ pariter amplæ sunt quarum externæ maxima sui parte cinereæ videntur, sed explicatæ quatuor, quos dixi, coloribus ita evariant, ut descriptu admodum sint difficiles; septem velut venæ rubicundæ eas percurrunt, inter quas in extremo totidem sunt, velut columnæ nigræ albis circulis notatæ ac supra hæc septem etiam maculæ nigræ V. literam exactissimè expriment; sed in dextra tantum; sinistra enim neque columnas eas, neque literas habet, in qua re mirus naturæ lusus conspicitur, coloresque omnes in hac sunt dilutiores, pallidioresque; Dextra etiam punctis exiguis nigris erat notata, quæ in sinistra quoque non sunt, nisi quæ corpore nectitur,

*Aldrov.
lib. cap.*

Etitur, nam deinceps in strias oblongiusculas mutantur. Postremò dextra in extremo candicat, striisque in signis est nigris descendantibus, cum sinistra nigrescit eo loco, neque striarum aliquod habet rudimentum; Internæ verò alæ totæ sunt coloris miniacei, præterquam, ubi duæ illæ fasciæ apparent, nam hæ nigerrimæ sunt. Alæ externæ inversæ modò albicantis, modò nigricantis coloris areas obtinent, internæ loco albidinis habent colorem miniaceum, sed dilutiorem, quàm externæ. Antennæ erant nigricantes, proceræ, leves, in extremo obtusæ.

Tertium in hoc ordine Leucomelanum nominavi, quod præter colorem alarum album, ad subflavum nonnihil vergentem, totum corpus per tergus nigrum ac exile habeat. Alæ internæ in extremo sunt ferratæ, habentque longas appendices, ut icon ipsa declarat. Supra ferras, quæ semicirculum constituunt, maculæ quoque sunt semicirculares, candidæ, atque in his maculæ rotundæ, ferè cæruleæ quæ simul omnes egregiam speciem ac venustatem Papilionipræbent. Cætera, ut dixi, Leucomelanus est excepto ventre, qui candicat, antennæ in extremitate, quàm in plerisque obtusiores.

Tales est in quarta serie positus, qui totis alis nigricat, & quatuor habet in hisce oculorum specie maculas rotundas nigerimas, cæruleâ velut pupilla decoratas; Alæ internæ longiores sunt externis & ferratæ, sed aliter ac in præcedentibus, hujus enim ferræ obtusæ sunt & rotundæ.

Quintus ex maximorum est genere, sed eorum, qui interdum per hortos obvolitant, corpore est procero; mediocris crassitudinis, coloris fumati, annulis per alvum lutescentibus, alis ejusdem coloris in medio, infrà candidis, & nonnihil ferratis, deinde nigris, & in ipsa nigredine maculas habentibus candidas ad latera, infrà verò ad cæruleum vergentes. Antennæ longissimæ, obtusæ sunt & nigre.

Sextus à macularum multarum serie, quæ in alis internis tam foris, quàm intus cernuntur, *πολύχθαλμος* nominatur. Oculi nigri sunt, pupilla candida, circulis ambiens luteus, suntque, ut dixi, in internis alis tantum, nam quæ in externis apparent maculæ rotundæ, totæ candidæ sunt; Habent tamen etiam hæ unicum oculum eisdem, quibus internæ, coloribus ad externa latera, cætero alæ totæ ex luteo ad castaneum vergunt. Per superiora corporis ater est, alvò supina ex cinereo ad fuscum vergit; alæ internæ, item pectus longa quadam lanugine viridi, plendente vestiuntur.

PUNCTUM IV.

*De Papilionibus Aldrovandinis
tabula tertie.*

IN tabula tertia novem habentur.

Primus, inquit *Aldrovandus*, ex mediocrium genere natus mihi ex Eruca, quam olim Bononiæ pluit; capite est, tergo alvoque coloris aurei, ad latera nigri. Alæ internæ ferratæ sunt, totæ ex aureo miniaceæ, & nigris punctis conspersæ, & in extremo nigre. Alas externas venæ percurrunt deorsum descendentes, nigre in area aurea, seu potius miniacea, item maculæ magnæ transversales ejusdem coloris, ipsæque alæ in extremitate undique nigre sunt, & ibi maculas habent candidas. Pedes & antennæ lutescunt, & instar pedum polypi cirris præditi sunt, ut ad ea, quibus insiliunt, fortius adhæreant.

Secundus, qui numero secundo & tertio pronè & supinè depictus est, ex eodem est genere. Corpus enim habet mediocre, nigricans, alvum ferè auream, nigris annulis distinctam. Oculi candicant, alæ externæ in extremo nigre sunt, & albis maculis insignes, cætera aureæ, venisque nigris, & tribus aliis nigris maculis incertæ figuræ speciosæ. Internæ in ejusdem aurei coloris area duplicem habent ordinem majorum macularum nigrarum, velut oculorum, sicut in icone exprimuntur. Colores omnes supina parte variant; In internis etiam alis (ita voco, quæ corpori sunt viciniore) qui extra erat aureus, nunc ferè est amethystinus ad cinereum vergens, adeò, ut lutescere videatur, estque unus tantum oculorum ordo nigrorum, majorumque, hos circulus ambit candidus. Corpus etiam supinum totum lutescit, pedes cinerei sunt, alæ externæ prope caput cinereæ, nigrisque guttulis oblongis notatæ, dein majori parte coloris sunt miniacei, & nigris maximas maculas habent, denique in extremo sunt rursus cinereæ.

Tertius, qui quarto loco depictus est, toto corpore pronè aterrimus, aterrimæ item alæ externæ, sed fascia ferè transversali coloris miniacei decoratæ, nec non alterius fasciæ candidæ rudimento, & punctulis aliquot rotundis, candidis. Internæ totæ ferè extrà miniaceæ sunt punctulisque nigris admodum exilibus insignes.

Quartus, in icone quintus, cum hoc idem est, sed supino corpore pictus, alæ externæ hic plus habent ex miniaceo & albo colore, quàm in prona parte, atque color remissior est. Internæ in extremitatibus

tibus ad miniaceum vergunt, cætera cinereæ, fuscis maculis respersæ, & alba ad latera externa macula conspicuæ, toto corpore ad cinerem vergit.

Quinto, in icone sexto: color totus miniaceus, notis diversis, lineisque nigris, alis angulosis, & leviter ferratis. Promuscidem habet longissimam, ac, dum vult, recurvam ejusdem cum pedibus coloris, nempe ex cinereo ad luteum vergentis.

Ex hoc genere *Sextus*, in icone septimus, esse videtur, longa item armatus proboscide, alisque præditus angulosis. Supra caput, præter antennis, etiam bina alia habet cornua, quæ in aliis plerisque non videas, corpore, aliisque colore ferrugineo, albo, cœruleo, viridique varius est. In supremis præterea alis puncta quædam habet viridia in alba area, id dorso item viridescit.

Septimus, in figura *oëtavus*, totus luteus est, versus caput tamen alæ ad ferrugineum vergunt, nimirum ubi maculas non habent, suntque hæ numerosæ admodum, ac incerti ordinis, omnes aterrimæ.

Oëtavus; in tabula *nonus*, idem est supinè sculptus, quod colorem mutet, interne enim alæ partim viridescunt, partim candicant, & maculæ illæ atræ vix hic conspicuæ; externæ ferè palearis sunt coloris, in quæ his maculæ evidentiores, corpus etiam flavescit, pedes habet luteo, antennis castaneo colore, alæ utraq; leviter angulosæ.

Postremus in hac serie corpore nigroque capite & hirsuto, proboscide procerâ admodum, alis intus candidis, amethystinis striis ornatus extrâ nigricantibus, suntque angustæ, laciniatæ & longiusculæ.

PUNCTUM V.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula quarta.

TAbula quarta Papiliones mediocres sunt, iique duodecim iconibus exhibentur.

Primus complicatis alis literam Δ quodammodo exprimit, corpore est prono, fusco, pedibus hirsutis, antennis admodum exilibus, alæ externæ ex candido & aterrimo splendentibus coloribus variant, internæ totæ sunt miniaceo.

Idem supinus exhibetur *tertia* serie, in quo color ille miniaceus dilutior est, externæque alæ totæ candicant, venis decoratæ miniaceis & maculis nigris, magnis, & corpus totum ex albo lutescit, alvus nigris punctis sive guttis exiguis consparsa est.

Secundus est hirsutus & crassus, alis su-

pernè cinereis, infernè miniaceis, lineis transversim nigris dissectis.

Quartus corpore est exiguo, nigro, luteis circulis distincto, oculis magnis luteis & ejusdem coloris antennis, alas habet tam internas, quàm externas etiam luteas, in extremo nigras, versus corpus ad castaneum vergunt, versus nigram verò ambientem fasciam planè est color ochros. Externæ prope exteriora latera maculam habent rotundam, nigram.

Quintus totus est ferrugineus sive castaneus, corpore intensius, alis remissius, alæ externæ unico tantum oculo, pluribus internæ exornantur nigris, intus albis, utraq; fascias habent nigras transversales incurvas, quæ angustæ sunt, rectasque, quæ latæ sunt & extremæ.

Sexto caput est luteum, oculi lutei, luteique pedes & antennis, corpus nigricat, alæ utraq; ferè aureæ in extremo, ut icon ostendit, aterrimæ, externæ ad latera externa maculam habent rotundam, nigram, exiguam.

Septimus ex luteo totus ad viridem colorem vergit, minus in exterioribus, magis verò in interioribus, hoc est, interiores exterioribus magis viridescunt. Externæ maculam habent nigram, rotundam, internæ albam, caput quoque nigra macula insignitum est.

Oëtavus antennis habet procéras, in fine obtusas, caput exiguum, oculos magnos. Corpore est luteo & nigro distincto, alæ quoque luteæ sunt, sed magis ad castaneum vergunt; externæ nigris punctis maculantur, quibus internæ carent, utraq; dentatæ sunt.

Nonus ex eorum genere est, qui proceras habent proboscides, alis est primum versus caput luteis, nigris modò punctis, modò maculis, hisque & rotundis & longis maculatis, dein cœruleis, in extremo nigricantibus & dentatis.

Decimus propter insolentem vultum, quo Satyrum quàm exactè æmulator, *Σατυριόδης*, dici potest. Corpore toto est flavo, rubro distincto, albo bifurcata, alis nigricantibus, & velut stellis candidis elegantissime exornatur.

Undecimus corpore est nigro, albo annulis albicantibus, alæ ejus ex albo ad luteum vergunt, sed maculæ ferrugineæ & nigræ alternatim huc illucque conspersæ luteum illum colorem ferè extinguunt suâ copiâ.

Postremum corpore etiam atro est, sed renuori, habetque alas internas dentatas & exterioribus proceriores utraq; aterrimo & lutescente coloribus variæ, habent tamen in fine aliquid candicantis.

PUNCTUM VI.

*De Papilionibus Aldrovandinis tabula
quinte.*

*Aldrov.
lib. cap.*

Habet & quinta tabula mediocres, quorum sex icones Author ponit.

Primus corpore est nigricante, alvo extrema & dorso cinereis. Alæ externæ internis sunt angustiores, ex albo ad viridem nonnihil inclinant, magis tamen viridescunt internæ, utraque in extremo circumcirca rosei coloris velut circulo ambiuntur, externæ prope finem nigrescunt, habentque in medio ferè maculam nigram. Antennæ purpureæ sunt, in extremo obtusæ & albæ.

Idem *secundo loco* datur supinus, in quo, quod in externis alis prope finem erat, nigricat, hic viridescit, sed macula tamen nigra colorem retinuit nigrum, internæ prope corpus prorsus virides, in fine ad luteum vergunt, cingunturque eodem circulo roseo. Estque hoc observatu dignum in internis, quod maculam habeant albam cum circulo ferrugineo, quæ extrinsecus non est.

Qui sequitur pronè & supinè pictus, à potioribus coloribus *πολύχλωρος* dici potest, sed hunc, quia admodum maculosus est, *πολύχλωρον* variegatum nuncupavi. Prono corpore leucophæo est, capite nigricante, oculis instar saphiri viridibus, antennis nigris cum appendicibus in summitate albicantibus, pectore hirsuto, alis candidis, suprâ prope caput ad cœruleum vergentibus, maculis magis nigricantibus, inferius respersis; dico inferius, nam, ubi cœruleæ sunt, nullam cernere est maculam, supino corpore magis candidat. Alæ externæ sunt candidæ & nigro variæ, internæ ex albo & viridi eleganter admodum decoratæ.

Quintum Papilionem *crucigerum* nominavi, quod externis alis complicatis, albis tæniis, quibus ornatus cernitur, crucem, vel potius literam X. exprimat, quanquam id in icone pictor non exprefferit. Sunt itaque alæ illæ nigræ, fasciis seu tæniis albis insignes, & venis rubicundis deorsum descendentes. Interiores sunt totæ miniceæ, maculis nigris rotundis illustres. *Sextus* idem est parte supina exsculptus, in cujus internis alis maculas illas nigras non videas, & fasciæ quæ in externis alis pronâ parte albæ erant, hic aureæ sunt. Corpore est iste Papilio pronè luteo toto, supino ventre albo, nigris guttis triplices ordinis consperso, oculi nigri sunt & exigui, exiguæ exilesque antennæ.

Sextus ac postremus alas externas ac internas exterius rubicundas, ad castaneum vergentes habet nigris guttis conspersas. Supinâ parte alæ internæ candidant, exteriores colorem eundem ferè, quem prona earum pars, conservant. Corpus pronum atrum est, supinum cinereum, cinerei quoque pedes, antennæ nigræ, oculi lutei prominentes.

PUNCTUM VII.

*De Papilionibus Aldrovandinis tabula
sextæ.*

Papilionem, qui in tabula sexta *primo* depingitur ordine, *πολύφθαλμος* nuncupavi, quod internis alis intus ac extra multis notaretur oculis, qui tamen, licet duo tantum, in externis exterius & interiorius elegantiores sunt. In his enim iris est nigerrima, pupilla alba. Alæ supinè ex luteo & castaneo variant, internæ intus prope corpus primum cœruleæ, dein ferè amethistinæ, in quo colore cernere erat lineas duas transversales, flexuosas, castanei coloris, sub quarum postrema color subsequitur luteus, deinde rursus amethistinus, quem lineæ percurrunt castaneo colore, atque intra has siti sunt, quos dixi oculi, quos subcœruleus cingit circulus. Corpus animantis nigricat, pedes & antennæ lutei, oculi nigri.

Alter alas habet dentatas, rubicundas, ad ferrugineum accedentes, & maculis respersas nigris, in medio rotundis, ad latera oblongis ac magnis. Alæ supinè nigricant, & albam fasciam habent, quæ vel currentes æmulatur fluminis undas. Corpus supinum cinereum est, pronum nigricat.

Separatim in Bononiensi editione depictus ex iis est, qui in arborum truncis nascuntur, capite admodum exiguo, albo, antennis ferrugineis, latis & quodammodo ferratis, dorso ferrugineo & albo, alis alvoque luteis, zonis castaneis.

PUNCTUM VIII.

*De Papilionibus Aldrovandinis tabula
septimæ.*

Sed & illi, qui in tabula septima dantur, sex mediocribus sunt, quorum tredecim figuræ dantur.

Primus corpore toto niger est, annulos verò habet luteos, alæ omnes candidant, & venis distinguuntur nigricantibus.

Tertius & Secundus Bombylii sunt, ex erucis bombycivomis orti, vulgò noti, undique candidissimi, exceptis antennis, quæ nigrae sunt & hirsutæ, invicem coeunt, mas est tenuiori corpore, secundo scilicet loco pictus. Inter utrumque ova appinximus exigua, coloris ferè crocei alas habent breves, & ad volandum velut ineptas.

Quartus in hac serie totus quoque candicat per alas, per quas venis habet subcœruleas, deorsum descendentes, & punctorum rubicundorum triplicem ordinem, quæ transversalia sunt. Externæ duobus velut oculis nigricantibus decorantur, in extremo ad luteum vergunt oculi & deorsum lutescunt.

Quintus corpore ex crasso, castaneo, luteis zonis, antennis habet ferrugineas, latas & hirsutas vel plumosas, in capite & cervice candicat. Alæ etiam albæ sunt, ferrugineas habentes venas, & ubi corpori hærent, striarum nigrarum rudimenta.

Sextus totus est candidus, corpore scilicet ac alis, quæ venas habent nigras, nigros item pedes & antennis.

Septimus μολύχλαρ dici potest propter colorum diversitatem, corpore toto nigricat, nonnihil tamen ad ferrugineum vergit, sicut item pedes, proboscides & antennæ, quæ admodum tenues sunt & obtusæ. Alæ internæ totæ sunt miniacei coloris, sed nigris lineis flexuosis distinctæ, externæ, quæ corpori annectuntur, atræ, dein miniacæ, dein rursus atræ, mox albæ, postremò iterum nigrae, majorem tamen aream albus color occupat, eumque percurrunt venæ ferrugineæ, rubescentes, notandumque est, album illum colorem infrà versus corpus in luteum commutari, & guttis modò rotundis ac exiguis, modò oblongis distingui.

Octavus superioribus omnibus minor est, corpore prono nigricante, alis ex luteo ferrugineis maculis nigris refertis.

Nonus idem est, at supinè pictus corpore, quod candidum est. Alæ externæ colorem retinent, internæ planè mutant, utpotè quæ maculosæ sunt argenteo splendidissimo, & ferrugineo.

Decimo alæ externæ ac internæ nigerriimæ, maculosas habent alas, uti pictura indicat, corpus etiam nigrum est.

Undecimus corpore ex luteo ad ferrugineum vergit; & nigro distinguitur; Alæ exteriores ex albo & nigro variant, internæ luteæ sunt, & quatuor nigris maculis insigniuntur. Externæ supino corpore pictæ, ut *duodecima icon ostendit*, etiam ex albo & nigro variant quidem, sed ad latera sunt ferrugineæ, internæ colorem retinuerunt, sed nigrae illæ maculae minores sunt, in extremo tam hic, quàm illic nigrae sunt.

Decimus tertius, qui in hac tabula postremus est, totus est ferrugineus, alæ externe in medio oculum habent, cujus pupilla alba est, nigrum, internæ denticulatæ sunt, utraque in extremo nigricant.

PUNCTUM IX.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula octava.

Minimi sunt; qui in tabula Octava depinguntur, inter quos qui *tertio loco datur* non inveniustus est, triplici nimirum colore, albo, ruffo & luteo varians per alas. Nam lineæ, quæ in his cernuntur, & transversales & descendentes ruffæ sunt, cætera vel candida vel lutea, punctis etiam notata ruffis, corpore angusto, exili & nigricante, alvo bifurcata, pedibus exilibus & proceris.

Huic consimilis est quodammodo *secundus*, corpore item nigricante, sed crassiori, crassiori item capite. Alæ externæ luteæ sunt, supernè magis, minus verò infernè, utrumque transversalis linea nigra distinguit, totæ maculis, seu punctis exiguis nigris sunt distinctæ, internæ nigricant, & in extremo facias angustas habent luteas.

Primus toto corpore niger est, alvo in extremo acuta, alis rotundis, candidis.

Quartus corpore quoque nigricat, oculos habens luteos, alas ex luteo ferrugineas, ubique nigerrimis decoratas notis.

Quintus lutescit, punctis, insignis cinereis, quæ totas ferè alas occupant. In externis alis macula conspicitur nigra, neque aliud in hoc notatu dignum, ut in præcedenti, maculas habent cinereas in area lutea.

Septimus corpore & alis totis subalbidis est, pedibus & antennis nigris, in medio externarum macula est nigra.

Octavus alvo est rubrâ, nigris punctis notata, pectore & externis alis nigris quidem, sed nescio quid cœrulei etiam demonstrantibus. Alæ internæ luteæ sunt, striis plenæ nigris, deorsum descendentes.

Nonus corpore est admodum brevi & exili candicante, alis item candidis, ad latera subluteis, undique nigris guttulis refertis. In medio duæ tæniæ sunt coloris aurei, tortuosæ, in singulis gyris punctum habentes nigrum.

Decimus toto corpore candidus est, & nigris punctis variat, alas verò habet pulcherrimas, majori areæ parte ferruginei coloris, in quo mirum est, quàm luserit natura. Primum enim in eo fecit fasciam ex maculis rotundis, literam O. exprimentibus; dein parva addidit ejusdem coloris pun-

puncta, postmodum alias duas tæniâs tortuosas, tum denique albam cum punctis intus nigris.

Undecimus niger est, alas verò habet ex ferrugineo ad luteum vergentes, totas nigris, ut icon ostendit, maculis distinctas.

Duodecimus crassam admodum habet alvum, coloris propè cœrulei, luteâ fasciâ sive circulo insignem. Tergus nigricat, ut & caput, & oculi, pedes & antennæ, quæ admodum sunt proceræ. Alæ versus corpus cœruleæ, deinde nigricant, suprâ duabus maculis rotundis luteis, infrâ tribus albis conspicuæ.

Decimo tertio corpus est nigrum, præterquam in dorso, ubi cinereum est. Alæ luteæ, auro resplendentes, oculis innumeris nigris, quos circulus ambit candidus, cohonestatæ.

Decimus quartus hirsutus est, ac alis totis cœruleis parte externa, interna cinereis, maculis albicantibus (in quibus mediis punctum est atrum) ordine pictis, in extremo margine notis rubicundis oblongis, oculis caudæ pavonum similibus, albo ac nigro utrinque clausis dispositis, lineâque nigra in latitudinem alæ discurrente terminatis. Totum corpus nigerrimum, item pedes, oculi, & antennæ. Alæ in fine albæ sunt, cætera, ut dixi, exterius cœruleæ.

PUNCTUM X.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula nona.

Nona tabula viginti quatuor habet Papiliones exiguos, quorum equidem infinitus est numerus, infinitaque diversitas.

Primus in hac serie corpore prono nigricat, pedes & antennæ sunt cinerei. Alæ prius nonnihil ad ferrugineum vergunt, mox candicant, punctis & lineis ubique atris conspicuæ.

Secundus corporis mole vix culicem vincit, quin, ni alas Papilionis haberet, culex omninò foret. Alvus ei cinereus, pectus nonnihil ex cœruleo possidet, alæ albæ sunt, ita tamen, ut nonnihil etiam fuscescant, habentque puncta minutissima nigra cum circulis ambientibus ea candidissimis.

Tertius *πολύχλωρος* minimus dici poterit propter alas albo, nigro, rubro & subcœruleo maculosas; Externæ in notabilem acutiem desinunt, corpus ei totum subatrum est, proboscis & antennæ lutescunt.

Quartus alas habet aureas, in margine ferè castaneæ colorem imitantur, pro-

pe extremitatem est macula ferruginea; alvus argenteo micat; pectus superna nigricat, in capite duo sunt puncta coloris argentei.

Quintus ex iis est, qui ad ignem candellarum advolant, corpore subcinereo, alis totis candidis, lineis sive venis ad ferrugineum inclinantibus.

Sextus alas habet infrâ nigras, cætera coloris rutili. Corpus cum antennis & pedibus nigrum est.

Septimus quoque niger est, sed circulis sive annulis duobus per alvum luteis distinctus, oculi quoque lutei sunt, alæ supernè magis, infernè minus nigricant, & maculis ubique insigniuntur candidis.

Octavus ex ad volantibus etiam ad lucernas est, alvò coloris flavi, nigris, ut in iconè apparet, punctis rectâ deorsum vergentibus insignis, reliquo corpore candidissimis, sed quæ exiguis admodum ferrugineis ferè punctulis insigniuntur, & in fine nigricant.

Nonus septimo similis, sed corpore major est, minoribusque contrâ alis, & in quibus majores maculæ albæ sunt, & velut argento resplendent.

Decimus alas pro corporis portione breves habet angustasque, alvum admodum proceram, nigricantem, annulis candicantibus distinctam, alæ leviter pallidæque lutescunt.

Undecimo caput magnum ac nigrum, corpus & internæ alæ miniacei coloris, lineis transversalibus nigris in extremo insignitæ, externæ totæ sunt coloris castanearum, pedes brevissimi.

Duodecimus corpore est flavescente, proceroque, dorso crassiusculo, in quo color ille flavus paulò est intensior, capite exigio ac rotundo, pedibus brevioribus, alis candicantibus, vel pallidè lutescentibus.

Decimus tertius vulgarissimus ille est, qui candellarum lumini infestus est; Corpore est admodum exiguo nigricante, alis & antennis flavis.

Decimus quartus internas alas totas habet rubras, supernasque ejusdem coloris, sed ad internos margines cinereas. Corpus totum atrum, præterquam in cervice, ubi circulus aureus est, pedes sunt rubicundi, antennæ nigræ in extremo obtusæ.

Decimus quintus idem est supino pictus corpore, ut alvi crassities magis apparet. Nam alioqui nihil, vel parum differt. Fœmina erat, & ova mihi peperit rubicunda.

Decimo sexto corpus est oblongum, & fuscescit infernè, supernè argenteo micat. Alæ ejusdem sunt coloris fusci, & argento auròquemicantis.

Decimus septimus toto corpore nigricat, alas habet ferrugineas, sed elegantissimè aureo colore resplendentes.

Idem *decimo octavo* loco exhibetur supinus, quia variat admodum. Nam corpore toto candicat, alæque minus sunt ferrugineæ, minúsque resplendent auro, sed contrà innumeris punctis atris maculantur, quas circuli sui ambiunt candidi. Habent verò eandem fasciam auream, prope extremum marginem.

Decimus nonus alvo admodum est procerus, tota lutea, cervice nigra, pedibus, antennis & summo capite candidissimis, alæ quoque candidissimæ sunt, sed striis sive lineis nigris interstinguuntur, suntque adeò breves, ut ad volandum videantur esse inutiles. Nam hoc in eo observavi, quod continuò foliis, velut zoophyton quoddam, adhæreat.

Vigesimus, nisi alas haberet latiores, ex muscarum potius, quàm Papilionum genere videretur. Corpore enim est admodum compacto, nigricante, alis ex cinereo ad castaneum inclinantibus, & aurum resplendentibus.

Vigesimus primus ab alis tam internis, quàm externis prorsus argenteo splendore emicantibus, argenteus dici potest. Corpore præterea toto candido est, præter oculos, qui nigri sunt; & antennis, quæ sunt luteæ.

Vigesimus secundus toto corpore aterrimo, alas habet nigras colore ruberrimo distinctas, pedes & antennis longiusculos, nigros.

Vigesimus tertius antennis habet latissimas, hirsutas ac velut plumosas, coloris flavescentis, caput & alas candidissimas, has tamen fuscae transeunt lineæ subtilissimæ. Alvus tota crassa est & gravis colore luteo; nihil, vel parum volat, foliis semper adhærens.

Postremus omnium minimus, brevioribus tamen, quàm par est, ac latioribus alis pictus. Sunt enim angustiores ac oblongiores, totæ albicant. Triticiarius dici potest. Nam tritico infestus est, utpotè ex tritico prognatus.

PUNCTUM XI.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula decima.

DE istis etiam ita Aldrovandus: Papilio primo ordine in hac decima tabula depictus figura corporis est admodum insolentis. Habet enim in albo seriem quandam velut plumarum subtilissimarum, penicillos pictorum exactè exprimentium, coloris partim albi, partim nigri. Corpore toto

admodum crasso est, dorso & vertice summo cinereis, alvo luteo, annulis distincta atris. Inter quintum & sextum annulum ab utroque alvi margine macula est candidissima, inter sextum verò & septimum aterrima. Alæ exterius ex cinereo fuscescunt, intus sunt rubicundæ corpore supino, sicuti etiam, qui *secundo loco* depictus est, candicat. Antennæ latæ sunt, & ex cinereo fuscae. Alvus supina nigra est, in medio candida. Ad mediocres pertineret, nisi tam crassus esset.

Tertius ex minoribus est, alvum habet luteam nigris zonis distinctam. Alæ quoque flavescent, tergus ferrugineus est, ejusdemque coloris antennis, quæ latæ sunt & hirsutæ, supino ventre albicat.

Quartus alvo quoque lutea est, sed magis ad croceum accedit, & punctis notatur in medio deorsum descendantibus aterrimis. Alæ internæ ejusdem cum alvo sunt coloris, & similibus quoque punctis maculantur, exteriores leviter pallideque lutescunt, tergus & antennis colore sunt ferrugineo, pedes croceo. Habes eundem alis complicatis, prout ex sua chrysalide erumpit.

Sextus valdè est exiguus, corpore superno fermè ferrugineo, inferno planè aureo, alas habet luteas ad croceum vergentes, admodum parvas.

Septimus corpore nigricat, alas habens luteas ad ferrugineum nonnihil vergentes, & ferrugineis venis distinctas. In exterioribus macula est nigra, rotunda; puncto intus albo.

Idem est, qui *Octavo loco* depingitur erectis alis, quæ eundem plane colorem retinent; præterquam ubi corpori junguntur, quâ parte ad cœruleum vergunt, habentque lineam albam, quæ medias percurrit.

Ex minimorum genere est, qui *nono loco* exhibetur, corpore cinereo, nigrescente, aliscinereis admodum obscuris, internis luteis. In externis macula est candida, literam V. exactè exprimens, item altera figura semicirculi.

Decimus alas habet longas & angustas, colore flavescente, fasciis sive tæneis ornata tribus atris. Pedes & antennis flavescent, oculi admodum exigui sunt & nigri.

Postremus omnium minimus Papilio est triticiarius rectius, quàm in præcedenti tabula exaratus, simul cum sua chrysalide, & vermiculo sui ortus. Alas habet, ut cæteri, quaternas; albidus totus, cinereusve, corpore levi in acutum alvo desinente, argenteo splendore. Vermiculus iste Circulio vocatur.

PUNCTUM XII.

*De Papilionibus Aldrovandinis
tabula undecima.*

Rariores sunt & formæ insolentioris, qui in undecima tabella depinguntur. Ex quibus *primus* alvo est crassissima, supernè candida, infernè nigrescente, seu potius ad cœruleum inclinante, annulis & punctis distincta nigricantibus. Tergus ac caput candicant, admodum hirsuta. Antennæ latissimæ ac villosæ, coloris ferè amethystini. Alæ ex amethysto & cyaneo mediæ, venas habent rutilas primum, post nigras: In extremo candicant, ubi punctis maculantur exiguis, aterrimis. Pedes robusti, ejusdem cum antennis coloris. In alvo notatu dignum est, quod in extremo longè crassior sit, quàm ubi corpori jungitur.

Secundus ex eodem vel consimili genere, licet minor, corpore est fusco, capite acuto, oculis protuberantibus, per tergus & summo vertice cinereis, alis brevibus pariter cinereis internè prope alvum rubicundis. Antennas non rectà, ut cæteri, erigit, sed ad latera extendit.

Tertius ex eodem quoque est genere, & ipse acuto capite, & ad latera emittens antennis suas. Corpulentus est, crassiori tamen thorace, quàm alvo, quæ nigris extenditur annulis. Toto corpore superno leucophæus est, infernè candicat. Alæ totæ fusæ sunt, internæ, quæ ventrem spectant, nonnihil possident rubicundi.

Quartus totus ex cinereo fuscus est, alas habens longiusculas & angustas. Alvo est crassa & bifurcata. Hæc annulis, alæ venis insigniuntur ferrugineis. Caput admodum breve est, antennæ minutissimæ, ac vix apparentes.

Quintus insolentis formæ caput obtinet, à cujus lateribus duo sunt tubercula, rotunda, nigra multis capillamentis nigris hirta, & in extremo alia duo, sed quæ ejusdem cum capite sunt coloris, nimirum ruberrimi, qui quoque color communis est tergo, à cujus quoque lateribus duo alia sunt tubercula nigra, ut priora. Alæ ex infima tergoris parte exoriuntur, colore ferè nigricante, luteis aureisque lineis & guttis refertæ. Alvus est bifurcata, tota lutea, rubris zonis interstincta. Pedes & antennæ nigricant.

Sextus tota alvo rubra est, aureis prope finem lineis notata, in quibus puncta sunt rubra. Alæ primum luteæ sunt, dein totæ nigræ, albis conspersæ punctis, & lineis distinctæ aureis. Caput villosum est & nigrum, tribus antennis instructum, ut pictor pinxit.

Septimus minimorum generis alis est denticulatis lutescentibus, nigris lineis & punctis rubris insignibus; alvus albida est bifurcata, nigris lineis ornata ambientibus, pedes nigricant.

Octavus alvum item habet bifurcatam, sed crassior, ejusdem prorsus cum præcedente coloris, sicut & ipsæ alæ, sed quæ loco punctorum in extremitatibus infernis rubescebant.

Nonus crassissimam habet alvum rubram, supernè luteo distinctam, alas angustas, ferrugineas, nigris lineis refertas, dorsum candicat.

Postremus alvo est crassiuscula, alis & toto corpore cinereis, pedibus nigris.

PUNCTUM XIII.

*De Papilionibus Moufeti, & primo quidem de Phalanis
magnis.*

NON cedit Aldrovando Moufetus. Moufet. de Insect. I. c. 14. a pag. 89. ad 94. Plurimas enim tam nocturnarum, quas Phalænas vocari diximus, quàm diurnarum species, easque in magnas, medias & minimas distinctas dedit, quas hic etiam exhibere placuit. Et magnarum quidem octodecem species habet.

Maxima Phalænæ venter arenosi admodum coloris est, uti & interna alarum pars; oculi cœrulei videntur, caput verò lividum; inter oculos antennæ duæ emergunt subfusæ, aquilinum referentes fucum, & nigris transversim lineis superem contortum imitantes. Scapulis veluti pannus quidam adhæret arenosus, furdus, à quo macula nigra decussati tracta scapulas finit. Cæterum corpus, si dorsum spectes, cyaneum, si ventrem, arenosi coloris est. Alæ duæ exteriores permagnæ, aquilinas colore æmulantur, maculis albisque orbibus variè distinctæ; internæ, multò sunt minores, atque intus furvis striis & maculis quibusdam insignes: Crura habet lacertosa & valida, furvi singula coloris, & in extremo duobus nigris digitis forcipata. Volat magno cum strepitu, & nocte exoculata, quemcunque splendorem ex ligno putrido, squamis piscium, aliisve rebus ortum avidè consequatur. Sicut magni Tyranni minorum gentium nobiles devorant & hauriunt, ita hæc nocturnæ diurnas Papiliones sub foliis latitantes alis diverberant atque occidunt.

Secunda primæ magnitudinis phalæna, ut mole corporis nonnihil superatur: ita primam colorum harmagoge, tono & elegantia longè vincit: ac si natura in hac ornanda pigmentariam suam omnem officinam exhausisset, atque illam primam Re-

gem papilionum, id est, fortem, strenuum, nigellum, lentiginosum, hanc verò Reginam, mollem, tenellam, comptam, unionibus, gemmisque consitam, opere plumato & Phrygio superbientem fecisset. Corpus lana quasi anserina, nonnihil lævigatum & hirtum. Martis, vel Sabellionis potius pellem mentitur, capite est parvo, oculis magnis prominentibus, antennis plumiformibus duabus, buxum colorem referentibus. Alas habet quatuor magnas singulas multicolore oculo donatas, quorum pupilla nigra, iris *παλῶχος*, circulis & semicirculis mellinis, flammeis, albis & nigris pulcherrimè distincta. Externæ alæ ab exortu ad oras albicant, nigris quibusdam venulis punctulisque insignes. Oram ipsam peniculamentum cum limbo ornat, exortu surdè fuscum, sive subflavum. Internæ alæ fuscæ videntur, uno quoque oculo superioribus conformi præditæ, tribusque institis ornata: harum prima plana est, mediâ opere dentato excurrens (ignei utraque coloris) extrema verò subalbida, & veluti à pellionibus assuta, cruribus incedit validis, hirsutis, lacertosis, ejusdem cum reliquo corpore coloris. Hanc Carolus Clusius Vienna misit tam eleganti forma notabilem, ut suspicere potius admirarique eam quàm verbis aptis describere facilius sit.

Tertia est corpore magno, hirsuto, nigricante; singulæ alæ uno oculo notantur, cujus pupilla nigra, circulus fuscus, semicirculus albus. Varii quasi panni in alis conspiciuntur dilutò amethystini, fimbriæ vero alarum extremæ primùm cinerei, deinde aquilini coloris videntur. Caput valdè breve & exiguum, unum utrinque oculum coracinum emittit, pupilla albissima insignem. Inter hos duæ antennæ valdè breves & exiles fusci coloris erumpunt. Ex pilosa eruca oritur, non glabra.

Quarta caput habet magnum fusci coloris, è quo duæ antennæ rectæ & subnigræ surgunt. Collum miniata macula ornatum, pectus hirsutum quadratum, fuscum. Scapularum pars anthracina, venter amethystinus quinque vel sex orbibus nigris dividitur. Pedes picei videntur; alæ leviter fuscæ; subnigris in longum venulis satis conspersæ.

Quinta caput albescit, oculi nigrescunt, cornicula aliquantum flavescunt, alæ exteriores longæ ex fusco atque albo surdescunt, interiores leviter & quasi obiter pictæ rubescunt. Scapulæ nigerrimæ conspiciuntur, reliquum verò corpus subroseum, septem nigris circulis linea albescente per medium totum ventrem currente alligatis ornatum.

Sexta caput scapulæque, atque exteriores alæ, sanguineis venulis lineatæ ex fusco albescunt: Capitis oculi propen-

duli, hyacinthini videntur, vel potius cyanei. Internæ alæ nonnihil incarnatæ oculum media sua parte repræsentant, pupilla corvina, circulo hiacynthino lucentem. Corpus carnem arefcentem, & leviter infumatam refert, sex quidem orbiculis ex nigro atratis notatum.

Septima alas habet exteriores albas, fuscis quibusdam maculis undulatim variegatis insignes; collum miniata quasi pellis circumcingit, ad totas deinde scapulas capucii instar decurrens: caput rubrum, oculi margaritei, antennæ flammeæ videntur. Alæ internæ rutilæ, tribus nigris maculis lentiginosæ, pedes rubri, venterque totus concolor, incisuris septem plenius miniatis & transversim ductis conspicuus.

Octava tota ferè Bætica coloris est, nisi quod omnium alarum extremitates buxæ videantur, uti etiam media antennarum pars.

Nona illi ferè est similis, sed extrema alarum pars arenam nigriorem refert. Cornicula verò lata habet & repanda, ex fusco albicantia, mediam externarum alarum partem candida rotunda macula adornat.

Decima parilem præ se fert magnitudinem, ex albo tota furvescens, nisi quod media alarum extremarum pars puncto admodum albo, oculus verò pupilla valde nigra conspiciatur.

Undecima caput tuberosum, cornicula exilia, corpus atque extrema alarum pars lutum subactum æmulantur, alias verò alæ totæ obscuræ argenteæ fuissent.

Duodecima videtur subcinerea, alis nigris quibusdam maculis infestis, oculos item habet nigerrimos, pupilla candida lucentes.

Decima tertia antennulas vix ostendit exiguas, toto corpore flavescit, præter oculos (qui exigui & nigri) atque alas, quæ albidæ videntur.

Decima quarta varii coloris videtur, cornicula tuberosa nigra habet, uti & ocellos & pedes. Scapulæ albis quinque veluti plumis ornantur, quarum utramque mediam tres nigræ maculæ occupant. Alæ nivæ nigris, luteis & cœruleis hic illic maculis pinguntur. Corpus illi nigro-cœruleum, articulatam, & juxta latera albicans; caudam pro arbitrio exerit vel recondit, mucronatam, subluteam, articulatam: totum corpus pulvere quasi conspersum; aliàs enim corniculorum tuberantium gratia in papilionum classem venisset. Ova numerosa ponit, sublutea, ac inter excludendum caudam exilem exerit, ac deinde pro libitu recondit.

Decima quinta cornicula duo habet nigra, exilia, caput atque scapulæ hirsutæ, fusci coloris, cullum miniato torque decoratur, femora rubescunt. Alæ extremæ ex fusco & albo scutulatæ vel undantes

tes potius. Intimæ verò exactè rubent, maculis piceis infectæ. Corpus leviter miniatum institæ sex nigræ orbiculatim circumcumeunt.

Decima sexta mira admodum videtur, si supinam videris ubique, Xerampelinam dixeris, si pronam, ex viridi lutescentem. Scapulas autem pronas quinque ruberrimæ lineæ deductæ ornant, sicuti & septem medio dorso puncta affixa reliquum corpus. Alæ item Xerampelinis transversim maculis vel umbris potius visuntur, quarum exortus à capite ad pectus usque infimum albescente linea terminatur.

Decima septima, si compressis eam alis incedentem videris, fusca videtur, si verò expansis volitantem, alas interiores explicat coloris incarnati, sed nigricanti limbo juxta oras distinctas. Corniculis donatur oblongis, & involuta quasi promuscide, canescentes scapulas macula arenosa rotunda inficit, latera item & corporis omnes articuli ceu canis confiti & fimbriatidentur.

Decima octava. Clusius misit perpulchram: Antennæ illi albo-nigræ, caput piceum, nasus aduncus, oculi circulus candidans, collum coccineum, scapulæ hirsutæ, nigro quasi pallio vestitæ. Alæ exteriores nigris albisque institis interpolatæ, interiores rubræ, nigris hic illic maculis ornatae. Corpus habet piceum, sicut & pedes, sed latera corporis septem utrinque maculæ ornant sanguineæ.

Huic *affinis* illa, quæ est antennis omninò coracinis, mediisque scapulis instita candidissima, ceu margaritarum linea ornata.

PUNCTUM XIV.

De Phalanis mediocribus
Moufeti.

MEdiæ molis Phalanarum septemdecem exhibentur species.

Prima ferè albescit tota, nisi quod alæ exteriores nigris nonnullis maculis & lentiginibus; interiores verò quasi variolis & morbillis ruberrimis medio albescentibus fædantur: oculos item nigerrimos, pedes, antennis subluteas habet. Nasi loco capillus provenit hirsutus, veluti in spiram sæpius involutus.

Secunda corpus totum habet hirsutum atque spadiceum, cujusmodi alæ exteriores, (absque maculis fimbriisque albicantibus & ocello luteo fuisset) Antennas flavas nigra punctula adornant; internæ alæ calendularem colorem referunt, sed ocellis quibusdam & fimbriis uti exteriores nitent.

Tertia alas habet quatuor albas, exte-

riores autem cœruleæ quædam venulæ affluentiùs sparæ infuscant, duæque in medio rotundæ, nigricantes maculæ adornant; linea circum alas ducta mellina videtur, qualis antennarum color, corpus caputque nigricant, oculos habet albißimos, scapularumque latera quatuor utrinque lineæ albißimæ obliquæ decorant.

Quarta cornua gerit repanda gruini coloris, corporis nigri latera canescunt. Alæ subluteæ nigris multis maculis serpentariam æmulantibus inficiuntur, superiùs latis, inferiùs orbicularibus: fimbria alarum Vespertilionem more dentata & veluti spinosa nigerrima est tota, quam intus sex utrinque margaritæ positæ commendant.

Quinta tota est anthracina, nisi quod maculæ ex albo rubescentes alarum faciem adornant.

Sexta corpore & antennis nigerrima oculos albos obtinuit. Alæ illi subtus coracinae, extrà aureis villis atque maculis conspicuæ, quibus vicissim lati clavi nigri coloris & argenteo quasi filo transfixi adherescunt: extimas quoque alas mæander quidam ornat nigerrimus, auro subtus fuso & quasi striatim acu picto.

Septima laticornis, corpus nigrum canescens, nescio an dedecori si magnis, quàm decori. Alarum primordia rubent, reliqua flavescit pars, utramque verò partem nigræ tessera laminatim positæ inficiunt, quarum extremitas linea una aurea splendescit.

Octava quatuor cornicula habet racemosa, cinerea, duo autem prælonga, & extremitate latiora: corpus aliquale septimæ alas subcinereas obtinet, nigro tessellatas, & circa extimam oram guttes ejusdem coloris æqualiter pictas.

Nonæ caput, oculi, antennæ, corpus, internæque alæ arenam illam auriferam representant; scapulæ externæque alæ nigrescunt, nisi quod instita quadam nigerima lineis utrinque cinereis decorata ornantur.

Decima corpus habet luteum, nigris quibusdam guttis à collo ad caudam usque lateribus & dorso insignitum; oculi, antennæ, pedes nigerrimi; alæ exteriores candidæ, sed limbis flavis, clavis angustis nigris, maculis quoque nigris distinctæ.

Undecima alas si videris, niveam dixeris vel lacteam, nisi illam minimæ hic illic nigerrimæque maculæ inficerent vel orna- rent potius; scapulæ item papposæ albicant: dorsum corpusque luteum, & articulatam octo nigra punctula commendant: oculi prominent magni, inter quos antennæ emergunt nigræ atque hirsutæ. Noctu in pratis & pascuis volant.

Duodecima alas habet adeò productas, ut

ut volare commodè non possit; brevissimas antennas gerit, oculos parvos nigerimos, totum alioquin corpus albescit, lutescentibus quibusdam venulis atque villulis rarius conspersum.

Decima tertia corpus totum (oculis demptis nigerrimis) gruinum colorem subnigricantem æmulatur: antennas habet productiores, corpus hirsutum, alas corpori concolores, sed juxta oras tono quodam virescente & vitreo coruscantes.

Decima quarta pulchra quidem est, quamvis tota propemodum arenosa: cornua gestat pro mole corporis valida, nigra & taurorum more curvata; oculi nigri & magni, caput breve, collum crassum. Alas externas nigri quidam clavilli gratiores reddunt. Spinam veluti supremam quinque nigra ceu caryophyllorum capita trifurcata insigniunt.

Decima quinta alæ ferè sunt subcinereæ totæ, antennis sola ex omnibus destituta est, oculos habet subnigros, dorsum subluteum & quinque fuscis punctulis distinctum.

Decima sexta ejusdem penè coloris videtur, nisi quod illius exteriores alæ macula pulla transversim ducta ornabantur; hæc verò ubique unius coloris (oculos nigellos dempseris) conspicitur: corpus habet longum, articulatum; alas quatuor longas atque angustas, pedes sex; quorum postremi prioribus duplo longiores sunt; cornicula item habet exilia, sed longè excrefcentia.

Decima septima ex eruca bombycina originem ducit, tota albescens præter oculos nigricantes, & venulas quasdam subluteas rectè per alas & transversim per corporis articulos currentes. A nobis Phalæna Bombycina nominatur.

PUNCTUM XV.

De Phalanis minimis Moufeti.

Moufet. l. c. p. 97.

DE iisdem ita Moufetus. Minimorum in classẽ unam primam faciemus mirabilem, quatuor tantum pedibus piceis incedentem; externas quoque alas cœruleas, habet, internas luteas & externis (præter morem) minores: corpus item luteum adeo magnum est, ut ab alis regi vix possit: cornicula punctis plena, atque oculi (dempta pupilla albida) nigrescunt: caput atque promuscis (longa, exilis, involuta) flavescent.

Altera ex cœruleo viridis videtur: corpus exiguum habet, pedes & antennas nigricantes.

Tertia scapulas atque alas habet porraceas, corpus ex subluteo fuscum apparet: alas extimas limbus ornat albis fuscisque

maculis notatus: caput perpusillum habet, pedes & antennas cineri similes. Quin etiam in ædibus parvæ aliquot Phalænæ argenteis maculis notatæ ad lucernas advolant, quæ laneas & linteas vestes depascunt & ova deponunt, è quibus tineæ, & ex tineis vicissim hæ Phalænæ oriuntur: feruntur autem primum ex rosarum foliis, aliisque herbis putrescentibus originem cepisse.

Tres alias minores in pascuis & pratis observavi, quarum *Prima* alas externas nigras obtinet, singulas quinque maculis quasi sanguine perfusis notatas: alæ interiores totæ rubent, corpus fuscum videtur, caput, antennæ breviusculæ, & pedes nigricant.

Secunda similis videtur, nisi quod quatuor tantum sanguineas maculas in alis exterioribus habet, corporeque constat graciliore.

Tertia ferè parilis est formæ, absque antennis esset multò longioribus & sanguineis maculis alio modo aspersis; nam circa extremitatem alarum guttæ sanguineæ duæ tantum apparent, ab exortu verò maculæ duæ logius tractæ conspiciuntur.

PUNCTUM XVI.

De Papilionibus Moufeti diurnis, magnis.

Diurnæ Papiliones quoque in magnas, *Moufet. l. c. p. 98.* mediocres, & parvas distinguuntur. *ad p. 102.* Magnarum sedecim sunt species.

Prima, omnium maxima, maximam partem flavescit iis locis partibusque exceptis, quæ hic atramento denigrantur. Quin etiam extremi illi internarum alarum globuli cœli colorem spirant, ut genuinis saphyris consitum putares. Oculi chrysolithum referunt, magnitudinem formamque adeò exsculptam hic exhibemus, ut plura de iis attexere non sit necessum.

Secunda præter magnitudinem parum differt à prima, oculos habet nihilominus nigerrimos atque porrectiores antennas: ubi album colorem vides, ibi melinum sufficito, exceptis illis quasi oculis majoribus juxta finem alarum interiorum positis, quorum pupillam flammeam, semicirculum verò Xerampelinum reddere oportet.

Tertia non multum colore abludit, nisi quod internarum alarum exphyses, totaque ipsarum extima lacinia glastiva sit, uti & tres illi spintheres, quos sub concava illarum parte vides depictos.

Quarta, omnium Regina dici potest; Nam extremis alis, veluti Adamantes quatuor in pala Hyacinthina radiantès, miras opulentias ostendunt, imò ferè adaman-
ti &

ti & Hyacintho oculum effodiunt. Lucent enim pulcherrimè (ut stellæ) scintillasque iricolores circumfundunt; his notis ita dignoscitur, ut reliquum corpus describere (licet variis pictum coloribus) supervacaneum esset.

Quinta caput, pedes, cornicula Xerampelini coloris obtinet, oculos verò hyacinthinos, dorsum atro cœruleum videtur, venter subflavus; alæ juxta basin luteo hilari, deinde tristiori nitent: extimas verò partes rubiginosas & inamœna fusc dine nigrescentes tres luteolæ maculæ adornant, internis rubigine conspersis duæ, primæ luteæ, deinde tres ex luteo pallescentes maculæ adhærent. Si autem supinam faciem consideres, alæ superiores ex luteo in viridem languescunt, senis octonisve maculis insignes: internæ autem leviter herbidæ & virentes duabus quasi lenticulis albis inficiuntur. Venter vultusque totus subflavus, ex aurelia prodit albicante, fuscis spinulis notata.

Sexta alæ superiores extrâ nigrescunt, per mediam partem limbo quodam obsoletius rubido currente, extremitates ipsarum panno, guttisve niveis micant, obscuris per ambitum crenulis asperatæ; intus autem limbus ille puriorem atque saturiorem exprimit colorem, & juxta radicem cœuleæ videntur. Inferiores alæ alteram intus, alteram foris faciem ostendunt, foris fuscae sunt totæ, excepta spinosa instita subrubente limbo perpusillis nigris quatuor punctulis & opalis duobus polychrois simul positis notata, intus autem nihil tale monstrant, sed ex nigro purpureo vermiculato in Xerampelinum tristius languentes desinunt; corpus illi nigrum, oculi, antennæ, pedes concolores, fusci.

Septima corpore tota picea, in singulis dorsii tamen incisuris punctulos duos gerit albissimos; alas ex flavo rubescentes maculæ nigræ, candidæque albæ adornant. Verum munifica rerum parens natura extremam alarum oram potissimum decoravit, quæ nonnullis denticellis serratim æquo intervallo distantibus donatur, in quarum fimbria viginti clavi cœrulei filo nigro transfixi mirificum edunt splendorem.

Octavam veste undulata & mixta peperit natura, sed vegetis coloribus destitutam: constant enim alæ ex nigro, minio, flavo, & fusco fatisciente, magisque vellere mollicula, quàm ornatu splendida videtur.

Nona maximam ferè partem cinerea conspicitur; si verò internam interiorum alarum faciem intuearis, vix aliquid Indici galli alas signantius exprimit: nam pennas remiges alæ quasi vestitricæ &

squameæ tegunt; oculus coracinus est, cujusmodi & tuberosæ typhamque æmulantes antennæ.

Decima corpus piceum, scapulæ flava quadam lanugine, (uti & totum caput) vestitæ, antennæ item flavescunt caput tenus, quod macula ex sanguineo atrata tristius occurrit, externam omnium alarum fimbriam circinatam plurimæ ovals margaritæ aquis distinctæ intervallis gratiorem reddunt, intus verò maculis nigerrimis, lentis effigiem imitantibus foedantur. Verùm sicut foris minus speciosa, ita interior internarum alarum pars, albo virore nitens, guttulis verò argenteis superinductis resplendet, & quæ extra ovales margaritæ videbantur, intus argentum purum putum non mentiuntur.

Undecima speciosam radiantium in-cœrulo margaritarum iustitiam ostentat, alæ superiores ex flammeo flavescences ignem referunt, sex nigerrimis pannis infectæ: internarum radix anthracina, deinde flavo in igneum coruscant: corpus fuscis capillamentis hirsutum, quem colorem cornicula cum pedibus imitantur.

Duodecima eximie est pulchritudinis, alæ leviter cruentæ & maculis nigris tinctæ, radiolis micant auratis filatim ad laciniam usque ambitum dispersis. Hæc verò Xerampelina serratim desinens intus aureis lineis lunatim ductis ornatur. Corpus ex nigro purpurascit, oculi aurei videntur, pedes & cornicula nigricant.

Decima tertia corpus & alæ nigredinem referunt, alis autem nigris & ambitu pinnatis primum capilli, deinde panni, ultimo clavi aurei medio atrii inducuntur; oculi item exigui piceo in capite auro illiti; antennæ verò punctulis nigro candidis excrescunt, & in tuberculum nigerrimum finiunt.

Decima quarta cultura lenociniis mirè arridet, corpus habet hirtum, ex albo nigricans, oculus niger pupilla albicante: circa oculum glabrum circulum videas ferè niveum, antennæ cum priore communes; extera majoris alæ facies ex flammeo aureis lineis productis dignoscitur, quas nigri quatuor limbi dentatim ducti inficiunt, circa finem verò tres numuli argentei ferè triangulariter positi commendant. Interna autem facies pulcherrima videtur, variis auratis squamulis & clavis loricatim & imbricatim positis insignis. Extremam alarum partem aurea quoque linea adornat. Pavonem nonnihil alis refert, ejusque ritu corpus gloriosum & elegans, pedem autem & tibias aliquantum nigricantes (ne forma superbiam aleret) obtinuit. Promuscis hec lineam, veluti in labyrinthos convoluta.

Decima quinta quoque proboscidem habet capillarem, viminei instar viticelli, sese torquentem. Est cinerea intus, forisque dilutè cæsia videtur: alas habet spiniformes, vespertilionum more crenatas, has extra fuscæ aliquot lineæ inter secant, intus sex clavi nigricantes multum commendant.

Decima sexta alis superioribus exterius obscurius virescit, quas maculæ pannique albescentes flavescentesque aliquot adornant: interiores exactè rubidæ maculis decem scatent nigerrimis. Venter octo flavis squamis splendescit: dorsum ex rubro in flavum vergens caudæ hordeolum ostendit quasi-venetum. Hirtas scapulas citrina lunula deorsum ducta commendat; oculos rubentes pupilla acutiores reddit argenteo.

PUNCTUM XVII.

De Papilionibus diurnis Moufeti mediis.

*Moufet. l.
c. p. 103.
ad pag.
105.*

Mediarum diurnarum tredecim species occurrunt.

Primæ oculi subflavi videntur, cornua obsoletè pulla, alæ reliquumque totum corpus ex pallido flavescent, interiores alæ extrà una tantum macula saturiore lutea notantur; intus autem caducæ herbidæ fusca quadam variola inficiuntur, dorsum ex cœculo nigricat, venter subflavit. Ex chrysalide oritur auro illita.

Secunda minus grati coloris videtur: alæ interiores tristi in gruinum fatiscunt cœculo, & quasi in plumbeum desinunt; externas nigriores habet, fuscis hic illic maculis notatas, tale item corpus videtur. Serratis alis summaque ora crenatis, & veluti aculeatis horridiuscula volitat, & quasi suæ gentis præfica nunquam, nisi funerali habitu tristius incedit.

Tertiam depinximus rigidulam, erectis alis sese veluti tollentem; est etiam spinosis crenis, sed exterior ala ex pallidior flavo tribus pannis nigris maculatur; internæ verò proxima à radice pars furvescit, media pallefcit ultima rectis, transversisque fibris cancellata subalbescit. Corpus fuscum videtur, oculus picem refert, typhæ nigricant.

Quarta duplici modo distinguitur. Nam quando passis alis se librat, corpus nigrum ostentat, atque fuscas quatuor alas nigricante peniculo veluti liratās, & in rubiginosum fulgentem desinentes eidem affixas. Quum autem floribus insidens alas attollit, prima ala luteola eleganti clypeo ornata conspicitur, cujus centrum pallidum, umbo piceus, circulus exterior citrinus. Venter atque thorax, nec non

totus vultus albicant; antennæ nigricantes in flavum divergunt.

Quinta intus forisque sui similis videtur: caput alæque pallorem monstrant, corpus livescit, veluti etiam antennæ; oculi ex flammeo rutilant, scapulæ pallenti quadam lanugine hispidæ.

Sexta dum adversas alas expandit, arenosum æmulatur splendentem, nigricantibus maculis modo Dracantii varium: corpus item, si dorsum videas, aquilinæ nigredinis videtur; venter nonnihil fuscior, oculus niger, albida, vel potius candida pupilla clarus, antennæ coracinæ; alæ aversæ ingrati bætici coloris, & obsoletioris mustellini.

Septimi generis crenulatæ alæ pyritem imitantur, æreis micantes venulis, & fimbria maculisque nigris conspersæ: corpus totum nigro colore splendescente, nisi quod antennas punctuli albi interfecant, & in picea fronte aureoli quodammodo oculi scintillant.

Octava ejusmodi corpus obtinuit, sed ex luteo rubescunt antennæ; alæ polymitæ conspiciuntur, variis plicis, liris, fimbriis, limbisque multicoloribus insignes: surdi illi autem omnes colores atque hebetes videntur, vacui splendore omni & tono, solaque mixtione, positione & numero amœni; alicubi flammam fuliginosam, alibi ingratum fuscum, languentem rubidum præ sese ferunt, rubinique ultima fimbria albis semicirculis inclusi nihil vividi spirant.

Nonæ alæ exteriores sordidis luteolis maculis affectæ atque infectæ, ultima ferè parte clypeolo nigro (quem medium punctus ornat eburneus) ornantur. Internæ verò quatuor ejusmodi gestant clypeolos, sed circulo insuper flavescente auctos, quorum duo medii justæ magnitudinis, laterales pusilli admodum videntur. Corpus huic ex fusco candicat, oculi prominentes nigricant. Si verò internam interioris alæ partem inspicias, fuliginosæ videntur, & è sex pulcherrimis bracteolis affabrè collocatis elegantiam habent.

Decimæ caput intaminato floret cando-re; Lacteolas verò alas maculæ quædam fuscæ & nigricantes ornant, dorsum lateraque ex flavo subrubentia novem decemve nigræ labes sub incisuris positæ decorant.

Undecima proportionem & fermè colore formaque corporis nisum refert, avicularum prædatricum. Alas habet ac reliquæ. Papiliones arctiores, caudam latam & quasi plumosam; internæ alæ non ut reliquum corpus aquilinæ, sed ex luteo rubentes & ferè flammeæ, nasus illi avicularum more aduncus, venter veluti inanis, antennæ validæ, magnæ, ejusdem cum

cum alis superioribus coloris, oculi satis exerti nigri, pupilla nivescente.

Duodecima forma eadem est, differt tantum colore; corpus cinerem refert, cauda nigrescit, atque dorsum nonnihil argentum mentitur: productiores alæ fuscæ lebeculis nigris polluantur; interiores, subluteæ, surdæ videntur. Miræ velocitatis sunt hæ ambæ papilionum species & pernecitate nisum provocant.

Decima tertia omnium velocissima ascapulis flavomuscidis aparet, alæ quidem lacteæ, in extremitatibus fuscis quinque sexve pennis notatæ, medium dorsum subflavescens macula ornat nigerrima, ex lateribus tubercula utrinque duo papposa prominent: uropygium nigra quadam lanugine circumscribitur, de volatu hirundinem non metuit, atque omnes revera alites superat.

PUNCTUM XVIII.

De Papilionibus Moufeti, diurnis, minimis.

*Moufet.
l. c. pag.
105. &
106.*

HArum decem exhibet. *Prima* alæ internæ, vegeto, nitidoque coccine saturatæ, suave rubent; exteriores vero luculentam purpuram ex rubro nigroque mixtam, & niveis quibusdam nervulis obductam repræsentant; reliquum corpus nigrescit, etiam racemosæ antennæ.

Secunda juxta alarum basin deargenta ta conspicitur, quæ deinceps ex cæruleo purpurascens finiunt, superiores interius clavi duo albo nigri adornant; corpus fuscis plenum punctulis, purpureolos pedes emittit utrinque tres, rostrum habet aduncum, è capite quatuor antennulæ, præter duas longas, erumpunt.

Tertiam si volantem videris, alas purpurei exoleti coloris in cæruleum vivaceum abeuntes esse dixeris, variis plicis donatas: intus autem anulis oculois præditæ, cæsiæ magis videntur atque æruginosæ. Caput ex viridi cæruleum splendet; corpus fuscis albisque institis ornatur, oculi nigerrimi, pupillæ albissimæ videntur.

Quarta lætiore aspectu prodit, alis oculatis, cyanum cœlestem atque incomparabilem spirantibus. Fecit illam Dædala rerum artifex] natura totam oculeam, adeo ut *ταυτίλλου* illum in Mythologo Arctoris filium, non pavonis caudæ insertum, sed in hujus alis habitantem haud ineptè fingeres: quas quidem non minori superbia adverso sole expandit, atque illa avis Junonia, quàm (præ cœlesti, quo excellit, colore) ferè in ruborem dat.

Quinta corpus gruinum, alæ superiores in caule albo virentes, medio luteæ ci-

neritiæ, inferiores exortu atro virente sunt, reliquum albidæ: intus autem maculis in amœno virore pictis frequentius conspersæ: oculi nigricant, veluti & capita antennarum.

Sexta globosis scapulis atque gibbosis planis cernitur, quæ cinerem attramento mixtum imitantur, corpus incisuris plenum, subcinereum: alas item angustas, & gruini coloris extimas stillicidiis quibusdam sanguineis intensè rutilantes habet: pedes, capitulum, antennæ corpori concolores sunt.

Septimam ex filiquastro natam illi affinem dixeris; & præter molem corporis minorem & majorem nigredinem, primarumque alarum deargenturam vix discrepat.

Octava alæ omnes languidæ luteæ, vel potius pallefcente flavo nitentes, punctulis quibusdam fuscis, & aliis annosam æruginem referentibus inficiuntur, ocelli huic nigerrimi, aliàs flavescit tota.

Nonæ alæ omnes conchis marinis ex albo fuscis pictæ videntur: extremitatibus circinatæ, & in medio albis quibusdam lineis crenulatim currentibus ornata.

Decima item conchatis & clavatis alis donata, ex albo & obscuro rubente variè miscetur, nobisque inenarrabilem magis Dei potentiam, quàm narrabiles suo nomine colores ostendit.

PUNCTUM XIX.

De Papilione Bombycum.

Bombycum Papilio, Bombylius quoque vocatur, ex eruca staminis serici tetrici provenit. Meminit ejus & Aristoteles, si Aldrovando accedimus, cujus verbis historiam ejus ideò describere placet, quòd brevioribus clarè describi non possit. Ait ergo. Hujus generis papilionum generationem paulo aliter, quam apud nos nunc fit, describit Aristoteles his verbis. *Ex quodam magno Verme, qui cornua habet, & ab aliis differt: primum quidem cum is mutatus est, nascitur Eruca, deinde Bombylius atque ex eo Necydalus. Sex porro mensibus in has omnes formas mutatur. Sic ille paulò aliter, ut dixi de Bombylii ortu tradens, quam nunc fieri videmus. Non enim nostræ Erucæ sive Bombyces ex vermibus fiunt, sed ex ovis Bombyliorum. Notandumque præterea ibi textum Philosophi à quopiam esse corruptum, ac inversum, & debere legi, nascitur Eruca, dein Necydalus, atque ex hoc Bombylius, quanquam mendosam illam lectionem secutus sit Plinius: nisi & apud hunc quoque corrupte*

*Aristot.
H. A.
l. 5. c. 19.
Aldrov.
Hist. Inf.
l. 2. c. 3.*

omnia legi dicamus, quod certissimè affirmare ausim. Textus corruptus habet sic. Est & alia Bombycum (de Bombycibus Vesp. par. aut sylvestrium Apum generis erat locutus) origo è grandiore vermiculo, gemina prætendens sui generis cornua. Hi Erucæ sunt. Fit deinde quod vocatur Bombylius, ex eo Necydalus, ex hoc in 6. mensibus Bombyx. Ego verò lego sic. Est & alia bombycum origo è grandiore vermiculo gemina prætendens sui generis cornua: hinc eruca fit, quæ & Bombyx appellatur, ex eo *Necydalus*, ex hoc bombylius. Omnia 6. mensibus. Locus Aristotelis colligitur facilè ex ipsiusmet præcedentibus in eo capite verbis, quæ nos ante citavimus, ubi nimirum disertissimis verbis scribit, ex Eruca fieri Chrysalidem, & ex hac Papilionem. Idem ex Plinio diximus, idem Theophrastus tradit, binis in locis, nimirum in quinto de causis Plantar. & in secundo de historia earundem, in quo postremo loco mutari scribit *generationes quasdam per plura animalia*, ut cum ex Eruca fit Chrysalis, ex Chrysalide Papilio: sed Theodorus perperam ibi habet, cum ex tineæ Eruca, tum ex ea Papilio gignitur. Nam Theophrastus Tineæ non meminit, sed Chrysalidem ait nasci ex Eruca. Jam verò *νεκύδαλος* idem esse, quod *χρύσαλις*, ipsum nomen indicat, cum velut mortuum, vel potius sopitum sonet, unde Gaza rectè invalidam transtulit, talem esse Chrysalidem præterquam, quod vulgò notum est, ipsemet ibidem Philosophus attestatur, cujus dictionis vim cum non assequeretur Jac. Dalechamp. in fatidissimum errorem impegit, & suo seipsum gladio jugulat. Nam cum prius locum Aristotelis eodem planè, quo ego restituisset sensu, imò iisdem penè verbis, in subsequenti Plinii capite, mutata prorsus sententia, quamdiu inquit filum ducit Eruca, & latebras illas sibi ædificat. Bombylius Erucæ nomine relicto, nuncupatur non à sono, quem *bombyzationem* Festus vocat, sed à *bombycio* id est vellere, quod orditur, unde bombycina vestis nomen habet. Post quadragesimum diem, quam Eruca se abdidit, & in bombylium mutata est, subnascens Papilio, nimirum cornutus vermis, & 4. alis pennatus, tum succum exhaurit, qui mollitiem velleri præbet, tum exeso folliculo, ut exitum sibi quærat, velleris extrinsecus incumbentis filum proscindit ac diffecat, ut ejus tractum, qui tota carminare nititur, sequi non possit, sed discerpatur, ac divellatur. Papiliones *νεκύδαλος*, Aristotelis vocat ut equidem censeo *ἀλλὰ θάνατος*, *νεκύνων*, veluti redivivos, morte liberatos, hac vita restitutos, commutata forma, vel *νεκυστάτες* id est, *νεωπύτης & προφρατωδάτες ἐξαλλομένους* ultimos, recentissimos, novissime pro-

filientes. Sic ille. In quibus *hoc præterea notandum*, quod Bombycium vellus, & vestis bombycina, non dicuntur à bombylio, sed à Bombyce. Bombyx enim est Eruca, quæ textit, non Bombylius, ut patet ex Plinio, cujus caput 23. lib. 11. de Bombyce Coa inscribitur, & in fine capitis de bombycinis vestibus loquens, Assyria inquit Bombyce adhuc fœminis cedimus. Sed cum in hujus capitis mentionem inciderimus, in eo quoque nodus explicandus est, locus inquam alius emendandus, non tamen eo modo quo restituit eundem Dalechamp. Plinii verba sunt. Bombycas & in Co Insula nasci tradunt, cupressi, terebinthi, fraxini, quercus flerem imbribus decussum terræ halitu animante. Fieri autem primo papiliones parvos, nudosque mox frigorum impatientia villis, inhonescere, & adversum hyemem tunicas sibi instaurare densas, pedum asperitate radentes foliorum lanuginem in vellera. Legit Dalechamp. Fieri autem primo Vermes parvos, deinde Erucas nudas, mox frigore, &c. Ego lego sic. Fieri primo Erucas nudas mox frigore. Erucæ enim prius vermes non sunt. Ut modo ad Bombyliorum nostrorum generationem revertamur, ea plane quo dixi modo se habet, nimirum ex Eruca jam folliculo induso sit Chrysalis, ex qua Papilio, qui folliculum terebrat.

Summæ equidem imbecillitatis, & brevissimæ vitæ Papiliones isti sunt, ut qui ex folliculo erumpentes, haud ita multo post Venerem ineuntes diebus tribus coeunt, quo peracto masculus moritur, fœmina verò, ordine iterato ova parit innumera rotunda, minuta, semini hyoscyami non dissimilia, aut herbæ peti sive Nicotianæ substrato sibi panniculo, vel albo, vel rubro, deinde emoritur: tunc panniculus cum ovis suscipitur, & ubi non possit hyemis pertingere frigus, reponitur.

Scribit Aristoteles esse *quoddam Papilionum genus*, quod durum quiddam simile cartamo, id est, cnici semini producit, sed intus fluidum. Docti considerent, nunquid exacte hoc nostris bombyliis competat. Ego id neque negare, neque certo affirmare ausim. Modus enim ille generandi aliis Papilionibus etiam est communis, & Aristoteles in eodem post capite de Bombylio agit. Rursus cum Bombylii Erucam inquit ex magno, & cornuto verme oriri, cumque nostræ Erucæ nascantur ex ovis, aliquando credidi Aristotelem utrumque generationis modum scripto mandasse, prout à diversis audierat. Videtur enim ex mera aliorum relatione isthæc scripsisse. Quamobrem si ex utraque relatione unam, eamque veram conficias, rejecto scilicet cornuto illo verme, & in

& in ejus loco supposito, duo illo simili cartamo bombyliis applicari poterit. Nolim enim cum Dalechampio cornu: cum illum vermiculum inter cornutos nostros Papiliones: nam sic semestri spatio varia formarum successio, non complebitur, ut voluit Aristoteles, repetit Plinius, quanquam confirmat experientia 2. mensibus omnia absolvi. Semini autem Cnici semen Papilionum horum simulare potuit, non quia æquè magna sint, sed quia intus utrumque est humidum. Hactenus Aldrovandus.

CAPUT II.

De Anelytris bipennibus.

ARTICULUS I.

De Muscis in genere.

ANelytra quadripennia, bipennia, quæ binis, ut Plinius scribit, pinnis advolant, excipiunt; *Musca*, *Tabanus*, *Culex* & *Ephemerum*. *Musca* primum dāmus locum, quod in ejus laudibus diffundendis, ex veteribus Homerus & Lucianus; ex neotericis, Leo Baptista Albertus, Henricus Conradinus, Andreas Dactius & Franciscus Scribabanus, defudarint.

Nomen, à musculo accepit. Nam detractus alis, caput nervosum, corpus molle, cauda tendinosa apparet. Hinc *Muscula* apud Boëtium nomen. Græcis *μῦα* à *μύω* dicitur. De *Caninarum* nominibus inferius dicemus.

Bipenne esse insectum & in anteriori parte promiscidem seu aculeum gere; apud Aristotelem etiam habemus. Senos pedes habere scripsit Plinius, ex iisque primas longiores ut oculos quos duos & hebetes habet, detergere valeat. Variis depingi cancellatim quasi coloribus, pavonis instar, per microscopium apud celebrem illum mechanicum Drebellium Londini observavimus. Reliqua, quæ huc spectant, in *Musca domestica* descriptione, ex Luciano adjicemus.

Locus. Humidis & æstuosis locis gaudent. Tam numerosæ in Apulia, ut proverbio locum dederint. Tot & in Hispania olim, ut earum venatores conducerentur. Apud pyramides in Ægypto tam frequentes, ut aër volantium murmure concutiat. Causam in sepulchrorum copiam, facile conjicias. Astracanæ denique ad mare Caspium, examina illarum oberrare, ut vix tolerari possint, navigationibus Anglorum

debemus. Levibus & politis non diu insident. In Cretæ monte Carina novem M. passuum ambitu non reperiuntur. Fodi-

nas, propter noxios halitus fugiunt. Romæ in Herculisin foro boario ædem non ingrediebantur: nec in Papho per fores Veneris aliqua, si Appolonio fides. Præterea Bremensibus ab Emma donatum, nullas ferre, Cranzius prodidit, nullas & quandam Venetiis domum ingredi, quod Cardano debemus. Causam frustrâ vel in sublimitatem conjicias, cum tota urbs in lacunis sedeat; vel in parietum marmoræ, cum & in politissimis armis, & splendentibus templis, muscerdæ inveniantur; vel in amuleta, quæ nimis dubia sunt. Vidit ad arcendas muscas conflata lamellam Scaliger, ad quam in fenestra vix depositam musca advolans, alvum exoneravit.

Omnibus fere eduliis insidiantur: sed inprimis, lacti, cadaveribus, melli, (mel Atticum ob thymum, & Carinæ montis excipio) & sphondylis. Plinius ideò balsami melle adulterati certissimum signum ponit, si à muscis infestetur. Varro earum proprium *ligurire* dixit. Lycophron ideò *δάμναι* vocavit.

Triplex videtur esse Muscarum generatio. Una è Coitu, qui in æstivum tempus, hyemem clementiorem, vento meridionali sese vibrante, accedit. Coeunt quædam diu, aliæ non item. Mas postquam inscendit, membrum foeminæ, intra suos meatus receptum, materia & vi prolifica adimplet. Visæ in agro Heydelbergeni mixtæ cujusdam naturæ, à Pennio. Vicissim enim conscendebant, sed talium & Lucianus meminit. Post coitum excluduntur vermiculi, qui in muscas abeunt. Albi hi, oculos ad latera prominentes habentes, quorum similitudine staphylomatis species quædam *μυρμικαλὸν* vocatur. Altera ex putrefactione. Nam plurimæ ex fimo oriuntur, in quo inchoatæ latent, & ex quo perfectæ exeunt: nec non aliis sordibus æstivo imprimis tempore. Meminit utriusque & Aristot. *Muscarum*, inquit; *ortus fit in fimo, quem agricola seorsum à stramentis separare. Quare ii qui in hoc opere sunt, contendunt discernere reliquum stercoreis, quod syncerum non est: ibique ajunt finem confici. Vermiculorum autem principia exigua: primum enim, in his quoque rubor subit: atque ex immobilibus proficiunt ad motum tanquam enascendo habentes. Deinde vermiculus evadit immobilis. Tum demum motus, rursus movere sese cessat: atque ex ea musca perficitur: moveturque flatus solisve superventu. Videtur tamen ex aliorum observatione loqui. Nulli qui per coitum generantur vermiculi: nec qui ex putredine tot metamorphoses subeunt. Crescunt primò ad justam magnitudinem, mox quasi in Nympham mutati, immobiles jacent; rupta*

Card.
Subil.
lib. 10.
p. 609.
Scal. Exe.
246. f. 4.

Victus.

Generatio.

Arist. H.
A. 1. 6.
cap. 19.
f. 226.
ed. Scal.

rupta tandem statò die nympha, egrediuntur. Scalig. non tam ex putrefactione, quam principiis quibusdam immutatis, ex gummi nempe quodam liquido oriri scribit; vel fortè ex alia aliqua materia à Natura in hunc finem concocta. *Tertium* generationis modum Knivetus Angelus detexit, *Corruptum erucæ corpus*, (verba sunt Mouf.) *vel parum contusum in aureliam imperfectam convertitur, tunc ex ea, non papilio, sed tria oblonga ova nigricantia ejiciuntur, ex quibus muscæ vulgares, vel alie iis similes oriuntur.* Quandoque aurelia ipsa corrupta, nec papilio, nec ova, sed vermiculi albi, per foramen (quandoque unus, nonnunquam plures) egrediuntur, ex quibus postea muscæ valdè exiles. Ex guttis sudoris de laborantium digitis decidentibus in Dariena regione prognatas, vidit Petrus Martyr. Rivello verò rebus Britannicis præfecto, ex sanguineo imbre procreatæ sunt. Videntur cum rhododaphne amicitiam colore, quod ad eam etiam inscrobe defossam undiquaque convolent. Bellum cum araneis gerere notum. De crabronibus superius diximus. Fortè cibi gratia ab iis capiuntur. *Atas* plærisque brevissima. Magnis & militaribus paulò longior. Pereunt oleo, quòd hoc angustissimos, quales ipsis, spirandi meatus, lentore suo intercipiat. Potes id & temperamento, quod frigidum, adscribere. Excalefactæ, haud facilè contrariam mutationem perferunt. Frigidæ, celeriter refrigerantur, & moriuntur facile. Mortuæ vel suffocatae, vel solis calore, vel cinere superfuso reviviscunt, ideò quidam immortalem animam habere putarunt. Tu calori id adscribe. Strangulatur vitalis in iis calor, cum exiles corpusculi meatus, copiosior humor infarcit: sublato per calorem externum isto, suæ libertati restituitur. Obtruncatas capite, currere, salire, & plurimum reliqua corporis parte vivere, notum.

De Volatu ita Lucian. *Est illi volatus, non continuo pennarum remigio, ut vespertilionibus: neque saltu ut locustis: neque cum stridore, ut vespis, & crabronibus: verum flexilis, ad quamcunque aëris partem se moveat. Adde, quod non volet quiete & cum silentio, sed cum cantu & melodia: non item immite & sæve, quemadmodum Culices & Muscellæ: neque cum gravi frimitu Apum & Vespærum, horribilem ostentans sonum & minacem; sed tanto volat his suavius musca, quanto sunt tuba & cymbalistibia dulciores.*

Et dum volant, & liberæ, & captæ, præcisæ etiam alis sonant: sed hæ, alio quam illæ modo: aliquando, exeunte in ore spiritu, ut Albertus loquitur, non sonant. Percutitur cadens inter alas earum aër:

meatque etiam non volantibus inclusus intus spiritus. Major in volatu sonus, quòd major aëris attracti copia ad septum transversum validius alliditur. Vix audiuntur quietæ, quòd tum se nec contrahunt, nec atolunt. Non trahitur sic intus spiritus, cujus agitationi sonus ipse adscribendus est.

Ingenium detegunt, audacia, impudentia, & indocilitas. Nulli rei non insident: nihil non conspurcant; redeunt etiam millies abactæ. Indociles esse, sed minus hirundinibus quod capitæ horreant, hæ sua natura hominem oderint, apud Plutar. cui suffragatur experientia, habemus. Araneos insidiantes observant illorumque cassusevitare conantur. Elephantem adortæ, in pertusa rimis pelle, si constringatur, intereunt. Plura in Leone Baptista, Alberto & Luciano vide. Dolorificos inferunt morsus, corporique diu affixæ hærent. Unde Homerus sagittarum ictibus comparavit. Aciores illi, si aliquid de serpentibus vel venenatis gustavere. Candidis illapsæ vestibibus ita eas conspurcant, ut difficulter eluas. Carnes, emissæ ab alvo vermium illuvie, fœdare solent. Imminente tempestate validius mordent: seu quod frigidior reddito aëre, calor naturalis appetitum excitet: seu quòd exhaustas in circumfluum aërem, unà cum vapore humidi substantifici, quod paucum habent, portiunculas, qua patet via refarcire moliantur. Tum etiam ex supremo aëre ad infimum descendunt: & in aromatibus maxime apparent. Multa contra insultus earum traduntur. Quidam cœpæ frustulo carnibus affixo arcent. Alii lupi caput intra domum suspendunt: ex falicaria seu lysimachia fumum excitant: foliorum minoris sambuci, vel cucurbitæ decocto, vel helleboro albo cum lacte trito, loca conspergunt. Sunt qui succum origani cum lacte & suillo felle & malo granatorum contuso, aqua diluunt, & solo superfundunt: visi, qui myrti aut hujusmodi plantarum fasciculos suspendebant, inque iis noctu congregatas, in faccum conjiciebant. Jumenta ab earum injuriis præservare creduntur, laurus cum nigro veratro in lacte trita; nepetæ odor & folior. ejus decoctum: Unguentum ex baccis lauri cum oleo paratum: frutices rhododaphnes, sit usi in scrobem conjiciantur, convolare in eos undiquaque volumina creduntur.

Habent in *Medicina* usum. Illinuntur à quibusdam cum radice lepathorum vitiliginibus. Impari numero, ab aliis, furunculis, medio digito, applicantur. *Capita* folio ficulneo asperata alopecie conferunt: cui, secundum alios, cinis cum nucum cinere contritus, prodest. Sunt qui melle, sunt & qui lacte subigi volunt. Ad pilorum rari-

Martyr.
Dec. 3. l. 9.

Sympa-
thia &
Antipa-
thia.

Ætas.

Galen. de
Medic.
simpl. l. 2.
c. 20.

Ælian.
H. A.
l. 2. c. 29.
Plin. H.
N. lib. 11.
c. 36.
Volatus.

Æliot.
H. A.
l. 4. c. 9.

Inge-
nium.

Plin. H. N.
l. 29. c. 6.

Ælian.
H. A.
l. 9. c. 15.

Fuga
musca-
rum.
Plin. H. N.
l. 24. c. 8.
& 25. c. 8.

Berret. vet.
Med. l. 2.

Ufus.

raritatem, vide ex iisdem & aliis remedium. In Epilepsia rufas & in potu exhibitas commendat Plinius *M. Seruil. Nonian.* addit idem, *princeps civitatis, non pri-*
dem in metu lippitudinis, priusquam ipse
eam nominaret, aliusve ei prädiceret, dua-
bis literis Græcis P. & A. chartam in-
scriptam, circumligatam lino, subnecte-
bat collo. Mutianus ter Consul, eadem
observatione, viventem muscam, in lin-
teolo albo his remediis carere ipsos lippitu-
dine prædicantes. Galenus ad chymosin,
cum ovi luteo tritas commendat. Ad pilos
palpebras pungentes, Dionysius Milesius.
Plinius ad easdem gignendas masearum fi-
mique murini cinerem, æquis portionibus
permiscet additis quibusdam aliis. Aqua
earundem per balneum destillata, oculos
à maculis & pterygiis liberari, si vesperi
laventur, capillos, si eadem sæpius ma-
defiant, in immensum crescere; duabus
guttis, surditatem tolli, Judæus quidam
apud Gesnerum retulit. Vas autumnò se-
pendendum, & materia sub hyemem de-
stillanda est. Audivi quendam, inquit Ges-
ner. solitum dare, tres vel quatuor muscas
intra corpus, atque album inde optimè so-
lutam. Rac. florum geniste g. 5. ponantur
in vase terreo, cum butyro alternatim stra-
to, quibus vas impleatur, ac optime clau-
sum in fimo equino, solem versus per annum
sepeliatur: post annum, muscas invenies,
ad unguenti formam redactas, que om-
nem dolorem, in quacunque corporis parte
sedant. Cedunt & quibusdam animalibus
in cibum. Aranæ iis insidiantur, hiru-
dines vescuntur. A Chamæleonibus, mu-
tacillis, anate muscaria, zygænis capiuntur
& vorantur. Arrident & piscibus truttis
inprimis. adhibentur & inter supplicia. A-
pud Persas, qui legibus obrectasset, die-
bus viginti in Archivo vinctus, perseve-
rabat, & melle ac lacte delibutus, nudus,
muscis exponebatur. Exercuisse & Deum
per eas sua iudicia; Historiæ tradunt. Me-
garenses è sedibus pepulere. Juliani a-
postatæ exercitum affligere: in Caroli
Galorum Reg. Anno. M. CC. LXV. ma-
gnum damnum morfu intulere. In O-
riente tanta ex mortuis & putrescentibus
exorta Anno. M. CCC. XLVIII. pestis,
ut vix decimus hominum superesset. Circa
medium Augustum in Brombiensis tem-
plici fastigio ingens examen quotannis con-
sidere solere, Brighmannus author est.

Genera Muscarum plurima occurrunt,
 quæ sigillatim in sequentibus ponemus.
 Differunt, *magnitudine, partibus, colore, lo-*
co, &c. Magnitudine, sunt magnæ, quas spartanæ
das militares, Lucianus dicit, alii Canes, so-
nitū asperrimæ, volatu velocissimæ, vi-
tæ longissimæ, tota enim hyeme perdu-
rant. Sunt mediæ, sunt minimæ. Partibus.

Aliæ capite sunt magno, parvo aliæ: ven-
 tre quædam crasso, exili, brevi proce-
 ro. Sunt pilosæ, glabræ, antennas in fronte
 gerentes, plurimæ non. In Cyrene ha-
 bentur latifrontes veluti mustelæ, aliæ vi-
 peris similes. Loco sunt *Domestica, Sylve-*
stres, quarum oleum in magno precio fu-
 isse memorat Cardan. Macedoninæ in flu-
 vio Astræo, *Hippuri* dicto, quæ simul ac
 hominis manu continguntur, alis evane-
 scentibus colorem perdunt. Moluccanæ,
 Sumatrenses, Americanæ. *Colore.* Nam
 virides & pictas, Vespam majores, quæ-
 que subterraneos sibi nidos forment. Hi-
 spaniola insula alit. *Albas*, aculeis acutif-
 simis, Casparus Balbii in itinere suo vidit.
 Insigni albedine notabilis & illa, quæ To-
 leti, in macello publico, sola per inte-
 grum annum comparere solet. Sunt & ci-
 nerea, cærulea, lutea. Huc pertinent
Canine quæ canes, *Boaria*, quæ bo-
 ves, *Equina* quæ equos infestant, *Na-*
pelli & Vinaceorum. Illis à napello, qui
 in Alpibus Reticis, mense Junio & Ju-
 lio floret, nomen impositum est. Con-
 colores ferme eidem sunt, communibus
 majores; alis capitibusque ex lucido viri-
 dique vel cæsis virentes, quasi Cicindelæ, vel
 Cantharides, ut Pena & Lobelius descri-
 bunt. Guainerius Antidotum ex eis con-
 fecit ad multa utilem, quem apud Aldro-
 vandum vide. De *Musca vinaceor.* ita Al-
 drovandus *Ælian.* Ephemera inquit, ani-
 malia unum diem vivunt: ex fæce vini ace-
 scente originem trahunt, aperto dolio, ut
 luce suscepta sunt, vita excedunt. Aristoteli
 verò Culices (*κρίσπες*) scribit nasci
 ex vermiculis, qui fece aceti gignuntur.
 Quo loco Gaza pro *κρίσπες* reddidit Culi-
 ces vinarii, sed quam bene dicetur in Cu-
 lice. Nascitur quidem in ipsis vinaceis Mu-
 scar. quoddam exiguum genus, *Mosci-*
nos vulgus vocat; Sed hi meo iudicio, ne-
 que culices illi Aristotelis fuerint. non e-
 nim ex aceti fæce gignuntur, argumento,
 quod vindemiæ tempore tantum appare-
 ant cum nova vina fiunt: neque *Epheme-*
ra Æliani, etiam esse puto: nam pluri-
 mos quotidie propè dolia extinctos repe-
 rire esset, quod alioqui non fit. *Moscini*
 autem nostri animalcula sunt admodum exi-
 gua, corpore crassiusculo, coloris ex ci-
 nereo fusci, brevi: capite rotundo, bre-
 vissimis antennis, brevibus etiam pedibus
 quæ ferè omnia in contrario in culicibus mo-
 do habentur. Hæ namque antennas habent
 longas, corpus procerum, pedes longos.
 Moscini vini valdè sunt appetentes, adeo ut
 in eo sese submergant, unde bibaculor. ad-
 agium cupientium Moscinorum more mo-
 ri, h. e. in vino, ut in extingubilem suam
 sitim sedent. *Vinulas* eos vocat Scaliger.

ARTICULUS II.

De Muscis in specie.

PUNCTUM I.

De Muscis Aldrovandi primæ tabulæ.

Aldrov.
de Inf. l.
2. c. 1.

Muscarum varias differentias Aldrovandus & Moufetus nobis proposuere hic in classes certas digestas, in tribus tabellis ille. Prima 25. species continet.

Prima Megalocephale haud ineptè vocari poterit. Capite enim est pro corporis portione satis magno, cum interim vulgaribus vix major sit. In fronte candicat, oculi rubent, alvus prope pectus sublutea est cætera fusca, alæ ex luteo & nigro variegatæ.

Secundam ad Boariarum genus reducendam judico: longa est duos ferè digitos, lata transversum pollicem, colore per totum corpus luteo, capite triangulari, in medio luteo & hirsuto, oculis colore castaneis & figuræ ovalis. Pectore lato, eminente, gibboso, utrinque ad latera depresso. Ventre longo, angusto, annuloso, deorsum inflexo, in extremitate acuto, colore lutescente ac lucido, in fine nigricante. Alæ subluteæ totum corpus longitudine æquant, quas, dum quiescit, simul conjungit, & supra supernas partes ita extendit, ut fere totas obtegant. Pedes flavescunt, in extremo ferrati, vel denticulati & bifidi; prona parte ex luteo ad fuscum colorem accedere videtur.

Tertia muscis vulgaribus majoribus paulò major, utpote ex Boariar. genere, corpore est crasso & rotundo, coloris nigri saturati, lucidi & splendentis. In capite maculæ sunt aureæ duæ, oblongæ & obliquæ C. literæ consimiles. Alæ quæ pectori hærent, eleganter admodum lutescunt. Pedes aterrimi, sed minimè splendidi.

Quarta propter cinereum seu leucophæum colorem Caninis poterit accenseri. Vulgaribus aliquantò minor est, figura corporis eleganti & vivida, colore cinereo, sed alæ ad luteum vergunt. Caput rotundum, venter oblongus & hirsutus, pedes rufescunt.

Quinta forma item corporis est admodum venusta, caput rotundum habens & rubescens, lineolis duabus candidis insignitum. Pectus, quod leucophæum est, duabus maculis nigricantibus perornatur. Alæ cinereæ nigris maculis eleganter variegantur. Venter oblongus, & rotundus in extremo, ceu in aciculam desinens.

Partem supinam lineæ duæ albicantes transversim secant. Prona pars cinerea est; Pectus primum cæruleum.

Sexta pectore est æneo, valdeque splendenti, ventre rotundo, colore viridi, sed 3. lineis transversalibus nigricantibus distincto. Prona tota virescit.

Septima majori muscæ compar est, capite in medio coloris argentei, antennis brevibus pectore leucophæo, alvo supina subrubra, quæ tamen si Soli obversetur, colorem etiam quandam lucidum cinereum præ se ferre videtur. Prona tota similiter subrubra est, & toto ferè corpore hirta.

Octava novissime descriptæ valdè cognata est & similis. Capite similiter albicat, corniculaque eadem in fronte gerit, & toto corpore pilosa est. Colore tamen quodammodo differt. Pectus enim & alvus ex cinereo ad cæruleum vergunt, & si soli obvertatur, subrubri quid in ejus alvo conspiciuntur. Est præterea aliquanto minor.

Nonna à vulgariarum muscarum generibus ob alvi gracilitatem degenerare videtur, & ad Culices accedere. Caput ei rotundum, pectus nigricans, dein color cernitur luteus, qui lineis duabus nigris invicem instar crucis interfecantibus insignitur, cæterò nigra est.

Decima tota lutea est. Alas, cum quiescit, supra alvum conjungit & explicat. Pectore est latiusculo, ventre angusto & gracili. Alas habet valde subtiles, & punctulis innumeris variegatas. Caput subtus albicat suprâ lutescit, & è medio duo brevissima exilia cornicula erumpunt.

Undecima contractior & brevior est, pectore cinereo obscurè ventre nigro, sed ad cæruleum quodammodo tendente, tota hirsuta.

Duodecima valdè pusilla, capite rufescente, pectore subalbo, multis tamen nigris punctis eleganter variegato; alvo similiter subalba, aut cinerea dilutè, quàm lineæ multæ nigricantes transversim secant, altera tantum per longitudinem excurrente.

Decima tertia in arborum truncis, pyri verò & pomi potissimum insidereprehenditur. Color toto corpore æneus, aut viridis, sed admodum obscurus. Venter autem supinus soli oppositus cinereo, lucido nigroque variegatur, pronus obscurè virescit. Pectus supinum lineis quibusdam rectis exornatur.

Decima quarta ad majores muscas ferè accedit, pectus ei obscurè lutescit; alvus admodum exilis est, angusta, & in extremo acuta, ex luteo & nigro eleganter variegata. Lineæ namq; quaternæ nigræ eam cingunt, quarum duas priores linea alia quædam intermedia conjungit, & fere unit: sed reliquis punctula quædam nigra substernuntur. Alæ

læ corporis longitudinem æquant.

Decima quinta vulgaris magnitudine est, alvo graciliori, colore luteo obscuro, capite rotundo, in medio eleganter rubro, oculis nigris, pectore lato, prominente, & utrinque ad latera depresso: ventre exili & gracili, & deorsum reflexo. Alæ & pedes dilutius, quàm reliquum corpus lutescunt.

Decima sexta vulgares aliquantò excedit: pectore supino nigro, sed pilis quibusdam lutescentibus insignito. Alvus depressa est, & versus pectus duas habet maculas luteas, cæterò penitus nigricant, præterquam extremo, quod obscure albicat. In alis, quæ pectori connectuntur, macula lutescens utrinque conspicitur.

Decima septima ex Caninar. majorum numero cinerea est, sed junctis quibusdam nigris depingitur.

Decima octava tota viridis, ac maximè splendidi coloris, pedibus ac capite nigricat.

Decima nona illis videtur accensenda, quæ carnes æstivis temporibus defœdant. Figura enim omninò est eadem, colore tamen magis fusco, lucido, & ad cœruleum obscurum tendente: toto præterea corpore hirsuto, alisque circa exortum flavescentibus.

Vigesima vulgarium magnitudine est, corpore tamen obesiori. Pectus admodum obscurè lutescit. Alæ maculis duabus velut tribus pinguntur. Eadem in exortu flavescent. Alvus tota ex cœruleo nigricat, & admodum plana est.

Vigesima prima corpore est rubro, oculis colore castaneo, pectore piloso, alvo nigra, sed tribus lineis subluteis transversis insignita.

Vigesima secunda ex Caninar. majorum numero, sed aliquantò minor, pectus habet atrum, & in eo lineas subalbas per longitudinem ductas, alvum cineream, ac admodum lucidam, maculis multis partim nigris, partim rubescentibus respersam. Pediculi sunt anterrimi.

Vigesima tertia alis est colore argenteo ad aurum tendentibus. In ore aculeum gerit. Caput majusculum & pectus obscurè lutea sunt. Alvum planè luteam linea longa in duas partes supine diffecat. Fucum fermè exprimit magnitudine. Sicut insuper.

Vigesima quarta, quæ ob varietatem colorum valde speciosa est, caput habet album, oculos amplos spadiceos, thoracem nigrum, sed lineis 2. subalbis rectis exornatum. Alvus oblongiuscula est nigra, aliisque coloribus conspicua. Quæ enim pectori jungitur, maculas 4. luteas habet, 2. utrinque intercurentes lineæ nigræ distinguunt. Cætera albo, nigro, luteoque

elegantissime variat. Prona pars penitus flavescit, præterquam in extremo, ubi nigricat.

Vigesima quinta vulgaribus muscis magnitudine æqualis pectus habet nigrum, lineis aliquot subalbis variegatum, alvum colore æris politissimi & splendidi.

PUNCTUM II.

De Muscis Aldrovandinis tabula secunda.

T Otidem species & 2. tabella habet.

Primo & secundo loco quæ positæ, invicem fere similes sunt, quanquam prior caudam sursum, altera deorsum flectat. Utraque anteriori parte muscas communes ad amissim repræsentant, capitis scilicet & pectoris figura. Dorso sunt eminenti, elatoque ac giboso pilosoque. Alæ longæ, angustæ, ad caudam propemodum extremam exprorectæ. Alvus nigra, angustaque in 8. determinata annulos, tandem ita accuitur & reflectitur, ut Scorpionis caudam efformare videatur. Pedes oblongi scabri, in extremo veluti in minutulos digitulos divisi.

Tertia exigua admodum alas habet argenteas, lineolis nigris ternis transversim sectas, alvo breviores, quæ initio crassior est, sed postea magis magisque attenuata paulatim in mucronem definit. Quidquid alvi ultra alas protenditur, id totum nigerrimum est. Pectioli colore sunt ferrugineo diluto ad luteum vergente. In ventre aut ejus apice nulla observare licet segmenta, quæ annulos vocat Albertus. Caput & dorsum nonnihil rufescunt superne. In dorso extremo, ubi alvo jungitur appendicem parvam quandam habet albicantem.

Quarta oblonga est & gracilis, capite pro corporis portione magno fusco, fusco item thorace, qui gibbosus est. Alvus exilis in medio rubra, cæterò nigricat. Pedes atri, quorum posteriores longissimi sunt.

In *Quinta*, quæ tota cinerea est, nihil præterea notatu dignum.

Sexta culiciformis est, caput & dorsum fusca sunt. Caput culicis exiguum, sed nulla fistula. Alæ longæ & angustæ, ad extremam alvum exprorectæ, aut etiam ulterius, ex fusco splendide. Alvus annulosa, angusta, oblonga; dorsum supinum, luteum, nigris maculis varium.

Septima in media fronte inter ocellos nigro punctulum aliquanto prominet jujubæ. Proboscide armatur insigni. Corpus totum; pedes & alæ colore sunt ferrugineo. Membrorum constitutionem icon exacte ostendit.

Octava ex minimarum genere est tota nigricans. Alæ in ipso exortu, nigræ, cætera argenteo splendent.

Nona pariter ex minimis est, colore viridi pereleganti conspicua, qui, si Soli obversetur, velut aureus apparet. Alvus angusta brevis, & in extremo nonnihil acuminata. Alæ ultraanum protensæ. Ejusdem generis, imò minor est.

Decima, & ipsa pariter viridis alvo exiliore, magisque acuminata.

Alvum quoque acuminatam, sed non adeo, habet.

Undecima, colore nigro est, sed maculis albis in capite, dorso & media alvo varians. Alæ argenteæ purpureum quid, si Soli obversantur, ostentant.

Duodecima à minimis illis viridibus nihil differt, nisi quod ano est rotundiore, crassioreque.

Decima tertia ad majores accedit, tota atra, præterquam in alvo (quæ compacta & crassâ est ubi tribus, quatuorve lineolis seu circulis cinereis transversim secatur. Alæ amplæ, & duplo fermè toto corpore longiores, in extremo albicant, cætera aterrimæ.

Decima quarta vulgaris muscæ speciem refert, sed thorax & alvus ex cinereo viridescent. Alæ & pedes flavescunt.

Decima quinta Fucum & Vespam refert, illum corporis crassitie, hanc colore potissimum alvi. Hæc enim lutea est, lineis quatuor transversis nigris insignita, per quarum medium linea aliàs ejusdem coloris rectâ percurrit. Pectus pariter subluteum, & maculis item duabus nigris utrinque decoratur. Caput in medio lutescens linea quædam nigra transit. Oculi sunt fuscii, antennæ admodum exiguæ, pedes lutei in extremitatibus quodammodo nigri.

Decima sexta ex caninis majoribus est, Oculos rubros, magnos, prominentes linea alba interstinguit. Pectus cinereum est, sed tribus lineis rectis, albis distinctum. Alvus quadrangulis fuscis, albisque invicem alternatim subeuntibus varia, latrunculorum lusum repræsentat. Ipsa tota in prona parte ex cinereo ad fuscum tendit.

Decima septima exigua est & nigra, musca vulgaris fortè nondum adulta.

Decima octava apem quodammodo refert. Alvum luteam & pilosam linea quædam nigra supernè à pectore ad extremitatem protracta rectâ percurrit. Pectore est nigro, capite albo, oculis fuscis extuberantibus. E media fronte cornicula brevia, nigra & apicibus rotundis insignita emittit. Alas subluteas & splendidas habet. Anus niger est & hirsutus, cætera lutescunt præter pedes, qui nigricant, præterquam in extremo, ubi albicant.

Decima nona toto corporis habitu vulgares refert, sed magnitudine inter majores & minores ambigit.

Vigesima eadem magnitudine est, tota ferè atra. Alæ maculis fuscis colorantur.

Neque ab his discrepat magnitudine.

Vigesima prima hirsuta, pectore nigro, alvo rufa, sed supinè nigris notis ad podicem usque nigrum item continuatis variegatur. Alæ fusco maculantur.

Vigesima secunda majoribus congener, tota penitus cœrulea est.

Vigesima tertia vulgaris domestica est, nulli non nota.

Vigesima quarta coloris est spadicei auri adinstar rutilantis.

Vigintam quintam, quæ ultima est in hac serie, totam penitus auream alæ argenteæ cohonestant.

PUNCTUM III.

De Muscis Aldrovandi tertia tabula.

IN tertia tabella viginti duæ exhibentur.

Priori loco quæ depingitur, corpore est exili, capite, alvo, antennis proceris, pectore nigro, alvo rubente.

Hac aliquanto majores sunt *duæ subsequentes* pulchræ admodum & valdè similes. Prior capite & thorace, pedibusque est cœruleis, corniculis oblongis, alis luteis, alvoque inter rubrum & luteum ambigente.

Quæ post has in eadem serie *quartum* & *quintum* locum obtinent, vespæ quodammodo speciem præ se ferunt, quanquam minores sint, antennis pariter instructæ, capite & pectore fuscis, alvo & alis lutescentibus, his intensius; illis obscurius.

Sexta corniculis adeò brevibus, ut carere eis videatur. Corpus totum annulis aureis, & nigris alternis variegatur. Alæ auro & argento mistis resplendent.

Septima ex iis, quas Tavanellos vulgus vocat, longa proboscide, brevissimis corniculis prædita, thorace obscurius, alvo dilucidius lutescente, alis argenteis.

Octava ex majorum numero est tota penitus viridi colore obsoleto vestitur, sed caput rubet, alæ albet.

Nona eadem videretur, nisi multò gracilior & minor esset.

Decimam quoque ex muscarum genere judicavi. In ore promuscidem habet valde longam & bifidam. Capite est rufo & hirsuto, antennis exiguis, corpore toto plano & depresso, colore aterrimo & splendido instar holoscerici: alis longiusculis, quæ in parte externa nigrescunt, in interna argentum referunt. Totum corpus supinum admodum hirsutum & pilosum est, in medio nigricans, ad latera albicans, pedibus est flavescens hirsutis. Alæ tametsi

tametsi flavescant, si soli obversentur, argento splendent.

Musciforme insectum, quod *undecimo loco* exhibetur, libuit appellare, quod proboscide, capitis & pectoris conformatione omninò muscam referat. Caput nigrum est, thorax item niger: viridis in dorso macula longa: alvus valde longa, deorsum inflexa & acuminata, ferruginea & maculis atris supinè per longitudinem ductis. Crura item sunt ferruginea.

Duodecimo ordine depictum Insectum musciforme quoque dici potest, capite crasso ferrugineo, pectore & alvo oblongis, angustis, colore viridi; alis albis, nigris fibris intercurrentibus, pedibus subflavis.

Tertium & *decimum* Insectum alvo pariter est admodum procera, colore modò nigro, modò croceo lutescente distincta, tenui & in extremo obtusa. Alæ latiusculæ sunt argenteæ, breves. Per tergus luteum fusca linea deorsum tendit. Caput nigrum, cervix lutea, antennæ perbreves, perbreves item pedes, qui cinerei sunt.

Jam verò *decima quarta* in hoc ordine elegans musca est, alas habens plane argenteas, caput nigrum, nigras item & subtilissimas antennas, oculos flavos, cætera viridia, præterquam in suprema alvo, ubi elegantissimo miniaceo colore insignis est.

Decima quinta exigua est, at longis proportionem alis, iisque fuscis. Tota ipsa candicat. Caput rotundum est, exiguum, alvus hirta.

Decima sexta muscula est omnium minima, tota aterrima, alis albis longissimis pro corporis exilitate.

Decima septima alis pariter longis & totam cooperientibus prædita est, corpore fusco & nigro, superius vario, pedes habet posteriores valdè longos, longas item antennas, easque nodosas & flexiles.

Decima octava tota est coloris fusci, corpore exili, brevissimis antennis.

Decima nona alis & alvo coloris aurei splendidissimi, longiuscula, pectore fusca. In capite puncta habet duo lutea, antennas nigras in extremo obtusas.

Vigesima capite est nigro, antennis brevissimis nigris, alis argenteis, cætera ex cæruleo viridis.

Quæ *penultimo loco* picta est, similis est ei, quæ in secunda tabula depicta est sexto ordine, sed crassior & elegantior, nigra & luteis annulis: alis item proceris ex luteo ad castaneum vergentibus, capite nigro rotundo, unionem nigrum æmulante, antennis brevibus, quæ capiti inferuntur, admodum tenuibus, in extremo crassis & obtusis: pedibus longis, subflavis.

Postrema ex Tavanellorum vulgò dictorum genere est, sed insolenti aspectu, quo ranam, bufonemve quodammodo æ-

mulatur. Corpore est procero, crassoque, coloribus nigro & flavo variegato, oculis nigris, amplis, & obtuso rictu ranam, bufonemve (ut dixi) exprimente. Antennis caret. Pedes sunt brevissimi. Alæ longitudine alvum excedunt & latitudine; color iis aterrimus.

PUNCTUM IV.

De Muscis Moufeti aquaticis.

Moufeto duplices sunt muscæ, *Aquatice* nempe & *Terrestres*, quarum illæ *Phryganides*, *Macedonica*, *Tiguri-na*, *Æschne*, *Lutea*, *Fusca* & *Tipule*. Græcis seu lacustres nomen tale, quod rebus aquis innatantibus vescantur, & super aquas potissimum degant, sortitæ sunt.

Phryganides, inquit Moufetus ex Phrygania vermiculo (quem Angli Cados Worme appellant) in aquis degente, & mensè Aug. ad superficiem aquarum ascendente exit, quaternis alis, colore fusco, corpore oblongo, 2. antennas breves habens, caudam verò bifurcatam, vel duas fetas è cauda exeuntes. Varia hujus muscæ est forma, quia Phryganiorum ipsorum tanta varietas.

Apud Macèd. circa fluvium Astræum, qui inter Berocam & Thessaliam medius fluit, volitat muscarum genus, quæ non ubique reperiuntur, nec ad aliarum muscarum similitudinem quicquam accedunt, nec Apum Vesparumve, aut crabronum faciem gerunt, harum tamen cujusque aliquid referunt: nam magnitudine crabrones, colore vespas, bombitatione apes, audacia reliquas muscas representant; *ιππεύς* indigenæ vocant. Equiseles Latini; per summas aquas volitantes piscibus in escam cedunt.

Musca aquatilis æstiva major frequens circa Tigurum conspicitur mensè majore (vulgò tes glaffi vocant) quam à generoso nominatum accepimus & à Tigurinis describi optamus.

Æschne muscæ sunt aquaticæ, colore cinereo, alis quatuor, sex pedibus juxta caudam, multos quasi exiguos pilos lanuginosos habentes.

Musca aquatilis lutea ex fusco lutescit; alas habet longas, in scapulis semper inter volandum erectas. Oculi illi magni prominentes, cauda longa articulata, cujus in extremitate duo pili longi exeunt; juxta flumina & paludes semper versatur, rarius alibi, præsertim à pluviis.

Fusca alia est quatuor alis longis, longisque cruribus corpore articulado; duas longas antennas in fronte gerit, parvum

Moufet. Theatri Insect. p. 69.

caput, oculos prominentes & nigrificantes. Alæ fuscæ, sed dilutæ magis, quàm reliquum corpus. In sylvis juxta paludes & stagnantes aquas ferè semper reperitur.

Denique inter rariores muscas illam Cardani referam, à semetipso descriptam his verbis: Animal, inquit, habeo scarabæo simile, quod non foetet, molle, celerrimum omnium, quæ noverim, annuloforum: colore est fulvo obscuro, non nigro; 6. pedibus, duabus alis per brevibus atque tenuibus, quæ caudam minimè tegunt, caudam habet ejusdem cum capite figuræ & formæ: ut bicipitem esse putares. Nam ut supina capitis parte os habet: duoque ibi cornicula sub mento breviora: Sic duo item alia in prona: toto animali longiora, totidem quoque habet in cauda, sed his duobus, quæ in capite longissima sunt, breviora, ex his tamen superiora inferioribus longiora sunt & crassiora. Quam fanè bestiolam non vulgarem utinam cum Cardano vidissem, ut descriptioni huic iconem adjecissem.

Et tantum de Muscis Aquatio. Moufet. Ego quadripennes ad Zygænam potius vel Papiliones referrem.

PUNCTUM V.

De Muscis Moufeti terrestribus

Ζωοφάγους.

Moufet.
pag. 58.
59.

Terrestres muscæ, ad quas & minutissimæ illæ, quæ celerrimè currunt, & in novellis sceniculi foliis subinde reperiuntur, sunt vel ἀλληλοφάγοι, vel ἰτεροφάγοι. Illæ magnæ sunt μακρόννημοι, & muscis potissimum vescuntur. Hæ aut sunt ζωοφάγοι, exque Carnivora, canina, Equisuga, δαμαλνοφάγοι buccularum ofores, ovisuga, ὀφιδόροι serpentivora, σκατοφάγοι merdivora, βομβυλοφάγοι, bombylivora, vel ἀζωοφάγοι. Carnivora musca est fere omnium, si corpus respicias, maxima, capite rubente, corpore punctulis ex fusco albicantibus variegato: ventre crasso, cæruleo, pellucido, alis duabus nigris, hirta pilis, carnes avidè appetit. Solitaria plerumque volat, rarius multæ simul conspiciuntur, nisi forte in carnario atque macello: ubi lanii lanistas agunt, muscario muscas continuò cædentes aut abigentes, ne illarum vermibus (Hippoc. ὄλλας vocat) obsonia scatentia pervilescant. Proditum memoriæ est (Cælio Rhodig. narrante) apud Toletum in publico macello unam muscam albedine nivea notabilem per integrum annum comparuisse. Quam hujus generis fuisse non dubito affirmare, quum in macello tamdiu fuerit conspecta.

Κυνομύα, Musca canum, Anglus à dog-

ge Flye, Germ. Hundsfliege / Hunds-
mücken / Polonicæ Psia mucha, ex Isid.
Euthym. & Philon. sententia Musca est
sylvestris, catulorum auribus infesta, quam
etsi frequenter excutiant, importunè ta-
men revolat, ac diutius ubi inhæserit,
erosione carnis ulcus excitat. De hac
Homerus Iliad. φ. τίτ' αὖ κυνομύα θεὸς ἐρίδῃ
ξυνελαύνει; Athenus: item eleganti cui-
dam scorto ob singularem impudentiam,
mordacitatem atque molestiam, κυνομύας
nomen additum libro quarto memorat.
Est enim κυνομύα (utor. Philonis ver-
bis) ἔντομον λίαν δεικτικὸν ἀναιδὲς & ἐπιβελὸν. Vide-
tur mihi in sacris literis (nempe Exod. 8.
Psalm. 77. & 104.) insectorum nocentium
generale hoc esse nomen, ut ex Chaldaica
paraphrasi apparet. Quod speciatim
aliquid significet, nulli generi muscarum
magis conveniet, quàm nigris illis gran-
dioribus latioribus compressioribus vul-
garibus, quæ impudenter involant jumen-
tis, & non tantum ichorem, ut reliquæ,
sed ex alto sanguinem maximo cum dolo-
re eliciunt atque exsugunt. Carent pro-
boscidè, verùm illius loco geminos den-
tes, ut vespæ habent, quos altè infigunt
cuti, potissimum verò pendulas canum
aures infestant apud Germanos (asserente
Camerario) atque sæpe excoriant. Has
nobilis quidam Anglus in Italia se vidisse
dixit, alis exceptis Ricino per omnia si-
miles: quem ita compressis alis repræsen-
tant, ut utrumque doctissimus ille Bar-
barus confundat Niphus illi ut summam ve-
locitatem, ita rotunditatem corporis as-
signat.

Ovisuga ad κυνομύαν proxime accedit, dum
volat, horrendum quid studet & Afilo gra-
vius & tardius volat. Duæ sunt ejus species,
solum magnitudine distant, major sylvicola,
minor verò sepicola.

Ἰτασοβόσκαι, German. Köszmücken / sunt
muscæ magnitudine vulgarium, corpo-
re compresso, duro, plano ac tenaci a-
deò substantia, ut inter digitos vix rum-
pi possint, nigrificant magis quàm vulga-
res, nunquam rectà provolant, sed late-
ratim, uti dicam, & quasi per saltus, nec
diu continuare volatum possunt, neque
longè. Equos præcipuè apud Anglos
vexant, eos circa aures, nares, testes &
emunctoria perpetim lancinantes, quorum
sudore juxta cutem ad radices pilorum
diffuente vivunt. Angli iis à sīde flyn vel
à horse flye nomina imposuerunt, ut &
Græci πολυροποτήτης vocant. Quidam è Græcis
κυνοράς appellat, ac etiam in calidioribus
regionibus easdem canibus quoque mole-
stiam afferre maximam affirmant. Crotonis
speciem alatem ac volatilem dicunt, sed
hanc plane aliam speciem esse arbitror, ac
solisequis infensam.

De

De Buculariis seu *δαμαλινάρις* in œstro agemus.

His proximè accedit alia musca, bobus & jumentis interdiu sole fervido infesta, quam Pennius *curvi caudam* seu *σκολοειδρον* jure appellat. Semper enim cruribus aut ventrijumenti insidens, caudam versus ipsam recurvam tenet & spiculum exertum, quò ad percutiendum cauda sit paratior. Hanc Angli à Whame and à Burrell flye proprie vocant; nec nisi in Anglia facile invenitur. Musca hæc apiferè similis forma & colore, sed corpore est crassiore. Non adhæret, nec sanguinem fugit, sed solummodo, stimulo in cauda pungit, atque ut equos affligat, per longissima itinera ipsos volando persequitur. Equi natura hanc muscam timent, & ad ejus solum contactum quasi horrent, cauda pedibusque & labiis tam cruentum hostem abigere sæpe conantes. Sunt, qui putant, hanc muscam non aculeo pungeré, sed stercorea pilis equi affigere cauda, unde postea molestissimæ lendes gignuntur; Sed hoc experientia dixerit, nam ratio in re tam minimè probanda fileat & obmutescit.

Ὀφιοβόρος in Dryini præsertim serpentis squamis latibula habere dicitur Ætio, quæ tandem ipsos serpentes exanimes reddit, hæc pennis æreis donata *χαλκή μύα* vocata ab Hesych. *ὀπιχαλκίζει τῇ χροίᾳ*, cum cantharis vescitur, & morfu colorem serpentibus ingentem parit, deinde sitim in ex plebilem & mortem. Horum postea cadaveribus si postea hominem momorderint, lethale infligunt vulnus & insanabile.

Merdivora muscæ plurimæ sunt, alia est *Creophago* similis, sed major, oculis obscure rubentibus, scapulis atratis, in quibus circulus oblongus paucillum albicans, dorsum nigrum ex lineis transversim ductis ornatum. Alæ argenteæ, corpore longiores, circa stercore humanum plurimum versantur, aliàs perrarò.

Est & musca *viridis* toto corpore, splendore nimio quasi lanterna Punica pellucens, capite fusco, alis argenteis, in sylvis frequens, circa stercorea ferè versatur vulgaribus muscis magnitudine æqualis. An sit *Giacucul Sylvatici* ignoro.

Aliam *κοποροφάρον* deprehendimus, musca viridi minorem, corpore fusco; capite rubro saturato, linea medium quasi caput secante.

Aliam item vidimus corpore hirsuto, subflavo, oculis nigris prominentibus scapulis & dorso nigro pulcherrimè maculatis, cauda sublutea.

Alia item est, cui scapulæ dilutum rubent, ad croceum colorem parum accedentes. Duas habet antennis cæteris longiores, alas argenteas, totum corpus te-

gentes, caput nigrum, quadratum & exiguum; in stercore potissimum equino frequens assidet.

Denique in sterquiliniis (unde eas gigni probabile est) muscæ quædam croceæ apparent, corpore reliquis magis oblongo ac gibboso.

Muscæ item raram, nec ubique obviam, murum ex aggesto fimo & materia putrescente factum depascentem vidi, omninò nigram, si absque alis quatuor argenteis fuisset. In scapulis etiam quatuor puncta alba, in reliquo corpore octo, id est, utrinque quatuor. Oculi albi, frons candido veluti asterisco notata, ex qua duæ antennæ nigræ & longæ emergant; habet item in supremo quoque femore album punctulum aspersum. Hanc muscam etiamnum in pyxide mortuam & conditam varietatis causa custodio.

Bombylophagus musca est montana, magna, nigerrima, corpore hirsuto, oculis oblongis, magnis, capite spadiceo, prædæ causa acrem cum Bombylio pugnam init, & volatu superans dorsum agilis conscendit, eique tenaciter inhærens tam acriter mordet, ut hostem præcipitem in terram mittat, & melle qualicunque absorpto victrix abeat. In summis Cartmeli montibus se hanc pugnam, donec acies staret, conspexisse memorat in schedis Pennius, sed fortuna muscis favente Bombylios vita fuisse ejectos narrat.

PUNCTUM VI.

De Muscis Moufeti terrestribus.

αἰσχροφάροις.

Αἰσχροφάροις rebus ab animalium natura diversis victum quæritant, suntque *Humisuga* & *Herbivora*, quas itidem Moufeti verbis describere placet.

Moufetus Theatri Insect. p. 74.

Humisuga corpore est fusco, in capite juxta os albicante macula resplendens. Venter & pedes nigri: secus alarum exortum macula utrinque album gerit, dorsum griseum. In scapulis secundum longitudinem quatuor lineas obscurius albicantes obtinet, alas argenteas, & (si in aquam positæ fuerint) noctilucas. In semitis & talparum tumulis recens egestis invenitur, amat etiam humum pedibus complanatam & lævigatam, unde ab Anglis vocatur *Thegraypath flye*: floribus rarò insidet, eâ præsertim tempestate, quando talpæ terram evertunt cujus se humore sustentant.

Herbivorarum varix sunt species, quarum tres apibus ferè similes, Luciano *εραβιδίδες* dictæ, id est, militares. Sunt enim aliis muscis grandiores; animosiores, magis-

gisque athleticæ, aspectu pulcherrimæ, alis argenteis duabus perinsignes.

Harum *maxima* & *primaria* caput nigricans habet, dorsum medium inter duas lineas transversas veluti decussatum, extrema cauda nigra. Aliàs corpore est luteo.

Secunda non multum dissimilis, capite nigricante, scapulas quatuor lineæ flavæ, & tres nigræ secundum longitudinem ductæ ornant, reliquum corpus eodem ferè modo & iisdem coloribus est distinctum.

Tertia atque minimæ harum scapulæ flavent hirsutæ, caput rubet, reliquum corpus quatuor lineis nigris totidemque flavis per transversum actis distinguitur. Omnium corpora splendent, ac quasi inania translucent. In hortis versantur, & floribus assidentes succum eliciunt.

Lucianus militares muscas ita describit: Nascuntur, inquit, & maximæ quædam muscæ, quas militares multi appellant, nonnulli verò canes, sonitu asperimæ & volatu velocissimæ. Hæ & longissimæ vitæ sunt, & totâ hyeme incubatæ perdurant: contractæ præsertim & connexæ tectis & culminibus. In quibus & illud est admiratione dignissimum, quod utrumque & foeminarum & marium faciunt, ut Mercurii & Veneris filius, qui mista natura fuit & duplici forma. His fortè *συγγενὴς* est alia musca apiaria dicta, cum splendore nigra, bipennis, cerilega, collectos florum succos posterioribus pedibus affigens apum more. Autumno apparèt, rarissimè aliis temporibus. An hæc Aristotelis Sirenis? Sanè alarum tantum numero dissentit, quoniam illam *τετραπτερον* fecit, hæc verò duas tantum alas à natura consecuta est.

Harum aliæ sunt *εραλὸπτεροι*, aliæ *ερινόπτεροι*, aliæ *χελιδόνες*.

Strutiopterôn tres species vidimus. *Prima* tenera est & mollis, sepes, binis alis, alvo oblongâ, à capite paulò supra oculos duas veluti struthiorum pennas præmitens, ceu cornua lanuginosâ mollitie ne ipsis quidem plumis cedentia: scapulis utitur gibbosis, reliquo corpore albo, nigris suis alis longiore.

Secunda est ejusdem generis colore albicante, capite fusco, aliàs parum differt.

Tertia est omninò similis, sed antennas adeò molles & plumosas non habet, cauda albicat, corpore oblongo, quatuor albis lineis transversis insignitur, pedes, longiusculi, albo nigroque colore distincti: dum gradus confert, caudam paulatim elevat, atque alas binas translucidas veluti jactabunda diverberat. Hæ tres species verno tempore cum primis apparent in hortis sepibus atque umbrosis locis, post atque ante pluvias frequentes.

Eripnopteros tota alba est musca, vel potius argentea, exigua & ubique plumosa, adeò, ut, dum foliis insidet, nisi penitus intuearis, plumam diceres: alæ illi quasi dissectæ, separatis pennis avium ferè modo disjunctæ. Ab Edmundo Kniveto depictam accepit Pennius, deinde in sepibus & ligustrinis topariis sæpius vidit.

Musca, *χελιδὼν* dicta, volatu post se omnes relinquit, lateribus, caudâ, capite fusca & pilosa, oculos nigros habet propendulos, rostrum vel potius nasum mucronatum, è cujus apice antennæ duæ erumpunt; scapulæ summæ, ut & dorsum, nigræ: alæ duæ argenteæ, quarum partes anteriores pedum nigredini respondent. Quandoque in uno loco residet, veluti immobilis, verum ubi propè accesseris, incredibili celeritate oculos fallit, & ne hirundini quidem celeritatis palmam (unde dicta Hirundo) unquam concedit.

Quam à Clusio Pennius accepit, nigra erat, alis duabus argenteis instructa, oculis albis conspicua. In dorso septem maculæ luteæ cum nigro in medio puncto erant.

PUNCTUM VII.

De Muscis *Moufeti seticaudis*.

PRæter has Muscarum species observavit adhuc *Moufetus*, *seticaudas* seu *pilicaudas* *πριχίμυς* & *Raras*. Illarum aliæ *unam*, aliæ *duas*, aliæ *tres* quatuorvè setas habent.

Moufet. theatri insect. p. 63.

Henothrix five *Unifeta* (sunt verba *Moufeti*) est musca caudata, toto corpore nigra (medio dorso ventreque rubesciente excepto) alis duabus argenteis prædita, scapulis crassis, antennulis duabus nigellis facta, pillum unicum longum è cauda emitens. Hanc depictam ad Pennium idem Joachimus transmisit, affirmans eam non nisi Ameo præstantiori insidere, reliquas herbas non attingere.

Διτὸπτεροι sunt muscæ duas in cauda setas pilosæ habentes, quarum aliæ sunt corpore fastigiato, aliæ tuberoso. Prioris generis duas vidimus alis quatuor argenteis sine maculis, capitibus & scapulis nigricantibus, reliquo corpore fusco, nigris lineis transversis variato. Utrique longæ & exiles antennæ, similesque in caudâ pili duo, sed paulò longiores, corpore tuberoso.

Bipiles quinque habemus. *Prima* *Henothrici* per omnia ferè similis, nisi quod huic plus quàm media corporis pars flavescit, duos in cauda pilos prælongos, quo-

quorum unus extensus canis leporarii currentis caudam refert, alter intus convolutus lineam spiralem.

Secunda muscarum longarum species est, quatuor habens alas argenteas, pedes longos mediocriter flavescentes, totum corpus nigrum, scapulas crassas, antennis duas longas & tenues, ventrem versus caudam protuberantem, è qua duæ breves setulæ sursum versæ erumpunt; In sepibus degit.

Tertiam Carolus Clusius Vienna misit: corpore ex fusco nigricante, alis duabus largis ex argento cæruleis donatam, corpore præditam acuminato, ex quo duæ seræ (ut Pennius notavit) vel plumæ potius excrescunt perdicei coloris, maculis nigris fuscisque mixtim ornata.

Quarta globoso est corpore, quod unciam longitudine æquat, caput, scapulæ ac pectus nigerrima, antennæ breves; pectori crasso sex pedes affixi nigerrimi, quorum priores omnium brevissimi, posteriores longissimi. Inter volandum pedes simul conjunctos pendulos dimittit, alæ quatuor obscuræ, argentei coloris, oculi nigri splendentes, caudæ extremitas nigra, unde duæ setulæ paucillæ longitudinis se monstrant: à scapulis ad mediam usque caudam colore est ferè subcroceo, cauda tenui quasi filo longo scapulis jungitur. Velociter currit quasi per saltus, in terra nidificat, muscis & erucis parvis famem extinguit.

Quinta longè hac minor est, figura eadem, sed alas verè argenteas monstrat, totumque corpus ad caudam usque fuscam rubescit.

Tripilium muscarum quinque duntaxat observavimus.

Prima oblongo est corpore & nigro, cujus medium valdè ex nigro rubet: antennis habet duas, etiam nigras, alas argenteas, quarum supremam oram macula nigriuscula adornat. Crura rubent, cauda tres crines longos emittit, velociter volat.

*Alter*a similis, sed minor, toto corpore nigra, priore multò longior, tenuior atque exilior; alæ item argentæ, antennæ priori similes, ac cauda tres longos pilos protrudens, volatus celeritudine à prima longè superatur.

Est & musca *tripilis* toto corpore albicans, nisi quod alæ quatuor maculis nigris distinctæ videantur, quarum exteriores majores, interiores verò breviores, has, dum quiescit, semper erectas tenet. Sex habet pedes, quatuor minores corpori affixos, duos anteriores majores, nigros, è collo ferè oriundos; inter duos oculos nigros prominentes globosos duæ antennæ nigræ atque breves exeunt. Corpus gracile, teres, longum transversum digitum: in

cauda tres visuntur setæ corpus longitudine æquantes, quas volando in veri trianguli modum expandit. Majo & Junio mensibus ante & post pluvias potissimum apparet; circa fluvios paucis comitibus stipata convolat, quibuscum in itinere sæpè coludit. Anterioribus pedibus utitur quandoque ad palpandum, ecquid in via impedimenti sese objecerit, extendit enim illos corniculorum more. Talem anno 73. observavit Pennius.

Sequitur *quarta* mirabilis structuræ, alas habet duas argenteas, totum corpus nigricat, os forcipatum & aquilinum, in fronte duo cornicula breviter erumpunt: quatuor illi tantum sunt pedes, sub pectore duo graciles & breves; paulò inferiori reliqui robustiores. Ex oblonga cauda primum duo brevissimi pili exeunt, atque sub his tertius multò longior, in extremo tuberosus oritur. Semel tantum se hanc muscam circa Hinigham, olim Comitatus Oxoniensis castrum, vidisse memorat Pennius.

Ultima toto corpore & cauda nigra est. Corpus habet oblongum, alas duas corpore nonnihil breviores, pedes ex croceo flavescentes, caudam longitudine reliquum corpus æquantem, nisi semel in Cantio circa Greenhive visa perhibetur à Pennio.

Quadripilis musca corpore Tripilem primam repræsentat, sed magis versus caudam protuberat; pedes item nigri, ut antennæ, alæ item proceræ, quarum externæ internis triplo majores circa medium nigrâ maculâ distinctæ. Quatuor è cauda pilos emittit.

De *raris* muscarum speciebus, quarum quædam ad Papilionum censum spectant, ita idem.

Prima est musca papilioni minori æmula, alis quatuor argenteis, nigricantibus maculis corpus argentæ lineæ transversim ornant, cauda rubens ex fusco, caput nigrum, scapulæ ejusdem cum cauda coloris, antennæ tenues, nigræ, breves, pedes exigui, nigri; in sepibus versatur præcipue tempore matutino.

Secunda parum à prima diversa est, nisi quod unâ cum corpore antennis, pedibusque & cruribus fusca sit.

Tertia est item *τριανθης*. Sunt autem longiores illi alæ, maculis nigris distinctæ caput majusculum, nigrum, punctulis luteis pauculis notatum, antennæ tenues, duæ, nigræ, pedes sex subalbicantes, pectori crassiusculo affixi: scapulæ lutescentibus ex albo maculis variegatæ; dorsum quinque lineæ transversim ornant luteæ, ac punctulus unicus inter duas lineas conspicitur colore subluteo; in cauda quinque vertebræ rubent, cujus extremitas bifurcata est.

Quar-

Quarta est non valdè dissimilis, sed alas habet argenteas, sine maculis antennas nigras longiores. Corpus septem lineis transversis albicantibus insignitur.

Vidimus & duas muscas *scorpiuros*.

Prima similes habet præcedenti alas argenteas, sed paulò minores, & in extremitate ipsarum tribus transversis lineis nigris signatas, caput nigrum, pectus (ut & scapulæ pedesque) albicat: reliquum corpus nigrum, cauda quinque quasi juncturas habet, quarum tres dilutè rubent, duæ nigricant; extrema cauda bifurca, furcæ autem nigræ, & scorpionum modo sursum curvatæ.

Secunda ferè similis, sed extremitas caudæ crassior, furcæ obtusæ, caput luteum, oblongum os, alæ singulæ sex maculis nigris ornatae.

Est & alia musca *quadripennis* corpore virescente, alis quatuor corpore longioribus, è liquido quasi argento factis, quarum nervi virescunt; antennæ huic tenues & nigræ, oculi aurei (unde jure Chrysopis dicitur) volatus languidus, odor teterrimus, quem, ut blattæ, cum vita amittit. Hortorum hospes vivit sambuco insidens. An ex Eruca oriatur, papilionum more, an verò ex vermibus arborum, equidem ignoro. Doctissimus ille atque humanitate clarissimus Joachimus Camerarius primus illam Pennio ostendit.

ARTICULUS III.

De Tabano.

Nomen.

ET si Isidorus & Junius Tabanum cum Oestreo seu Asilo, eundem faciant: ipsa tamen descriptio, diversitatem inter eos ostendit, Græci *μύπα*, à stimulando fortè, nam *μύω*, calcar, quo equi stimulantur significat, dixere. Apud Latinos tabe, quod corpore tabeat, id est gracilis sit, nomen obtinuit.

Descriptio.

Totum corpus oblongum est, in tres præcipuas partes divisum, caput nempè scapulas & ventrem, quinque vel sex incisuris distinctum. Nigricat ex diluto albo totus. In ore proboscis longa, torosa. Sex non octo ut Ardoinus prodit, nigris pedibus instruitur: reliquis maximam *κυνομύαν* refert. Cauda ei stimuligera nulla.

Plin. H. N. 11. c. 28.

Plin. H. N. L. 11. c. 33.

Frequentes sunt circa sylvas & vias regias, sepibus arboribusque munitas. Ex ligno, Plinio teste, proveniunt. Ex eodem nasci scripsit Aristoteles. Julio & Augusto mensibus propter nimium æstus ferociunt: homines tum, equos & serpentes affligunt. Equum in sylva ad arborem alligatum, sex horarum spacio à Tabanis occisum, Moufetus ab amico fide dignissimo accepit. Quia longè videre

nequeunt, jumenta per sudoris odorem consequuntur. Gerunt cum teterrimi foetoris serpente, circa Hellespontum bellum. Camelos etiam infestare, pinguedine piscium abigi, prodidit Plinius.

Diversa Tabanorum in India Occidentali genera esse, Oviedus observavit, sed non descripsit. Duo apud Aldrovandum habemus. *Unum* est corpore minore, capite nigro, antennis brevissimis, ut vix appareant, pectore & pedibus nigris, alis subluteis, circulisque concoloribus qui alvum ambiunt. *Alterum* minus adhuc, capite nigro, duobus albis punctulis in vertice insignito, pectore ex nigredine ad subcinereum colorem tendente. Alvo & alis subcinereis.

Proximè Tabano illa musca accedit, quæ *Μουσερίον* & *Curvicauda* Pennio. Api ferè est similis, corpus duntaxat crassius. Stimulo in cauda pungit, quam jumento insidens, versus ipsam recurvam tenet. Non facilè nisi in Anglia invenitur. Sunt qui stercora equi pilis affigere, sic pungere credunt; quòd molestissimæ postea inde lentes nascantur.

Huc referri potest & illa apud Moufettum *Tabanides musca*, quæ capite & corpore virescit. *Scapula* ex virore splendet: alas habet duas extremis mediisque partibus albicantes, reliquæ ex fusco nigricant. Pennius semel Hanworthi talem observavit.

Nicand. in Theriaca. Plin. H. N. 31. c. 2.

Differentiæ. Aldrov. de Insect. 3. c. 4.

Moufet. p. 62.

Moufet. Inf. 1. c. 11. p. 61.

ARTICULUS IV.

De Asilo seu Oestro.

ASilus à Calepino & aliis cum Tabano confunditur. Perperam, superius dictum. An à Silaro amne ad quem frequens, nomen sumpserit, dubium: ab asiliendo, vel quòd asellos infestet, verisimilius mihi est. Græcis est *οἰστρὸν* (Latinis Oestrus & Oestrum) *ἀπὸ τοῦ οἰστρεῖν*, infanire, quòd armenta in furorem agat. *Αἰόλον* Eustathius ex Homero vocat, vel quòd forma sit *ὀπρόχαλκον*; vel quòd turbinis in modum moveatur. A feroci natura Oppianus *ἀγριον* dixit.

Est *χλωροκεφαλὴς*, & toto corpore *ὀπρόχαλκον*, sive subætatus, superat Tabanum proboscidis magnitudine; ab eodem verò bombi stridore vincitur. Gestat antèrius, durum, robustum, & benè compactum *aculeum*, quo boves tergo facile pertundit. Eustathius muscæ per omnia similem; sed majorem facit. Alii locustæ similem (perperam) colore varium, mobilem, *ὀπρόχαλκον* ponunt.

Circa stagna & fluvios versantur, ad Silerum Lucaniæ amnem maximè. Elatioribus quibusdam bestiolis, quæ fluvios su-

Nomen.

Descriptio.

Suidas.

Natura.

Arist. H. A. l. 5. c. 19. pernatent oriri, ex Aristotele habemus; quas fortè alio in loco culices aquaticas nominat. Nicandri scholiastes hirudines, interpretatur: quasi sanguivora soboles ex sanguisugis matribus prodiret. Nasci & ex putri, nemo fortè negaverit. Tantummodò boves laceffunt, quos interdum furibundos reddunt; æstu inprimis urente. Ne attingant, piscium fortè adeps, ut apud Plinium legimus, faciet. Celerrimè volant, & præcipites.

Differen- tia. *Moufetus Ocularii, Apiarii, Indici, & Moscovitici* meminit. Prioris jam meminimus. *Apiarius*, in extremis partibusavorum nascitur. Caput est spadicei coloris: linea alba à fronte ad occiput intercurrit: scapulæ & dorsum fuscescunt. Non florum duntaxat succo, & melle, sed & sanguine vescitur. *Indicum* Virginia profert; muscæ maximæ capite subrubente magnitudine, capite nigro. Linea argentea à scapulis ad os pertrahitur: ipsæ ex fusco nigrescunt, & geminas alas argenteas emittunt. Caudam sex vel septem subalbidis coloris incisuræ stringunt, reliquum corpus subnigricat. Venter ex cinereo lutescente dilutè virescit. Celerrimè volat. *Moscoviticum* Elmerus Chirurgus Moufeto misit. Alæ huic argenteæ, toto corpore longiores; oculi magni, oblongi, & maximam capitis partem replentes, rostrum nigrum, duriusculum, tripartitum, quo citissimè caligas è triplici panno confutas penetrabat, & cutem ipsam admordebat.

ARTICULUS V.

De Ephemero, & aliis quibusdam.

*E*phemeron muscam vocat Aristoteles, quæ Æliano *ἐφίμερος*, Hesychio *μωνίμερος*, aliis *ἡμερόεις*, Latinis Diaria vocatur. Meminit ejus & Cicero. Quatuor alis, totidemque pedibus movetur, ut apud Aristotelem legimus. Scaliger addit, caput quale muscæ, oculos grandissimos, promuscidem in se convolutam; caudam longissimam, sectiunculis coaggestatam atque coaptatam, in extremo bifidam & trifidam; colore sub aureo in majoribus, in minoribus subfusco illustrem, ventriosa est. Taurini *Moniëttam* vocant quasi Monachellam: Adriatici ad Maranum & Tergestæ *Cuxotullum*; alii Sitivolam, quasi Sagitellam. Unà cum sole oritur, adolescit, vigescit, languescit, moritur. Scaliger nullam manè ad Sarcam & Benacum conspexit, circa vesperam omnes, captam per noctem servavit. Sub solstitio æstivo ex folliculis quibusdam uvarum putrescentium erumpit. Plinius tenues mem-

branas vocat. Frequentissimæ ad Hippanum fluvium inveniuntur, prodente Aristotele. An verò folliculi isti Chrysalides sint, à quibusdam Erucis prodeuntes, difficile est dicere. Succo animulam sustentant, nec aëri nec terræ quicquam debentes. Michevius eorundem ad Borysthenem meminit. *Sunt*, inquit, *vermes, & volucris alata, quaternis, interdum senis alis, manè supra aquam currendo, circa meridiem juxta ripas volando sese exercent, sole verò occidente, quotquot eo die nata sunt, eodem obeunt.* Huc pertinent, Pennii *πεννίος*. Æliani *Ephemeros*, & Scaligeri *volucella*. *Τριήμερος* corpore est oblongo & papilionari: Capite parvo subluteo; oculis grandibus, prominentibus nigris; *promuscide* involuta, verbasci lutei coloris, quo rorem à floribus fugit. *Cornicula* duo nigra, longiuscula, paulo supra oculos affixa habet: *ventrem* & dorsum sublividum, extremam caudam ferè luteam. *Alas* quot pedes; quarum exteriores lividæ, extremis fimbriis ex fusco subluteis, interiores ex fusco flavescentes. Alæ externæ, cum ad corpus tegendum conjunguntur, adeo sunt contiguæ, ut contactum earum vix animadvertas. Tardivola est, nec diu in volatu durat. Inter malvas & urticas, & quidem triduo duntaxat, vivit. Quam Scaliger *Volucellam* vocat, illa Cardano *Muscilio* est, Moufeto Bibio, Æliano fortè, *ἐφίμερος*, Grapaldo *Muscilla*, *muscula*, & *Muscio*. Ælianus suam è fece vini acescens oriri scribit: Grapaldus suam per autumnum in vinaceis. Nullum etsi rostellum habere videatur: ajunt tamen, dolia unciali robore confecta ab iis pertundi, ut vinum totum effluat. Frequentissima est in cellis, nec quicquam præter vinum appetit.

Coronidis loco duas adhuc Muscarum species adjiciemus. Una in florum calicibus, herbæ illius quæ *Ben album* à plurimis vocatur, latet, & quidem florivora: ut à Bruno Pennius accepit.

Alterà in occidentalis Angliæ urbis cujusdam agro (Tanton vocant) in fructu mali arboris, quem *Velin* appellant, æstate ad umbilicum mortua, viridis ac splendens reperitur.

Malo dissecto musca evolat, & ex vermiculo quodam ibidem orto gigni videtur.

ARTICULUS VI.

De Culicibus.

*C*ulex vel ab aculeo, quod eo sanguinem sugat & carnem terebret, quod Isidoro visum, Latinis dictus est; vel

Arist. H. A. l. 5. c. 19. & de partibus Animal. 4. c. 6.

Michev. Sarm. Europ. l. 2.

Moufet. Theatri Insect. I. c. 12.

Ælia. H. A. l. 2. c. 4.

Moufet. l. c. pag. 77.

Nomen. Isidor. Orig. l. 12. c. 8.

H

vel

vel quasi *Cutilex* quod cutem laciāt. Ufurpatur in virili & muliebri genere. Moufetus *Cuticem* vocare mallet. Græci, generali quo omnes culices comprehendant, nomine carent. *κύνωψ* amplissimum est, quod *πρόνωψ* Pausaniæ. Hinc Oetæis Hercules Conopius, qui culices abegit: Bæotiis Parnopius Apollon. Rulando, *ἐμπύς*, *κινάπεψ*, *κύνωψ*, *σάβησις*, *σέρφω*, *συνίψ*, & *κνίψ*, Synonima sunt. Nihil quidem certius *ἐμπύδα* culicem apud Aristotelem Gazæ esse: sed Aristophanis scholiastes, *ζῶον ὕδατος γινόμενον, ὁμοίον τῷ κύνωπι, μείζον δὲ τῇ περιόχῃ, κατὰ δὲ τὸ μέσον λελυγμένον*, seu animal propè aquas genitum Conopi simili, majus verò in circumferentia, & circa medium, linea alba cinctum, interpretatur. Alibi tamen *κύνωπα* dici ponit. *Κινώπεδα* Hesychio sunt *κυνόδαλα θηρία*: animalia reptilia, Nicandro *ἐν τῷ πένδω κινέμενα*, *κνίψ* peculiaris generis nomen esse videtur, quod fortè Plinio sub *Culicum mulionum* nomine venit. Hesychius volucre culici simile exponit. *Σάβησις* eidem sunt *κύνωπες*. *Σέρφω* denique animalculum formicæ aut veri simile Varino. Videtur & *σέρφω* dici. Constantinus animalculum Culici simile exponit.

Descriptio. Miratur hoc insectorum genus Plinius. *Ubi, inquit, tot sensus collocavit in culice? Ubi visum in eo prætendit? ubi gustatum applicavit? ubi odoratum inseruit? ubi verò truculentam illam & portione maximam vocem; ingeneravit? qua subtilitate pennas adnexuit? prælongavit pedum crura? disposuit jejunam caveam, uti alvum? avitam sanguinis & potissimum humani sitim accendit? Telum verò perfodiendo tergori; quo spiculavit ingenio? Atque ut in capaci; cum cerni non possit exilitas, ita reciproca geminavit arte, ut fodiendo acuminatum pariter, sorbendoque fistulosum esset. Corpus eis oblongum, proboscis, quam omnes in ore gerunt, quia ex bipennibus, muscarum proboscide triplo longior. Alæ duæ, magnæ, ex gibbosis scapulis oriuntur. Crura sec vacua, prælonga, valga, è pectore prominente & quadrato nascuntur, cum ut melius ambulent; tum ut facilius sese humo attollant.*

Locus. Paludosis & aquosis locis plarumque gaudent. Mesopotamia insignes & leonibus infestos alit. In Ægypto magna eorum copia. Bellonium cum comitibus ita circa Cairum vexavere, ut exanthematibus correpti viderentur. Eorundem cantu famosa Adriæ littora facit Martialis. In India Occidentali invenias qui vestes pertundant. Antiochiam & Byzantium ne possent ingredi, Appollonium Thyanæum fecisse, Tzetzes author est. Acidis delectari Aristoteles & post eum Plinius, reliquit. Nec dulcia respuere certum, siquidem sanguinem humanum,

qui dulcis est, eliciunt. Haurunt & vinum, consumptoque moriuntur. saliceto, ut Martialis habet.

Quia non coeunt, Ideò necesse est, ut ex putri, vel aliunde nascantur. Albertus ex aquosis vaporibus oriri scribit. Ex coctis provenire primus Pierius, & falsò, prodidit. Ut verbo dicam. Alii ex putridis cadaveribus, ex putrida in paludosis aquis materia alii: ex herbis, arboribus, ut polio, lentisco, ficu, therebintho, palmâ, ulmo, quidam prodeunt. *E vermiculis*, inquit Moufetus, *in napo, ligustro, lentisco, therebintho, ficu, caprifico, aliisque arboribus veluti seminum sparsis, & per non putrescentem sed animantem naturam natis, culices prodire nemo non novit.* Brujerus verò insectum longis admodum pedibus, quod culicem majorem dixisset, in lacuna valde fordida, ex theca coriaceâ molli sese proripere, vidit: putabatque ex verme aliquo crucæ simili ibidem incluso ortum duxisse: quòd casula talis intus fuisset, in qualem sese crucæ transformare solent. Plura in Differentiis.

Olfactu plurimum valent. In volando, aërem, ob alarum mollitiem & alvi tenuitatem, non commovent. Lumine adeò delectantur, ut sæpissimè in lucernas incidant. Strepitum alarum continuâ & replicata concussione edere, credibile est. Chærephon apud Aristophanem, an per podicem, an per os canant, facetè ex Socrate quærit. Quia morfu valent, ideò non mirum, Myntem urbem, è palude quadam, quam Mæander fluvius obstructo limo ostio, effecerat, olim vastasse: Acarnensium urbis quæ juxta Asiæ Pergamum frequens habitabatur, pulsos incolas, quod apud Pausaniam habetur.

Idem leonibus in Mesopotamia, & apud Rizophagos qui Astaboran & Astapan fluvios circa Meroën incolunt, Oriente Syrio olim accidere fuetum, Diodorus Siculus & Strabo authores sunt. Licet ex iisdem & præsagium sumere. Divergente sole, si in aprico colluserint, caloris, si in umbra, tepidas & mites pluvias, si prætereuntes pupugerint, frigus & nimbos præsagiant. Congressi aliquando inter Sennæ & Sionis monasteria in Anglia, (pugna per quatuor horas duravit) Monachorum exilium quibusdam innuisse credebantur: Bella in parte Occidentali nonnullis cum anno M. D. LXXX. per quatuor continuos dies, ex Italia, in Occidentem evolarent. E pomo quercino, si circa Michaëlis festum culex eruperit, bellum hostile Mizaldo præsagire videtur. Aquam subesse Paxanus eo loco pollicetur, quo se sole exoriente, trabis instar contorquent.

Multa

Tzett. Chil. 20. Cibus. Arist. H. A. l. 4. c. 7. Plin. H. N. 10. c. 70. Generatio.

Moufet. Theatri Insect. l. I. c. 13. p. 84.

Natura.

Pausan. in Achaicis.

Remedia.

Multa eorum exitio, vel ut fugarentur, vel vitari possent, humana industria invenit. Conopæo olim Alexandrini utebantur: hodie in summis ædibus sub dio habitant. Indi arenâ obruti, faciem frondibus inter ramos contegunt. Culices, eorum quidam, ut sibi pareant, adorant. Septentrionales tentoriolo ex panno lineo vel cortice facto se includunt. Merula cannabis humidæ ramusculos in lecto apponendos suadet. Angli suum *Fencanapy* palustre conopæum, seu stercus bovinum, patulum, planum, semiaridum, vel duriusculum filo ac imum lectum suspendunt. Huic odore illecti, totam noctem insident. *Abiguntur*, coniza, cupressi pillularum cum arboris coma, absynthii, melanthii, lupinorum, juniperi, rutæ, vitrioli, &c. suffitu, de quibus apud Dioscoridem, Plinium, Galenum, & alios legimus. Rhases pilum equinum per mediam domum extentum commendat: Pedemon-tanus, pulverem cumini subtilissimè triti, cum vinoque misti, quo pampini vitis, aut alicujus arboris frondes irrorari, cubiculorumque ostia, & fenestræ aspergidebent. Adhibetur & aceti cum origano decoctum. Ne jumentis noceant; serpentariæ suffitum facere, Olaus M. auctor est: ne hortis, amurcam recentem & ex caminis fuliginem hortis inspersam, Palladius; malicorii aut galbani fumum, Plinius *Enecantur*, si rutam decocto conyzæ madidam, in ædium angulis deposueris.

Ufus.

Vilis licet, abjecta & molesta bestiola, usum tamen aliis animantibus præstat. Solo quippe culice *Thymalus* piscis, *Ticini* fluvii incola capitur. *Crocodilus* iisdem victitat. Aves *κνιπόλογος* dici diximus, & *κνιποφάγος*. Plura in Differentiis dicemus.

Differentiæ.

Magnitudine imprimis, & generandi modo præcipuè differunt. Sunt quidem *magni*, quidam *parvi*, quidam *minimi*. *Magni* *ἐλαίοι* dicuntur, quod palustribus locis oriantur & vivant. Corpore sunt oblongo, duabus alis præditi, quas elimatas & politas, supra humeros extendunt. Ocreas sæpè & triplices caligas perforant; & morfu venenato, modo dura & livida tubercula; modò vesicas, modò punctula pruritu plena inferunt. In Hispaniola & calidioribus regionibus sunt crudelissimi. An *Θεοφράστη*? Strabo *μεγάλους κύνωπας* vocat. *Parvi* morfu mitiores sunt, æstate umbrosa, hyeme nivosa incolentes. Salsum duntaxat sudoris pabulum morfu eliciunt. Unde tuberculum jucundi pruritus plenum exoritur. Juxta sepes & arbuta mutuis quasi cursibus coludunt. *Minimi* in Anglia aquilonari, pyramidali semper figura provolant: figuræ suæ aciei fines nemo transiit. *Sursum deorsum* (verba sunt *Μουφeti*) feruntur, noctu oculi, & dicto citius,

in latera aciem deducunt, totumque subito exercitum in latera dispersiunt; quæ sive muscario sive pulvere, sive aquâ affusa, sive spiritu violento fregeris, coeunt tamen confestim, & ante digiti crepitum, in pyramidalem sese formam omnes recolligunt. Ex uliginè putrescente oriri credo, vaporeque aqueo ali. Intestinum siquidem iis tenuissimum, album, ferè invisibile, spumeo, albo, tenuissimo, & nullius ferè tenacitatis humore plenum. Longius quandoque ab aque volitant: & loca à flatibus libera amant. *Pierius Valerianus*, cujusdam generis inter minimos mentionem facit, quod tam est exiguum, ut visum inter volandum fallat, nisi intenderis; sed tam acuti ictus, ut cutem pèrterebret.

A modo generandi differentias apud Græcos habemus. *Εμπis*, *φλν*, *κνίψ*, præcipuæ sunt. *Εμπis* quid sit superius dictum. Albo cingulo à natura ornatur. Unde *Aristophanis* scholiastes, *ἐἶδος κύνωπας παραπτοάμενον ζώνην ἔχοντα*, dixit. *Muliones* quidam vocavere: sed perperam. Hi enim uno tantum die vivere dicuntur, & tanquam *Melliones*, quod solo melle vescantur vocari. Rostrum habent pici arborei instar, longum, acutum. *Crapulâ* disrupti statim expirant. *Eripidas* ex *Ascaridibus* (malè *tipulas* vertit *Theodorus*) fieri scribit *Aristoteles*.

Ascarides autem in limo puteorum, quo aqua, subsidente concretionè terrena confluunt. Principio limus ille putrescens, colorem capit candidum; deinde nigrum: postremò sanguineum. Tum ex ea quædam perexigua rubra oriuntur, algæ pusillæ speciei. Ea aliquandiu hærentia moventur: postea abrupta feruntur ab aqua, & vocantur *ascarides*. Diebus haud multis post, tollunt sese rectas ab aqua; neque moventur, & sunt duræ: tandem abrupto putamine culex superinsidet, donec sole vel flatu moveatur, ut inde avolet. *Φίγες* ficarii sunt culices. Generantur ex caprificis eorumque putrescentibus granis. Ideò cum evolavere non inveniuntur intus grana, quæ in eos versa apparent. Usus in maturandis ficibus. Nam fraudati alimento in matri, putri ejus tabe ad cognatam volant, morfuque ficum crebro, hoc est, avidiore pastu, intus solum secum primò inducunt, cerealesque aures immittunt foribus apertis. Mox lacteum humorem sive infantiam pomi absument: quod fit & spontè: ideoque ficetis caprificus præmittitur ad rationem venti, ut flatus culices evolantes in ficus ferat; qui ubi ingressi fuerint, turgent fici, & celerrimè maturescentes altum tumescunt. Ad hos pertinent quos *κνίπας* Græci, Latini *Gulices Herculeos* vocant. Inertes vivunt, & nonnisi ex occisis sui generis culicibus cum succo & sanguine plenos conspexere, victitant. *Κνίπες*, vel *σκνίπες*, ἀπὸ τοῦ κνίβειν, quod mordendo vellicent & pruritum excitent dicuntur.

Pier. Hieroglyph.
26. c. 24.

Arist. H.
A. c. 18.
Scal. edit.

Plin. H.
N. l. 15.
c. 19.
Arist. H.
A. 2. c.
32.

Plin. H.
N. l. 17.
21. l. 19.
c. 10. l.
23. c. 6.
G. l. 27.
c. 5.

Theophr.
de C. P.
2. c. 4.

Moufeti. l.
c.

Theophr.
H. P. 2.
c. ult.
Theophr.
H. P. 4.
c. 17. tur: Theophrastus vocavit etiam *ἄνθρ.* Videntur, secundum Plinium, ex humore dulci subdito corticibus in quercubus nasci, quod ex Theophrasto sumptum est. Velarandus Insulanus Pharmacopæus, ex quercus pillula; & gallæ foraminulentæ meditullio frequentes prorumpere observavit. Proveniunt & in ulmo, napo, rapis, polio, lentisco, therebintho, & aliis, cum vel sine putrefactione. Humorem ulmi vesicis primâ germinatione inclusum si aruerit, in *κνίπας* mutari, Symphorianus author est. Hortos præcipuè riguos infestant & incolunt. Pyramidis instar in aëre sublimes videntur, vesperi præcipuè, & juxta sepēs. Obliti ferè eramus *Vinaceorum* quos fortè Arist. *κνώπας* vocat. Trahunt ex vermiculis, qui in fæce aceti gignuntur, originem, *ἐκ σκαλίκων, οἱ γίνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος ἰλύου*. Generantur ter septem diebus. Wottonus in igne quoque nasci scribit: quod difficulter credetur.

Arist. H.
A. l. 5.
c. 19. In America circa metam incognitam & ad Nicolai portum miræ sunt magnitudinis. Incolæ *Yetin* vocant. Leriis inter pulices numerat apud Nieremberg nisi sphalma non est. In *Brasilia* est genus quoddam paulo minus vulgaribus tinnulis, elegantissimi coloris. Crura habet exilia sex brunni coloris, raris pilis hirsuta: Caput rotundum in duas parres veluti fissum superiusque ex viridi elegantissimus color resplendet ad latera purpurascens. Posterius corpus definit in aculeum satis longum, superius ex viridi elegantis aurei coloris & pilis raris hirsutum: habetque quinque juncturas subnigricantes: alas duas tenues satis longas, iridis colores repræsentantes, imò superantes: in capite cornicula duo, &c. Sed hæc per microscopium exploranda. In *Hispaniola* invisibiles quidam sunt, sed adurentis ictus. Littora amant, nec in interioribus inveniuntur. In ramis arborum circa eos præsidium. His domos cingunt. Huc fortè *Musca Culiciformis* Moufeti spectare, nisi coire scriberet, quod Culicibus negavimus.

Aldrov.
3. de In-
sect. c. 5. Aldrovandus, ne & circa istos nobis deesset, duas iconum variorum tabulas proponit, iisdem duas alias species adjicit. Qui exactè cum muscis Moufeti comparaverit, haud paucas inter eas inveniri fatebitur. Primâ tabula enim. 1. *Culex* communis dicitur. Vide p. 386. Bonon. editionis.

TITULUS II.

De Insectis Coleopteris seu Vaginipennibus.

CAPUT I.

De Locustis.

ARTICULUS I.

De Locustis in genere.

Tantum de Anelytris tam quadripennibus quàm bipennibus sufficiat: sequuntur *Cleoptera* seu *Vaginipennia*, *Locusta* nempe, *Gryllus*, *Scarabeus*, ad quem *Proscarabeus* spectat, *Cantharis*, *Ips*, *Euprestis*, *Coccojus*, *Cicindela*, & *Blatta*. Nullo aculeo infestare, difficulter volare, pennas fragiles & cortici inclusas habere, sedentia potius quam alata videri, commune omnibus. De Locustis tanquam maximè notis primò agemus.

Videntur apud Latinos fortidæ nomen, vel quod sint longis pedibus instar hastæ, vel quasi loca usta, quod messes & alia quod attingunt urant. Græci in genere *ἀκρίδες*, *παρά τὸ ἀκρὸς τῶν σαχύων & τῶν οὐτῶν νέμεσθαι*, quod summitates segetum & plantarum depascantur, vocant. *μάσαξ, κύρνοψ, πέρνοψ, μολερὶς, ἀπτελὰς βρέχθ, ἀκαρὶς, μαλίς, κόρνωψ, πρῶξαλις, μετὰχόσση*, quod apud Dioscoridem legitur, specierum quarundam nomina esse videntur. Cretenses *Ἀχίρον* vocant: quibusdam fortè *βέτλανα*, & *φόβαρα*, quæ iisdem *ἀκρίδες* dicitur. De nominibus Ebræis consule Aldrovandum. Dioscoridi *μεγαλόκωλον* vocatur, quod posteriora duo crura longiora habeat.

Egrogie & breviter Claudianus depinxit.

Dioscorid. 2. c. 57.

Descriptio.

*Horret apex capitis, modo fera lumina surgunt,
Vertice cognatus dorso durescit amictus,
Armavit natura cutim, dumique rubentes
Cuspidibus parvis, multis acvere rubores.*

Albertus, caput habere figura equi scripsit: & ante os duo additamenta dura, quæ labiorum & dentium vicem suppleant. Aculeus est pro cauda, pedes sex, posteriorum crura longiora & ad seipsa reflexa, (Plinius foris curvari dixit) ut melius de terra attolli possent, intestinum unicum sanie & sordibus (succus is plantarum est) plenum. Nigidius oculos iis negat: sed Plinius concedere videtur, quod

Plin. H. N. l. 11 c. 29.

Arist. de part. anim. 4. c. 6. & H. A. 4. c. 6. Plin. H. N. l. 11. c. 37. quod & Claudianus facit. Insectorum, inquit, omnium, & quibus testacea opera-
menta, oculi moventur, sicut quadrupedum aures. De alis perpetuum non est. Aliæ simplicibus, pluribus aliæ volant; quædam fa-
liunt. Nec color, quod authori de rerum natura visum. Sunt virides, nigræ, lividæ, variegatæ. Exuvium serpentum instar de-
ponere, quo tempore operculum circum-
rumpitur, Aristoteles testis est.

Arist. H. A. l. 8. c. 17. Loc. Plin. H. N. l. 11. c. 29. Nulla eas non ferè terra alit; in quibus-
dam tamen frequentius grassatur hoc ma-
lum. Visæ nuper in Russia, cum servi &
mancipia ad signa convolarent, & legiones
facerent. In Syria militari imperio olim ne-
cabantur. Italiam ex Africa, inquit, Plin.
maximè coorta infestant, sæpe populo ad Si-
byllina coacta remedia confugere, inopie me-
tu. In Cyrenaica regione lex etiam est, ter-
anno debellandi eas, primò ova obterendo,
deinde fœtum, postremò adultas: desertoris
pœna in eum qui cessaverit. Et in Lemno
insula certa mensura præfixa est, quam
singuli enecatarii ad magistratus referant.
Civitatem in Africa ab eis pulsam M. Varro
author est. Apud Nigritas singulis trien-
niis ad duodecim milliarium spaciū ter-
ram inumbrant, si Cadamusto fides. Circa
Brundisium quotannis agros absument. A-
pud Cassini montis incolas tot, ut Seleuci-
das aves à Jove sibi precentur. Planis ve-
rò rimosisque locis maximè gaudent; quan-
quam & in montanis, ubi Cotinus prove-
nit, invenias.

Victus. Plin. H. N. l. 11. c. 23. Herbis & segetibus victitant. Ideo
μίσαντα Nicander *Κιτωφάγον* vocat. Amygda-
lorum floribus impinguantur, si authorem
de natura rerum sequimur: folia quoque
lauri depascuntur & vites. Ideò haud sine
causa Plinius: *Pabula petere sciunt. Deo-
rum ira pestis ea intelligitur. Namque &
grandiores cernuntur, & tanto volant pen-
narum stridore, ut alie alites credantur:
solemque obumbrant, sollicitè suspectantibus
populis, ne suas operiant terras. Sufficiunt
quippe vires: & tanquam parum sit maris
transisse, immensos tractus permeant, di-
raque messes contegunt nube, multa contactu
adurentes; omnia verò morsu erodentes, &
fores quoque tectorum.*

Sigebertus. Jul. Obsequ. de Prodigis. Plena de iis Historiarum monumenta,
inter quæ & memorabilia quædam occur-
runt. Anno Christi 591. tantam Italix in-
tulere pestem, mortuæ ad littora ab Africa
delatæ, ut DCCC M. hominum periisse,
Julius Obsequens scribat. Quæ anno 874.
Galliam vastabant, senis pedibus, ac duo-
bus dentibus durissimis instructæ erant. Du-
ces præmissi pridie castra metabantur. Vo-
litabant diurno itinere, quatuor aut quin-
que millia passuum. Britannico absorptæ
mari, mox ad littora rejectæ, ingentem pe-
stilentiam excitavere. Anno 1542. alis per

initia carebant; mox binas, tandem quatuor
assumebant. Anno 1543. in Lucano agro
tam frequentes convenerant, ut glomeratæ
cubiti altitudinem excederent. Sub exor-
tum Tartaricorum & Cosacicorum apud
nos ante biennium motuum, visæ quoque
iisdem quibus tumultuatum est locis. Tan-
tum eorum agmen, ut postquam consedis-
sent, equorum in viis ungulas obtegerent.
Mirum, non ulterius rabiem eam rusticam
progressam, quàm istæ pervenerant. Nun-
dum Lublinum attigerant, cum versis velis,
Orientem à quo ferebantur, repetiere.

Generantur ex putri & per coitum. Ex
phalangiis procreari, apud Aristotelem, ni-
fallor, habetur. Ex putridorum corporum;
sicciore inprimis temporis constitutione,
apud alios. Sub bello civili in Sicilia, in se-
pultis mortuorum cadaveribus ingens At-
telaborum prodiit copia, si Plutarcho credi-
mus. Veris autem tempore à Zephyro &
Lybico ventis, si Diodori Siculo, ex deserto
ad Æthiopas Acridophagos deferuntur.
Austro & urente vento deferri Sacra Scri-
ptura habet. Ibidem ut & in Lybia, Strabo-
ne prodente, quòd rarò aut nunquam plu-
at, & lacus cœnosi fiant, magna copia oritur.
Fœminas ex se concipere, Vincentius in ea
quam nutrit, & prægnantē invenit docuit.

Coitus idem qui & insectorum omnium,
quæ cœunt, marem qui minor, portan-
te fœmina. Mas in congressu duos illos a-
culeos dorso ult. eminentes, per caudæ in-
flexionem infœmellæ uterum immittit:
fœmina subagitata intente alvum movet,
& se ima parte mari applicans, illum diu-
tius continet, modò vulvæ hiatu, modo
ejus contractione, venerem sibi jucundio-
rem reddens. *Visuntur enim meatus duo in
fœminæ pudendo, interstitio quodam disjun-
cti; (verba sunt Moufeti) & crassiuscu-
lo operimento contexti: quod externa sui par-
te nigricat, durumque est & cartilagi-
neum, intus autem leviter hirsutum, ru-
gisque quibusdam quasi scabrum videtur.*
Ad hujus operimenti fundum uterus albi-
cans, instar muliebris pudendi cernitur.
Quia ita hærent, ut nec saltu, nec motu,
vix manibus avulsæ discludantur, tardo
digressu coire Plinius scripsit. Parere in
terra fixo caliculo illo (*κατὰ πύλας τὸν ὄρος τῆ
κίρκου αὐτὴν*) qui caudæ adnascitur: ac uni-
versim, & loco eodem, factum simul non
sparsim deponere; ita ut quasi favus esse
videatur, apud Aristotelem habemus. Hinc
vermiculos specie ovi oriri addit, qui ter-
rena quadam prætenui tanquam membra-
nula ambiuntur: dissecta emergunt locu-
stæ & evolant. At verò ova incunte Au-
tumno condensu parere, experientia ha-
betur: tanquam mollis factura hæc est, ut
ad tactum levissimum conteratur. Ea du-
rant hyeme sub terra, cujus visceribus

*Moufet. de Insect. l. c. 16. ex Eker-
lio.*

*Genera-
tio.*

*Plut. in
vita Cleo-
nidis.
Diodor.
Sicul. 3.
c. 3.
Strabo
Geogr.
17.*

*Vincent.
in spe-
culo.*

*Arist. H.
A. l. 5.
c. 28.*

*Plin. H.
N. l. 11.
c. 29.*

Arist. l. c.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 29.

committuntur. Subsequenti anno exitu veris, (concoctione quasi peracta) emittunt parvas nigrantes, & sine cruribus peninisque reptantes. Mori matres cum pepererint certum est, vermiculo statim circa fauces enascente, qui eas strangulat. Eodem tempore & mares, dissipato per validam Venerem calido, obeunt. Alii duplicem earum foetum, geminumque exitum tradunt. Vergiliarum exortu parere: deinde ad canis ortum obire, & alias renasci. Est verò & alius eorum obitus. Gregatim sublata vento in mare aut stagna decidunt. Fortè hoc casu evenit, non (ut prisci existimare) madefactis nocturno humore alis.

Plin. l. c.
Theophr.
de animal.
lib. quæ colorem mutant.

Animales
actiones.

Visu sunt hebetiores, quod diurissimis sint, propter palpebrarum carentiam oculis. Vox earum ab occipiti proficisci videtur eo loco, ubi commissura scapularum.

Arist. H.
Al. 4. c. 9.

Ut Dalechampius legit: ut intextu est. *Eo loco in commissura scapularum quasi dentes habere existimantur; eosque inter se terendo stridorem edere, circa duo æquinoctia maxime, sicut cicada circa solstitia.* Aristoteles

πυλῶν τὸν φόνον facere scribit, per quæ alas & foemina innuere videtur. Alis edit observavit Casserius. Impositæ sibi invicem alæ moventur; quarum superior parte intima corpus habet subnigrum, durum, pertransversum locatum: inferior ejusdem substantiæ corpusculum in extremitatè oræ superioris parte exterma, cui perbellum

Plin. l. c.

tympanum adjacet. *Veteres nec volare eas noctibus propter frigora tradiderunt, ignari, etiam longinqua maria ab ipsis transiri, continuata plurium dierum, (quod maxime miremur,) fame.* Sed hic volatus divinæ præceptionis signum potius est, Aliàs non tam volant quàm saliant, iterumque pennis deficientibus cadunt interram. Dum se in aërem attollere conantur, cruribus primum se impellentes subvolant, postmodum alis evaginati evolant. Altius sese efferunt, æstu urente. Militari ordine uti quibusdam exemplis firmatum est. *Tam frivola ratione morientes, serpentem cum libuit, necant singula, faucibus ejus apprehensis mordicus.* Vidit id & Majori olitor. Graculi adversu volatu earum exitio occurrunt.

Plin. l. c.

Ideo à Lemni incolis colebantur. Idem Galeritæ & Ibides faciunt. In Argo cum scorpione congregiuntur, inde Scorpionum dicti, & aculeo exarmatum, interficiunt, & devorant.

Majol.
Coloq. 10.
Plin. l. c.

Arist. in
auscult.
mirabilib.

Pestem famem & bella portendunt. Illam infecto à mortuis & putrescentibus aëre. Hanc, absumptis satis, & quicquid fructuum arbor ferre potuit. Ista, cum militari quasi ordine procedunt. Cum Anno 1543. stupendis agminibus per Illyricum in Italiam convolarent, Turca Rhegium occupavit, Ostiæ subsedit, Nicæam cepit, & multa Christianorum millia, cum sex

centorum millium ducatorum præda abduxit. Idem tumultuantibus. Cosaccis & rusticis nuper in Polonia factum: & quod mirearis, eo usque lymphaticam illam nebulonum colluviem pervenisse, observatum, quousque locustæ, quæ præcesserunt, delatæ.

Variis tantæ pesti remediis, conata est occurrere humana industria. Nonnulli cucumeribus sylvestribus & lupinis amaris in muria fervefactis eas conspergunt. Quidam vespertilioes ex sublimibus arboribus suspendunt. Nonnulli captas exurunt. Odore illius fumi vertigine corripuntur. In Chuerch Scytharum Catainorum civitate, lacus cujusdam præsentia eas arcet. Mediolanensis præfectus Anno 1542. constituto in collectas præmio, brevi tempore duodecem mille saccos implevit.

Manè colligi debent, dum torpidæ sunt: collectæ terrâ obrui, ne ex occisarum ovium novæ prodeant. Vites non attingent, si propè radicem tria sinapeos grana confeceris, si Geoponicorum auctori credendum. Aristoteles odorem cornu cervi, sulfuris, aut styracis suffitum commendat. Arnoldus bovini aut vaccini stercore, aut cornu sinistri fumum. Palladius fluviatiles vel marinos cancos fictili vasi cum aqua immisos, si tecti sub dio statuantur, ut decem diebus in Sole vaporentur. Quicquid ea aqua perfundetur, illæsum manebit. Magorum remedia apud Plinium vide; plura apud Moufetum in Theatro Insector. p. 125.

In Cibus olim Æthiopibus Sillis, falsugine duratæ erant. Nec non Africanis, Syris, Persis, Arabibus, Mandis, & qui Lybiæ loca incolunt. Hodie in Orientali & Occidentali India comeduntur. Sed brevis eorum qui vescuntur vita. Quadragesimum ævi annum nullus supergreditur. Quin successu temporis dracunculi in pedibus exoriuntur: quos huic victui Mercurialis adscribit. Cibus & Johanni Baptistæ fuere. In Medicina quoque adhibentur. Suffitu stranguriæ maxime mulierum juvantur. Stercus pano confert, & morphææ: pedesque earum verrucas eradicant.

Remedia
contra locustas.

Arist. H.
Al. l. 4.
c. 8.

Pallad.
R. R. l.
Tit. 35.

Plin. H.
N. l. 37.
c. 9.

Ufus.
Plin. H.
N. l. 6 c.
28.

Mercur.
var. lect.
2. c. 20.

Plin. H.
N. l. 30.
c. 14.

ARTICULUS II.

De Differentiis Locustarum . Moufeti.

Tantum de Locustis in genere Differentias ex Aldrovando & Moufeto dare visum est. Hic in non alatas & alatas: ille in vulgares & variores distingunt.

Alatarum vulgarium locustarum sex sunt Majores omnes virides, tam foeminae quam mares, quinque Minores multicolores.

Moufet.
Theatri
Insect. l.
c. 16.

lores. *Prima* Majorum cucullo veluti herbaceo, caput, collum, mediumque ferè corpus contegit: alæ à collo subtus oriuntur, virentes, parvis paucisque nigris maculis insignitæ, dorso item virenti, venter fuscus subjicitur, caulis extremo nigricante; magnum illi os, & dentes validi latique, ad fruges absumendas egregiè nati. *Secunda* huic similis videtur, sed epomis collo annectitur; nasus item & os ipsum magis rubescunt, punctaque in alis habet majora. *Tertia* viridis omnino vultus; crura albicant, cauda nigricat, alas maculosiores obtinet, & circa extremitates ex albo rubescentes.

Hæ autem *feminae* sunt, à quibus tres itidem mares hoc discrepant, quòd vel extremâ caudâ, vel supra caudam, duos tresve gestant aculeas, medioque item caputio magis rubent. *Prima* minorum species *Holtzspecht* Tigurinis dicta, corpore nigro externis alis maculosis, internis minio illitis conspicitur; crura aboletius fusca, lineisque nigerrimis fusque deque productis accuratè picta. *Secunda* antennæ oculi tibiæque suave rubent; crura lineis item nigris variegata, alæ lentiginosæ; venter surdè rubens ex flaxo, scitam nobis bestiolam & pulchram exhibent. *Tertia* ex nigro cinerea videtur, antennas habens brevissimas, atque alas præter morem corpore longiores. *Quarta* undique absolutè viret, nisi quod caputium nigris duabus lineis ornatur, tibiæque postremæ vivida quadam rubedine resplendent. *Quinta* non nihil minor cæteris, sed colorum situ, & varietate gratior. Corpus illi nec non facies & pedes Xerampelini; alis virentibus gestit, caputioque aurea quadam instita per medium ducta splendente. Omnibus istis minoribus alæ longitudine corpori æquales, vel longiores; nullum item caulem; nullum in cauda spiculum gestant, pratissimè & in pascuis (rarò inter segetes) luxuriant; ut in Galliis nostraque patria Britannia sæpè vidimus.

Rariores tres tantummodo species vidimus, *Italicam*, *Græcam*, & *Africanam*. Illæ *mantes* dicuntur, vel quia suo adventu, (primæ enim omnium apparent) ver præagiunt, ut Anacreon cecinit; vel famem prædicunt (ut Cælius & Scholiastes Theoc. annotarunt) Vel quia anteriores pedes veluti manus supplices semper tenent atque elatas, vatium more; qui eo gestu orationes ad Deos fundere solebant. Mantis *Italicæ* (cujus hic Iconem repræsentò) mentionem facit *Rondeletius* libro de Piscibus ferè in hæc verba: Pectus habet longum tenue, cucullo tectum, caput simplex: oculos sanguineos, satis magnos, antennas breves, pedes sex, locustarum more, sed anteriores multò crassiores longioresque cæteris, quos quia

junctos plerumque elevat, (præcantium ritu) à nostratibus *Preque Dieu* dici solet: totum corpus macilentum est. Tam divina censetur Bestiola, ut puero interroganti de viâ altero pede extento rectam monstret, atque raro vel nunquam fallat. Cauda illi bifurca, setaceis duobus aculeis prædita: atque ut manuum elevatione vates refert, ita etiam & motus similitudine, neque enim ludit ut alii, neque saltat, neque gestit; sed lentè obambulans modestiam retinet, & maturam quandam ostendit gravitatem. Hanc quamvis in agro Monspensulano sæpè se vidisse Pennius affirmet; tamen Iconem ejus ab ornatissimo Antonio Saraceno Genevensi Medico missam fuisse, in schedis memorat. *Alteram* Mantis speciem *ἀνδρορραφίδεαν* Vienna misit Carolus Clusius è Græcia allatam, quæ magnitudine & formâ priori similis, alium tamen colorem ex naturæ locive dono accepit, habet enim cornicula saturatè lutea, hiacinthinum ocellum; alas ex luteo fatiscentes; corpus reliquum amethystinum, nisi quod tibiæ priores pilosioresque suffragines albescerent, & recurvæ digitorum chelæ nigrescerent. *Africanam* è Barbariâ nostris aliquot sumptibus accersivimus, gracilem, quinque uncias longam, cucullatam, capite pyramidalis, (ut Macrocephalum putares) è cuius penè vertice duo cornicula latiuscula, unciam ferè longa se erigunt, galerumque illum Turcicum biplumem (quali Janizarii utuntur) superbientem repræsentant. Paulò infra summitatem ejus oculus utrinque emergitis prominens, grandis, obscurè rubens. Corpus illi oblongum, purpureo cruentum; cauda hirundinia, bifurca; alæ quatuor subcinereæ maculis quibusdam fuscis ornatae. Priores quatuor pedes tibiæque pergraciles; posteriores robustæ lacertosæ, longæ, & ex maculis transversim per femora ductis subnigræ.

Atque hætenus de vulgaribus locustis aligeris, atque etiam rarioribus satis dictum sit: nisi fortè alias differentias adjicere necessarium mecum una existima veritis. Nam *vulgarium* facies torva, oblonga, rugosa, velut squamis munita, quæ os ferè contegunt: dentes illis supernâ parte affixi lati nigricantes, durissimi, quibus aristas facile mandunt, maximoque cum stridore fortiter conterunt. *Græca* vero & *Africana* locusta breviori apparet vultu, dentibusque adeo est languidis, ut molissima tantum gramina & summitates herbæ depascat. Vulgaribus antennæ longæ admodum; Manti verò perbreves: thorax illis durus, cartilagineus, validus; huic ferè nullus, inanis, languidus. Illis item alvus mollis, longa acuminata: his contra, durior, plena & torosa. Utrisque quatuor

quatuor alæ membranæ quasi ex nervorum filis contextæ; nam licet interna complicata duplex videtur, ubi tamen extenditur simplex apparet. Id quod Jodoco. Willichio fraudi fuit, dum oculorum errore lapsus, sex locustis alas imprudentius absciberet. Jucundum sane fuerit in nonnullis utriusque generis locustis animadvertere quorundam femora sexangularia, affabre in suis areis levigata, plexuque retiformi artificiose picta. Vulgares locustæ oculos habent magnas & prominentes: unde ἀτλαβοφθαλμὸς nomen Ebulo cuidam inditum ab Athenæo libro 10. cap. ult.

Non alata locustæ sunt *Bruchus Attelabus* atque *Asellus*. *Bruchus* ἀπὸ τοῦ βρύκειν, mordendo seu vorando nomen inditum. Quatuor eorum species: Maris prima, tres reliquæ fœminarum. Mas collare gestat subcruentum, sub quo duplex pendet cucullus leviter ex flavo virens, dorsum ad caudam usque sex porraceæ laminæ transversim ad latera ductæ adornant. Ventris (qui satis magnus) caudæque tres illi parvi aculei ad recens natæ herbæ colorem accedunt flavo viridem, veluti etiam & femora, facies atque antennæ; sed tibiæ rubidæ videntur. Prima fœminarum æruginosa est, absque linea esset *Xerampelina* à caputio ad caulem per dorsum ducta: caret item aculeo in caule nascente, videtur etiam plicis vel potius quasi orbibus 10. viridibus circumcincta. Secunda ferè omnino spadicea atque fusca; ventre tamen parum flavescit, aculeumque geminum gerit principio caulis infixum. Tertiæ vultus, caput porcinum vel vitulum marinum refert: antenarum loco barbellam quasi juxta nasum utrinque sitam obtinet; duo in suprema fronte tubercula, urfi veluti aures repræsentant, duosque in caule habet aculeos, fusci, (ut totum corpus) coloris neque parum acutos.

Attelabus παρὰ τὸ ἀτλεῖν, quòd tam minutis pennis conspiciantur, ut carere alis credantur, dicitur. Hesy chius parvam locustam, Plinius è minimarum genere vocavit. Omnia quasi in pollinem atterit. In arvis cessantibus parit, & postquam peperit, moritur. Ova autumnalibus aquis intereunt, cum nimis increvere; ac sicco autumno largior proventus.

Asello, qui τῷ Dioscoridi, tarditas nomen imposuit. Sine alis est, crassioribus, sed præter aliarum morem brevibus cruribus ventre propendulo. Ἀτλάωνς fortè Scripturæ, μίσαζ & σιδίκο: Nicandro: quamvis Ambraciatarum dialecto omnes μίσανες dicantur, quòd frumentum cum stridore mandant.

Quas Judæis licitum comedere quatuor erant, *Arbeth*, *Salaam*, *Chargol*, & *Chogab*. *Arbeth* Chaldæi *Gebah*, Græci

ἀκρίδα vocant. A fœcunditate nomen sortita est. *Salaam*, Chaldæis est *Chargola*. LXX. ἀτλακ. Hieronymo *Scarabens*, Kimchi species locustæ *Raschom* dicta, *Abenezræ Salaam*, quod infideat faxis Quatuor prioribus pedibus graditur; duobus posterioribus qui longiores salit. *Chargol* LXX. ὀκτὶμαχόν dixere. Pugnat enim cum serpente, quod Nipho incredibile. *Hagab* vel *Chagab*, Hieronymus ἀτλάων vocat. Nas citur in terra frugum fœcunda ex ovis quæ parens deposuit. Caulem etiam ipsum confringit. Habentur in scripturis & aliæ, nempe *Gazam* à tondendo, *Ielack*, à lambendo, *Chasil* à perdendo, *Telatfal* à rubigine, & *Chenamal*, à manendo, quod stationem non deferat, dictæ. Quæ verò formâ fuerit μιλῆρις Suidæ, μιλῆρις Cælii, μιλῆρις Nicandri, βρέττανα, ἀχέρ, πιδάλις, ἀρπας, θολαποτρὼξ Hesy chii, πάρνοξ Aristophanis, μίσαξ Eustathii, ἀλιγ & πάλις Phavorini, *Ludolochra* Isidori, ignoratur.

Joel. I.
Amos 4.

ARTICULUS III.

De Locustis Aldrovandinis.

Aldrovandus quatuor diversis tabulis, Aldrov. de Insect. 4. c. 1. diversas Locustarum exhibuit species, inter quas Papiliones quosdam superius exhibitos invenies. In prima tabula, omnium maxima est quæ prima *depingitur* &c. usque latitudinem distensas est in-
tueri.

Secunda tabula duodecim habet locustarum diversas species &c. usque & poplitibus distinctis.

Tertia tabula tredecim habet locustas. *Prima* &c. usque nigro distin.

In *quarta tabula*, primus est *bruchus* &c. usque *Postrema* tota purpurea.

Est & Locustæ genus apud Indos quod *Tenamaznanapoloa* nomen meruit à lapillis pedibus appredendendis, quæ est ejus natura. Cornua fert tenuia longa, à seipso triplo prolixiora. Crustatum animal, ternis utrinque pedibus, longisque, sed qui sensim procedentes versus caudam fiant breviores. Innoxium est.

Nieremb.
H. E. 13.
c. 23.

CAPUT II.

De Gryllo, & Gryllo talpa Moufeti.

Locustæ Gryllum, quòd cum ea in multis conveniat, subjungimus. Quidam à clamore arguto nomen accepisse putant, qui gryllismus vocatur: alii γρύλλον Græcis vocari, seu nullo authore. Junio est ἀχίτη, sed perperam. Freigio τρυζαλις, ani-

Nomen.

animalculum impenne, quod Gryllus non est.

Differen-
tia.

Sunt *Campestres* & *Domestici*. Hi nocturno stridore vocales aridam terram inter focos & furnos excavant. Sunt partim *mares*, partim *fœmina*: Fuscum illi totum ferè corpus, & oblongum; dorsum ex fusco varium magis nigricat: quod juxta mediorum pedum exortum, duæ lineæ transversæ, nivis instar albicantes adornant. Caput orbiculare. Oculi nigri, antennæ in omnes partes mobiles. Cauda bifurcata. Non videntur os habere, si Alberto credimus: sed invenitur in capite ejus, (verba sunt Alberti) longum membrum linguæ simile, & nascitur super exteriorem capitis ipsius partem, & pars illa non est fissâ, sicut finduntur ova animalium. Julio & Augusto, undosè volant, nunc alis expansis ascendendo, nunc descendendo constrictis.

Albert. 4.
c. 7. apud
Moufet.

Fœmina major est, alvo longiore, alis quatuor; quarum externæ breviores, internæ arctiores simul & longiores. Saltant celeriter. Liquore & sanie carniū vescuntur, & spumam juris zythique avidè liguriunt. Nulla tamen in ventribus eorum superfluitas. Delectantur cantu homines; ideò Fessæ in Africa caveis ferreis habentur & magno venduntur. Ad somnum inducendum & Scaliger in pyxide servabat: quam si cribro crebrius pertusam reddidisset, tertio post die non mortuos, sed diu superstites invenisset. Moufetus, subdito pabulo marem & fœminam servabat: octavo post die marem fœminæ latus erosissè comperit, qui etiam biduo post expiravit. Vix seclusi ab aëre vivere possunt, quia præter vocem & aërem nihil continent. Aquam vitriolo tinctam si in vitrum immiseris, fugabis. Discum aqua plenum, cum farina avenacea cinctum, si apposueris, insilient. Ad auxere & sylvam medicam. Purulentis auribus cum terra sua effossus, prodest. Manibus contritus sacro igni medetur. Curat allegatus parotides. In cinerem redactus, cum oleo, putrida ulcera. Aqua dilutus, calculum & dysuriam. Alligatus, faucium dolores, si Marcello fides. In collo suspensus, quartanam. De stridore in sequentibus.

Scalig. in
Arist. de
plantis.

Mouf. de
Insect. I.
c. 17.

Campestrium alii quoque sunt *Mares*, alii *Fœmina*. *Mari* corpus oblongius quàm Cicadæ, color nigricans, caput magnum, oculi exerti, frons antennata. Antennæ articulis carent. Sex pedum postremi longissimi ad saltem vegetiorem. Alæ insculptæ & incurvæ totum corpus tegunt cauda bifurca. *Fœmina* minor, ventricosa, viridis, oculis herbaceis, antennis rubentibus, cauda tridentis æmula. Per æstatem in campis, terra excavata nidificant: hyeme leniore latitant: per graviolem percunt. Omnibus commune antrorsum & retrorsum

incedere. Alarum attritu sonum edere, credidit Plinius: per duo obstrepentia corpora, quæ motu & agitatione alarum percuterentur, Cassorius: alvi parte cava, Scaliger: dentium collisione Sabinus Garretus Pharmacopæus alis avulsis, eundem sonum imitando assecutus est. Albertus, si medius dividatur, diu adhuc vivere scripsit. Vescuntur panico, maturo frumento & pomis. Loca umbrosa negligunt, prata sequuntur. Avidius strident magis à nobis dissiti: proximi silent. Formica capillo circumligata & in antrum conjecta, efflato primo ne se recondat pulvere, capiuntur. Ramulo cavernæ aliquoties inserto & extracto erumpunt, quasi quæsituri, quis foribus injuriam faciat.

Scalig.
Exerc.
273.

Albert 4.
c. 7. apud
Moufet.

Plin. H.
N. l. 29.
c. ult.

Ad Gryllos Moufetus *bestiolam quandam alatam*, Tryxalida & cicadam *Rondeletii aquaticam*, refert. De illa ita scribit. Restat adhuc *una bestiola alata*, quam an ad cicadas an ad locustarum classem referam plane ignoro. Qua enim catervatim volat ac segetes erodit, locusta videtur; forma tamen ad cicadam proxime accedit. Mira sanè hujus bestiolæ, & quasi infantis facies. Caput galero triangulari tegitur; in cujus superiore parte, quatuor sunt maculæ nigræ, duæ oblongæ, & aliæ duæ fere orbiculatæ, inter quas, duo etiam minutissima puncta nigra observabis. Alas habet quatuor, quarum internæ duplicantur, quiescit, ita ut *ἐξ ἀπλῶν* videatur. Atque hi fortè erant illæ locustæ, de quibus Cuspinianus è Sigeberto sic scripsit: Mense Augusto, Anno 874. immensa locustarum vis senis alarum remigiis volitabat ab oriente, & cum senis pedibus & cæteris à quibus tota ferè Gallia devastata est. Dixeris primò aspectu caputium scapulas ornare, sed propius intuenti, partes sunt superiorum alarum veluti semicirculo inclusæ. Totum corpus valdè crassum, nigro fuscoque est colore: posteriorum alarum partes infinitis nigris maculis notantur. Petrus Quickelbergius Antverpianus hanc ex Africa portatam ad Renum transmissit, quam nos eriamnum examinem in thesauro *ἐν τῷ θησαυρῷ* servamus, & cicadastram nominamus.

De Tryxalide habet ista. Non minus in Tryxalide hæremus. A rodendo nomen fortè obtinuit: verum ut vel tryxalides Bruchos esse censeam, vel olerum locustellas, vel cicadas, vel Gryllos, nequeo quidem induci: Non solum quia Athenæus, Plinius, alique eo ipso Philosophi sibi non constant; verum etiam, vel quod forma, vel natura longè discrepent. Et quare obsecro *τρυξάλις* à *τρυξω*, id est, stridor, non male non dirivetur? quod si verum sit, sanè Gryllis maxime conveniet, quas tum aliàs

aliàs tum per stridorem à Blattis Peucerus meritò distinguit: id quod Joachimus noster Camerarius (magni illius filius, & virtutum ex affe hæres) primus notavit. Plinius ex his viginti torreretur jubeat ac bibi è mulsa contra orthopneas atque hæmoptoicam passionem. Cinis illitus cum melle margines duos ulcerum complanat, & mulierum purgationes retentas præclare adjuvat.

Moufet. l.
c. Rond.
de piscib.
aquat. c.
38.

Cicade Rondeletii aquaticæ caput pentagonum imitatur. Oculi exerti atque globosi, non magni & nigri: antennæ ore extimo erumpunt per breves; pedes utrinque ternos habet, postremos longissimos: in dorso vel alas, vel earum rudimenta gerit. Cauda illi bifurca, venter sæpe veluti incisus; corporis color subfuscus vel potius ex albo nigricans. In aquis limosis stagnantibusque reperi, sed naturam ejus nondum habeo perceptam: hoc à terrestri differt cicada, tum quod capite sit magis exerto, & cervicis aliquid habere videatur; tum quod alas habeat inutiles ad volandum; licet ad sui correctionem non ineptas. Hæc in foliis nymphææ, potamogeti, aliarumque aquaticarum herbarum insidens; jucundum quid (more Cicadarum terrestrium) stridere dicitur: sed à nobis hætenus non est audita.

De suo *Gryllotalpa* hæc habet Moufetus. Bestiolam quam expressimus, Cordi *Sphondylus*, Dodonæi vera *Buprestis* est: perperam uterque nominant & nullo jure. *Sphondylis* enim alas non habet, hoc insectum vides alatum. *Buprestis* Cantharidi similis apud omnes dicitur; hoc verò animal nec figura, nec colore, nec magnitudine quicquam eo accedit: ut taceam elytrorum hic absentiam, quibus cantharides carere nemo sanus contenderit. *Gryllum* dicimus, quia eundem cum Gryllo stridorem nocte appetente facit. *Talpam* quia terram continuo fodit. Insectum visu horrendum ac monstrosum, quadruplo maximam superans Cantharidem: præcipue ætate si fuerit provectiore. Formam ob oculos habetis: ego colores addam. *Femina* levius, *Mas* saturatè fuscus. Illi præter duas longas antennis fibulæ quatuor, quasi è naribus labiisque propendent: oculos item habet majores, & alarum radix miniata macula ornatur. *Mas* verò fibulis illis nudus, earum loco setas duas fibulis duplo longiores obtrinit; concolor sibi undique videtur, & sine macula. Utriusque ungues coracini sunt. Anterioribus pedibus robustis admodum, & variis tumulos perfodit uterque & cuniculos agit: mediis insistit; ultimis quando opus est, saltat. Cauda illis bifurca; alæ corpore longiores membranæ; corpus incisuris variis insignitum. Juniores fere toti nigricant, adultiores implumati videntur.

Sub terra palustri & humida maximam ætatis partem vivit, noctu tamen egreditur. Tardigradum valde est animal, volatusque ejus saltum refert: unde in locustarum numerum à nonnullis ponitur. Sole occiduo primum prodit, Gryllorum more, suaque cantilena, sonora quidem satis; & supra mille passus stridente sibi applaudit; quam ubi audiunt agricolæ, oppidò exhilarantur: ac si ejus adventu terram humore gravidam, & calore solis veluti maturatam scirent. Grana tritici, hordei & avenæ colligit, ac in cavernam asportat, inde fortè hyeme victurus. Quidam stercorebus eum equinis vesci affirmant.

CAPUT III.

De Scarabæis.

ARTICULUS I.

De Scarabæis in genere.

Unde huic animalculo Scarabæi sit inditum nomen, vix ausim dicere.

A Cabo seu Caballo, quod ex ejus fimo prodeat, dici ineptum esse certo scio. Græci *καὶ βύρρον*, Tyrreni *βύρρον* vocant.

In eorum Descriptione nihil ferè in genere occurrit. Duas alas habent, teneras illas & valde fragiles: ideo superveniente crusta inclusas tutelæ gratia gerunt, ne à durioribus corporibus offendantur. Quatuor habere perperam Albertus dixit. Animalculo destituuntur, & omnes senectam deponunt.

Ubique ferè degunt, in Asia, Africa, Europa & America. In monte Ætna felicissima eorum progenies. In Thracia juxta Olynthum locus est parvus, in quo, cæteris animalibus illæsis, soli exanimantur. Ob hoc *Cantharoletrus* dicitur. Cornuti mense Julio & Augusto frequentissimi in agro Neapolitano visuntur.

Diversos cibos pro varietate sua appetunt: Sunt qui ligno arido; sunt & qui frumento & panibus vescuntur. Vivunt ex jumentorum excrementis. Ideò apud Aristophanem servus quidam Cantharo fæces humanas apponit.

Eriphiam quandam herbam prodidere veteres, Scarabæum in avena habentem, sursum deorsumque decurrentem, cum sono hædi, unde & nomen accepit.

De Ortu variæ sunt inter authores sententiæ. Isidorus ex putridis equorum carinibus nasci putat. Plinius ex asini, quidam ex muli. Aristoteles, Cantgaros in fimo quem volunt per hyemem condi, vermes parere, ex iisque procreari. Nonnullis visum

Moufet.
Insect. I.
c. 24.
Nomen.
Aldrov.
de Insect.
l. 4. c. 3.
Descriptio.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 28.

Locus.

Vitus.

Generatio.

Aldrov. de Insect. l. 4 c. 3. sum foemineo sexu distitui nec coire: quod tamen in Carabis falsum esse, Aldrovandus observavit. Variare ortum pro specierum diversitate ego putarem, idque in Differentiis patebit.

Natura. Tanto stridore volant, ut per eos Deorum cum hominibus fieri colloquia Laertius dixerit. Quia *κοκκυσις* delectantur: ideo rosan averfantur, & odoratis illiniti exanimantur. Hemerocallis Dioscoridis quoque à quibusdam *αντικάνθαρος* vocatur. Tacti, immobiles redduntur & indurefcunt. Solis & Lunæ coitum pillularii ostendunt, ut postea dicemus, ubi & devindicta quam de Aquila sumere solent, agetur.

Ufus. De *Ufu* in genere nihil occurrit.

Differentias. ex Moufeto & Aldrovando sumemus.

ARTICULUS II.

De Scarabaeorum apud Moufetum Differentiis, & primò de Majoribus Cornutis.

Moufet. de Insect. l. I. cap. 21. **E**Gregiè Scarabæos in sua genera dispefcit Moufetus. Sunt alii Majores, qui vel *cornuti*, ut *πλατύκερας*, *αγρόκερας*, *βέκερας*, *ρένκερας*, *κρίνκερας*; vel non *cornuti*.

Plin. H. N. l. II. c. 28. Cornutorum primus & præcipuus est *πλατύκερας*, qui cervina cornua imitatur. Nigidio dicitur *Lucanus* apud Plinium; aliis taurus: nonnullis Cervus volans. Hefychio *ἀκανθός*, quia cornubus spinosis obvia comprehendit; Comico & Eustathio à magnitudine *ἰπποκάνθαρος*, Cardano *σκαράβέλας*, Gazæ *κάραβος*. Quatuor ipsius occurrunt genera. *Primus* *fœmina*, *Lonicerus* Marem facit, sed mares inter insecta minores sunt. Colore ex obscuro, verba sunt Moufeti, spadiceo nigricat præcipuè circa elytra & pectus. Cornua illi duo integra, sine articulis, ramosa cervi instar minimi digiti longitudinis in adultioribus, in minoribus minora ac breviora, vel (ut Plinius loquitur) prælonga cornua & mobilia obtinet, bisulcis dentata forcipibus, cum libuerit ad morsum vel compressionem coeuntia: stringit enim mirum in modum; atque cornubus utitur eum in finem, in quem chelis cancri atque astaci: oculi duri prominentes, albiduli, juxta quos utrinque antennis habet, unas in radice inter cornua & oculos racemosos, quarum articulus rectum ferè angulum facit; alteras vero media fronte erumpentes, rectas atque planas, in tuberculum leve desinentes. Pedibus incedit sex, prioribus reliquis longioribus atque majoribus.

Alter *mas* est, illi omninò, magnitudinem si excipias, tum corpore tum cornibus similis: quæ licet non ramantur, acrius ta-

men compressa pungunt digitum, quam fœmina jam descripta.

Tertius priori triplo vel quadruplo minor, colore piceo, cornua admodum parva & bisulca, juxta quæ duæ antennæ plurimis articulis distinctæ oriuntur. Oculos habet prominulos, & pro corporis ratione magnos. Scapulæ utrinque in angulum acutum desinunt. Vescitur maximam partem succoternaci atque pingui è quercu exudante, nec facile extra querceta conspicitur.

Capite præciso diu reliquæ corporis partes vivunt: caput reliquo corpore diutius. Lunæ sacer esse creditur. Cornua, inprimis quæ excedunt, infantum morbis ex collo suspenfa medentur. Strumis quoque & podagræ apposita conferunt. In oleo decoctis si arteria in brachio inungatur, febres apud Mizaldum tollunt. Oriuntur ex vermibus putrido ligno innatis: forte & ex stercore.

Αιγρόκερας, dicitur & *παραγρόκερας*, *κεράμβυξ*, *κεράμβητος* Græcis; *Capricornus* Latinis. Magnitudine coloreque Platii, ceroten refert. Tredecem eorum genera occurrunt.

Primus caput habet latiusculum, oculos bovinos & grandes, tres fere transversos digitos longos: os illi forcipatum, hians, aduncis duobus dentibus durissimis horrendum, quibus dum ligna rodit, (exper-ti scribimus) argutulum porcellorum grunitum diserte exprimit. Hoc forte in causa fuit, cur eas arbori alligatas, culices ficarios abigere tradidit Hefychius. Scapulæ ejus curiosule à natura sculptæ, manubrium ebena factum & perpolitum oculis objiciunt. Pedes sex habet, tribus quoque geniculis distinctos: sed imbecilles admodum & languidos, tantoque oneri sustinendo longe impares. His ferunt auxilium cornua duo, supra oculos nascentia, toto corpore longiora, novem decemve articulis flexibilia, non exacte teretia, sed asperitatem capri imitantia; quæ licet in quamcunque partem movere possit, tamen dum volat, directe ea tantum protendit, atque volatu fessus pro pedibus utitur. Conscius quippe horum imbecillitatis, cornubus arboris ramulum circumplicat, atque ita pendulus quiescit, ut in agro Heidelbergensi vidit noster Bruerus; avem paradisi eò referens, quæ pedibus destituta pendulis illis nervis ramos illaqueat, atque ita laboris fatur quieti consulit.

Reliquos ita describit Moufetus. *Cerambyces* præter hunc memoratum varios vidimus, *unum* primò huic similem, sed magnitudine & colore varium: nam & paulo minor, & colore fuit fere cinereo: Venter, crura, & cornua, dilute cœrulea: scapulæ, cauda & elytra, nigris quibusdam maculis variegata. Cornuum quoque articuli nigricabant; postrema crura reliquis

longiora crescebant. Hos à Quickelbergio obtinuimus Antverpia transmissos. *Alterum* habemus extra viridem, supinè fuscum; caput, scapulæ, elytra obscure virentia, & auro itidem micantia: corpore est paulò porrectiore, priori similis videtur; sed paulò minor: cornua purpurea obtinet, crura pedesque Hyacinthinos. *Tertium* huic concolorem ipse primus Pennio dedi, nucem moschatam & cynamum vere spirantem. Verùm fragrantia illa dulcis (stacten contra non cara) cum vita in auras statim effluit, & cadavere exulans, sese in pyxidem (qua fuerit servatus) tota insinuat. Cardanus mentionem facit hujus Scarabæi: sed quia ante me invenerit neminem novi. Ex quoque *alter* cum splendore nigricans, ventriosus, crassus, corpore, cornuque breviori reliquis. Cornuum juncturæ non sunt (ut in aliis) globosæ, sed utrinque leviter serratæ. Hunc Carolo Clusio Pennius se debere fatetur. *Quintus* capite, ore & dentibus primo omnino similis oculis nigerrimis, colore per totum corpus fusco, ore patulo dentato, capite, collo, & alis minutulis punctis nigris dense conspersus; corporis magnitudine ferè secundam æquat Cerambicem, rariùs conspicitur; in ædibus vivit, & lignis aridis. *Sexto* cinerascienti caput valde exiguum, oculi albiduli, cornua longiuscula, articulata, candescentibus maculis distincta elytris, imò toto ferè corpore varius est; in ædibus item versatur, sed an etiam in lignis habitet, ignoro. *Septimum* ex Russia ab Edoardo Elmero allatum vidi, toto corpore infuscatum, juncturas habuit in cornubus globosas, septem vel octo: facilè ex forma cognoscitur. Ab hoc *Octavus* magnitudine, & forma parum abludit, nisi quod capite, scapulis & alis subcœruleis præditus videtur. *Nonum* misit ad Pennium Joachimus Camerarius (de literaria rupubl. obtinè cum primis meritis) cui alæ pedesque arenosi erant coloris; caput, cornua, venterque subnigricabant: cornubus repandis videbatur, ex pluribus verticillis nodulisque compositis, quæ in utramvis partem nictu citius versabat. In plantis (& potissimum Cithyso) repitat. Hujus generis esse puto Scarabæum quam Joh. de Choul (lib. de var. querc. histor. c. 26.) ita describit. Degit in quercu animal de Scarabæorum tribu (quantum conjectura ducimur) colore rubicante, proceris cruribus geminos capite gerens aculeos, modice inflexos: quibus acerrimè stringit adversantia Hanc bestiolam fabri lignarii quercus dolantes, in ipsis visceribus vivam invenere. Rustici Lugdunenses Thurro nominant. In laquearibus felicius diutiusque vivit, seque hypocausta colentibus levi cum strepitu prodiens conspiciendum subinde præbet. *Eundem*

vel illi similem quendam p. m. Gesner. Epist. l. 3. ab anu pleuritimpassa dejectum fuisse testatur in hæc verba: Peralvum inquit à potione ex Oxymelite nostro cum decocto fœnugræci exhibita prodiit vetulæ pleuritide laboranti scarabæi genus nigrum, longis pedibus, longis item cornubus flexibilibus articulatisque, rudi plenum pure, vivum; longitudine duorum articulorum erant digiti. *Decimus* totus ex nigro purpurans, os forcipatum habet. *Undecimus* ubique atrescit. *Duodecimo* cornua minus articulata, caput scapulæque cyaneæ, reliquum corpus totum spadiceum videtur. Horum omnium in iconibus utcumque cornua aliàs directæ, aliàs curvata cernitis (explanationis gr.) tamen plerumque nonnisi (caproꝝ more) ad humeros reflexa gerunt, veluti primus Cerambyx.

Ad Carambyces spectat *Quici Brasiliensis*. Insectum est corpore ovali instar Scarabæi. Corporis longitudo unius & trientis digiti, Crura habet 6. quodlibet tribus internodiis constans, estque ultima pars crurum serrata, & quodlibet habet duos unguiculos. Caput & ocelli parvi: duo cornua propè oculos exorientia, longa, posterius versa & in arcum porrecta, duos & semis digitos longa, longè excedentia corporis longitudinem; & singula habent internodia decem, undecimo inferuntur in caput: crassitie æquant filum crassius. Caput & anterior sectio obscuri & brunni coloris cum splendido nigri mixti, posterior & alæ brunni obscure splendentis. Per medium autem alarem seu dorsum transversim linea lata flava pallescens tendit. Crura lutea, & ad internodia obscuro brunno maculata. Cornua diversicoloria luteo & nigro, nimirum ad genicula nigra, cætera alternatim lutea.

Βύκερος seu ταυρόκερος cornibus duobus tauroꝝ more exertis & directis cernitur. Ex spadiceo circumquaque nigricat, & ferè ἀκίδανος videtur. Capite est exiguo, brevibus crassisque scapulis immerso. Media fronte, spina peracuta exit. Defensionem à natura destinata videtur.

Nasicornium quatuor species vidit Moufetus. *Prima* omnium maxima atque rarissima apud Indos vivit, colore nigerrimo: nasum habet ad faciem rostri navalis cornutum & extra curvum, circa cujus umbilicum aliud cornu intus reflexum è tuberculo nascitur, quale etiam è scapulæ tumulo. Totum corpus ab ultimis cornubus ad caudam, longitudinem quatuor unciarum continet, latitudo ferè duarum est. Cantharorum lege fœminam non habet, sed ipse suæ sibi faber est formæ; fœtum solo sibi genitum producit. *Secundam* Nasicornium speciem ratam atque pulcherrimam Mercurio sacram Carolus Clusius Viennæ depictam misit;

Marcgr.
Hist. Bras.
fil. l. 7.
c. 1.

misit; in cuius agro frequens est. Forma illi, qualem vides, absque ventre saturate rubro fuisset, totus videretur piceus: narium cornu illud recurvum adeo acutum est, ut (quod de præliaturo barro fertur) aciem illi rupis tenacis affrictione addi putares. *Tertius* nasicornis & *quartus* pariformes pene videntur, nisi quod illi alæ longiores elytris excrescunt, huic verò breviores apparent. Splendente atramento perfusos diceres, usque adeo undiquaque nigricant.

Κριόκερος seu *Aries*, cornubus est nodosis hyacinthum æmulantibus capite ex auro viridante, scapulis miniatis, purpureo ventre, elytris capiti concoloribus pedibus, cruribusque spadiceis incedit, alæ vero vagina inclusæ albicantem arundinis membranulam scite exprimunt.

ARTICULUS II.

De Scarabæis Majoribus non cornutis & minoribus omnibus.

MAjores Canthari *αἰνέταροι* sive Excornes plurimi sunt. *Pillularius* nempe *Melolonthes*, *Purpureus*, *Atratus*, *Arboreus*, & *Fullo*. *Pillulario* nomen quod ingentes pilas averfus pedibus volutet. Dicitur & *Stercorarius Fimariusque*, tum quod ex fimo nascatur, tum quod illo gaudeat. Græcis est *κοπρινός*, *ἡλεονάνθαρος* & à forma *αἰνέταρος*, id est, felliformis. Stercoribus vaccar. ita delectatur, ut ad ea frequens & citus advolet. De ejus *Generatione* hoc habetur, pillulam è stercore ad cœli formam conficere, eamque ab ortu ad occasum tamdiu versare, donec ad mundi figuram perduxerit. Mox eandem subter sterco, ubi nidificat, ad mensem lunarem reponit. Hoc exacto sigillatim singulas ejectas aqua dissolvit. Sic prodit scarabæus impennis, sed qui paucos intra dies absolutus, in volucrem abire solet. Nulla ergo in genere eorum anima. Porphyrius, genituram in cœlum emittere, mox pillulas magnas posterioribus pedibus fingere ait. Apollini ideò sacros Ægyptii voluere. Imò expresse Plinius. *Propter hunc Ægypti magna pars, Scarabæos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione, qua colligat Solis operum similitudinem huic animali esse, ad excusandos sue gentis ritus.* Per coitum quoque propagari observavit Aldrovandus. Vidit enim mense Majo vermiculos albos plusquam 42. horarum spacio, figura Curculionis prodire. Erucas esse opinatur parvas Bombycum modo progredientes, quæque intra 5. aut 6. horas filii tenuissimi folliculos, illosque candidos, Melopeponis seminis magnitudinis sine cortice texere cœperunt. Addit, fodere terram rutilos & prægrandes, fa-

vosque parvæ & fistulosæ spongiæ medicato melle fingere. Nidos ex lutosa valdeque fragili materia à Gregor. Capucino eidem communicatos, in quorum uno mortuum Cantharum invenit, hic habet. Una pudendi est figura, unico canali constans. Parti infernæ duo veluti testes appensi erant: singulis suus ductus, cum unico illo canali continuus: in hisce Scarabæi. Aliquando plures sunt hi testes, & figuræ oblongæ. Rosas averfantur. Hederæ umbra gaudent. Hyemem vix ac ne vix sustinent. Solis calore excæcatis mori, tradidere quidam: plerumque à pediculis suffocantur, quibus undique scatent. Insculpuntur Smaragdo contra veneficia. Oleo rosar. cum terræ intestinis cocti, aurium doloribus medentur. Ex iisdem ad calculi dolorem pulverem Lanfrancus conficit. Ad hæmorrhoidas unguent. quod unguentum populeum; cum oleo rosaceo in quo Scarabæi cocti, aselli, & crocus ingrediuntur Habet & Villanovanus contra spasmus suum. Lethargicos excitabis, si duos vel tres sub mediæ juglandis cortice conclusos, occipitio bene raso, musculis brachiorum anterioribus & plantis pedum alligaveris. Bene cecidit M. Johan. de Florentin hoc experimentum. Quartanariis medetur, si fulvo linteo vivus inclusus collo appendatur. Expertum se Trallianus scribit. Cheloniti de gemma aureis guttis insigni, cum Scarabæo in aquam ferventem missa tempestates cicere velle, insani esse puto. Huic similis est *Melanolocyanus*, cum illustri quodam splendore. Facie est felina. Augusto à pediculis intra crura hærentibus vexatur, & tandem interficitur. Ubique occurrit.

MELOLONTHEN, Attici *Melonthen*, quidam *χυσάλλιδα* vocant. Nonnullis est *χυσομελόνθην* & *χυσοκένθαρος*: quibusdam *Cantharis*; Aristophani *χαίτην χυσιζον κανθάρου* *δρυσ*; Eustathius, *Vespa major*; Polluci, *animalculum volucre*: rusticis Lombardicis & Gazæ *Galenica*; aliis *Scarabeus arboreus*. Hesychius cum coloris aurei facit: Aristophanus scholiastes flavi, recentiores Smaragdinum sed auro radiantem volunt. Idem & Plinius sentit. Mas undique viret, oculos si exceperis rubicundos. Elytra foeminæ castanei coloris, grato splendore micantia. Pectus utrique mucronatum. Stridulum edunt sonum. Generantur è vermibus fimi bovini aut jumentorum: si Aristoteli credimus: si Steph. ex Theophr. ex floribus pomor. Sunt ejus *duæ* præterea species. Priori quæ Clusii, caput, scapulæ & pedes nigricant, sed è cœruleo. Antennæ sunt corneæ, elytra striata, sed in circumferentia nonnihil rubent. Alter est Thilesii, totus præter oculos qui nigricant viridis. Venter ex auro parum rubescit.

Mercell.
de Medic.

Plin. H.
N. l. 30.
c. 11.

Trallian.
l. 12. c. 8.
Plin. H.
N. 37. c.
10.

Theophr.
περί δεινών.

Ælia. H.
A. l. 4. c.
11. & l.
10. c. 15.

Plutarch.
Symp. 4.
Praxan.
in Geopon.

Plin. H.
N. l. 30.
c. 11.

Plin. H.
N. l. 30.
c. 20.
& 29.
c. 9.

Mouset.
l. c.

bescit. Medium dorsum luna elytris concolor adornat. Ideò Equus Lunæ vocatur.

Purpureus Constantinopol. delatus fuit: Totus talis & violaceus erat, nisi oculi, venter & pedes, picem retulissent.

Atratus totus nigrescit. Os ipsi forcipatum; scapulæ fere quadratæ: tibiæ & antennæ breviusculæ: In lignis aridis habitat. Frequentius graditur quàm volat, & inter gressum, obmurmurat.

Arboreus obvius est, Julio in primis & Augusto mensibus. Vaginæ alarum, puniceæ sunt, & tenuissimo polline conspersæ, leviterque splendent. Oculorum circulus, antennulæque parvæ flavescunt, juncturæ ventris albescunt. In Normandia tertio quoque anno sunt frequentiores. Anno 1574. vigesimo quarto Febr. tot in Angelia in Sabrinam delapsi sunt, ut molenarum rotas sislerent. Affinis huic est totus ex fasco albicans, glauco ventre & quodammodo canescente. Inservit anatum venationi. Grues quoque eo capiuntur, ut Gesnerus prodidit.

Scarabæus, quem Plinius *Fallonem* dixit, Gaza *καὶνθάρων* Aristotelis esse opinatus est; Scarabæum rubeum Plinius, animalculum cauda forcipata Junius, est Arboreo major, cervo volante foemina minor. *Caput* gerit corneum, antennulis duabus ornatum. Oculos, & pectus hirsutum, ex albo flavescencia; pedes anthracinos. *Venter* caudaque plumas referunt gruinos. Scapulæ & elytra, albis nigrisque maculis variegantur, tam pulchre, ut vestem Damasce-nam, Phrygia acu intertextam jurares. Non ubique est obvius. Magi contra quartanam alligatum, commendant.

Tantum de majoribus cornutis & non cornutis sufficiat. *Minores* vel *maculati* sunt corpore, vel *immaculati*: illos *ἀνδροχρόους*, hos vero *μυρροχρόους* Græci appellant. *Macula* aliorum ex nigro albicant: alii flavescunt, alii rubescunt. *Albicantium* è nigro septem, flavescentium tredecim, Rubescentium duodecim; quos hic sua quemque classe donavimus. Immaculatum color corporis idem deprehenditur: atque inter eos sex nigricantes, duos spadiceos, globosum unum ex cæruleo nigrum, alterum ex luteo vidimus. Quidam quoque nuperrimè à nobis, inquit Moufetus, deprehensus est fucopuniceo, alter muricis succo inebriatus comparuit. Aurecentes quinque habemus, parvulos illos quidem, sed clare micanteque auro undique suffusos, quos etiam ne invidisse nepotibus videamur, sculpi appingique curavimus.

ARTICULUS III.

De Scarabeis Aldrovandi.

Aldrovandus eosdem in *Cornutos*, & non *Cornutos* distinxit. Ex illis alii unum, alii duo, quidam tria cornua habent, & rarò vident. *Δικίπατοι*, aut sunt *Lucani* sive Tauri, quorum cornua sunt dentata, ac forficum modo aperiuntur & clauduntur: aut *Carabi*, quorum cornua nodosa sunt, & ad prætendendum iter facta. Triginta & quinque utriusque generis sunt species, quas sex diversis tabulis exhibet. Exhibeo & ego omnes, ut siquid interjam enumeratos omisum est, adjiciatur, & comparatio inter utrumque melius institui possit.

Prima tabella septem continet, ex quibus primus è Caraborum videtur esse genere, quoad figuram corporis quam habet communem cum aliis Carabis, quamvis locum, quo nascatur, neutiquam observaverim. Toto corpore niger, antennis longiusculis parvis nodulis constantibus, longis in postica capitis parte sitis cornibus, seu potius appendicibus binis prope os nodosis, item crassioribus, quàm sunt antennæ, sed plus quàm media parte brevioribus; pedibus in extremo bifurcatis, asperis: caudam constituunt duæ appendices vaginalium, cum conjunguntur.

Secundus est Scarabæus aquaticus pronus & supinus. Aquaticum nuncupavi, quod præter reliquorum morem in aquis degat, inter majores sanè connumerandus: toto item corpore niger prone & supine exceptis capillamentis, quæ in pedum extremitate cernuntur, itemque antennis, nam hæ rubescunt.

Quartus è minimorum genere, pollicem enim latum longus, totus quoque niger, capite parvo, trigono, minutis antennis, quarum extremitas obtusa, & veluti rotunda quadam pilula insignitur, pedibus bifidis in extremitate, paulò versus corpus habebat quasdam asperitates, seu appendices, quibus ingressu juvabatur, tanquam cirris polypus. In ea parte, qua vaginæ sese invicem in aliis contingere solent, evidens apparebat rimula, qua dilatata & aperta prodibant alæ subvirides, sed nonnihil ad castaneum vergentes: cùm eas ad volandum expandit, toto corpore maximè splendet, alvoque robustissima.

Quintus est Scarabæus pilularius, seu Cantharus compacto latoque corpore & nigro, sed cæruleum splendescente. Capite plano inferius, & superius nonnihil arcuato & lato cucurbitæ instar, ac multis eminentiis superius conspicuis, è quo ab utraque parte duæ prominent antennæ breviusculæ, sed in fine divisæ in plurima tenuia

Plin. H.
N. l. 30.
c. 11.
Moufet. de
Insl. c. 22.

Aldrov.
Hist. Inf.
l. 4. c. 3.

tenuia filamenta, pedes sunt antèrius serrati in fine, ita à natura facti; ut illis, cum continuò in stercore vitam transigat, abstergere anteriores capitis partes facilius posset. Crasso magnoque pectore, cujus medio ab utroque latere pedes priores annectuntur.

Sexto loco datur Scarabæus viridis Melo-loathæ Aristotelicorum quorundam sententia, quem inter volandum putant sonitum edere: corporis parte supina & alvi maximè colore est obscure viridi; unde nomen sortitus, capite parvo nigro ferè, & ab utroque oris latere duobus cornibus nodosis insignito, itemque dentibus, quibus apprehendit valide, antennis longis, æqualibus, in extremo paulatim in acutum desinentibus, pectore autem rotundo, tenuiorique ligamento alvo latè annexo.

Ultimus ejusdem tabulæ nigro corpore est, in quo maculæ virides, sed aliquid flavedinis in se habentes, proceris cornibus eisdem maculis conspersis, quæ versus posteriora flectuntur, eisdem quoque maculis & ipsi pedes, præsertim eorum femora; alvo procera, quam non universam vaginæ contegunt.

In secunda tabula est Lucanus Nigidii, Cervus volans Leoniceri, Scarabelaphus Cardani, Taurus Scaligeri; aliqui Scarabæum bicornem appellant; apud Thessalos *κράβυσα* dici & *ἐκροφάρον* βέν, quasi bovem ligni edacem author est Antonius Liberalis. Gallis dicuntur Cerfs volantes: Turo Lugdunensibus rusticis fortè à Tauro derivato nomine, Italisque cervo volante, Bucarone del corno, Gusano con cuernos Hispanis. Ferrantes Imperatus cervi volanti vocat. Belgis *Gen vliegende Hert*. Germanis *ein Schryter* dicitur. Nigro est toto corpore & maximo, huic duo cornua prætenduntur ramosa seu dentata, quibus cum constringuntur, validè apprehendit: oculi utrinque à latere horum positi, intra verò cornua duo parva cornicula veluti antennæ; capite latiori quàm pectore, sed minus longo; hujus & caput & corpus reliquum à se invicem divisa diutius vivunt.

Qui vero hunc ordinem consequitur, cætera priori similis, ut magnitudine tantum differre videatur; qua dimidia parte minor est.

Sequuntur *duo alii* *μενίπυροι*, hoc est, unico cornu in summo capitis, quos ab Ægyptiis Mercurio dedicatos suprà meminimus, corpore nigro, cui nonnihil rubri admistum sit, crasso magnoque capite. Horum posterior hirsutus atque pilosus est prona parte, horum species Rhinocerotas appellat Ferrantes Imperatus ob similitudinem cornuum, quam habent cum Rhinocerote, animali quadrupede, tarde

volant, quò fit, ut ultrò fere in manum ejus, quiprehendere voluerit, involent.

Quinto loco est Lucanus Papilioni similis, est enim versicolor toto corpore duos digitos per transversum longo, cornibus instar cervi dentatis nigris, quibus ab utraque parte posteriùs ante oculos prominent antennæ tenues, longæ, ut ad latera viam tendant factæ, nam ad latera utraque protruduntur, capite albis insignito maculis, per quas rubor quidam obscurus perfunditur, pectore angustiori, quàm capite est, tribus albis maculis in medio notato, alvo proluxa, crassa, longa, ut Papilionibus quibusdam contingit, annulis rubris, alis non universam alvum contegentibus, sed multò brevioribus, & ut puto, farinaceis. Nam, ut verum fatear, id nunc me fugit, cum ejusmodi Infextum inventurarum existat, nec ejusdem descriptionem exactam, quam olim feci, reperire postea unquam potuerim; variis coloribus hujus alæ exornantur, nam suprema parte, qua superiori alvi parti contingunt, vicinæque sunt pectori, rubicundam maculam ingentem præbent cordis, quod vulgò pictores depingere solent, compresso mucroni seu cono similem; reliquum deinceps alatum corpus nigrum est, maculis aliquot primum argenteis, deinde lineis latioribus obscure rubentibus, quæ utraque aliquoties per vices iterantur, ita, ut in hujus animalculi alis natura illuisse pictores artemque eorum videatur.

Tertia tabula tota Caraborum plures continet species, excepto primo, qui ad Lucanorum genera potius pertinet, parvo corpore, nigerrimoque cornibus incurvis parvis sine dentibus ad eundem usum, ad quem Lucanorum aliorum, his item antennæ postponuntur singulis à latere, pectore modice crasso & crassiori, quam caput est, alvo duplo longiori, ejusdem crassitie & latitudinis. Cervettino vulgò dicitur.

Secundo loco datur Carabus inter minima genera referendus; ejus caput, quod parvum est, itemque pectus antennæ & pedes nigra sunt: sunt autem antennæ longæ, nodosæ, vaginis rubris ab utraque parte, quæ in medio maculam nigram grandem habent. Porta terra vulgò Italici dicitur.

Huic ex ordine *secundo loco* succedit Carabus, quem Aristotelis verum esse arbitror, cum aliquoties in ligno is sit repertus arido, è quo postea evolavit.

Tertius Carabus è ligno arido quoque nascitur, ut vidimus, nodosis procerisque cornibus, quæ nodis constant novem aut decem grandioribus primum prope caput, deinde minoribus, in quos singulos extremitates tenuiores superiorum nodorum inseruntur ita, ut articulationes nodosæ appellari possent. Ultima autem articula-

tio

tio ex parte constat nodosa & absque nodis ita, ut ea; quæ nodis destituitur, tenuis in fine in nodosam partem inseratur, veluti in ultimis digitorum articulationibus facile est videre. Porro hæc cornua, quæ antennæ meritò ab Aristotele nominantur (supplent enim earum usum) quandoque corpore multò breviora, quandoque longiora sunt, vidi quandoque duplo longiora ipso corpore; cæterum colore nigerrimo, ut totum corpus. Capite paulò minor, quàm pectore, quod inæquale est, venter omnium longissimus latissimusque, prona parte annulis quatuor aut quinque latis constans, in ventris fine, ubi alvus est, hirsutus, pedum extrema ferrata sunt & aspera, multis hirsutis particulis constantia, quarum ultima bifurca, seu bifida, & adunca in modum hami, qua validissime cuique obviæ rei, velut lapidi, ligno, linteisque adhærent, ut vix inde tutò avelli subitò possit. Unde Portapeso ab Insucribus dictus putatur. Nam etiam si parvum sit animal, tamen quandoque sustinet, retinetque pondera sextuplo; aut amplius ipso animalculo longiora cum suis cornibus suspenditur, & in altum evehitur; hunc aliquando in pertusa pyxide conservavi vivum per aliquot hybernos menses, apponens lignum aridum & cariosum; Sed hybernis illis temporibus observare non potui, num eo vescatur, quod quidem verisimile est, cum duobus dentibus aduncis sit instructum, ut reliqua Scarabæorum genera; his enim se conjungentibus sectum alimentum ori ingeritur: universum autem corpus exceptis cornibus longum duos digitos, latum minus uno.

Qui descriptum sequitur ejusdem generis, differt autem corporis universi colore, qui fuscus est ad castaneum vergens, cornua sunt tenuiora, longioribus constantia internodiis, sed tenuioribus, pectore multò minus caput, in quo oculi sunt satis conspicui, siti in posteriore magis parte, nec ita distantes, & ad latera, ut in præcedenti, pectore quoque minore ventreque longiori & nigra cauda insignito.

Succedunt *duo alii* sub eodem Caraborum genere referendi, minores, corpore nigerrimo: capite majori, quàm pectore, quod linea quadam fusca à pectore separatur, alvo seu ventre figura ferè ovali; qui totus vaginis binis cooperitur, secus quàm in prædictis, pedum extremitas non usque adeò aspera, ut cuique obviæ rei adhærere possit.

Ultimus est Carabus dubius: nam ex antennæ, quæ in aliis nodosæ erant, in his veluti Papilionum sunt quorundam plumatæ, toto corpore nigro, capitis ac pectoris magnitudo fere eadem, sed in pectore ab utraque parte duæ appendices

videntur nodulis aliquot constantes, quæ, cum pedibus pectus duobus destituatur, secus ac in multis aliis pedum vicem supplere putantur; pedum utique constitutio differentia est notabili, nam secundus eorum articulus, atque tertius iisdem villis est, seu asperitatibus, & capillamentis, quibus sunt antennæ & descriptæ appendices pectoris; universi autem corporis ea est parvitas: qua in icone cernitur.

Quarta tabula duos tantummodò continet, quorum primus ad Caraborum quoque genera referendus, ac præcedenti tabula quarto loco descripta congener, dorso multis punctis protuberantibus resperso, alvoque caudata.

Secundus totus niger dentato capite absque cornibus nodosis; quorum loco duas antennas nigras æquales mediocriter longas habet.

Quinta tabula primus uvas corrodit, toto corpore niger, exceptis pedibus, vaginis & antennis, quæ sunt colore castaneo, antennæ in extremitate multifidæ sunt veluti scopæ, vaginæ ad finem alvi non pertingunt.

Alter ferè ejusdem generis caudatus, pectore & capite nigris viridè resplendentibus, vaginis non totam alvum circumdantibus colore castaneis, pedibus in extremitate magis rubentibus, item antennis eodem colore præditis, quæ cum in fine crassæ apparentur, ut fructus tenues & oblongi, æqualesque, parvo admodum pediculo capiti adnectuntur.

Insecta tria quæ subsequuntur, ad Cantharidum genera referuntur, quorum *primum* toto corpore nigrum exceptis vaginis, quæ miniaceæ ferè totæ sunt. Nam linea nigra in principio latiuscula à medio vaginarum ambarum, qua parte sibi invicem contingunt, oritur & versus anum protenditur, finitque; antennæ sunt in eo longæ. *Secundum* capite, pectore, antennis, & duobus prioribus pedibus ferrugineo colore, reliquis membris colore nigris cœruleum fere splendentibus, seu plumbeis. *Tertium* & *ultimum* pedibus antennisque nigris, reliquis membris miniaceis.

Sexto loco ponitur Scarabæus vermis facie, toto corpore niger, duabus in ano appendicibus crassis, antennis proceris.

Septimus caudatus est, toto corpore ex cinereo ad castaneum vergente, pectore & vaginis aurum splendentibus, antennis tenuissimis, oculis conspicuis à latere capitis collocatis.

In Sexta tabula ordine primus ponitur Scarabæus fætidus dictus, quod tetrum haberet odorem, in campis repertus, Scarabæo pilulari magis, quàm alteri alicui insectorum similis, antennis est nigris geniculatis, in quarum extremitate duo sunt globuli seu pilæ, maculamque prope has ha-

habet ferruginei coloris, ceteræ partes omnes nigerrimæ, exceptis vaginis, in quarum suprema parte quatuor apparent maculæ ferruginæ; pedes erant in fine maximè ferrati & asperi, cauda annulosa, quam extendere & retrahere poterat. Dum tangitur, stridet, curritque velociter. Notandum in hoc eodem animalculo in parte inferna circa os vermiculum, aut exiguum animalculum extitisse, quod utrum ei naturaliter insit, an verò per accidens, adhuc me profectò latet: nam tamdiu, quam apud me continui, semper apparuisse deprehendi.

Secundus & illæ foetidus, totus niger, minor, antennis ferratis & absque pilulis, pedum extremitate aspera.

Tertius serpentarius à nobis nominatus, non quod serpentis figuram referat, sed quod in occisi serpentis corpore, cujus carne vescebatur, deprehensus sit, pilulario minor, angustiorque corpore, capite nigro depresso, antennis nigris, parvis, quarum apices flavescent, rostro bicornis, oculis emissitiis, pectore nigro scutiformi, vaginis quadrangularibus brevibus (non enim totam alvum cooperiunt) nigris, quarum utraque duas in medio habet fascias luteas paululum ferratas, alvo valdè annulosa & circa extremitatem valdè pilosa: pedibus omnibus ferratis, quorum tamen anteriores in extremo articulo reliquis erant latiores, ut manum quodammodo imitarentur, subtus verò flavescentes. Inter medios & posticos pedes colore est aureo, obversusque ea parte Soli splendorem emittebant: sed hunc colorem aureum pili quidam rufescentes efficere videbantur; In pectoris parte supina cruce erat notata, inter antennis macula obscurè lutescente & triangulari: pars ejus inferna multis pediculis scatebat.

Quartus è Pilulariorum fortè est genere: nam circa excrementa cum versantem deprehendi, brevi corpore & obeso, nigerrimo colore & relucenti capite rotundo, & instar scuti militaris efformato, è cujus medio cornicula duo exerit breviora cum apicibus, & alias duas appendices his multò exiliores: Pectore item scutiformi, quod tamen in anteriori parte appendicem quandam protensam & acuminatam, habet, ut tertium cornu referre videatur, vaginis striatis, pedibus in fine ferratis & asperis: anteriores horum minus asperis, posteriores magis; ad latera pilis quibusdam rufescentibus vestitus, ani figuram medii scuti figuram exprimit.

Quintus niger, parvo capite, antennis longioribus, nec pedibus asperis. *Sextus* aquaticus minor dictus, quod in aquis degat, corpore est nigro, lucido, ad viridem quodammodo accedente, pectore ac ven-

trelato, vaginis ventre majoribus, in medio ventre inter pedum exortum appendicem quandam habet, qua pedes à se invicem separari videantur.

Duo postremi minimi, dorso uterque variegato. Prior pectore scutiformi, ac capite rotundiusculo, duabus antennis exilibus insignito, dorso autem multis punctis seu granulis resperso, coloreque nigro. Posterior corpore magis rotundo & compacto, capiteque exiguo, antennis longioribus, dorso toto variegato, & colore magis nigro.

Postrema tabula primus è minimorum genere est, toto corpore nigerrimus, compactus, antennisque exiguis, vaginis universam alvum tegentibus.

Qui hunc ordine sequitur, major & corpore item nigro, magis oblongo, antennis longioribus, pedum extremitatibus minimè asperis, sed levibus & æqualibus, ut ad scandendum non usque adeò aptus videatur, nisi ejus parvitas has asperitudines cernere non sinat.

Tertius inter Scarabæos quoque à nobis relatus, quod cum eorum natura corporisque constitutione magis quam cum aliorum conveniat, capite parvo, cujus articuli cum dorso aurei sunt, ceteræ partes nigerrimæ.

Quartus corpore universo niger, capite rotundo parvo, antennis mediocribus, pectore triplo majori, vaginisque universum ventrem contegentibus.

Quintus è minimorum genere niger fere totus, præterquam in vaginis, in quibus aureus color, sed obscurè videtur; capite rotundo, & exiguis valdè antennis, nec facile conspicuis.

Sextus totus niger, capite serrato & magno, pedibus ferratis & asperis, in fine bifidis, vaginis brevibus, nec alvum totam contegentibus.

Septimo loco positus est Gryllus potius: oblongo corpore, colore flavo, sed circum latera præsertim vaginarum nigris quibusdam maculis variegato, antennis rectis, longis & nigro atque flavo colore distinctis.

Octavus supine depictus, capite rotundo & exiguo nigro, antennis parvis & tenuibus nigris cum pectore, quod majus capite est, pedibus item nigris, inferna ventris parte seu prona rubra.

Nonus totus niger & oblongus: capite minutissimo, antennis mediocribus acuminatis, pectore grandi, quod à ventre divisum longo interstitio & exiguo ligamento connexum: pedum ultimis articulis ferratis & asperis.

Decimus quoque niger excepto dorso, quod quodam argenteo splendore nitet, mixto scilicet cum nigro, capite est exiguo, exiguisque antennis, ventre paulatim versus inferiora gracile-

scence, pedum extremis particulis bifidis.

Ultimus & is exiguis antennis, totusque niger, minus gracili extrema parte alvi, inter minimos hic computandus.

CAPUT IV.

De Proscarabæo, & Scarabæis aquaticis.

Moufet. de
Inf. l. I.
c. 23.

Quem Latini Proscarabæum dixere, illum Paracelsus *Meloen*, Agricola *pingitulum*, Græci ἀγρινίδαν, & ἡλαιοκίδαν, vocant. Germani Majalem Scarabæum appellant. Corpus ei molle, è cæruleo obsoleto, cum splendore nigricans. Scapulis alæ duæ, vel potius alarum rudimenta innascuntur, celeritatis in gressu adjumentum. Circuli, dorsi ventrisque fasciæ; viriduli in junioribus, in adultioribus, cœrulei apparent. Agricola falsò quadrupedem facit: constat enim sex pedibus Wier. apud Clut. sic describit. Hic vermis, in capitis & colli circuitu colore purpuræ saturato aut violaceo annotatur, paulum scintillans, alæ delitescente viriditate tinctæ sunt; Sub alis atque in dorsi ambitu circuli visuntur diverso colore imbuti, subinde viriditate micantes, subinde flavedine obscura distinctæ; venter atque pedes colore caput & collum repræsentant; in utroque latere ventris tres pedes continentur. Rostro autem incurvato aliis congenerebus & rostratis non absimiles. Ubi ætas tenerior est promiscuè cæruleo colore tinctiores censentur; excrescunt in duorum articulorum digiti longitudinem & unius crassitiem. Contritus fragrantiam fundit. Foliis violar. & graminis tenelli præcipue vescitur. Rarò extra Majum conspicitur. Reliquis anni temporibus vel latet vel semine pillulis incluso, obit. In ericetis colligitur: solet & ex fossa herbacea rorida erui. Coeunt averfis caudis, fœmina, quæ major & oris forcipati, quæque levissimo tactu oleum fundit, trahente marem, qui minor, & quasi exsuccus, ut retro reptare cogatur. Wieri supinus, (*vermem Majalem* vocat) ad faciem humanam maxime accedit. Alas longiores reliquis gerit, & cingulis pluribus corpus ambientibus distinguitur. Quem Edmundus Knivetus vidit, parvus & exsuccus erat. Habent in *Medicina* usum. In Ditmarsia filo circa collum appenduntur. Ibidem in Epidemico capitis dolore tres excicati & in pulverem redacti, in Cerevisia propinantur: ad sudandum per novem dies. Sed solemnis in arthritide vaga usus. Manibus eos tangere cum colliguntur, religio est. Numerus semper impar. prima vice unicus post ternos assumitur: quinque ad summum: in pulverem redacti in

Clut. de
Ephem. p.
74. Pro-
scarabæus
Wieri su-
pinus, &
pronus, a-
pud Mouf.
p. 163.

Clutius l.
c. p. 82.

cerevisia calida exhibentur. Maxima hinc primò ventris perturbatio, maximus & circa urinæ ductus dolor, ut cum morte conflictari videantur: hinc vomitus, cardialgia, ardor urinæ, & similia. Serum tandem copiosum proliciunt, & aliquando restituuntur. Paracels. in hydrope aquam ex dr. x. Meloum & sem. raph. unc. j. ab unc. ij. ad unc. iij. propinat. Destillati tumores oculorum tollunt. Pinguedo fissuras manuum sanat. Kegler. in oleo dulcissimo suffocatos, ad bubones & carbunculos commendat. Quid de *Scarabæo Culione* Marcellus scribat, vide apud Moufetum.

Scarabæum Aquaticum Moufetus ita describit. Scarabæos aquaticos Græci ὑδροκιδάρης appellant. Horum omnium ventres spadice infecti, dorsetque carbone notata, præter Anglicanum; In cujus icone si limbum scapulis totoque corpore ovali circumcurrentem leviter infuscaveris, atque oculos argenteos feceris, non est quòd amplius expetas ad illius descriptionem. Sex quilibet pedes obtinuit, posteriores longitudine latitudineque cæteros vincentes, quibus pro remis inter nandum utuntur. Sed elytris nigerrimis; membranæ latent alæ argento tinctæ, quibus noctu aquis egressi, celeriter convolant per aërem, quem interdum perarò (forte nunquam) diverberant. Omnium verò minimi sunt illi, qui irrequieto motu huc illuc in aquæ superficie multi nullo ordine transcurrunt, & q. colludunt, & aqua turbata vel se fundo immergunt, vel in riparum foraminibus abscondunt: Deinde verò mutis & tranquillis fluctibus iterum gestiunt. Christoph. Leustner. se Scarabæum in loco quodam invenisse scripsit ad Gesnerum, vaginaria (ut solent) crustula, qui quasi formicæ caput subluteum, atque alæ multæ erant affixæ; ventre inferiore pinnae spargebantur, caudis astacorum similes: quibus (ceu in aquis remiges) divagabantur. Cauda prominebat pro sua munitione exigua, sed in longissimas fetas divisa. Ex aqua palustri in fontanam conjectus paucis interjectis diebus vita excessit.

Moufet.
de Inf. l.
I. c. 23.

CAPUT V.

De Tauro volante Brasiliensi, & ei congenere.

TAuri volantis, seu Scarabæi platycerotis, quatuor sunt apud Brasilienses species, *Enena* incolæ vocant.

Totius corpore in primo longitudo plus duorum digitorum Rhyndandicorum; crassities autem fere quatuor. Totum corpus splendide nigrum, sed pilis flavescens viscentibus opertum, ita ut flavescens vide-

Marcgr.
Hist. Bra-
sil. l. 7. c.
2.

videatur. Sex habet pedes seu crura duos antèrius versus, duos ad latera fere extensos directe, & duos post se extensos, nigros omnes splendidosque & superius raris pilis præditos; in quolibet autem pede tres ungues, cum parvulo digito, qui quasi tertius unguis: suntque crura variis denticulis armata. Unius fere digiti intervallo à capitis initio (quod minimum) sectio est corporis. Capitale cornu habet magnum, & in extremo sectum, nigrum & splendidum, unum pene digitum longum: oculos nigros eminentes & propè illos duos cirrhos extensos, singulos tribus apicibus qui in extremitatibus sunt fuscis. Prima sectio corporis tricornis in summitate anteriori habens cornu protensum & paululum deorsum flexum, longitudine dentis humani: & utrinque ad latera unum, ejusdem magnitudinis. Alæ ejusdem coloris cum tota corpore, pilosæ ac duræ. Posterior sectio corporis inferius multas habet divisuras. Prior sectio superne magis rufescit pilis, posterior autem magis flavescit.

Alter paulum diversus à priori est. In toto corpore superiori obscurè castanei seu nigricantis splendentis coloris, in infimo per totum castanei coloris splendidi. Totius corporis longitudo, duorum & semis digitorum crassities circiter quatuor. Corporis anterior sectio, unum digitum longa. Caput parvum: oculi nigri splendentes, non tamen prominuli, ut in priori: propè oculos duos habet cirrhos ut prior: proxime caput cornu erectum & paulum versus posteriora reflexum semidigitum longum, & ad latera in sectione anteriori superius versus utrumque cornu crassum erectum, paulò brevius & abtusus quam prius illud. Alas habet ut alter & corpus ita conformatum: Crura sex tribus juncturis, & tribus digitis, & uno minimo pro quarto: media crurum pars inter secundam & tertiam juncturam aculeis pyramidalibus munita: integra autem crura sunt hirsuta pilis castanei coloris, uti & circa os ac in sectione corporis.

Tertius, rarissimæ est conformationis. Magnitudo illi eadem cum prioribus; crasso & rotundo ventre: crura habet sex, singula duabus juncturis constantia: anteriora autem quinque processus acutos quasi digitos habent, quibus terram fodiendo citissimè sub eam se ingerunt. Alas habet duas striatas, & in prima sui corporis sectione eminentiam sellæ formem, & ante illam foveam s. cavitatem subrotundam, avellanæ majoris capacem, in qua magnus numerus foetuum vivorum visitur, coloris bruni & filamentis quibusdam in fovea annexorum, qui magnitudinem referebant femina papaveris, sed Megascopio quilibet inditus magnitudinem ostendebat piffi, eratque omnibus numeris absolutus &

cornutus ut parens. Caput semilunaris fere figuræ & compressum, cui cornu impositum, satis crassum & plus digito longum, erectum, sed in summitate paulum versus posteriora inclinatum. Pone cornu hujus exortum, in quolibet latere oculus granii milii magnitudine rotundus, niger, splendens. Totum autem corpus, crura & alæ sunt insignis splendentis coloris, ex nigro, viridi, & aureo mixti, estque totum subtilissimis pilis vestitum. Validissimus est, nam scatulæ crassæ à me inclusus ac latere cocto crasso imposito, nihilominus se semper exserebat, ut funiculis fuerit coercend. Hirci pene odorem de se fundit.

Quartus. Crura habet sex, quatuor in posteriore, & duo anteriore sectione corporis: pedes desinunt in duo lunata cornicula: singulaque habent tenuius tenaculum. Anterior sectio digitum longa in cornua desinit duos & semis digitos longum, teres & paulum deorsum incurvatum, & duos habens veluti dentes versus posteriora. Inferius in antica parte corporis, sub exortu hujus cornu, jungitur caput, parvum quidem sed & cornu habens sursum incurvatum, duos fere digitos longum, cum processu tripartito in ipso acumine. Oculos habet rotundos, nigros, splendentes semin. canabini magnitudine, pone oculos autem duos processus coniformes, contortos, posterior sectio duos digitos est longa, atque alis crassius tecta, cum anterior sectio glabra & solida testa tegatur, quæ in cornu extenditur.

Tota autem anterior sectio cum cornibus capite & cruribus, atque inferiore ventre, nigri & splendentis est coloris, & superius seu longum cornu, versus inferiora, villosis pilis, obscure flavis sive luteis vestitur, ita ut ad tactum holosericum referat: Junctura ad caput quoque villosa; crura autem & infimus venter brevioribus vestitur pilis obscurè flavis. Alæ exteriores constant testa colore fuctus olivarum cui obscurè flavum admixtum, & variegantur sparsim punctulis fuscis. Cornua illa duo magna conjungere potest & illis aliquid tenere.

Congener Tauri volantis Brasiliensis, corpus habet bissectum, cujus anterior pars tertiam partem digiti longa, posterior paulo plus duobus digitis. Caput habet quasi quadratum & duos forcipes exsertos pro dentibus, oculos magnos prominulos ellipticos: duos cirrhos ante oculos, in exortu latiusculos, hinc angustiores plus duobus digitis longos, novem juncturis constantes: crura sex, duo in anteriori sectione, quatuor in posteriore quodlibet duos digitos longum, tribus juncturis constantes, pedes latiusculos, & in extremitate duos ungues aduncos. Anterior sectio ad latera desinit in quatuor aculeos, testa nimirum qua tegitur: posterior quatuor

*Marçg.
Hist. Bras.
lib. 1. 7.
c. 10.*

habet alas tenues, duabus testaceis tectas. Totum corpus superius obscure est flavescentius, seu lignei coloris; caput, oculi, cirrhi, forcipes, crura, inferius corpus splendide nigra, & venter præterea cana lanugine obductus.

Marogr.
Hist. Bra-
sil. l. 7.
c. 8.

Hiscæ Colophonem imponat *Tambeiva*, insectum testudinem terrestrem non male referens, mediocris avellanæ magnitudine; alæ, nimirum exteriores duæ testaceæ, figura ut clypeus testudinis: anterior sectio corporis testa coloris splendidi quasi aurum viridi colore tinctum transplenderet: in ambitu autem testæ coloris est splendentis instar rubro tincti. Duo cornicula ad quodlibet latus oblique extensa. Crura habet sex nitentia ut aurum quod elegantissimo rubro transplendet. Corpus inferius ejusdem splendoris. Tarde incedit nec facile avolat.

Nieremb.
Hist. Nat.
Exot. l.
13. c. 20.

Facit denique quorundam Scarabæorum Indicorum mentionem Nierembergius; quorum cornua derafa, & in aqua sumpta, venerem mirificè excitare ajunt.

CAPUT VI.

De Cantharide.

Nomen.

NOmen quod insectum istud apud Græcos habet, apud Latinos quoque obtinuit. Variegata *κατὰνίδες* dicitur, quod in modum testudinis compuncta; & variis maculis conspersa sit. Plinius omnes *parvos scarabæos* vocat.

Descriptio.

Descriptions in Differentiis adferemus. Qui *παχύλας* eas describunt, alii vespæ similem, sed corpore longiorem faciunt: alii vermem terrestrem, coloris viridis, auri colore superlucentem: nonnulli insectum oblongum parvum aurei coloris. Quidam denique animalculum parvum, varium, luteis lineis, quas in pennis transversas habet, promisso corpore, blattarum modo præpinguem.

Locus.

Occurrunt in Italia & aliis regionibus, in quibus frumentis, rosis, fraxinis, & oleastris insident. Nec tamen omnia ubique genera occurrunt. Nam in Belgio, & ultra ejus ad Septentrionalem plagam provincias, ea quæ in frumento inveniuntur, reperiri, Aldrovandus negat.

Aldrov.

Hist. Inf.

l. 4. c. 4.

Vitus.

Arborum foliis & fruticum quorundam floribus ut & frumento, victitant. Unde *καυθαρίδων σιτηφάγας*, Nicander meminit. Noctu in unum diem congregant, & mutuis auxiliis, formicarum instar, conservantur. Die per totum locum volare Vincentius prodidit. Ex putrescente humido & sicco, oriuntur, seu humore foliis insidente, in summis fraxini ramis, ficubus, pyris, pinis, populis, & Cynacantha. Ex erucis illarum arborum gi-

Alia. H.
A. l. 9. c.
39.

gni, Aristoteles prodidit; & Plinius expresse. Cantharides *nascuntur* ex vermiculo in spongia, maximè cynorhodi, quæ fit in caule, sed fecundissimè in fraxino: cæteræ in alba rosa. *Coëunt* tamen & quidem tardo motu; generantque vermiculum. Perit ficus, si in ea prodierint. *Olfaetu* picem liquidam referunt, gustu Cedrum, ut Nicander prodidit. Calidissimæ sunt & siccissimæ. Ideò corpus adurunt, erodunt, & exulcerant.

Generatio.

Theophr.
de Caus.
plantar. l.
5. c. 13.

Inter venena reponuntur, periisseque illis assumptis, Cajum Carbonem, Pyrrhum, tertium ab eo qui cum Romanis bellum gessit, Cossinum item amicitia Neronis notum, proditur. Adde & Abbatem illum, cui scortillum, ut in amore detineret, condimentum pulvere cantharidum aspersum apposuerat, ut apud Paræum habetur. Catoni denique Uticensi obiectæ sunt, ceu venenum vendidisset in auctione regia, quod eas sestertiis LX. addixerat. Largius si bibantur, vel diutius extra hæreant, dolorem in visceribus qui ab ore ad penem extenditur excitant; vesicam ulcerant, penem & vicinas ei partes inflammant: sanguinis & carnis mictum; sæpè diarrhæam, dysenteriam, syncopen, mentis alienationem etiam concitant. In ore sapor picis sentitur. In capite quidam & pedibus venenum hære judicant: negant alii. Variis malum impugnatur remediis. Lac humanum ab ubere sumptum, caprinum, bubulum, singulis horis exhibitum, clysteres ex jure pingui cum oleis emollientibus quos nitrum ex hydromelite non malè excipiet. Oleum liliorum, amygdalinum recens ex ovo scorbili, Samium, cœnanthinum, & quam Lycus Neapolitanus pro antidoto posuit, portulaca, vehementer laudantur: Oleum verò cydoniorum certissima hujus morbi Theriaca est. Nec frudari sua laude debent, acetum scilliticum, terra samia, lutum Armenium, quod vi emplastica erosionem prohibet. His quidam theriacam & Mithridatium, quæ tamen refrigerantibus & erosioni resistentibus doloremque levantibus castigari debent, adjiciunt. Nec vomitionum obliviscendum est. Ideò à Dioscoride imperantur.

Nocumentum.
Cic. ad
Pætum l.
9. Epist.
Plin. H.
N. l. 9.
c. 4.

Plin. H.
N. l. 29.
c. 4.
Gal. l. de
Ther. ad
Pison. de
Tem. l. 3.
c. 3. Ni-
cander. in
Alexi-
phar.

Plin. H.
N. l. 20.
c. 13.

Plin. H.
N. l. 23.
c. 2. & 4.
l. 28. c. 10.

Usus.

Circumspectè in Medicina adhibeantur necesse est. Vesicæ enim ita sunt infestæ, ut quidam, manu duntaxat detentas, sanguineam urinam prolicere credant. Montagnana certe cum alteri genuum applicatæ fuissent, quinque sanguinis per urinam libras eduxisse scribit. Cautè agetur, si mensuræ, medicamenti, & ægri habita fuerit ratio. Tria vel quatuor præbentur intus grana; exterius, majore copia opus est. Calidiores ægerrimè ferunt; destituti viribus aut viscerum scirrho affecti planè non.

Gal. l. de
viſ. rat.
in acutis.

Gal. l. II.
Med.
ſimpl.
Plin. H.
N. l. II.
c. 35.

Differen-
tiæ.
Mouſ.
Theatr.
Inſect. l.
I. c. 20.

non. Ipſæ cantharides, abjectis alis, capite & cauda à quibuſdam exhibentur, quod & Hippocrati in uſu. Audax qui has partes abjecto corpore adhibuit Medicus, mortis in uno & altero hydropico cauſa erat. Nonnulli tamen totis utuntur, quod & Galenus fecit. Alæ reliquorum remedium. Unde *Plinius*. Alæ medentur, quibus demptis lethale eſt; niſi fortè mutilatus ſit locus. De cætero, ad urinam ciendam, lichenes tollendos, verrucas, faciei puſtulas, ſcabiem, podagram, menſium ſuppreſſionem, foeminarum ſterilitatem, uteri ſtrangulatus, quartanam, &c. adhibentur. Scapulis vel brachio appoſitæ potenter urinam provocant. Excoriatorium lichienum Pamphili, quo Romæ uſus eſt, dum mentagra morbus graſſaretur, Cantharidas recipit. In quartana telæ araneæ involutæ de collo ægri ſuſpenduntur. Reliqua in Aldrovando vide. Venerem excitare notorium eſt. In graviſſima ſymptomata, & penis diſtentionem perpetuam incidunt, qui incautius propinatas hauſere. Formulas paſſim apud Medicos invenies. Viperas ſi domi in vitreo vaſe alere volueris, cantharidibus ciba. Suffitu ſtercoris bubuli cum galbano, à frugibus depelluntur.

Mouſetus in *maiores* & *exiguas* diſtinguit. *Majorum* alæ ſunt, ut verbis ejus utar, oblongo corpore craſſæ, ex tritico collectæ, ac Blattarum more pingues, variæ aureis lineis, quas in pennis tranſverſas obtinent (atque hæ in medicina potiſſimæ habentur) alæ *minutiores*, macilentæ, latæ, piloſæ, interiores dictæ; & ad medicos uſus inutiliores. Majorum quoque non omnes ex viridi radiantes videris, ſed alias item ex Xelampelino; inexplicabilis omnes ſplendoris, & colore oculis gratiſſimo donatæ. *Parvum* genus Cantharidum Thomas Decatæus primus mihi communicavit; forma nonnihil & mole diſpares videntur, ſed virtute Cantharidea & ortu conſentiunt. Harum (ſcilicet minorum) *prima* corpore, & capite oblongo eſt, & forcipato, oculis nigerrimis prominentibus, antennis longis atque nigris, alis circa medios lumbos extuberantibus, quæ duobus punctis argenteis, & maculis paucis albis notantur: in Cicutaria herba per æſtatem plerumque reperitur, pedes habet & crura, gracilia admodum atque longa, purpureſcente minio ornata. *Secunda* ejusdem cum *prima* coloris eſt, niſi quod antennæ oculique virides videntur. Caput huic exiguum, ſcapulæ globosæ, atque gibboſæ.

Tertiæ caput & ſcapulæ confunduntur, coloris æruſinoſi, ſed ocelluli picem referunt nigerrimam: alas habet capiti concolores, ſed ſtriis quibuſdam aureis micantes: pedes item piceos & breves. *Quarta*

tertiam æmulatur, ſed herbaceo potius colore eſt, quàm æruſinoſo; aliàs præter magnitudinem (quippe omnium minima eſt) non differt.

Aldrovandus quinque tabulis eaſdem repræſentat.

Primæ tabulæ primo loco depingitur Cantharis è maximarum genere, colore viridi, atque aurum lucente in roſa aperta.

Secundo prolixiori corpore, lineis luteis, in capite, pectore ac dorſo, antennis longiuſculis ac nodosis, luteis, ut etiam pedibus in roſa ex eruca nata, in qua & *tertiam* reperi rotundò corpore nigro & piloſo, violarum ſpeciem exiſtimo.

Quarto ac quinto loco eſt Cantharis rotunda ſeu Viola nigra prona & ſupina, obſcure in vaginis punctis albicantibus & rarioribus, in alvi vero parte prona quatuor lineis parvis & albis ejusdem generis, & ea eſt, quæ *hanc ſequitur*, niſi quod punctula illa alba, quæ in priori rariora erant, magis ſint frequentia & conſpicua.

Septimo loco eſt araneus, quem exactiùs ſuo loco deſcribemus.

Proxima huic cantharis oblonga capite ac pectore nigra, duabus antennis faſtis conſpiciis, in extremitate pilulam habentibus, pedibus item nigris, vaginis rubro & nigro colore tranſverſim maculatis.

Eadem ſequenti pictura expanſis alis oſtenditur, ut alvus, quæ tota rubra eſt, exactè videri poſſit.

Decimo loco eſt Cantharis alia fuſco colore, ſeu potius ſubcinereo ad obſcurum tendente antennis longis.

Undecimo colore nigriore multò, antennis nonnihil nodosis & in fine obtuſis.

Duodecimum locum negligenter Culex occupavit, longis alis & antennis, rubicundis pedibus.

Poſtremo eſt Cantharis tota viridis, & in vaginis colore mixto aureo, pedibus nigris.

Secundæ tabulæ prima eſt viridis, antennis longiuſculis, è mediocrium genere, oblongo corpore. *Secunda* inter minimas numeranda, tota cærulea. *Tertia* inter fabas reperta, prædicta paulo major, tenuibus antennis, lineis in vaginis tranſverſalibus nigris, reliquo corpore nigro.

Quarto & quinto numero notatur Scarabæus *χλωρόχρεος*, ſive colore viridi in ſuſupina parte, qui ſoli expoſitus aureum fulgorem edit, ut in aliis quibuſdam Cantharidibus, tamen inter Scarabæorum genera referendus; fortè erit Scarabæus viridis Plinii, quem ait ſuo jucundo aſpectu contuentium viſum exacuere. Prona parte niger totus antennis exiguis.

Sexta eſt Cantharis parva pectore nigro, antennisque exiguis, vaginis ſubaureis, recteque ob parvitatem deſcribi nequit. *Poſtrema* è Violarum, ſeu rotunda-

rum Cantharidum specie, capite nigro & pectore, antennis longiusculis, vaginis rubris; pedibus in fine nonnihil divisis & rubris. Melancephalon appellavi.

In tertia tabula primo loco ostenditur Cantharis omnium minima cœrulea. Secundo Longicolla dicta paulò minor Vespa, toto corpore nigro, rostro seu collo protenso, cui utrinque duæ insunt antennæ.

Tertiò minima colore aëreo & viridi.

Quarto numero notata, est capite, antennis ac pedibus nigris, vaginis luteis, quibus sex nigra, rotundaque insunt punctula, bina superiori parte, quæ caput proximè contingunt, reliqua in parte extremâ versus alvum per transversum ex ordine posita. Hanc alia sequitur latiori corpore atro, capite & pedibus lutescentibus vaginis obscurè, longiusculis antennis.

Sexto loco ponitur Musca viridis, antennis longis, inter Muscarum genera referenda.

Septimo & octavo duæ exiguæ, prior cœrulea tota, altera cinerea.

Octava oblonga corpore, capite, pectore, antennis ac pedibus nigris; vaginis rubris.

Nonus numerus significat convolvulum, ita Græcis Tagliadizzo vulgò apud Italos agricolas, corpore cœruleo, pedibus obscurè lutescentibus in vite repertum, ac folia ejus depopulantem; nascitur hic ex ovis Bombicum, ovis similibus magnitudine, colore rubicundis, hic cum parere vult, multa cumulat, convolvitque folia (undè fortè à Latinis id nominis datum) atque in his sua ova reponit.

Sequens numerus aliam ejus speciem cœruleam continet.

Duodecimus Cantharidem nigram duabus maculis fuscis, nigris in vaginis distinctam. Minima & è viridi aurea decima tertia est. Hanc sequitur nigra semicirculis minaceis in crustis insignita. Postrema minaceis vaginis, sed nigro maculatis, pedibus antennis, ac capite nigris.

Quæ in quarta tabula proponuntur, omnes ferè sunt cantharides rotundæ, violæ dictæ à nobis nomine & idiomate Italico, è quarum numero prima est lato corpore ac pedibus nigris, quos extendit in utraque latera cancri marini aut Paguri modo: capite nigro; antennis ejusdem coloris longis in fine obtusis, vaginis rubris, quatuor maculis nigris rotundis æquè à se invicem distantibus, quadratæ figuræ modo.

Secundo loco Culex idem, quem prima in tabula numero duodecimo exhibuimus, hunc eximere sumus veriti, ne notas numerorum atque ordinem depictorum inturbaremus, quemadmodum & eum, qui hunc ex ordine succedit, numero undecimo primæ tabulæ delineatum & ibidem descriptum.

Sequuntur Coleoptera duo, quorum primum fuscum corpore, alterum viride, & usque adeò exiguum, ut ad aliquod genus rectè referri non possit, nos inter Cantharides retulimus.

Sexto loco datur Viola colore rubra, maculis nigris insignita.

Septimo & octavo eadem, sed nigra utraque, quarum prior linea rubra cingitur.

Nona est ex prædictorum genere, rubro nigroque colore varia.

Alia decimo numero notatur rubra duobus punctis aspersa nigris.

Undecimo & Duodecimo pectore sunt nigro albis punctis maculato, vaginis luteis, maculis nigris aspersis.

Quinta & ultima tabula quatuor continet violas, quarum prima est minima punctis albis ornata. Secunda magna, nigro & aëreo varia, triangulo in lineas dissecto nigras, dorso pulchra. Tertia nigra quinque aureis notis ornata. Ultima exigua cinnabari colore tineta.

Est & in India genus Teocuilin cantharidum parvarum, rubri capitis, pectoris smaragdini, & reliqui corporis fulgidi. Ajunt, lepræ illitas, atque confricatas, mederi. Vivunt apud Hocitalpenses. Est autem Teocuilin vermis igneus, & ab igne aut urente naturâ impositum est insecto huic nomen.

Nieremb.
l. 13. c. 17.

CAPUT VII.

De Bupreste, & Ipe.

Quem Ardoinus Buprestem vocat, is Vegetio, Vulpestris & Bulpestris, Sylvatico, Bustasaris, Bublites & Bubestis vocatur. Græcis βύρρης Nicandro βύρρης, & βύρρης, dicitur: quanquam fortè hæc pro araneola illa ruberrima boves mordente sumi possit, quæ devorata eadem cum Bupresti Symptomata inferat. Bupresti verò, nomen παρὰ τὸ πρὶν τὰς βύς, quod boves rumpat; seu παρὰ τὸ πύρραδαι, quod incendat, impositum est. Primò enim per summam acrimoniam intestina inflammantur, mox tumor, febris, & tympanites ingruunt: tandem membranis ruptis, crepunt pecudes mediæ.

Nomen.
Veget. veter. l. 3. c. 15.

Difficulus describi potest. Nam & apud veteres altum de ea silentium. Scarabæo longipedi similem, & in Italiâ raram scripsit duntaxat Plinius; in Lybia frequentem Lucianus. Ideò nondum se veram Buprestem reperisse reliquit Aldrovandus. At Pennius veram se in agro Heidelbergensi invenisse gloriatur. Ex Cantharidum genere esse dicit, quod & apud Galenum, Aëtium, Æginetam, Phavorinum & Avicennam habemus, sed oblongiore corpore. Elytrum exterius aurum imitatur. Caput est

Descriptio.

Aldrov.
Hist. Inf.
4. c. 6.
Mouset.
Theatri
Insect. l.
1. c. 19.

est parvum, os patulum, durum, robustum, forcipatum, dentatum: *Oculi* globosi & prominentes. Ex fronte duo oblonga & articulata cornua. *Venter* in longum productus. Bellonio in descriptione montis Athos, est bestiola aligera, Cantharidi similis, sed major, colore flavo seu luteo. Visa & altera Buprestis vera, corpore paulò brevior, & circa ventrem latiore; caudâ magis acuta; capite parvo, oculis prominentibus, ore hiatulo; & forcipatio; elytra secundum longitudinem striata, colore saturata gramineo, ex auro splendente, ut Mousetus habet. Addit idem, crura pro corporis mole longiuscula tantum sex habere, (malè Grevinus & Mathiolus octo ponunt) eaque nigricantia; cornua prioris cornibus duplo minora & subtiliora; &c.

Rarò in Italiâ reperiri scripsit Plinius: frequentior tamen nunc.

Vescitur muscis, erucis, lacertis, lumbricis, & aliis insectis. Araneum etiam interficit. Morticina non tangit, & ubi se interfecit implevit, reliquum ad cavernas trahit. Nitrosi est saporis, foetoris vix tolerandi. Tam exquisiti veneni, ut infectas contagio herbas, pecudes, si, depascantur, intereant. Intus sumptum, corporis tumor, flatuum inter cutem & carnem copia, labiorum livor, sapor in ore virosus insequuntur: ne de urinæ suppressione, ventriculi & intestinorum dolore, quicquam dicam. Hinc benè capitis ejus propinatores tenentur.

Remedio sunt, aphronitrum cum aqua; lac muliebre è manimis affatim extractum; urina muliebris epota & vomitu reddita; pyrorum sylvestrium omnia genera; quæ tamen corpore tumido exhiberi non debent: Cantharidum alæ & pedes, si quibusdam credimus. Reliqua apud Dioscoridem vide. Bos vel equus si comederint, inflantur, stercore minutim & frequenter reddunt, & cibum averfantur. A cursu & venæ in palato sectione remedium. Quidam oleum naribus infundunt. Plura apud Aldrovandum habes.

Usum nihilominus in Medicina invenire, si Cantharidum instar præparentur. Dioscorides eas super cribrum ferventi cinere torret, Galenus aceto macerat, Hippocrates capita, alas, & pedes abjicit. Cum sevo hircino, septica vi, lichenastollunt, ut Plinius prodidit. In desperatis mensibus; cum duplo ficus pulpæ, ab Hippocrate supponitur, ne de uteri scirrhi & suffocatione, aut molæ ejectione quicquam addam.

Quantum ad *Differentias* Mousetus duas *Scaraboides* describit, alteram ex auro virescentem, alteram ex flavo nigricantem. Illa priori major, alæ externæ auro saturato lineatim ducto illitæ, & pauxillo viridi (verba ejus sunt) adumbratæ: Inter lineas umbones concavi, eleganter sculpti, assur-

gunt. Alteram à Jacobo Quickelbergio ex agro Viennensi accepit. Lonicerus, Cornarius, & Cordus propter foetoris magnitudinem Cimicem sylvestrem pro Bupreste sumserunt. Aldrovandus tres proponit. *Prima* in arvis deprehensa, rictu satis magno, coloris candidi, in interna parte serrato; supra cujus duo cornicula, quibus constat, aliud corpus habetur candidum similiter, in ipso rictu appendices illi quatuor breves, & pilosi, quibus videtur primum gustare cibum antequam in os sumat. Capite est obscurè viridi; item dorso, & vaginis, quarum utraque maculam habet rotundam, albamque. Antennis longis. Lineam quam utræque vaginæ, cum in alvi medio conjunguntur, constituunt, ænei coloris, sub alis viridis, ut elegantiorum colorem vix intueri quispiam posset, pedibus longiusculis pilosis, colore non semper uno, sed prout soli obvertuntur, ita nunc colorem viridem, nunc æneum referentibus, plus tamen ænei participantibus. Color qui supina est parte nullum colorem de se fundit: in parte pronâ omnia eleganter micare conspiciuntur. *Secunda* superiori similis, colore tamen differt, qui in toto (exceptis pedibus, qui flavi sunt) niger est, & hæc quoque in arvis reperta. *Tertia* est Jacobi Grevini, quam quatuor pedibus ab utroque latere depinxit, colore viridi. Similem depinxit Matthiolus in suis ad Dioscoridem Commentariis. Sed cum ibidem eam non describat, dubito num eam velit esse Cantharidem; quibus in Medicina utendum est, an Buprestem.

Ips Plauto est *involuculus*, Italis rusticis *Tagliadizzo*. Proprium ejus in vitibus versari, easque ut & cornua arrodere. Hinc ab *ἰττω*, id est *βλάττω* noceo, nomen accepit. Qui Serpentis genus esse putant, ab Hermolao redarguuntur.

CAPUT VIII.

De Cucujo.

Insectum Indis familiare Cucujus; seu Coccojus, & ex Scarabæorum genere esse videtur. Septuplo cicindela nostrate volante major est, digiti minimi crassitudine, duarum unciarum longitudine. Haud pauci cervinos scarabæos æquant. Vespertilionibus paulò minores ex Petro Martyre Nicrembergius dixit. *Corpus* duodecim incisuris ornatur, ex cinereo parum nigricans. *Caput* est longum, cujus anteriori parti nigra superius quasi in medio, triangularis macula insidet; breves antennæ; *Oculi* grandes, juxta cornicula prominuli & nigri, prope os locantur; reliquum caput coloris est spadicei ferè, exceptis duobus clavis propè *collum* aureis, è quibus *radij* splendentes;

Descriptio.

Nieremb.
H. N. 13.
c. 3.
Mouset.
Theat. Insect. I.
c. 15.

Mouset. l.
c. p. 142.

Grevin. de
venenis, l.
2. c. II.

Locus.

Victus.

Venenum.

Ælian.
H. A. l.
6. c. 25.
Remedium.

Gal. l. 1.
2^a edit.
c. I.
Differentiæ.

dentes, in volatu præsertim, atque alis expantis, insigni fulgore exeunt. *Pedes* sex nigri à corpore exeunt. *Elytra* quibus alæ teguntur, colore ferè castaneo videntur. Icones ex Moufeto apposui. Hic, à Candido, pictore peritissimo, qui eas in Hispaniola & Virginia, observavit, accepit.

Lux.

Lucere noctu nemo dubitat: qua parte non convenit. Oculis duntaxat radiare quidam prodidere. Unde Moufeto *κεφαλο-λαμπίς*, dicitur. Quatuor lucidissima specula habere, Nierembergii; oculorem sede duo, in ilibus sub vagina latentia duo: quæ tunc ostendit; quando more scarabæi evaginatis tenuibus alis, aërem captat. Navigatores oculis & clunibus eandem adscribunt. Alii visceribus & cuti ventris diaphanæ. Nullum aliud olim Indis sive domi sive foris lumen. Noctu gradiuntur duobus ad pollicem pedis alligatis: gestant & manu unum, dum *Utias*, seu cuniculorum genus murem magnitudine superans, venantur. Tantum id, ut quivis in cubiculo legere, scribere, & necessaria peragere possit. Imminuitur, dum fatiscunt; post mortem, evanescit. Quare vix credi potest, formari ex eo pastam, quæ ad faciem & pectus attrita, lucere ea faciat. Candisio & Dudlejo, cum ad Indiæ littora appulissent, imposuisse Moufetus ex itinerariis Anglorum author est.

Captura.

Nieremb.
N. H. 13.
c. 3.

Quomodo capiantur, & culices, quorum gratiâ captura instituitur, capient, Nierembergii ex Martyre prodidit. Primo noctis crepusculo exit domo cucujorum indigus, titionem manu gestat ignitum, tumulum unde queat à cucujis prospici, ascendit vicinum, elatis vocibus cucujum appellando, circumrotat titionem, cucuje, cucuje inclamitando, aërem obtundit. Ad vocantis reboatum simplices putant nonnulli, cucujos, eo delectatos strepitu, convolare: veniunt namque properanti ac præcipiti accessu. Ego vero accurre arbitror ad titionis fulgorem cucujos, quod ad lucem quamcunque agmina culicum advolent, quibus cucuji vescuntur in aëre ipso, uti cipelli & hirundines. En cucujorum numerum optatum, titionem venator manu projicit. Titionem aliquando sequitur cucujus aliquis, & solo se dimittit, captu facilis tunc est: uti scarabæum ambulantiem vaginâ clausâ, licet viatoribus si quis eo indigeret, carpere. Negant alii hoc pacto solere capi cucujos, imo ajunt paratos habere venatores frondosos maximè ramos aut latam lineam, quibus alto circumvolantem percutiunt cucujum, in terramque impellunt, ubi jacens torpescit, & capi se patitur; vel, ut alii dicunt, secuti volucris lapsum frondoso eodem ramo, vel linteo projecto super eum, prædam assequuntur. Utcum-

que sit, venator venatore cucujo apprehenso, domum revertitur. Ostiolo domus clauso, prædam solvit. Totam circuit præcipite volatu domum quæritando cucujus culices, sub lectis pensilibus, & circum facies dormientium, quas implere culices assueverunt. Custodum officio, ut quiescere queant, inclusi, fungi videntur.

Sunt & aliæ ibidem bestiolæ, volantes quæ noctu lucent, sed nostris multò majores, & lucem etiam majorem emittentes. Lucent enim adeò clarè, ut qui itinera constituunt, capitibus & pedibus, has cicindelas arte quadam pendulas vivas figant. Sic enim de longinquo oculis facile percipiuntur, & ideo rei veritatem ignorantes attonitos reddunt. Mulieres non alia luce ad negotia sua peragenda in ædibus noctu utuntur.

CAPUT IX.

De Cicindela.

PLura hoc insectum tam apud Græcos quam apud Latinos accepit nomina. Græcis enim dicitur *λαμπίς*, *λαμπρίς*, *πυρολαμπίς*, & *κισσολαμπίς*. Aristoteli *βόσρυχος*. Suidæ *πυρολαμπίς*. Hesychio *πυρολαμπίς*: vel potius *πυρολαμπίς*, igniclonis & luciclonis. Aliis *λαμπιδων* & *σπίτιος* metaphoricè, *μυκίδας* Aristophanis quidam Cicindelas exponunt. Male *φάλασσα* dicitur, *κάδαρις*, verò vocabulum majori competit. Apud Latinos invenies appellari *Cicindelam* & *Cicindelam*, quod canderem cieat, *Noctilucam*, *Nitidulam*, *Noctuvigilam*, *Lucionem*, *Luculam*, *Luciolam*, *Flammidem*, *Venerem*, (Levinus vetustissimus author, sic vocavit,) *Lucernutam*, *Incendulam*, ut ex Cicerone, Plinio, Scopa, Agricola, Varone, Festo, Plauto, Scaligero, Turnebo, & aliis videre est.

Descriptionem in Differentiis vide. Nul- libi in hyeme apparent. Mensibus Aprilis, Maji, Junii, & autumno, quo rarè volant, in pratis vesperi cernuntur. Plinius, ideò, ante matura pabula aut post discessum conspicuas dixit.

De *Generatione* dissentiant authores. Baptista Porta è rore nasci putat: apud Hesychium aliquid de stupa *φρύγανα* legitur. Crediderim locum generationis innui. Arist. non volantes, ex erucis non magnis, densis, nigris, hirsutis procreari scripsit: ex his pennatas, oriri. An *βόσρυχος* dicantur, & utrum hæ ex pennatis oriantur, non facile dixerim. Ephesus sanè Græcus, *αὐτὸς βόσρυχος* à cicindelis prodire, & rusticis *Ciccas* ac *Platas* vocari (Ricinos Niphus vertit) reliquit. Cardanus ex genere Crabronum oriri voluit. Primus Scaliger, fœ- mi-

Mouf. l. c.

Nomen.

Aldrov.
Hist. de
Insectis
4. c. 8.

Locus.

Genera-
tio.

Porta

Phylogn.

6. c. 3.

Arist. H.

A. l. 5.

c. 19.

Mouf. l.

Theatri

Insect. 1.

c. 15.

Scaliger

Ex. 191.

minam cum suo mare in coitu deprehendit. Mas, ne contactus quidem destitit: postero die in meridie solutus obiit. Ab ea hora sub vesperam usque multa ova cecidit foemella: quæ intra viginti horas vivificata abiit. Idem Guil. Bruerus Anglus observavit, ut apud Moufeturum habetur. In eo à Scalig. erratum, quod ova benè non observaverit. Aristotelis opinioni Merula favet. Observavit is vermes noctu splendentes pilosos, tam in foro Lebetiorum in fossis herbidis & aquis carentibus; quam in lacunis circa Viglevanum, quod veteres Vergeminum appellabant. Diu in coitu hære, solutas parere citò, Aristoteles, tradit.

Ad Naturam ipsarum pertinet, noctu lucere; quod tamen non omnibus competit. Mares enim in Vasconia, teste Scalig. non lucent, sed foeminae quæ vermes. In Italia & agro Heydelbergenfi foeminae omnes sunt *ἀνιπύρι* mares lucigeri. Exit utrinque à lateribus & clunibus fulgor, si hient & efferantur: Compressis tota lux obscuratur. *Fulgorem igni similem alarum compressu tegi, secumque lucem & noctem habere, dixit Plin.* Non ante crepusculum vespertinum conspici, hinc Plinio, *stellantes volatus, & terrestres stellas*, apud Politianum habemus. Innoxia sunt: nec morfu nec punctione impetunt. Ad candelas frequenter & avidè advolare, prodidere nonnulli.

Liquorum ex Cicindelis fieri posse, seu ipsis per se sumptis, seu cum ligno salicis putrido, felle canis & albumine ovi commistis, qui noctu resplendeat, docuit Vitalis, Cardanus: Quomodo destillari debeat, Weckerus & Mizaldus. Ridet hæc Scaliger, & lucem hosce de coelo deductam, in materia, tanquam in turrem captivum remigem imponere, atque in cæteris habere velle videri, tam verè quàm facete, ait. Sanè, bestiola mortua, aliquot post horis, pars illa albida, ac in tenebris splendens, lucem omnem amittit. Vitro lucido cum gramine inclusas impennes, lucem per duodecimum dies de se largiri, si recens semper injiciatur gramen, ipsæ libro fruuntur aëre, concedere Moufeturum videtur. Sed illam fatiscientibus imminui, mortuis planè evanescere addit. Quid Ardenus Anglus fecerit, apud eundem vide.

Duplices sunt, *pennate* nempe, & impennes: quarum istæ, adeo clarum noctu splendorem emittunt, ut ad illum majusculæ literæ legipossint. Utrasque in *Masculos* & *Foemellas* Moufeturum distinguit, Masculus (verba ejus sunt) animalculum est pusillum, volucre, quatuor alis, quarum exteriores coriaceæ, interiores membranæ, colore argenteo, translucidæ. Corpore est oblongo parum compresso & la-

tiusculo quinque incisuris prædito, ut pro lubitu extendi & contrahi possit. Corpus extensum, alis longius videtur; contractum brevius: Caput latum, fuscum, compressum ad cuculli formam fabricatum. Cornicula duo è media fronte tanquam ex uno centro exeunt, juxta quæ antè caput parum extuberat. Non procul ab antennarum exortu minutissimus utrinque globulus niger apparet, Gagatis splendore nitidus, qui oculorum vicem supplet.

Caput collo corporique brevissimo junctum est, colore ex fusco nigricante: pedes sex pectori juxta caput affixi, quorum posteriores & crura, juxta subluteo sunt calore; reliquæ pedum partes nigricant. Tardius & gressu quasi compolito proreptat; pectus parum extuberat; corpus juxta incisuras albicat, juxta caudam duas habet maculas; utrinque unam, ad lunæ crescentis formam: ex quibus noctu splendor emicat pellucidus, sulphuris accensi æmulus, ut scintillas lucidissimas per aërem volare crederes: hinc nunquam in Anglia apparet, vel saltem si hic degat, non tamen lucet. Cicindela Europæa foemina, tardigradum est animalculum, alis carens duos plerumque digitos transversos longa, (licet in Vasconia longè majores longioresque, luctartas ibidem dictas vidit Josephus Scaliger) erucarum magnitudinis mediocris, cui ferè est similis. Caput illi parvum, compressum, durum, nigrum, oblongum, & os versus acuminatum: è cujus extremitate duæ exeunt antennæ, breves nigrae. Sex habet pedes, parvos, nigros, tribus articulis distinctos, juxta caput, erucarum ferè modo. Corpus oblongum crassiusculum, tæniæ instar compressum, duodecim incisuris profundioribus præditi, præter collum quod pro arbitrio nunc exerit, nunc laceßita retrahit & abscondit: partes intermediæ nigricantium laminarum sese ingressu elevantium faciem obtinent. Per dorsum linea admodum exilis & parum candicans à capite ad caudam usque decurrit. Latera ventris ex xelampelino suave rubent. Cauda atque venter juxta caudam albicant. Uropygium tamen ipsum nigrum est. Cujus beneficio & nisu sese attollens arenatim ripit, & furculis inde enatis sese pendulam affigit, sub hoc Uropygio excrementum ab alvo reddit subviscidum & filiosum, mellis æmulum, quod caudæ furculis ad os reductum, denuò absorbet, staminaque exinde retrocedens fingere videtur lentoris prodiga, quæ secunde devorat, eorumque revomitio- ne & resorbitione sese sustentat. Partes albæ in tenebris mirabili splendore fulgent, & stellas quasdam terrestres repræsentant: adeò ut cum lucernis lunaque

de lumine certare videantur. Hoc observatione dignum; clarissimum istum splendorum una cum spiritu vitali prorsus evanescere, ubi ergo perpetua illa lux, de quâ nonnulli putidi Paraphysici tam ineptè imprudenterque garriunt? In arvis sæpius pennatas, quandoque verò intra opidorum mænia per plateas volitantes vidimus.

Aldrov.
Hist. Inf.
l. 4. c. 8.

Aldrovandus quoque aliquot species nobis exhibuit, de quibus ita loquitur. Insectum hoc, quod *primâ tabulâ* Erucæ ferè simile, in sepium favea repertum Lampyridem *ἀντρίον* esse judico, cum, & ipsum proprio suo lumine in fovea latens noctu proditum fuerit, tineæ est instar compressum, pollicem ferè longum, sex pedibus anteriore parte instructum, nullis posteriore. Capiculus nigrum quatuor cirris tanquam corniculis Limacis instar munitum collo albo, quod ad libitum modo exerebat, modo contrahebat, præsertim laceffitum sub primæ incisuræ lamellam tanquam galeam caput contegentem. Compactum enim est segmentis duodecim, sibi mutuo imbricatim succedentibus, ac se subeuntibus laminarum instar dorso æqualibus, ac compressis nigris, quæ tamen singula ad latera puncto utrique notata purpureo. Pedibus, inquam, senis oblongiusculis & trium articulorum: stans, & caudam trahens dracunculi quodammodo speciem præbet. Cum verò his pedibus anticis progreditur, caudam sub ventrem inflectens & antrorsum complicans postica parte arcuatim repit. Nam & cauda pedum eorum vicem subit, qui in posteriori parte in veris Erucis existunt. Hanc enim candidam, & tricuspitem promit, qua posticam corporis partem inter serpendum sustinet, & cuilibet rei ut aciculæ affixæ adhærescit pendula. Prima & antica segmina longiora sunt, breviora verò versus caudam vergentia, & medio latissimum corpus paulatim in caudæ penicillatum mucronem attenuatur. Alvo extrema egerit excrementum quoddam lentum, acceræ in modum fulvum, quod ipsum nonnunquam cauda ad os adducta in circulum ceu vertitur, contractum ori admoveat, quo tamen etiam similem liquorem vomere videtur, ac veluti filo facto, retrocedit, illud diducit, ac protrahit lente sequax, deinde denuo absorbet. Parte prona modicè nigrescens diluta purpura qualis Perfici florum est, admixta variat. Qui purpureus huic est macularum color, in quibusdam magis lutescit Julius Scaliger in Vasconia sine alis Cicindelas esse scribit, Erucæ majoris quantitate, crassiores, ventricosas, Lucrambam ibi vocari. Ex harum grege ea forte erit quam secunda tabella pronam, & supinam ostendo, una cum Lampyride alata.

CAPUT X.

De Blattis.

Blattarum nomine, non tantum vermes quæ in auribus & alvearibus nascuntur, Phalænæ dictæ veniunt: sed & p. grani in ilice humili nascentes vermes; nec non farinarii. His illi intelliguntur, quos *σίλφας*, & *τιλφας* Græci, Itali *Platellas* aut *Buccaroni* vocavere. Nec audiendus est Hermolaus, qui *καρίβας* & *παρακαρίβας*, blattas vertit.

Nomen.
Aldrov.
H. Inf. l.
4. c. 9.

Insectum est lucifugum, scarabeo simile, sed elytro carens. Plura in Differentiis occurrunt. De *Ortu* non constat. Alii ex vermibus & erucis provenire credunt: quidam, ut Cardanus ex ligno. Omnes senectutem exuere, Aristoteles & Plinius testantur. Mares majores, & omnes alati esse creduntur: fœminæ ventricosæ, & alis destitui.

Descriptio & alia.

Faciunt contra surditatem & aurium dolorem, si duodecem alis abjectis, in vini veteris & mellis ana uncia una semis, cum malicorio uno, pomi succi sesquiacyntho, coquantur; post terantur, & tritis unguentum Syriacum, pix liquida, & succus è quatuor cepis expressus, adjiciantur. Fugantur herbâ blattaria dictâ; vervecis recenter mactati ventriculo, ex consilio Diopanis, si is in loco in quo versantur, deponatur; oleo denique spicæ, si eo innungantur: & hoc laudatissimum est.

Cardan. l. de ven. c. 7.
Arist. H. A. l. 8. c. 17.
Plin. H. N. l. 11. c. 28.
Ufus.

Tres Blattarum sunt species, *Mollis*, *molendinaria*, & *fatida*, cui *Peruanam* addere possumus. *Mollium*, mares omnes alati, & minores: fœminæ, magis ventricosæ, & alis destitutæ. Caput habent parvum, unde duo cornicula, prælonga, & in quamcunque partem mobilia exeunt. Pectus unâ cum scapulis orbiculare, cum septem incisuris. Alæ corpori concolores: Cauda bifurca & forpiculata: pedes sex. Visâ Petropoli in templo, vulgari sextuplò major, sanguinem venantibus eliciens. Visâ & in Philippo navi à Dracō capta, molliores nostris, coloreque magis fusco. Cursu omnes valent: & struthiocameli instar, currunt magis quàm volant. Latrinarum & balneorum incolæ. In oleo decoctas, verrucis efficaciter illiniri, experientia testatur. *Σιποδάρις* dixere quidam, quòd farina vescantur. Dioscorides *ἐν ἀρτοκοπέοις εὐρισκόμεναι* dixit. *Molendinaria*, Græcis *μυλοῖς*, *μυλῖς*, *μυλαρίς*, *μυλῆς*, & *ἀρτοκοπέαν*, ita à Mouseto describitur. Fœminam, ni fallor, vidi, quia alis caruit: vulgari illa molli longiorem, crassior, & cum majore splendore nigriorem, os forcipatum illi, parvum, quasi sub ventre positum, antennas habet primæ

Galen. med. sec. loca. l. 3.

Differentiæ.
Mouset. Inf. l. 1. c. 18.

Arist. H. A. lib. 8. c. 17.

Plin. H. N. 11. c. 28.
Mouset. l. c. p. 131.

primæ similes, oculos item exiguos concavos, vel potius oculorum signa atque vestigia. Pectori penè quadrangulari quatuor primi pedes affiguntur, posteriores ventri: supra scapulas alarum quasi rudimenta conspiciuntur, alæ tamen dici non debent, corpus reliquum crassiusculum, variè orbiculis incisum, quos, si à latere intuearis ferram referunt. Caudæ apex & furca utrinque una innascens, ad tridentis formam accedunt; stabulantur istæ Blattæ in locis tepidioribus, pistrinis & vaporariis. Vix magna in fame lucem ferunt: vel si victus quærendi gratia in apricum procedere coguntur, celeri cursu ad tenebras recurrunt, vel pulvere sese tegentes, venatores fallunt.

Μυλακρίς Polluci est insectum, magnitudine Cicadæ, colore exalbido, quod farina in moletrinis vescitur. *Σίλην* appellatum, Stephanus addit.

Fætida, Græcis *Σίλην βδέα & βδέα* dicitur. Plinius, acuta clune facit: recentioribus scarabæos pillulares, abscissa cauda, graphicè præsentat. Nigerrima est, *ἀπιδέ*, etsi alatham & elytro tectam crederes, ore bifurco, cruribus longiusculis & gracilibus. Nocte lentissimo gradu proreptat. profundis in cellis habitat: lucem fugit, & foetore universam viciniam inficit. Vix sanè marem in hoc genere alatum inveneris. A quibusdam cum Cimice confunditur. Datur & alia ejus species in Hungaria, Gryllo similis. In aggeribus & apricis invenitur. Dirum quid dum volat strepit. Hyeme lucis socia, quam fugit æstate. Tempore pestis, ceu arcanum gestatur, imò à quibusdam deglutitur. Frequentiores, ubi vina generosa nascuntur, invenias. Pinguitudinem, si caput avellatur, cum rosaceo tritam, auribus mirificè prodesse, scribit Galenus: sed lanam paulò post extrahendam; cum pisselæo ulcera sanare traditur. *Poruane*, Aranets dictæ, gryllorum sunt magnitudine, & gregatim noctu volitant, omnem ferè mollem supellectilem ambedentes. Melius fortè inter gryllos recensueris. Aldrovandus unam, pronam & supinam, colore fusco, pedibus tamen & antennis paulò plus rubentibus, quam corpus reliquum.

CAPUT XI.

De Forficula.

Monf.
Th. Inf.
I. c. 27.

Arnoldi *Forficula*, Latinis recentioribus *Auricularia*, Priscis *Mordella* dicitur. Niphus *Velliculam* appellatâ Vellizando. Gallis *Aureilliez* vel *Perceauraille*, Germanus *Ohrenwurm*. Belgis *Orenvuetel*. Anglis *Earewig*. Hadrianus Junius *Fullo-nem* esse existimat, quum tamen à Scarabæi

forma multum differat. An hæc Græcorum *ὀφιοδάνη*? Sane & ortus ratio, & morsus conspirant; nam & hæc generatur in caulibus herbarum fistulosis (utpotè Pastinacæ sylvestris, Angelicæ, Ferulæ) & in Brassica frequens conspicitur. Boreales Angli obsceno nomine *Tunichballok* nominant, quasi *Scortimordium* vocaveris, vel *ὀφιοδάνη*; nam ubicunque rogasam plicatamque cutem invenerit, vel ore mordendo, vel cauda bifurca stringendo, maximum dolorem excitat, quod semel nobis pueris accidit inquit Pennius.

In duas auriculariæ species incidimus; utraque volucris erat, contra multorum opinionem. Nam si eas in loco alioquo tabulave inclusas, scyrpo huc & illuc repuleris, quod Illustrissimus Knivertus Pennium docuit, expansis continuo alis, quæ sub elytris conduntur, avolat. Sed diligenter cavendum, ne festuca aut scyrpo durius prematur, aut vulneretur; tunc enim si velit maxime, avolare minimè possit. Vulgatiore corpore spadiceo cernitur. Antennæ, pedes, caudaque forficularia, flavescent. Altera (quæ in Angliâ rarior & semel atque iterum duntaxat à nobis visa) vulgatiore major est, corpore nigricantiore, collum, argenteus quidam torques adornat: extrema elytra subpunicum referunt colorem; os forcipatum habet & flavum. In dorso utrinque juxta latera quinque maculæ subflavæ oriuntur, caudæ furca brevis est & nigra, quæ versus caput sublata per aërem irata provolat.

Reperiuntur sæpè in Brassicis & ferulaeis arboribus, ulmique foliorum tuberculis. Ex vermibus in caulibus ortis generantur: pellem quotannis veterem exuunt, quæ spoliata nivæ videntur. Sed cum ætate renascitur pristinoque colore imbuitur. Anglicæ mulieres maximo eas odio habent ob garyophyllati flores depastos, atque exesos, insidiasque struunt hoc modo: extimis areis bacillo in terram defixo ungulas bovinas, suillas, vel veteramenta cava supponunt pannis vel stramine leviter infarcta: quæ dum per noctem (pluviæ vitandæ animo, & tegumenti causa) Forficulæ intraverint, manè veteramentis subito ablatis atque excussis, magnus earum numerus excidit, atque ita pedibus contritæ diem obeunt. Arnoldus eas in oleo communi vel flamulæ coqui consulit: eoque convulsorum arterias, tam temporibus quam carpo inungi, ut febris convulsivæ medela inducatur. *Iosephus Michaelis Halus* Medicus non incelebris, magnum earum numerum colligere solebat, ac in vitro arctissime clauso per balneum in pulverem tenuissimum redigere. Tunc urinæ leporis tantum admiscebant, ut in aurem infundi manè vesperique possit.

Breviur.
I. c. 25.

fit. Arcanum hoc esse in surditate pellenda sæpius protestabatur Pentio. Alii pulverem cum oleo garyophili miscent, atque adhibent ut supra. Gallinago minor (Snite ab Anglis dicitur) & gallinæ, auriculariis vescuntur: maximumque harum omnium numerum in ventriculiscarum reperisse, me sat memini.

CAPUT XII.

De Scorpio, Formica, & Pediculis alatis.

Mouf. Tb. Inf. l. 1. c. 28. Pausan. in Bæot. Æl. H. A. l. 16 c. 42. & 43. Strabo. l. 15. Nicander in Theriaca. **S**corpiones alatos dari, negavit Aristoteles, Apollodorus teste Plinio, Pausanias, Nicander, Ælianus & Strabo asseruere. Sane homo Phryx alatum in Joniam attulit. Psylle eosdem in Italiam importare conati sunt. Latinis *Nepales* quasi nepæ alatæ dici possent. Colore sunt melleo, unde *μελίχλωροι* dicuntur. Flammeos Ælianus facit. Summæ caudæ niger nodus est, duplici præditus aculeo. Septinodem Strabo facit. Alæ locustæ Malaci similes. Magnitudo vulgaris. Reperiuntur in India apud Prasios, in Ægypto, Palimbrotæ, &c. Intra Siculi cœli regionem non vivunt, in Italia sunt innocui. In Joniam alatos supra diximus. Communis his cum impennibus generatio: venenum calidum est. Lacertas, araneos, & omne genus serpentum enecant. Suo vulnere applicati medentur: & si exusti nidor ad alios scorprios pervenerit, ædibus exigit.

Arist. de partib. animal. l. 1. De Formicis alatis, quæ Aristoteli, ut Moufetus vult *ἰππομόρμυκες* & *ἰππῆες*, hæc pauca adjicimus. nempe *νύμφαι* & *σέρφαι* quibusdam appellari: vulgaribus corpore & lacertis esse majores, & inter nigrum furvumque medias: quatuor alas argento perlitas, externas majores & longiores toto

corpore; internas duplo minores habere. Quæ de Indicis vulpibus non minoribus auri indefessis custodibus, & quarum pelles quasi pantherinas se vidisse Onesicritus scribit; & cornua Erythris in æde. Herculis miraculo fuisse, Plinio produntur, mendacia sunt. Plura capite de formicis vide.

Mouf. Tb. c. 28. De *Pediculis alatis* ista habet Moufetus. Agatharchides auctor est, à maris rubri incolis non multum distare Acridophagos, sive locustarum esores, quæ quidem gens staturæ aliis brevioris, aspectu macilens, ac supra modum nigra. sub æquinoctium vernum, quando apud Italos Africi & Zephyri spirant, ex loco quodam incognito, ineffabilis magnarum locustarum multitudo una cum illis ventis ad ipsos provehitur, quæ ab avibus volandi facultate parum, at corpore longè differunt. Ab hoc animalium genere toto tempore nutriuntur, iis salitis atque alio modo paratis vescentes. Venantur autem ipsas fumo ex aëre in terram dejicientes atque hi agilitate quidem & velocitate pedum pollere dicuntur. Sed quum valdè siccum nutrimentum capiant ultra quadragesimum annum vitam minimè producant, imò vitæ sanè miseriorem mortem obeunt. Siquidem appropinquante senectute, eorum corporibus alata quædam pediculorum genera innascuntur, figurâ quidem caninis muscis similium, sed alioquin minorum. Incipiunt à pectore ac ventre, brevique universam faciei cutem depascuntur. Atque horum alii scabiosorum instar afficiuntur, deinde semetipsos graviter dilacerant, tandemque morbo consistente, nec non cum bestiolarum exortu tenuibus effusis humoribus, intolerabiles cruciatus subire miseri coguntur: sicque vel ob succos, vel ob alimentum, vel ob aëris pravitatem intereunt.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

INSECTIS.

LIBER II.

De Insectis terrestribus, pedatis non alatis.

TITULUS I.

De Paucipedibus.

CAPUT I.

De Insectis sex pedum.

ARTICULUS I.

De Formica.



ANTUM DE INSECTIS terrestribus alatis sufficient: sequuntur non alata, eaque vel *Paucipeda*, vel *Multi-peda*. Illa sunt pedum sex, octo, duodecem. *Sepeda* sunt, *Formica*, *Cimex*, *Pediculus*, *Ricinus*, *Pulex*, *Lens*, *Forbicina*, *Talpa*, *Sphondyle*, *Staphylinus*, *Asellus arvensis* & *Anthrenus*.

Incipio à *Formica* stupendæ naturæ insecto, & ad quod hominum genus obstupescat & confundatur. A ferendis farris micis Latinis dictas, Isidorus opinatur. Græcis *μύρμηξ* est, *μύρμηξ*, & Doribus *μύρμηξ*, quibus etiam *μυρμηδῶνας*, *μύρμηκας* vocari, Hesychius scribit.

Notissimum animalculum describere, superfluum est. Promuscidem ore contentam gerunt. Plinius ipsis linguam tribuit; Wottonus dentes; addit, parte posteriore aculeum gerere. Nulli in capite propter parvitatem oculi: super quædam additamenta quæceu duæ pili de capite egrediuntur, habentur. Alas senes, nec diu supervicturæ emittunt.

In quibus degant locis, nemo est, qui ignoret. In acervis, quos congersere condi, notum omnibus.

Frugum granis vescuntur, unde *frugilegæ*, & *agmina granifera* dicuntur. Cupressi & papaveris semina, expetere, apud Plinium & Plautum habemus. Fructus exsugunt, nec à mortuis anguibus abstinent. Cadaveribus, humanis fortè parcere, Ælianus prodidit. Aliis frugibus, si menstruo sanguine polluantur.

Hyberno quoque tempore coire, & ferenis austrinisque diebus nasci, Aristoteles prodidit: vermiculum ovis similem, veregignere, Plinius. Oblonga illa, & columnatæ figuræ, in locis calidis & muscidis, extra corpus, incrementum accipiunt, si Alberto credimus: vermes ipsi albi, & paniculis involuti erumpunt. In America ex mortui parentis corpore prodire dicuntur: miroque modo vivunt, donec ex subterraneis specubus alati evolent.

De Ingenio, ita eleganter Plinius: *siquis comparet onera corporibus earum, fateatur nullis portione vires esse majores. Gerunt ea morsu Majora aversa postremis pedibus molliuntur, humeris obnixa. Et iis Reip. ratio, memoria, cura. Semina arrosa condunt, ne rursus in fruges exeant è terra. Majora ad introitum dividunt. Madefacta imbre, proferunt atque siccant. Operantur & noctu, plena Luna. Eadem interlunio cessant. Iam in opere qui labor? Et quoniam ex diverso convehunt, altera alterius ignara, certi dies, ad recognitionem mutuam, nundinis dantur. Quæ tunc earum concursatio? quàm diligens cum obviis quædam collocutio atque percontatio? Silices itinere eorum attritas videmus, & in opere semitam factam, ne quis debitet, qualibet in re, quid possit, quantulacunque assiduitas. Sepeliuntur inter se viventium sole, præter hominem, defunctasque in granorum folliculis efferunt. Hieronymus, alias herbarum quædam semina forcipe oris traxisse: alias humum de foveis egressisse, & aquarum meatus aggeribus exclusisse, vidit. Quædam venturæ hyemis memores, ne madefacta humus, in herbam horrea verteret, illata semina præcidebant: quodque magis mirum est, in tanto agmine, non obstabat egrediens intranti: quin potius si quam vidissent sub fasce, & onere concidisse; suppositis humeris adjuvabant. Ælianus, ad pabulandum profectas, natu grandiores agmen ducere, segetes ascendere, spicas abscissas dejicere dicit. Natu minores sub stipulâ stant, spicas distrahunt, & grana vaginis inclusa explicant. Interlunium sentire*

Generatio.
Arist. H.
A. l. 5.
c. 9.
Plin. H.
N. l. 13.
c. 30.

Plin. H. N.
l. 11. c. 30.
Natura,
& Ingenium.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 38.

Hieron. in
vita
Malchi.

Ælia. H.
A. l. 2. c.
25. l. 4.
c. 43. l. 6.
c. 43.

Plin. H.
N. l. 2.
c. 41.

apud Plinium habemus. Alvi onus, quod urinæ simile, in ædibus non ponere; ubi per cænium factum itinere, maculosæ redeunt, in ipso ædium vestibulo, ad asperum se corticem elimare; recentiora ova in ulnis gestare, ubi ad amplitudinem eam devenere, ut laborem remorari possent, alto sinu deponere, ab aliis observatum est. Exclusis, fœtum ad loborem instruunt: denegatur tardioribus cibis. Hinc suetum, ut robustiores, unguiculis, ore, rostellis, terram egerant, egestam accumularent, cumulatam stipulis inspergant: sapientiores ædificent; minores in cuniculis versentur; peritiores, mæandros, labyrinthos, concamerataque cubilia efformant. Languens otio, ædibus ejicitur; pro foribusque ductum, facta omnium ordinum corona, capite mulctant. Intus Veneri operam dare, modestiæ debetur. Additum & prælagas esse. Scilicet, exposito ad siccandum à formicis frumento, nunquam imber cecidisse visus est. Democritus, cum cœlo serenò id facere observasset, ut messem sub tecta referret, fratrem monuit; subsecutumque diluvium. Theophrastus pluvias portendere putat, vel, cum densioribus & in se invicem per viarum angustias concurrentibus agminibus, prædam convehunt: vel cum ova ex depressione & cavo loco, in eminentiorem deportant. Quæ de Nerone apud Suetonium, & Cimone apud Plutarchum dicuntur, sublimiora sunt. Piaculum esset, domiciliorum, in quibus extruendis singulare artificium adhibent, oblivisci. Tortuosissima illa, ut vel invia sint, vel aditum saltem difficilia. Terra proforaminibus aggeritur, tanquam muri & propugnacula, ne descendente pluvia, alluvione intereant. Triplex iisdem regio. Mares & fœminæ in androne habitant: Panmyrmecium verè dixeris: in Gynæceo fœminæ pariunt: tertium granorum acervis destinatur. Plutarchus, in una, vitam degere & comedere; in altera, alimenta tanquam in granario recondere; in tertia, mortuos sepelire, scripsit. Radices & extremæ monticuli oræ Coemiterio assignantur. Domicilium sibi visum Majolus descripsit, Aldrovandus unius & alterius, quæ in putrida quercu, & semiputrido trunco observata sunt, iconem apposuit. Apparuit, inquit ille, in argillosa humo urbs quædam quadrangularis, longa pedes fere quatuor, lata ultra pedem; in qua per vias velut ad negocia ultro citroque curitare, velut cives, ipsæ formicæ visebantur. Admiranda erat angulorum, laterumque directæ delineatio, quam artificum amussi, circinoque fabricatam putasses, quod æqualis semper dimensio longitudinis, latitudinisque servaretur. Urbis longitudinem media servabat via quædam directissima, profunditate, la-

titudineque digitali: quem rursus per transversum æqualibus inter se spaciis tres aliæ viæ eadem digitali profunditate, & latitudine directissimè interfecabant, ut ita tria compita, foraque spectarentur.

In extremis viarum angulis, velut angustioribus spectabamus collecta in acervos servari ova, unde Formicarum proles gignitur. Altera urbis parte antra vidimus frumento ita, opleta, ut in vias ipsas redundaret. Mira fuit omnium viarum mundities, nihil in illis lapillorum, nihil pulveris, nihil festucarum, nihil humoris, ut deprehendas urbem illam à suis civibus ita curatam, ut prolis eximium studium, annonæ, & structurarum ornatus ubique spectaretur: qui omnes illi cives communi studio ad Reipubl. beneficia incumbentes, dum alii domi de rebus consulunt, alii foris res agunt, summa pace, concordiaque curandam Rempubl. nos docebant; studuisse quoque iidem cives visi sunt omnium incolarum incolumitati. Erat enim in urbis longitudinis medio unica porta Zephyro objecta, quod ab Aquilone, Euro, atque Austro, immunem urbem sua Philosophia oportere esse didicissent.

Simile domicilium in putrida quercu inventum, rusticus ad Aldrovandum attulit, quod secundo loco in iconè expressum est. Admirandum quoque in quod Cleanthes incidit spectaculum. Venisse formicas de suo cavo ad aliud formicarum examen, formicam portantes mortuam, verba sunt interpretis Plutarchi, *ascendisse alias formicas, tanquam ad colloquium, rursusque descendisse. Id bis terve factum. Tandem has, sursum extulisse vermem, tanquam redemptionis precium promortua. Hoc illas accepto & reddito formicæ cadavere discessisse.*

Elephantos atque urfos læsæ ab illis lædunt. Serpentes & Dracones in rabiem agunt, seu quod laborantibus viam obstruant, seu quod cavernis venenatum halitum affluent. Cicadas gliresque summo prosequuntur odio: illas quia cantando hyemem conterunt; hos, quia dormiendo eandem perdunt. Pugnam & inter se inire, Æneas Sylvius, post Pontifex observavit. In agro Bononiensi, inquit ille, pyrum aridam, pastus gratiâ ex minoribus formicis famelicis complures ascendunt, supervenere majores non parvo numero, quæ illas erepto faucibus bolo partim occiderant, partim dejecerant. Dejectæ ad suam revertentes Myrmeciam sive acropolim, in itinere cum obviis quasi habito colloquio injurias memorant, omnemque sociorum vim & numerum castris educunt. Post duas ferè horas tot Minorum Centuriæ, tantæ acies exortæ sunt; ut totus ager nigro agmine atratus videretur, accessere stipatæ omnes; & arboris utrinque stipitem circumdantes, paulatim

Majolus
Dier. c. 1
me. coll. 7

Plut. de
seleert.
anim.

Antipathia.

Sylv. l. de
Europa c.
40.
Mouf. Th.
Inf. 2. c.
1. p. 242.

Ælia. H.
A. l. 6.
c. 43.

Aldrov.
H. Insect.
4. c. 1. p.
509. adit.
Bonon.

latim ascendere cœperunt. Majores, ubi hostes adesse animadverterent, conglobatæ supernè pugnam expectaverunt, postquam simul comisso prælio acies conveniant, Majores è minoribus permultas morfu rabido interemerunt, omnesque primo impetu ascendentes miserrimâ strage confectas disjecerunt, ut mortuarum cumulus ad pyri radices non parvus in terrâ succreverit. Reliqua minorum pars mediaque acies, non animos propterea ponere, aut locò cedere voluerunt; sed concenturiatis spiritibus tentant, pertinaciusque instantes, atque aciem acie prementes majori quam antea numero arborem conscenderunt, hostesque à tergo, à latere, & à fronte undique pungentes, manus herbamque dare vi coegerunt. Magnæ majoribus vires ad victoriam valuisse, nisi minorum prævaluisse numerus, unamque viginti simul essent adortæ. Hæc acta sub Eugenio IV. Pontificis cathedram occupante, spectante Nicolao Pistoriense juris consultissimo viro, omnemque pugnam bona & sincera fide narrante. Tale quid Olaus Magnus recenset Upsaliæ & Holmiæ contigisse, antequam Barbarus, & immanis ille Tyrannus Cristiernus Secundus à Sueciæ incolis è Gothorum Suecorumque regionibus fuit expulsus. Quo in prælio illud non omittendum. Minores post adeptam victoriam suorum cadavera inhumasse, relictis hostibus, & ad corvos, porosque expositis. Martis item in aream Campanile elegerant altissimum, ac si Tyrannorum prodigium ejusque Satellites, ad sui fati *ἀποκρίναι* poenæque imminenti contemplationem, clarâ voce vocarent atq; traherent.

Ufus.

In Indiis in *cibis* fumi, & quidem pipere conditas, inferius dicemus. In *Medicamentis* maximo sunt usui. Aqua ex iis destillata vomitum excitat, & febres solvit apud Gesnerum. Omnem intermittentem febrem curabis, si æger omnium unguium præsegmina pro formicarum foribus projici curet, & primam ea trahentem apprehenderit, colloque subnexam gestaverit, si prodentibus fides est. Ovo trita & auribus imposita, quemvis obtusum auditum sanant, si Marcello credimus. Eadem inter psilothra numerat Arnoldus, & ad phagædænas commendat. Quidam conterunt, & aquosam substantiam expressam instillant. Balneo myrmecino calculus pel-litur. Oleo, & aqua destillata virilitas promovetur. Gesnerus, ollam melle intus obductam, & ad medias formicis plenam accipit, pyrethro, nuce moschata, cardamomo, pipere longo, & butyro additis. In fimo macerata destillantur. Aquæ aliquid jejuno exhibetur. Brunfelsius quatuor in potu sumptas, omnem coeundi potentiam auferre scripsit. Cum sale communi, ovis

& axungia, panno interposito applicatas, Ischiadicam tollere idem author est: Impetigini cum modico sale appositas, præ-senti remedio esse, Marcellus; pruritui & scabiei è papulis, Serenus: flatus potenter dissipare, Albertus: clavos & tumores auferre Nonnus. Uris in nausea ex plenitudine, & postquam mandragoræ poma degustavere mederi, ex Plutarcho; supercilia cum muscis tritas denigrare; tritas, adjecto sale, psoras, lepras, & lentigines curare, quinque contra phalangiorum morfus auxiliari, ex Plinio habemus. Idem, terram à formicis egestam, aliquos strumis illinere scribit.

Plut. de solert. animal.

Pli. H.N. l. 30. c. 3.

De Ufu dixi: meminere & *damnorum* authores. Venenum morfu suo spargere, & pustulas excitare, Albertus prodidit. Apud Cumanenses, capita, inter venena quibus sagittas inficiunt, sumuntur. Ova pota, flatulentiam & ventris tormina excitant. Agris, hortis, horreis, areis, arboribus, vitibus, frugibus, fructibus, cibis insidiari, notius est quàm ut demonstrari debeat. *Remedia* passim apud authores occurrunt. Rubrica & pice liquida ab arboribus abiguntur, si caudices perunxeris. Sunt qui caudicem succo Cyrenaico, ex aceto soluto inungunt, vel hedera amiciunt. Non exedent vitem, si bitumine cum oleo cocto, imas vites tetigeris. Ex latibulis pellentur, si vel tithymali ex aqua decocto, vel cochlearum testis cum styrace ustis, vel origani sulfurisq; pulvisculo, ea consperseris. Sabinus Tyro, apud Plinium, heliotropio necari putat.

Damna & Remedia.

Arist. H. A. lib. 4. cap. 8. Plin. H. N. lib. 19. cap. 10. Differe-
rentiæ.

Differentiæ formicarum, à *constitutione corporis, loco, quantitate, colore & effectis sumuntur. Illam si spectes, sunt quædam alatæ, quædam semiformicæ. Alatæ, de quibus supra, apud nos senes sunt & inutiles & ejusdem generis, nymphæ dictæ. In India Orientali laccam conficiunt, & in Brasilia, ut post decimus, rubri sunt coloris. Habentur & in aquilone alatæ. Semiformicæ quæ & semivermes, in Occidentali India invenies, Comixen indigenis dictas. Alba velut cauda prorepunt, & ligna erodendo penetrant. Arbores vel parietes scanfuræ, opercula terrea, digitum crassâ secum ferunt, in iisque ad quatuor & ultra palmos productis, nidulantur: Ex Loco sunt Indicæ, Brasilienses, Philippinæ, & Aquilonares. De Indicis ita Plinius. Indicæ formicæ cornua, Erythris in æde Herculis fixa, miraculo fuere. Aurum ex cavernis egerunt terræ, in regione septentrionalium Indorum, qui Dardæ vocantur. Ipsi color felium, magnitudo Egypti luporum: Erutum hoc ab iis tempore hyberno, Indi furantur æstivo fervore, conditis propter vaporem in cuniculos formicis: quæ tamen odore sollicitatæ provolant, crebroque lacerant, quamvis prævelocibus camelis fugientes. Tanta pernicitas feri-*

Ovid. In-
dia Occid.
cap. 52.

Plin. H. N. l. 11. cap. 31.

Strabo
Geogr. l.
15.

Ælian.H.
A. l. 3. c.
4. & l.
16. c. 15.

Cardan.de
subr. l. 9.

Dale-
champ. H.
P. l. 18.
c. 1.

Nieremb.
Exot. l.
13. c. 13.
p. 28.

Oried. in
bistor. no-
vi orbis.

feritasque est cum amore auri. Nearchus earum pellem, pardi pelli similem sibi visam scribit. Solinus, pedes illis leoninos tribuit. Ælianus Campylin fluvium nunquam transire author est: domunculas, sinuosos foraminibus obliqua, in excelsis locis construere, ut fluvio rem alluviones effugiant, addit. Aggeres aggesti confirmantur magis. Primum enim ex matutino rore pulveri admixto, tunicâ tenui sed validâ vestiuntur. inferiore parte, de fluviali coeno, cortex muscosus ad nascens, aggerem stringit. Fides sit penes authores. Strabo talia prodentes, ridet; Arrianus rejicit; moderni navigatores tacent, non omitturi, si veritati responderet relatio. Taceo ergo & Rhasis formicam, publicè in regno Persidis nutritam, quæ in dies singulos libram carnis comederet: taceo & illas, quæ apud hydrophagos, catuli magnitudinè reperiri dicuntur. *Laccam* in Orientali India conficere certissimum. In regnò Pegu cum terra pluvia, vel aqua justo plus irrigatur, ligna tenuia ab incolis disposita confcendunt. Ex illis certa gummi species defluit, quod illæ exsugunt & circa ramos, ut Apes mel ac ceram diffundunt. Stercus favaginemve ipsarum esse, Dalechampio visum. A costa arborem nominat, Lusitanis, Mancanos de la India dictam, quæ alatis perpetuò onusta æstate videtur. *Bra-liensis*; velut forfices in ore habent, quibus fata & fruges abscindunt. Morsu earum arescunt omnia. In sinu Salvatoris inveniuntur. De rubris in sequentibus agetur. Apud eosdem, si non alibi, aliæ agros depopulantur, aliæ eosdem, vastatores pellendo conservant. De *Philippinis* ita Nierembergius. Reperiuntur in Philippicis, duo formicarum genera, *sulum* dicta, quarum aliæ sunt sex digitos longæ, ac crassæ digitum latum, coloris nigri nitidique, rictu dimidii digiti prædura maxilla, & eodem quo corpus colore, cui tres hærent dentes tenues & firmi, vivuntque in montium arboribus. Aliæ sunt alatis *formicis similes*, & aliquando majores. Vivunt in campestribus, atque adversus hyemis injurias congerunt arenæ acervos incredibilis magnitudinis, intra quos favos construunt, ubi & tutæ & munitissimæ degunt.

Aquilonarium una species est, quæ ex frondibus pini & abietis in edito aliquo in campis loco, nidos ædificat. Ursos insidiantes adeò solerter invadit, ut ejiciat. Si vel unica pilis immersa in latebras delata fuerit, ita foetificat, ut & inde urfi pellantur.

A quantitate, aliæ sunt magnæ, quales Indicæ, aliæ, minime quales in novo orbe reperiuntur. Domum modij magnitudinè sibi exstruunt, lutum adeò durefcit, ut glutinis instar appareat, nec gladio penetrari possit. Ad ingressum ostium latens

constituitur. Apud Brachmanas palmatis sunt longitudinis: in nova Hispania, scarabæos æquant. Majores Aristoteles *in pummas* nominat; Gaza formicas equites vertit, Plinius *Herculanus*. Ille in Sicilia inveniri, Abensina in Lycia negat. Ad minores & illæ spectant, in novo orbe, quæ domos luteas, sphæricas, capitis magnitudine, parant, quas per prælongum accessum, quasi exiguam fistulam, ingrediuntur, ibidemque horrea conficiunt. *Acolore* sunt *alba*, vel *rubra*. Illas in regno Nigritarum, Senegæ, Pephno parva insula, vel potius Pheneo Laconicæ invenies. Humiles in Senega casas exstruunt; & absque calce ferruminant; clibanos vel ruscula in ordine dices. Aliquando enim centum & centum quinquaginta se subsequuntur. De *albis* etiam ita Nierembergius: Circa montem Leænæ, album genus formicarum est, idolis inclusarum. Vocant idola quædam *Chimas*, quæ pyramidis artificiosæ formam referunt, in quibus formicæ albæ, quæ foras non prodeant, sed internis cellulis distinctæ, ut quo vivant cibo incertum sit reptantes cursitantesque apparent. Has Chinas formidant barbari. Quocitres mancipium coëmunt, ante pyramidi huic vinum aliaque offerunt, mancipium sistunt, eique quodammodo devotent, orantes ut ipsum, si fugam ineat, serpentes, lacertæ, tigridesque dilacerent. Quas servi minas adeò exhorrescunt, ut etsi ab heris acerrimè vapulent, inire fugam minimè ausint.

Rubra in provincia Magni, quibus cum pipere vescuntur, & Brasiliâ visuntur. Magnæ hæ, & dum conteruntur, cedri odorem spirant. De iis ita Aldrovandus: Verno tempore, hoc est, mense Septembri magnum sensim foetuum agmen educunt idque eo potissimum die, qui pluviam subsequitur, atque tonitrua, cum videlicet Solis æstus viget maxime. Parentes præcedunt, ducesque sunt liberis, ore aperto huc, illucque cursitantes, viasque undique complentes, morsus multo quam aliis temporibus acerbiores inducunt, ad sanguinis effusionem usque. Secuuntur subinde liberi magnitudine prævalentes, volatuque novas sibi habitationes quæruunt, tanto sæpè agmine, ut velut densissimam in aëre nubem efficiant. Ubi quiescunt terram eo in loco effodiunt, ac quæque sibi habitacula construit. Vita earum brevis est, ut ex singularum ventre ingens foetuum numerus erumpit. Cum latibula sua egrediuntur, accurrunt Indi, accurrunt & volucres coeli. Indi autem magno cum desiderio tempus hoc expectant, Formicas istas, ceu novos fructus in cibi usum colligentes. Accedunt autem ad cavernarum ingressus, eas aquæ ductibus circumsepiunt, adversus mordaces, & graviter morsu vulnerantes patentes

Scal. Ex.
96. 7.

Scalig.
Exerc.
367. Pau-
san. in
Lacon.

Nieremb.
H. E. 13.
c. 13.

Aldrov.
H. Inf. 4.
c. 1. p.
516.

tes formicas sese defendentes. No vas recentisque eas formicas, in multos dies servant, ac igne torrentes devorant. Quam modo suavem, delicatumque cibum præbeant, testantur Jesuitæ, qui & ipsi illis vescuntur. Ab *Effectu Venenata* quædam dicuntur. Tales Telephus Cretensis *Laërtas* nuncupat. In Brasilia nidum, hirundinum more in arboribus faciunt. In isthmo del Sur & Nort, tam duras casas erigunt, vix securibus rumpi possint. Indi iis sagittas inficiunt. Ictis, necessariò moriendum est.

ARTICULUS II.

De Cimice.

Cimici nomen Latini à *κίμυ* cubo, quod in cubilibus nascatur, imposuisse videntur: nisi fortè à *cama*, lecto brevi, & circa terram deducere volueris, Græci *κίμυ* vocant, à cori herba, quam Latini Cimicariam dicunt. Appellatur & *κίμυ*, & à recentioribus *κίμυ*.

Fastidiendum natura animal est, ut Plinius loquitur, & simile ferè ricino. Corpore est rhomboide, colore nigro, parum rubente: pedibus tribus, & juxta collum brevibus: dorso & ventre incisuris notato: Cuti apprimè tenera, ut vel levissimo contactu media crepet, foetoremque abominandum expiret.

Reperiuntur in lectis, abiegnis inprimis, & quorum linteamina & stramina rarò renovantur; parietibus lectis proximis, & alabaistro obductis; coturnicum caveis; libris chartaceis.

In insula S. Thomæ non inveniri, prodidere quidam. De die in parietum rimis stabulantur. Ex cujusdam mulieris aperta calvaria, magna Cimicum multitudo prorupit. Hominum sanguine, quem sugunt vitant: post morsum vestigia purpurascencia cum dolore pruriginoso tumida relinquuntur. Vicitare & aliis vel exinde colligas, quod in iis etiam lectis inveniantur, quos nemo sequatur. Ex humore per summa corporum animalium exsudante, generari apud Aristotelem habemus. Oriri & ex humoribus aliis circa lectos putrescentibus, & è lignis paulatim exsudantibus nullum dubium. Vidit Aldrovandus peregrinantium vel rus euntium lectos subinde à Cimicibus infestatos, cum nulli præsentibus apparuerint. Scaliger etiam inter chartaceos libros, oriri innuit. In coturnicum caveis, maximè brevi tempore multiplicantur. Propagari & per coitum Pennius in agro Aurelianensi animadvertit. In dissecta vagina adultos & juniores, cum magno ovorum dilutius albicantium numero comperit. Cardanus Carthusianos cum iis non conflictari, quod carnibus abstinerent, ridiculè credidit. Tolo sati lectuli,

inquit Scaliger, carnes non esitant, & nihilominus eâ peste sunt infames. Vulgò jactatum est è contritis alios oriri. Pestem multiplicatos prælagire, apud Alexandrum Benedictum habetur.

Arcentur ad ingressu, cucumeris anguini aquâ alicubi reposita, felle bubulo acetum permixto & lecto inuncto: crinibus equi in ostio cubiculi suspensis: nigellæ & cicutæ fumo. *Fugant eos*, Canabis in lecto posita: stercus tauri si eo suffitus fiat: Genistæ communis filiquæ semine prægnantes, si sub pulvinari ponantur: odor rubrarum pellium, quas, *Rousschleder* Germani vocant: pix liquida, & cucumeris sylvestris succus cubilibus inspersus. Cornu cervinum vel leporis pedes circa lectum pendentes, faeces butyri coctæ: obolus lecto substratus, &c. *Necantur*, tinctura sulphuris: foliis hederæ cum decem hirudinibus tritis; lupini madentis imbre: foliis utriusque filicis fumo Chalcanthi & æruginis: calce cum lixivio fervente mixta staphidiagria, hydrargiro, sulfure, & oleo laurino, additis; illis denique, quæ apud Aldrovandum occurrunt.

Conferunt, in serpentum moribus, si cum testudinis sanguine fumantur: contra epilepsiam ab utero, si suffiantur ægræ in Tertianis si cum allio & mero tribus diebus vel ovo fumantur. Gesnerus fidem facit: in quartanis, si cavis fabarum inclusi, ante febrium significationes septeni devorentur: in urinæ suppressione, si fistulæ urinariæ indantur. Plinius in aspidum morfu commendat: Vegetius in stranguria equorum si unus in aurem, alter in meatum penis imponatur: Galenus in urinæ incontinentia: in Calculo Valerandus: in eodem cineres per clysterem injectos, recentiores & quidem mirè: in colica Gesnerus quatuor ex vino manè bibitos, per tot dies donec duodecem devorati fuerint. Sic Functium urbis Tigurinæ nepotem liberatum, & cæc.

Alii sunt *Domestici*, de quibus hic: alii sylvestres, de quibus inter alata egimus.

Ad eos pertinent *Hocitexca*, & *vermis cornutus*. *Hocitexca* denarium æquat magnitudine, teterrimo odore, & haustu sanguinis infensa: morsu excitat rubeas eruptiones. *Vermis cornutus* apud Mechoacanenses *ytzuaqua* & *sipantipe* dictus. Duobus corniculis rubris iter prætentat, nigro fuscoque variegatus.

ARTICULUS III.

De Pediculo, & Syronibus.

Pediculo à pedibus nomen est. Plinio dicitur *pedunculus*, aliis præcis *Pedes*, & *pes*; & quidem in fœminino

Scalig. l. c.

Fuga.

Varro R. l. I. c. 3.

Plin. H. N. l. 27. c. 9.

Ufus.

Quint. Seren. Samonic. in Carmin.

Plin. H. N. l. 18. c. 4.

Galen. Eupor. 5.

Moufet. l. c.

Differentiæ.

Nierenb. 13. c. 15.

Nierenb. 15. c. 16.

Nomen. Aldrov. H. Inf. 5. c. 4.

M ge-

genere; nonnullis *sexcupes*, *vermis*, *serpens*, &c. A Græcis vocatur comuniter, *σθαρ*, modernis *σθρα*; Achæis *νίρι* & *νίρι*; aliis *κάρν*, *ἐγκάρν*, *σθρα*, *σθρα*, *σθρα*, *σθρα*, &c. *πολύπεδες*, & *λεκία*, species sunt.

De *Descriptione* & *Loco*, non est quod simus solliciti.

Genera-
tio. Arist. H.
A. l. 5.
c. 31.
Theophr.
de Caus.
Plat. l. 2.
c. 22.

Ex carne oriri, & futuris, pustulas quassdam emergere; ex punctis, pediculos fundi, Aristoteles putavit; ex corrupto sanguine Theophrastus: ex materia putri calida & humida, quæ in cute redundat, Mercurialis.

Sanguinem inprimis pituitosum hic locum habere dicerem, cum biliosus & melancholicus, interimat eosdem, & felle illito intereant. Locum si spectes, inter cutem & carnem prodire visus est dixisse Galenus: in toto gigni corpore, cum ubique porosa cutis sit, nemo negaverit.

Dicendum tamen, in capite magis, & ad axillarum & inguinum emunctoria, erumpere. Copia ibi excrementorum colligitur, & pilis obiectæ sordes, difflatione negata promptius longè putrescunt. Nec collum, licet detectum & glabrum eximendum est. Cum enim & illic emunctorium, cum amplissimis quæ humorem ad caput deferunt vasis, frequentior & copiosior illic sudor excitatur. De efficiente tot sunt sententiæ, quod de spontaneo viventium ortu occurrunt. Principium ibi occultum esse necesse est, animatumque illud, sed quod ab alio in actum deduci

Plin. H. N.
l. 20. c. 2.
Gal. l. 2.
de al. fac.

Plutarch.
Symp. 2.
q. 49.
Moufet.
Theatri
Insect. l.
2. c. 22.
Oviedus
c. 82.

oportebit, ut alibi dicemus. Occasionem ortus nonnulla præbere, experientia docuit. De Ocimi cibo id apud Plinium legimus; de castaneis & ficubus, apud Galenum. Idem de raphano, xyloaloë suffita, apio hortensi, dactylis, &c. apud Diodor. in Empiricis traduntur. Lanam ovis à lupo admorsæ, si vestis ex ea sudore madeat, eos procreare, apud Aristotelem & Plutarchum habetur: imò pannos equino adipe illitos idem efficere, apud Moufetum. Accedit complexio, regio & cultus. In India Occidentali Christianis ne in capite quidem innasceri, prodidit Oviedus; incolis ubique. In insula S. Thomæ, nigri pediculis scatent, albi ab iisdem non attinguntur, si Vespucio credimus. Iter maris Indi qui ingredi solent, pediculos, ubi Azores insulas à tergo reliquere, confestim rabescere ajunt: subito oriri ubi eas reviserint. Oviedus de tractu æquinoctialis lineæ id sumit. In tota Hibernia ob immunditiem diffuere dicuntur, nihil de ergastulis dicam.

Morbus
pedicu-
laris.

Pedicularis hinc aliquando morbus, quo haud paucos mortuos, Historicis proditum: illos inprimis, qui vel sævitie famam quærere, vel divinitatem aucupari volebant. De Antiocho Epiphane in Maccabæorum libris legimus: de Hero-

de Ascalonita, apud Josephum: de Hero-
de Antipa in Actis Apostolorum: de Pheretima Cyrenæorum regina, postquam Barcæos ob interfectum filium crudelissimè ultra esset, apud Herodotum. Eodem morbo periisse traduntur, Pherecides Syrus Pythagoræ præceptor; Cassander Antipatri Fil. qui Alexandri matrem & filios interfecit; Sylæ, quem Plinius, erodente seipso & supplicia sibi gignente, periisse scribit: Vidisse se sævo ab agmine vinci Sammonicus. Idem de Euno servo in Sicilia, Galerio; Maximino, Speusippo Eurymedontis filio, Juliano Juliani apostatæ avunculo, qui Antiochiæ sacram mentem perminxerat, & aliis proditum est.

Remedia contra eos plurima apud authores invenies. Dioscoridi allium cum origano decoctum, vel coriandrum cum eodem tritum probatur. Plinio Staphidis agricæ semina corticibus abjectis trita: sinapi, allium cum aceto & nitro, oleum raphaninum, extra: senecta anguium trita myricæ semen, aqua ex raphani foliis, &c. intra laudantur. Oribasius, ad helxines succum diu infricatum confugit: ad berberis folia Rhafis: ad argentum vivum oleo rosaceo, nec malè, Abensina. Fallopius ceratum ex oleo, argento liquido & cera componit, eoque corpus inungit. Nonnulli statim interim putant, si cingulum ex lana eodem illitum, nudo ventri circumligetur. Idem linimenti, quod ex pomi cocti medulla cum argento vivo componitur, author est. Quidam apud Moufetum Nosocomii præfectus, virgis betuleis novapelle ægros vestiebat, quæ vibicibus picta, pediculos postea non admisit. Plura apud Aldrovandum & Moufetum vide.

Cumani, si navigatoribus credendum, & crudis & coctis vescuntur, quod & Phtrophagis olim suetum. Ictericis, si duodecim contusos ex vino vel cum butyro exhibebis, certo certius subveniunt. Quidam in dysuria vivos & grandes coli immitunt. Si ex diuturno morbo decumbentibus, in capite nascantur, solutionem morbi indicant.

Differentiæ à subjectis sumuntur. Sunt enim alii *Hominum*, alii *Erutorum*, quibus & qui in plantis Moufetus adjungit. *Homines* qui infestant, vel sunt *Manfueti*, vel feri, vel *Syrones* & minimi. *Manfueti* inter digitos leviter fricati quadranguli videntur, & pulicibus paulo duriores. in capite nati, majores sunt, nigriores, quod succus ibi pinguior, longiores & velociores; in reliquo corpore magis obesuli, ventriosi, tardi, obscure albidi, & nigricantibus liris insigniti. Aldrovandus oblongiores cæteris, in postica parte crassiores, versus caput in acutum desinentes dixit. Gignuntur & in visticibus laneis, leucophæis inprimis, Pueris magis, viris minus in capite

Macc. l. 2.
c. 1.
Joseph.
Antiq. l.
18. c. 1.
Herod. l.
4.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 13.

Remedia
contra
morbum.

Ufus.

Differentiæ.
Arist. H.
A. l. 5. c.
31.

capite oriuntur : nec malè tum illud valer. *Feros* alii *pediculos inguinales*, *Ciccus*, *ricinos humanos*, & *vulturinos pediculos* vocant. Italis *Piatole* & *Piatones*, aliis *Platula* & *Platula* dicuntur. Palpebras, pubem, inguina & axillas occupant. Compresiore sunt corpore, acutius rostro, quo tam alte cutem penetrant, ut vix cum capitis iactura avelli possint. Rarò vagantur, sed loco quem sibi excavavere affiguntur. Duriores mansuetis Aristoteles dixit. Quia minus turgiduli, aridiorem & quasi semiassatam materiam fortiti videntur. In Synonimiis, *Motes* & *Immotes* dicuntur. Palpebras sæpè ita infestant, ut oculis exulceratis, visus aciem obtundant. Evelli primò diligenter debent: mox sapone nigro acerrimo locus optimè inungi, & si corpus fuerit calidius, argento vivo, pomi dulcis pulpa excepto. Lixivium senæ, vini facem, succum genistæ, magnificiunt Medici: Varignana, decoctum ex staphidis agriæ unc. ij. vini phialis iij. setarum porcinar. unc. ij. Hydrarg. purgati unc. j. parat. *Syrones* antiquitati ignotos, Thomæ à Veiga opinio; ἀκροδιδόν Aristotelis esse, Moufeti. Videntur ἀπὸ τοῦ οὐροῦ ἐκπεσεῖν dici, quia tractim sub cute repunt. Latini *Pedicellos*, Taurini *Sciros*, Vascones *Brigantes*, Itali *Cirones* vocant. Langius inter pediculos refert, Moufetus non item. Nulla illis expressa forma præterquam globi: vix oculis capitur magnitudo tam pusilla; ut unum ex Epicuri atomis diceret. Colore sunt albicante, capite excepto: propius intuenti nigricant, vel parum ex nigro rubent. Ita sub manuum, crurum & pedum cute habitant, ut actis, quamvis pedibus destituantur, cuniculis, & excitatis aqua plenis, penes quas habitant pustulis, pruritus maximum ingenerent. Acu extracti, movent se, si calore Solis adjuventur. Ungue pressi, haud sine sono crepant, aqueumque virus reddunt. Intra oculos, & toto corpore generari, certum. Illud, le Jeune Chirurgus prodidit, apud Moufetum: hoc in nobili quadam Angla sexagenaria accidit. Interdiu & noctu, labiis, gingivis, plantis pedum, capite, naso, aliisque partibus lancinata, tandem carne depasta occubuit. Major succedebat soboles, quo diligentius acubus ad stantium effodiebantur. Maximum & præsentissimum eorum venenum, acetum falsum, & vini sublimati portio. Abenzoar corpus pulma melonum fricat, vel succo foliorum Persici. Plura in Moufeto vide. Huc *Tineæ* pertinent, quas Græci *τριχοβράτες*, *τριχοπράκτες*, *σίτες*, *τριχοβόρες*, vocant. Nascuntur sæpe in capite, & pilorum radices exedunt. Succo limonium cum aqua vitæ & sale usto mistis, & inunctis, depelluntur. Alii, panis filiginei calidi micas sæpius alligatas com-

mendant. Fortè nec semen in abiete summa crescens; in cineres redactum & aspersum oberit. Oviedus *Nigra* bestiola apud Indos Occidentales meminit: de qua sub pulice. Nec est quod *Dermestis* insecti obli- vescamur, quamvis ad hominem non pertineat. Pelles id consumit, & pro earum ratione colorem mutat. Pulicis est magnitudine, pedum sex, & forcipati rostri.

Bruta quod concernit, *Leo* adeò à pediculis in palpebris infestatur, aut aliquando in rabiem conjiciatur. *Equi* rubentes capitibus reliquo corpore albicantes habent. *Bovum* & *vitulorum*, nigri sunt. *Porcorum*, qui *Uris* ab urendo, adeò grandes & duri, ut vix digitis interimantur. *Canum* sunt parvi, lentiginosi, capite albicante, reliquo corpore excæruleo livente vel nigricante. *Ovium* minuti valdè, quibus capita rubent, corpora candicant. *Cervorum*, capiti concolores. *Capror.* ab ovillis parum differunt. *Avium* exigui sunt. In capite potissimum atque alis oriri, Columella testatur. De Phasianis, perdicibus, coturnicibus Gallinis, &c. taceo. *Asino* parcent, quod tardo gradu incedens, nullo sudore perfluat. *Salmones* macilentiores sub brachiis pediculis scatere vidit Plinius. In Abrotano, Absynthio, Nymphææ floribus, & potissimum Aquilegiæ foliis, mense Junio, ob singularem ejus dulcedinem haberi, Moufetus author est.

ARTICULUS IV.

De Ricino, & Reduvio.

Ricinus, nomen à Ricini plantæ seminibus, quæ æmulatur, apud Latinos obtinuit. Vulgo Græcor. dicitur *κρότων* *Hesychio* ἀκρότων, Suidæ κρότων, aliis *κροσπίτης*, Ferlinis, ut ex Didymo Zolonote apud Hermolaum Barbarum accepimus, *ῥαϊσός*. Gaza *Reduvium* vocat, Albertus *Tacam*, Guillerinus de conchis *Eugulam*, Sypon- tinus *κροσπίαν*, sed falsò, Scaliger *Cicam*, vel *Ceccam*. Insectum est parvum, compresso valdè & plano corpore, cute admodum tenaci, figura corporis rhomboide, colore nigro cum quodam splendore, aut ex fusco obscure nigricante. Sex habet pedes collo affixos, rostellum acutum sed breve, exitum excrementi nullum. Æstate ineunte in pascuis inter gramina, & in sylvis inter folia ex putri quodam humore nascitur. Gignitur aliquando in carnibus. *Observavi*, inquit Aldrovandus, sæpe in canibus, quod cum domo egrederentur, prorsus Ricinis carerent, redeuntes vero ex agris, ubi frequentior, spissior, & altior herba erat, iis infecti essent. Infixo semper sanguini capite vivit, atque ita intumescens, quia ei, ut dixi, nullus cibi exitus, dehiscit

M 2 nimia

Colum. R.
R. l. 8.
c. 7.Aldrov.
Hist. Inf.
l. 5. c. 5.Moufet.
The. Inf.
l. 2. c. 26.Mouf. Th.
Inf. l. 1.
cap. 24.Lang. Ep.
l. 2. ep.
42. Scal.
Exer.
194. 7.

Mouf. l. c.

Tineæ.

nimia satietate, alimentoque ipso moritur. Æque est mira sanguinis, ut Hirudinum generi in palustri aqua sitis. Perfert tamen & famen per septiduum. Sanguis igni sacro auxiliatur: mulieris lumbis si inungatur, veneris tædium parit. Ex aure sinistra canis avulsus, omnes dolores adalligatus sistit, ut Plinius ex Nigidio prodidit. Præservantur ab eo canes, si aures oleo nucum avellanarum & amygdalarum amararum illinantur, vel ex vino, aceto, cumino & aqua salsa abluantur.

Plin. H.
N. l. 22.
c. 18.

Adeò similis ricino *Reduvius*, ut sæpe inter se confundantur. Rostellum ipsi longius, pedes obscure rubent, dorsum cineritio est colore, tribus minutissimis nigricantibus punctis distinctum, & ad cordis figuram effigiatum. Corpus à maxima repletione nunquam ita distentum, quin semper compressum, nunquam globosum videatur. Caput rarius cuti infigitur. Sanguinem per vices exugit, & excrementa inde genita per alvum exprimit: quæ lanam viridi colore ita tingunt, ut vix calido lixivio ablui possit. In vellere detonso annum integrum vivit, & boves, oves, capras, barbam etiam hominis & inguina infestat.

Tolluntur mandragoræ radice, cedria, pice liquida & sevo ovillo, amurca optime depurata, & vini fortioribus fœcibus, cum decocto lupinorum, si iis oves detonsæ illinantur. Reduviorum pulveris drachma una & semis, in potu exhibita, Ictericam certissimè & cito sanat, si quibusdam Anglis credendum.

ARTICULUS V.

De Pulice.

Aldrov.
de Insect.
l. 5. c. 5.
Mouset.
Th. Inf. l.
2. c. 28.
Descriptio.

Pulex, quod ex pulvere generetur dicitur. Græcis est *φύλλα*, *φύλλας*, Æolibus *αυύλλα*. Caput illi exiguum, os torosum, collum breviusculum, proboscis, cujus mucro rigidior, sine dubio cava, ut sanguinem exugat, & intus transvehat. Duæ minutissimæ è fronte antennæ, quibus tum viam explorat, tum de objectorum natura judicat. Oculos habere vel inde colligas, quod luce se subducant. Posteriora crurcula ventrem versus retrò flectuntur, anteriora ad pectus, Extremæ tibiæ, bifidæ, uncatæ, acutæ, & corneæ quasi, tum ut certius sublimia scandat, tum ut glabræ cuti firmitus adhæreat. Intestinum unum minutissimum & implicatum, quod pro cibi quantitate, vel relaxatur, vel contrahitur. Non tantum in animalibus, canibus, vulpibus, homine reperiuntur, sed & in terra subsiliunt. Hea civitas propter caprarum abundantiam, eorum est feracissima. In territorio Sigelucensi, nec ii quidem qui importantur vivunt. Loca

Arist. de
partib. a-
nim. l. 4.
c. 6.

Vidus.

Locus.

Ortus.

calida & sole illustrata amant. Sanguinis sunt appetentissimi. Oriuntur ex pulvere, inprimis si capræ aut hominis urina præmade fiat. Sed & inter pilos canis, ex humore succido putrescente. In Perienne regione, è mancipiorum sudoris guttis, quæ statim in pulices delapsæ convertuntur. Coeunt mare fœminam conscendente, diuque in coitu hærent. A coitu gravida fœmina obesior videtur, ovorum plena; quæ in ventre oblonga, minutissima, numerosa & candida videntur; exclusa, repente nigricant & in pulicellos minutissimos abeunt. Ova non lendes parere, apud Philoponum habemus: quod & Niphus tradidit. De *Natura* hæc habet: *Natura*.
carni putri vel mortuæ non insidere, nec morbo regio laborantes, & quidem ob succi amaritudinem, nec morituros, ob ejusdem fœtorem, attingere. Nocte inprimis infestare. A pastu in lodices villosas vel pulverem se abscondere. A morsu locum rubicunda macula notatum dimittere. Imminentibus pluviis maximè mordere: frigore deficere & mori.

Pelluntur variis, inprimis verò, equæ *Fuga*.
urina & fœcibus; aqua marina; decoctionis arsenici aut sublimati; calce viva cum hellebori albi succo permixta, &c. Eisdem negotio inserviunt caules, ebuli folia, filix, anchusæ radix, pulegii flores, ruta, colocynthis, rubus, oleander, mentha, lupulus, rapi semen, cuminum, staphis agria, persicaria, sinapi, & alia, quæ apud authores vide. Alcairi redigitur in pulverem persicaria: pulveris circa lectos sparsi odore ita soporantur, ut non mordeant. Numidiæ mancipia quia calceis destituta, injuriis hujus animalculi nimis sunt obnoxia, ferro, & igne eadem arcere solent. Multi ex eo digitis pedum, vel pedibus integris mutilati superfuere.

Sunt alii *Communes*, rariores alii. *Illi* *Differen-*
pediculi magnitudine, sed molliore corpore, dorso gibboso, & ferè porcino. Pectus venterque ex nigro flavent. In castellis candidis sunt dilutiores, in ruffis fulvidiores, in nigris nigriores. In Hispaniola non sunt magni: sed mordent dirissimè. Ex Rarioribus sunt illi quos juxta Niguam fluvium parit India. *Pulicellus* est, inquit *Scaliger*, *rostrum acutissimo: pedes potissimum invadit, (raro partes alias) non ingredientium tantum, sed & Cubantium quoque. Idè in sublimi cubant Indi. Frequentissimè partem illam quæ subest unguibus, lancinant, quarta die crescere tumor incipit, tum ad eam turget magnitudinem, ut pisum superet. Tumor fœtus est lendibus candidis: quibus extractis, calidos imponunt cineres. Quæ de Numidiæ mancipiis superius diximus, ad eundem spectant.* *Scaliger*
Exer. 44.
l. 8.
Marcgr.
Hist. Bra-
si. l. 7. c. 3.

ARTICULUS VI.

*De Lendibus, Forbicinis, & Talpa
Ferrantis Imperati.*

*Moufet.
Theatri
Insect. l. 2.
c. 35.*

TRia hæc animalcula Moufeti & Aldrovandi verbis describemus. *Lendes*, inquit ille, Græci *δένδρας* & *κόνιδας*, Itali *Lendine*. Hispani *Liende*. Germani *Dusse*. Angli *Nits*. Illyrici *guida*, apellitant. Sunt autem minuta quædam animalcula albicantia, Syronibus, (si pedes haberent) quam simillima, sed duplo ferè minora: corpore item oblongiusculo, ex quibus nihil aliud gigni posse Aristoteles testatur. Inter ungues compressi cum sonitu moriuntur; non solum in hominum capillis & ciliis, sed etiam boum & equorum macilentiorum crinitus scatent; pedum exortes tam pertinaciter nihilominus adhærent ut eadem opera totum pilum qua illos auferas. Has *Trotula* *πριχοσπάτας* non ineptè dixit, nam ut cochleæ herbarum, sic istæ capillorum succo viçtitant, eosque depascunt.

Philosophus ex pediculorum coitu provenire eos affirmat, quorum proinde ova dicuntur. Sunt autem Iasmini florum apud nos crescentis similia. Nam sicut ille flores profert seminis expertes, sic pediculi ova pariunt effœta. Moriuntur aut alimenti inopia, aut pectinis densioris usu, aut medicamentorum vi: qualia veteres neotericique medici multa præscribunt. Plinius alumen cum aceto, vel acetum cum felle vitulino miscebat, & lacte item caprino eas tolli affirmabat. Laudat item nitrum cum Samia terra illitum, & scrobem cornu cervini cum vini epotam. Abinzoar cum centaurea minore, & Alkitrum capillos inungere præscribit. Sulphur in aceto tollit lendes, uti quoque oleum cum lixivio illitum. Marcellus stercur suillum cum vino & succo rosarum mixtum, mellis item cum sale armeniaco inunctionem, sed præsertim oleum raphani cum fortissimo lixivio variè prædicat. Hildegardis ex dactylorum ossibus lixivium parat, quo cum oleo radiculae mixto lendes enecat. Ardenus sublimati hydrargyri parum cum vino ardente miscet: atque etiam dicit; Si caput primum ovo gallinaceo, deinde cyclaminis succo, vel aqua marina irrigetur, nunquam renascituras esse lendes. Gilbertus Anglicus fel cuiuscunque animalis, uti etiam amara, mundificativa, & aromatica, cum succo calendulae mire effert.

Ejusmodi insecta vulgò *Forbicina* dicuntur, quod caudam habeant bifurcatam ad instar sorficis: apud Belgas (ut audio) *Oor-Wormen*, id est vermes auriculares,

seu potius aures petents, siquidem Belgæ existimant in aureis irrepere, ut cerebrum offendant. Habitant multum inter uvas, in cavis arborum, foraminibus parietum, sub lapidibus, sub terra. Color eis ferè castaneus, pedes sex, corpus oblongum. Quæ *prima* pingitur, omnium est vulgatissima, sed nec dum magnitudinem suam adepta. *Secunda* rara & insolens, capite etiam bifurcato, corpore crasso, tota subfusca, & flavescens. *Tertia* ejusdem cum proxima speciei, minima, candida. Prima verò in secunda tabula, nescio an è forbicinarum genere (alata enim est) leucomelana, sive nigra & alba, alis expansis. Numer. 2. eadem clausis alis atro castanei coloris caudam habet, & bifurcatam & serratam. Numer. 4. omnium est vulgatissima. Quinta omnium minima caudam habet trifurcatam: sicut etiam sexta corpore admodum crasso, magnis & crassis pedibus tota nigra. Postremo loco pictum insectum, è Gryllorum forte potius, quam Forbicinarum genere, coloris leucophæi, cauda trifida.

Ferrantes Imperatus Neapolitanus diligentissimus ac eruditissimus aromatarius, in naturali sua historia Insectum, quale hic depingimus, *Talpam* nominavit, quod *Talpæ* more pedibus anterioribus ceu manibus terram effodiat: sunt enim pedes utriusque animantis simillimi. Rusticis Neapolitanis, inquit, *Guffulo* dicitur, sed cur, non explicat. Nostri rustici vocant *Zuccaram*, quos ego secutus vermem cucurbitarium nominavi. Siquidem cucurbitas quas *Zuccas* vocant, summopere infestant. Imperatus hoc insectum hortulanis apprimè odiosum esse ait propter plurima, quæ stripibus damna infert, earum radices devorando. Insectum est quatuor digitos longum, unum verò latum, habitu, corpulentia fere locustæ. In tria segmenta præcipue divitur. Caput enim prima sectione ab ea parte, quam pectus libet appellare ventri superstitem, separatur. Hoc Locustæ ora, & faciem fere antèrius repræsentat, sed oculorum medio quidpiam eminens nonnihil conspicitur, quod nasi vices, & locum tenet. Ocelli utrinque aterrimi splendentes gagatis in modum: sub his duo velut cornicula oblonga tenuia, forsàn ad prætentandum iter extant. Extremo rictu, seu fræno alia velut emissitia cornicula, seu appendices in articulos seu internodia quaterna, aut quina ad commodiorem flexum, minora tamen superioribus, intra verò rictum ipsum, ac oris lateribus aliæ binæ utrinque appendices, denique sub mento utrinque una protenduntur, quibus ut opinor, tanquam digitis quibusdam, alimentum in ore retinet ac complectitur, & forsàn comminuit,

ita ut partim dentium manus obeant. Terni utroque latere pedes. Primi antici lati, tribus articulationibus compacti, quarum extrema velut in digitulos secta est plures acutos feræ dentes referentes, cristam galli diceres, aut equitis calcar. Media & postica crura similiter tribus constant articulis, sed hæc majora & in femore crassiora in altum supra tergum elevato medio, seu poplite, anticis longiora, sed minus lata majora mediis, hirsutie molli infernè. Venter lanosus octo compactus est annulis. Dorsum vestiunt quaternæ alæ, superiores breves, & latæ, aliis angustis longioribus, & ad caudam fere extensis incumbentes. E cauda geminum exit spiculum longiusculum, ac subtile: cum Gryllo Locustæ specie affinitatem quandam habere videtur, estque colore fere per totum subcastaneo.

ARTICULUS VII.

De Sphondyle.

DE Sphondyle seu verticillo (ita dicitur, quod circa radices ita convolvatur, ut verticilli speciem gerat) diversæ occurrunt sententiæ. Plinius serpentem facit. Aristoteles & Absyrtus, domesticæ meminere, quæ selphio similis Hesychio & Camerti ex Aristophane, averfa coit; si tetigeris fugit, & præ metu male pedit: exiguo eadem corpore & subnigro. *Sylvestris* fit apud Theophrastum mentio. Natura ejus nullam radicem etiam acrem intactam relinquere. Agricola cum longitudine & crassitie minimo digito æquat. Capite rubro, reliquo corpore albo, nisi quod superne sit aliquanto, ubi cibo sumpto turget, nigrum, sepedem, addit. Rodit radices cucumeris asini, chamæleontis nigri, centaurii, peucedani, aristolochiæ, vitis sylvestris, &c. Tertio suæ generationis anno formicarum instar prorumpere, & Moguntinensem dicecesin infestasse, Malleolus auctor est: anno suum ortum sequente in scarabæos majales verti, Cordus. Germanis *Enger* forte quasi *Enger* dicuntur. Anglis Aprilis & Majo mensibus plurimum nocent.

De *Differentiis* ita ex sua Observantione & Camerario Moufetus. Habeo penes me sphondylam cruciformem, colore ex cinereo albicante, capite nigricante; tacta veluti sese in sphæram colligit, & Verticillum fœminarum fuso nentium scitè exprimit: unde nomen. Extra terram torpet, aëris impatiens. Vulnerata liquorum emittit dilutius atrum, quo tanquam encausto literas scribere quis possit. Habeo & *rubram sphondylam*, intra terram ad duorum pedum profunditatem viventem: cui caput nigerrimum, os forcipatum: collum ex luteo rubescens, dorsum cocco infe-

ctum, sex pedes anteriores miniatuli, venter reliquumque corpus omninò flavum; nisi lateri utrique juxta ventrem, octo rubescentia punctula, ornatus nomine addita fuissent. Medium digitum longitudine æquat, & vergente æstate in muscam transmutata abit. Vidimus quoque *lucidam*, corpore crassiore, satis à medio dorso ad caudam cœrulescentem: à collo autem cæsi magis coloris videbatur, caput illi flavescens uti & pedes: os forcipatum atque rubeculum. Dum juvenis est, tota candicat corpore: Livor ætatem sequitur, incipitque à cauda. Mirum quo modo corpus in latum longumque undoso quodam motu sine loci permutatione agit, ac inter movendum colores sæpius mutat. Nam dum in terra quiescit, albicat tota; dum verò agitur, quasi per iracundiam, livescit. Omnino Cossis majoribus simillimum Insectum, quod ad corporis formam attinet; sed illi sese in verticillum agere & torquere nequeunt. Ex isto vermi magnum muscæ genus natum conspeximus, quatuor alis donatum. Aliam denique habemus juxta *capæ radices* inventam, ejusdem fere cum livida magnitudinis, capite viridi, albo, Xelampelino, coloribus mixtis notato: nos *Cepariam* vocamus; quarum hic omnium icones repræsentamus. Nunc insuper Joach. Camerarii de sphondylis sententiam addere placet, cujus mihi judicium semper integrum. Sphondyli (inquit) fortè sunt isti vermes qui in terra inveniuntur, initio Veris planè candidi, aut potius nonnihil lividi; qui autumno fiunt obscure virides; & pellucente è cute, pullo quodam succo colorantur: Caput iis spadiceum, nigricans & satis durum, ut facile radices arrodere possit. Erucæ statim conglobantur, & moriuntur, aliasque resumunt formas, muscarum aut erucarum.

Crassitie sunt digiti unius & longitudine sesquiunciali; pedes habent octo in medio corporis, quod caput spectat: nostri vocant Erdtworm. Guilandinus dicit Sphondylos esse vermes, sic dictos, quod instar verticilli radicibus herbarum circumvolvuntur. Alii etiam vermes, *nigri subrubentes* testaceoque cortice, multis pedibus instar Scolopendræ præditi (cui etiam cognati, videntur, nisi quod rotundiores, nec ita lati) reperiuntur in terra eruta prima æstate, eo quo dixi modo (si quis eos tetigerit) convoluti. Engerlin quoque vocant Germani vermes subterraneos, flavos, nigro capite; juxta quod pedes tenues: in reliqua parte corporis nulli. Hi cum eruti fuerint, in globum se formant, atque Soli expositi statim tabescunt. Vivunt etiam tantum intra terram, & plantarum radices arrodunt. Omnes

Arist. H. A. l. 5. c. 8.
Plin. H. N. l. 27. c. 13.
Theoph. H. P. l. 9. c. 14.
Agric. de animalibus subterraneis.

Malleol. l. de exorcif.

Mouf. Theaur. Inf. 2. c. 6.

nes hifese conglobantes vermes, quis non inter Sphondylas cenferet?

ARTICULUS VIII.

De Staphylino.

Abfyr. in
Pippiar.
Moufet.
Theatr. l.
2. c. 7.

Staphylinus Sphondylo domestico, apud Abfyrum, similis est, qui cum nobis ignotus sit, non est mirum, nec tantam Staphylini notitiam esse. Moufetus duo insecta cum suis iconibus proponit.

Prima tota cum splendore nigricat Blat-
tis non multum dissimilis, sed corpore ma-
gis gracili ac longiore. Totum corpus duos
digitos transversos vel minus longum,
cauda bifurca; quam dum aufugit (fugit
autem atque currit valde velociter) quasi
in sui defensionem elevat, at duos veluti
aculeos candidissimos, breves, extrudit:
Verum nec pungere eum vidimus, nec fe-
rire; minoresque & molliores aculei sunt,
quam ut penetrare possint. Hos dum per
iram exierit, effundit cum iis albam &
crassam quandam substantiam, sed humi-
do unguento molliorem. Vivit maxima ex
parte super terram; sæpius tamen inter
segetes supra terram conspicitur.

Altera quam à Kniveto depictam acce-
pit, quæque frequens in Norfolcia, caput
habet parvum, è puniceo fuscum, fere
globosum, os forcipatum atque exiguum.
Proxime à capite tres utrinque pedes; quo-
rum duo priores breves sunt, (Erucarum
more) quatuor reliqui colore ferè san-
guineo, quadruplo longiores. In medio
corpore sub ventre octo habet pedes obtu-
sos, veluti etiam Eruca. Cauda tuberosa,
& duabus setis bifurca. Venenatam utri-
usque naturam ex eo didicimus, quod equi
duo, dum cum fœno eas devorarent, toto
corpore inflati interierunt.

Meminit Staphylinorum & Cordus, qui
Gallis Courtilles. Inveniuntur in hortis par-
vi digiti quandoque longitudine, tumulos-
que elevat more talparum, in quibus dor-
miunt. Thymum potissimum & sambucum
infestant; sed non ita, quin aliis quibuscun-
que herbis plantisque vim inferant.

ARTICULUS IX.

De Anthreno & Asello Ar-
vensi.

Referre huc placet Anthrenum & Asel-
lum arvensem Moufeti. Illum Græci
ἀνθρήρον αἰνέρον, alii Crabronem reptilem; qui-
dam speciem Phalangii, Plinius pennis
tantum à Crabronibus differentem. Ro-
strum illi, inquit Moufetus, aduncum, &
forcipatum, vultusque erectus. Noctuum

illam cornutam (qualem in Belgio vidimus)
plenè exprimit; Oculos habet piccos, pectus
hirsutum valde & fulvidum; pedes ortu fla-
vi, deinde fusci: octo incisuris ex rubro fla-
vescentibus constat reliquum corpus, quas
maculæ in dorso Coracinæ valde ornant. A
summo rostro antennæ sive cornua emer-
gunt flava, hirsuta, flexibilia, tamen tactu
nonnihil dura. Morsum ore infert agrè cu-
rabilem; non ita tamen lethalem, ut Phalan-
gium videatur, nec ita lenem quin Crabro-
nis superet *κακώθετα*.

Asellus arvensis ob similitudinem, quam
cum asello habet, dicitur. Reperitur in-
ter arvum, segetes, pedum duntaxat nu-
mero (quippe sex tantum parvos & nigri-
cantes habet) à reliquis discrepans; Col-
lum illi brevissimum, corpus latiusculum,
compressum; cauda aliquantum mucro-
nata. Julio mense agro Colcestriensi eum
Pennius vidit, alias nunquam reperit.
Quem in Medicina usum obtinuit, nobis
adhuc inexploratum est.

CAPUT II.

De Insectis apteris octopedum.

ARTICULUS I.

De Scorpione.

Insecta aptera octo pedum sunt *Scorpio* Nomen.
& *Araneus*. *Scorpius* nomen apud Græcos *Aldrov.*
αρά το σκωριζεν τον εν, quod venenum jacule- *Hist. Inf.*
tur; vel ut alii *αρά δόκατος επεν*, quod flexuo- *l. 5. c. 11.*
se serpat, nomen invenit. Plinio *Scorpio* *Moufet.*
etiam, Ciceroni & aliis *Hepa*, Pandectario *Theatri*
Satocollos dicitur. *Inf. l. 2.*
c. 10.

Animalculum est colore subatro & velu- *Descri-*
ti fuligineo, corpore oviformi, Capite, quod *ptio.*
in pectoris summitate gerit, latente, *Ocu-*
lis tam exiguis ut penè nulli conspiciantur.
Pedes habet octo: chelis & forcipibus soli-
dis furcata bina *brachia*, cæteris grandiora,
fluvialibus astacis & cancris haud absimilia.
Aristoteles quinque bifulcis dentata forcipi-
bus habere scribit. Ex corporis imo, *cauda* *Arist. H.*
producitur, globubulis multis septem plæ- *A. l. 4.*
rumque, aliquando sex, & novem, quorum *c. 7.*
ultimus, cæteris longior, solus præfixo sim-
plici vel duplicato aculeo, & nonnihil reflexo
ad ipsius extremitatem, armatur. Dentem
Plinius dixit. De lingua nescio quid apud
Gordonium habebis. Lambere ea cutem
dicuntur. An tenui fistula quod Plinio, *Æ-*
liano, & Nicandro, visum, pertusus sit acu- *Plin. H.*
leus, qua venenum ejaculetur, authores vi- *N. l. 11.*
derint. Galenus certe negat. Admitti for- *c. 37.*
tè potest, cum & viperæ sectione, sub den- *Nicand.*
tibus vesicula lateat, è qua venenum, cum *in The-*
mordet, effundere solet. *riac.*
Plin. H. N.
l. 11. c. 37.
Ælia. H.
A. l. 9. c. 4.
Galen. de
loc. aff. l.
6. c. 5.

Loca

Locus. Loca frigidiora nullos alunt: innoxii qui
 Strab. in Germania & Helvetia habentur. In Ita-
 Geogr. lib. lia, Romæ imprimis, America, Persia, inter
 16. c. 17. Sufas imprimis & Mediam, Canariis insulis,
 Plin. H. Numidia, Scythia, Pescara, Barbaria, Æ-
 N. l. 5. thiopia, India Orientali prope flumen Esti-
 7. & 1. menum, tanta multitudo, ut incolæ solum
 8. 16. 29. vertere necesse habuerint. Plura in differen-
 Ælia. H. tiis occurrunt. Sub lapidibus & in parieti-
 A. l. 10. bus plærumque latitare solent.
 c. 23.

Vitæ & Terra vivunt, & aliquibus in locis, her-
 bas, lacertas, aspidas, verticillos, & blattas
 Genera- comedunt. Non coire, sed nimio Solis ca-
 tio. lore procreari, apud Ælium habemus.
 Ælia. H. Per putrefactionem ex paguris, Crocodili
 A. l. 6. c. 22. cadavere, sisymbrio socymo, & si Alberto
 Plin. H. fides, lignis putridis, nasci, dubitari non de-
 N. l. 11. bet: percoitum, & quidem vere & autum-
 c. 25. & 1. 20. cap. 12. no, sæpius undenos, Moufetus author est.
 Antig. *Vermiculos*, inquit, *quod vidimus albos, vi-*
 Hist. Mi- *vos, ovorum specie pariunt & incubant: mox*
 ra. c. 24. *ut prolem perfecerrunt, pelluntur ab ipsa, in-*
 Holl. *terimunturque magno quidem numero.* An-
 Prax. l. tigonus foetum ab ipsis devorari arbitratur,
 1. c. 1. unum modò solertissimum relinqui, qui
 Plin. H. ipse matris clunibus imponendo, tutus &
 N. l. 10. à cauda & à morsu fiat: reliquorum hunc
 c. 72. ultorem, & supernè parentes conficere.
 Plin. H.

Nonnisi pilosas partes attingunt. Cum in-
 cedunt, transversos sese inferunt. Propter
 longitudinem enim pedum posteriorum,
 quos in vacuum ponere necesse habent, in-
 gressionis corrumpitur quadratura. Nun-
 quam mansuescunt, quod Galenus prodidit.
 Unum per viginti duos dies in oleo vixisse,
 & in imo vasis ambulasse, Albertus author.
 Quid in foetum committant, & ab eodem vi-
 cissim patiantur, paulò ante dictum. Um-
 bram solis declinantes, umbram petunt: nec
 nisi calcati, prodeunt & aculeos exerunt. Ca-
 pite ablandiuntur prius, ut cauda commo-
 dius feriant. Nec Isidis sacerdotes circa ur-
 bem Copton lædere, nec Psyllos, apud Ælia-
 num invenies. Porci nigri percussi, omninò
 moriuntur: non nigros ab ictu liberos di-
 cunt. In Æthiopia, qui eorum excrementa
 calcavere, ita pedibus exulcerantur, ut vix
 convalescant. Nulli animalium nocere, cui
 non sit sanguis, reliquit quidem Plinius, sed
 Wolphius cum vipera, conclusum, mutuis
 periisse vulneribus vidit. Cum omni viru-
 lentorum insectorum genere, escæ causa
 conflagrare, Ælianus author est.

Pestis importuna veneni, nisi quòd gra-
 viore supplicio lenta, per triduum morte
 conficiunt, virginibus lethali semper ictu,
 & foeminis ferè in totum, viris autem matu-
 tino, exeuntes cavernis, priusquam aliquo
 fortuito ictu egerant venenum. Constat eos,
 quibus septem aut novem caudæ internodia
 sæviores esse: pluribus enim sena sunt: fe-
 riunt obliquo ictu & inflexo. Venenum
 omnibus medio die, summa item æstate

exasperatur, cum incanduerit solis ardori-
 bus: itemque cum sitiunt inexplibili potu.
 Maximè exitiales sunt, si suum genus
 adeant, antequam noceant. Incurabile ve-
 nenum, si ictus eo die ocimum comederit.
 Non sentiunt puncti dolorem, si manu cni-
 cum tenuerint. Symptomata varia affligunt.
 Locus affectus inflammatione corripitur,
 indurefcit, intensius rubet, vicissimque do-
 lore premitur: modò æstuat, modò frigore
 corripitur. Vulneratum affligit sudor & tre-
 mor. Extrema frigescunt, inguina attolun-
 tur, flatus per sedem prorumpunt, capilli
 eriguntur, facies distorquetur, &c. Dodo-
 næi famulus tam frigido sudore perfusus
 erat, ut argentissima nive se opprimi quere-
 retur, &c. Infinita contra ictum apud au-
 thores prostant remedia. Ex herbis sunt
 Absynthium, Abrotanum ex vino pota;
 Amomum, Ammi, Anisum, Allium, Aristo-
 lochia, Aspodelus, Asia fætida, Attracti-
 lis, Atriplex, Blitum, Caltha, Calamintha,
 Coepa, Centaurea, Chamæpitys, Colocyn-
 this, Cyperus, Galbanum, Hordeum,
 Iris, &c. Ex fruticibus Balsamum, Myrtus,
 Paliurus, Rosa, Rubus, Laurus, Morus,
 Thus, Vitis. Ex animalibus Sputum hu-
 manum & urina, Mumia, Ranæ fluviatiles,
 Coracini piscis in Nilo, Scorpio denique
 ipse tritus, & cum sale, lini semine & althæa
 impositus. Taceo composita, quæ apud
 Diosc. Plinium, Rhafen, Albucasin, Oriba-
 sium, Serapionem, Sylvaticum, & alios ex-
 tant, & à Moufeto ac Aldrovando collectæ
 sunt. Villanovanus herbam trinitatis, cum
 succo radicis ebuli, & vino, tanquam uni-
 cum remedium commendat. Joh. Arden.
 Chirurgus Anglus præsentissimum ait, si
 tres quatuorve sanguinis guttæ juxta vul-
 nus extrahantur, eodemque vulnus statim
 illinatur. *Fugantur* suffumigio ex sulfure,
 galbano, & ungula asini. *Non egrediuntur*,
 si raphanum incisum cavernæ imposueris.
 Rhasis radicem enulæ gestatam laudat, &c.
Torpescent, si delphinium herbam substra-
 veris. *Necantur*, si raphanum commansum,
 basilicum latifolium, in aqua nascentis, aco-
 nitum, helleborum nigrum, ocimum rubro
 flore imposueris, & Galatæ insulæ terram.
 De *Antipathia* habe. Scorpionem & Cro-
 codilum, simul atque alter alterum conspe-
 xerit, in mutua funera sponte rapi, id ab
 Ægyptiis proditum. Stellionem, visu quo-
 que pavorem ipsi inferre, & torporem frigi-
 di sudoris. Cum sol in Cancro est, serpen-
 tes ictibus torquere. A vipera devorari. A
 vespis, apibus & crabronibus non attingi,
 qui à scorpionibus percussi sunt. Revivi-
 scere mortuum ajunt, si quis helleborocan-
 dido linat. De odio inter eos & aconi-
 tum, ita Plinius: *Hoc quoque tamen in usus*
humane salutis vertere, scorpionum icti-
bus adversari experiendo datum, in vino
calido.

Plin. H.
N. l. 20
c. 12. l.
21. c. 23

Plin. H.
N. l. 20
c. 4.

Plin. H.
N. l. 35.
c. 19.

Antipa-
thia.
Plin. H.
N. l. 29.

c. 4
Arist. H.
A. l. 8. c.

29.
Plin. H.
N. l. 25.

c. 10.

Plin. H.
N. l. 27.
c. 2.

calido. Ea est natura, ut hominem occidat, nisi invenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus invento. Sola haec pugna est, cum venenum in visceribus reperit: mirumque exitialia ambo cum sint, duo venena in homine commoriuntur, ut homo supersit. Imo verò etiam ferarum antiqui remedia prodiderunt, demonstrando, quomodo etiam venenata ipsa sanarentur. Torpescunt scorpiones aconiti tactu, stupentque pallentes & vinci se confitentur. Auxiliatur eis helleborum album, tactu resolvante: ceditque aconitum duobus malis suo & omnium, &c.

Magni est in calculo atterendo & pelendo usus. Combuitur à quibusdam, & cinis cum pane felicissimè exhibetur. Alii Olea conficiunt, inter quæ laudatissimum & mirabile, quod Matthiolo debemus. Habetur & apud Janum Damascenum confectio.

Differentiæ Scorpionem, à forma, sexu, loco, quantitate, colore & viribus sumuntur. Formam si respicias est 1. *Gibbosus*, cauda pro corporis pusilli ratione magna, quam post se convolutam trahit. Pallidus videtur: sed aculeus admodum productus albescit. Omnium celerimè, & calidum solum, venenum infundere, prodiderunt Arabes. Ad ictum, calor corporis in singulas ferè horas variat, & ex viridi flavo, albo, rubidoque alteratur: acuta febris affligit, lingua tumet, urina sanguine tingitur. Remedia vide apud Mouf. 2. *Caudati* & non caudati, & vel unum habent aculeum vel duos. Qui paguros imitantur, splendescere sunt colore, & eadem quæ alii inferunt accidentia. 3. *Alati*, quos Mauritania alit, Lybiam dicit Lucianus. Alis sunt tenuibus ut Cicadæ. 4. *Non alati*, quos ibidem inveniri Strabo asserit. 5. *Paguror.* & *cancror.* instar, qui splendescere colore sunt, & eadem quæ alii accidentia inducunt, vide infra in Differentiis de colore. 6. *Septem* vel *octo* nodis, qui fixiores. Sex qui benigniores. 7. *Caudati* qui vel unico muniuntur aculeo, vel duplici. *Excaudes.*

A *Sexu* sunt 1. *Mares* graciliores, longiores, ventre, chelis & ipiculo maculatiores, qui venenum habent infestius. 2. *Femine*, quæ majores, pinguiore, ventricosiores, placabiliore.

A *Loco* sunt 1. *Pescarens.* in Afr. à quibus icti continuo moriuntur. Ideò cives relictæ temporis æstate urbe, ruri ad Novemb. usque mensem commorantur, si Leoni Africano fides. 2. *Egyptiaci*, qui maximi, & statim interficiunt. 3. *Lybici*, qui vel *terrestres*, multis corporis vertebra insignes, vel *volatici*, de quibus antehac. 4. *Americani*, omnium minimi, sed maximè virulenti, si Africanos demseris. 5. *Castellari*, quos agricolæ, dum terram aratro scindunt, for-

micarum more congregatos, inveniunt, ubi per hyemem delitescunt.

A *Quantitate*. 1. *Minimi* sunt Americani. 2. *Maximi* Africani, & illi qui in India Orientali.

A *Colore* septem sunt apud Nicand. genera. *Primum* albicat, & minimè est lethale. *Alterum* ore est rufescente: ad ictum, vehemens ardor, febricitatio, & sitis intolerabilis sequitur. *Tertium* luridum & nigricans, cujus ictus inconstantem membrorum ictum facit, cachipnumque Sardonicum. *Quartum* colore ad viride inclinante. Ad ictum frigus & horror invadunt. *Septena* aut *novena* habet internodia. *Quintum*, lividum pallidumque est, amplo & distento ventre. Vescitur herba: & dente quoque mordet. Virus ejus Nicander *βασίλειον* vocat, quod ab ipso vulnerato, homini bubo intumescit. *Sextum*, & *septimum*, ad differentiam ex forma pertinet. *Illud* cancro marino littorali simile est, corpore grandiori, orbiculari. Matthiolus nigros, ferrugineos, virides, in Arcinonenfi comitatu vidit. *Hoc* ad Paguror. formam accedit, ex quibus in sicco cavernam aliquam ingressis, & postquam mortui sunt putrescentibus oritur. *Ælianus flammeum* vocat: quod pagurum coctione rubentem æmuletur.

A *viribus* sunt 1. *Noxii*, de quibus in præteritis. 2. *Innoxii*, quales sunt in Noricor. subalpinor. regione, Pharo, Avaniensi territorio, Helvetiæ agris, & Germaniæ regionibus.

ARTICULUS II.

De Araneo.

PUNCTUM I.

De Araneis in genere.

A Raneum, seu Araneam, Isid. quasi ab aëre nutritam & natam esse vult, perperam. Sollicitè muscas capere scimus: scimus & coire, & ova ac vermiculos excludere. Melius cum Becman. ab Ebraicis *ארא* texunt deducas. Græcis *ἀράχνη* & *ἀράχνης*, *παρά το ἀράχνη ἔχον ἔχειν*: ἢ *παρά τὸ εἰς τὸν αἶρα αἰρῶν τὰ ἔχον*, dicitur. Alii *μυοχαύτην* muscatricem, Kiranides *θήραρον*, Hesych. *σίβην* vocat. *Οἱ ἄλλοι* quoque nonnullis arancus, *φάλαγξ* & *φαλάγγιον* pro araneo quovis sumuntur, *Lydiam* & *aridam* Juvenalis vocavit. Illam propter Arachnen puellam, quæ in hoc insectum à Pallade immutata dicitur. Hanc, quod telam aridam texat. *Audax* est Claudiano, quod cum Pallade congredi ausa fuerit.

Caput omnibus minimum, excepto uno, Descri-
N quod prio.

Ælian.
H. A. l.
5. c. 26.

Nomen.
Aldrov.
Hist. Inf.
l. 5. cap.
12. Mouf.
Theatri
Insect.
l. 2. c. 11.

Usus in
Medici-
na.
Galen. l.
de The-
riac. ad
Pison. c. 9.

Diffe-
rentiæ.

Plin. H.
N. l. 11.
cap. 25.

Plin. H.
N. l. II.
c. 47. &
24.

quod gradissimo capite Plinius esse dixit. Omnibus terna in cruribus internodia, quibusdam bini pedes prælongi accedunt. Nam omnes ejusdem longitudinis habere, diversitas operarum innuit. Quibusdam fila quæ neverunt, attenuant, & in longum protrahunt: aliis eadem in telam deducunt, ac invicem conjungunt: aliis denique per eadem prorepunt, & cum volunt, ex iis ceu immobiles se suspendunt.

Locus.

Nulla ferè non regio Araneos alit. Gaudentius tamen Merula in vetusta prope Gratianopolim in Gallia turri non inveniri, immisos emori, author est. De *Phalangiis* in *Differentiis* agetur.

Vicius.

Vicitant muscis, asilis, tabanis, vespis, sæpè & parvis Lacertis. Nihil conficere vel recondere, author est Aristoteles. Quicquid ceperint, foras fugendo evaporare. Filo suspendere, alii existimant.

Generatio.

Ex feminibus aëriis situ & corruptione putrefactis generari inde colligere licet; quod novissimæ ædes, primo ferè quo dealbantur die, eorum corporibus telisque scatent. Propagatio plærumque coitu fit, cujus actio & desiderium fere totum verdurat. Tum retis mutua & repetita attractiuncula, venerem quasi accendunt: continuo inter trahendum propius accedunt, tum denique averfis clunibus quia ille coeundi modus, (ob globosam corporis formam) maximè erat conveniens. De *Partu* ita Aristoteles: *Parit vermiculos pusillos primum. Totius n. mutatione fiunt, non ex parte. Subrotundi per initia sunt: cum peperit, incubat, ac figurat tribus diebus. In tela sua parit omnes: sed partim in tenui & brevi, partim in crassiore & alia insinuata: nonnulla etiam aliqua ex parte circumdantur à tela. Non omnes aranei simul generantur: statim nati & saliant & filum emittunt. Humor idem in vermiculis attritis, & in juvenculis araneolis; quippe crassus, candidus. Circiter quater septenis diebus absoluti fiunt. Vifa ova multa, modica, livida, exiguis maculis aspersa, mollia, viscida. Vifi & ex unico ovo multi prodeunt fœtus, tam exigui, ut vix oculis percipi queant. Visus denique sub captæ aranæ alvo, magnus ovorum, adeò exigui ut atomis comparare licuisset, candidorum, & quæ digito compressa, crepitum excitabant, cumulus.*

Arist. H.
A. l. 5.
c. 22. ed.
Scalig.

Plin. H.
N. l. II.
c. 48.

Aldrov.
l. c.

Antipathia.
Plin. H.
N. l. II.
c. 24.

Cum stellione, lacertis, & serpentibus dissident. Lacertor. catulos venantur, hos primum tela involventes, & tunc demum labra utraque morfu apprehendentes, amphitheatrali spectaculo cum contigit. Librat idem, verba sunt Plinii, se filo in caput serpentis porrectæ sub umbra arboris suæ, tantaque vi morsus cerebrum apprehendit, ut stridens subinde, ac ver-

tigine rotata, ne filum quidem desuper pendentis rumpere, adeò non fugere queat: nec finis ante mortem est. De *Præfagiis* hoc habet: ruinis imminentibus cum telis primos cadere: incremento omnium futuro, telas altius tollere, & quia sereno cœlo non texunt, nubilo texunt, multas araneas imbrium signa esse. Sub *Leuctricæ* pugnæ tempus, albas circa templi valvas texuere telas: adorientibus fines Macedonibus nigro opere omnia complevere.

Plin. H.
N. l. 8. c.
24. & l.
II. c. 24.

Pausan. in
Bœoticis.

Ingenium solum texturæ artificium testatur, quod in tertio genere post Aristotelem Plinius elegantissimè describit. *Orditur*, inquit, *telas, tantique operis materia uterus ipsis sufficit, sive ita corrupta alvi natura statò tempore, ut Democrito placeat; sive est quedam intus lanigera fertilitas, tam moderato ungue, tam tereti filo, & tam æquali ducit stamina, ipso se pondere usus. Texere à medio incipit, circinato orbe subtegmina (xpinas) annectens: maculasque paribus semper intervallis, sed subinde crescentibus, ex angusto dilatans, indissolubili modo implicat. Quanta arte celat pedicas scutulato rete grassantes, quàm non ad hoc videtur pertinere cribrate pexitas tela, & quadam polituræ arte, ipsa se tenax ratio tramæ? (villosa & lanuginosa filorum natura) quàm laxus adflatus non ad respuenda quæ veniunt sinus: derelicta lasso prætenti summa parte, ut arbitrari licet illa quæ difficile cernuntur: atque ut in plagis lineæ offensæ precipitant in sinum? Specus ipse qua concameratur architectura, & contra frigora quanto villosior? quàm remotus à medio, aliudque agendi similis? inclusus vero sic, ut sit nec ne, intus aliquid cerni non possit? Age firmitas quanta irrumpentibus venis? qua pulverum mole degradante. Latitudo tela sæpè inter duas arbores, cum exercet artem & discit texere: longitudo fili à culmine ac rursus à terra per illud ipsum reciprocatio, subitque pariter ac fila deducit. Cum vero captura indicit quàm vigilans, & paratus ad cursum? licet extremum hæreat plagii, semper in medium currit: quia sic maximè totum concutiendo implicat. Scissa protinus reficit ad polituram sarcians. Namque & catulos lacertar. venantur: hos primum tela in volventes, & tunc demum labra utraque morfu apprehendentes, amphitheatrali spectaculo cum contigit. Fæminam putant esse quæ texat, marem, qui venatur, ita paria fieri merita conjugio. At Aristot. fæminam & venari & texere scripsit. Flandris ideò similes Scaliger facetè dicit, qui otiose agitant: mulieres negocia exercent. Novam verò telam mane & vesperi textit: illudque tam firmum, ut ex alto se filo demittens, parieti vel arbori adeò affigat, ut*

Ingenium.
Arist. H.
A. l. 9. c.
39.
Plin. H.
N. l. II.
c. 24.

Scalig. ad
Arist. H.
A. l. 9. c.
62. f.
203.

ne ab

Arist. Lc. ne ab imbre vel ventis detrudatur. *Μακρονέ-
λες* de imo loco se suspendit, ut inde
bestiolæ irretiantur; minor superiore loco
excubat, in exiguo se telæ foramine ocul-
tans. Sensus esse exquisitissimi vel exinde
colligas, quod in medio suæ telæ residentes,
Muscam in remotissimam etiam partem im-
pegisse sentiant.

*Nocu-
menta &
Remedia.* De *Nocuentis* & *Remediis* in Differen-
tiis exactè agetur. Oleis & vitibus sunt
inimici, domosque conspurcant. Demorso
penis erigitur. Si quis casu devoravit, vinum
melissæ superbibat necesse est. Prodest &
resina abietis sumpta. Morsui allium cum
ruta permistum & ex oleo tritum feliciter
superimponitur. Huc emplastr. de mu-
scis, adeps humanus, sanguis testudinum,
cinis ungulæ arietinæ, sterco capræ dissolu-
tum, cerebrum capi cum pip. in vino dulci
sumtum, &c. faciunt.

Ufus. In *Cibis* ap. quosdam fuisse admiratione
non caret. Fit cujusdam meretricis tempo-
re Alex. M. quæ à juventute araneis nutrie-
batur, mentio. Meminit & Albertus Colo-
niens. cujusdam puellæ. Sed & Heroïna
quædam ap. Anglos, teste Mouf. eis non
abstinebat. Notat & Cardan. triennem.
*Mouf. Th.
Insect. l.
5. c. 15.* In *Medicina* haud contemnendi sunt usus
tam *aranei*, quàm telæ. *Aranei* faciunt ad
quartana aversionem, si alutæ vel nucis pu-
tamiini inclusi, lacerto aut collo appensi
fuerint: quod per experientiam verum fuisse
scripsit Pennius. *Ad auris dolores*, si
oleum cui incocti tres auri immittatur, vel
succus eorum exprimatur. Plinius aceto
macerari, conteri, & cum croco immitti
debere scribit. *Ad uteri suffocationem*, si ce-
ratum ex iis confectum umbilico superpo-
natur. *Ad suppressam alvum*, si cum filo de-
scendens, sinistra manu apprehensus & con-
tritus, umbilico appositus fuerit. *Adstringi*
ajunt, si ascendentem ita adhibueris. *Ad*
Condylomata, si dempto capite pedibus-
que infricetur, &c. *Tela* adstringit, refri-
gerat, siccatur, glutinat, & nihil putre-
scens diu subesse permittit. Ideo hæmor-
rhagias, dysenteriam, & alios fluxus sistet.

*Schrod.
Pharm. l.
2. c. 53.* Emplastri febrifugi compositionem apud
Strobelbergerum ingreditur. Cum oleo
imposita, articulorum vulnera consolidat.
Ingreditur unguentum contra serpigines.
Condylomata, alligata absumit. *Verru-
cam* si rudior in pilæ formam convoluta,
& verrucæ imposita, accendatur, & in cine-
res ibidem redigatur. Paratur apud Ægy-
ptios ex multis araneis & telis medicamen-
tum, cum oleo rosaceo linimenti instar: vel
araneas in ipso oleo incoquant, quo calido
carpum ambarum manuum inungunt.

*Prosp.
Alp. l.
4. de Me-
dic. Æ-
gypt.*

PUNCTUM II.

De *Arancorum Differentiis*, & primo
de *Innoxiiis*.

DE Araneis dicturis occurrit Moufe-
tus. Hic enim Araneos eleganter, in
Noxios seu *Phalangia*, & *Innoxios* qui vel
Domestici, vel *Subdiales*, distinguit. Utro-
que denique in *Retiarios*, *Telarios* & va-
rios dispescit. Omnes cum ætate mayo-
rem acquirere peritiam, lanis inclusos, ti-
nearum generationem augere, & senectu-
tem quotannis sæpius exuere addit. Apud
Aristotelem tria habentur genera. *Primum*
mordax: *alterum* luporum: *tertium* eru-
dita operatione conspicuum, de cujus tela
superius diximus. Aristoteles *σοφώτατον &
γλαφυρώτατον*, sapientissimum & elegantissi-
mum dixit. Aldrovandus à se obser-
vatos duabus tabellis expressit. Nos, ne
quicquam omittatur, utrumque conjun-
gemus.

Ex *innoxiiis* ergò, de *Domesticis* jam in
genere ex parte actum est, qui omnium
maximi *subdiales* à rapacitate venatorum, &
Lupor. *λύκων* nomen acceperunt. Horum mi-
nimi non texunt: qui verò major est, aspe-
ram parvamque telam apud terram aut se-
pes orditur. Cavernarum exigua vestibula
prætendens, & primordiis telar. intus po-
sitis, observat dum aliquid inte la offendens
commoverit; mox accurrit ut capiat.

Ex *Retiariis* unum maximum vidit Mou-
fet. *Corpus* illi spumeum ovali ferè figura.
Caput sub ventre exiguum & forcipatum.
Dorsum variis maculis candidantibus orna-
tum. Brevi tempore à pisi magnitudine ad
eam crassitiem ascendit. Inter rosarum ra-
mulos autumnno rete expandit, & muscas,
culices &c. mira dexteritate fune attracto
illaqueat.

Telarii vel *subtilem* telam texunt, vel
mediocrem, vel *vilem*, *crassam*; rudem
& deformem. *Priores* sunt *Domestici*, ex
quibus unius, fusci coloris, & cujusdam
si inter oculos solemque ponatur, pellucidi-
tatis. Ex illis qui *Mediocrem* texunt est
Agrestis seu *Sylvestris*, qui in sepibus cum
sago linteamen expandit. *Corpus* ipsi fu-
scum, leniter hirsutum. *Pedes* polymiti,
nigris & albis maculis seriatim varii. Os for-
cipatum, accetabulis munitum. Puncta in
capite supra os duo, albicantia, forte oculo-
rum vice. Tela ne pluvias quidem trans-
mittit. *Filum* ducit & quasi in fasciculum
colligit *hic Campestris*. Pennius eum in
Colcestrensi agro inter Origanum muscis
insidiantem observavit. *Corpus* est globi
æmulum. *Dorsum* quindecim maculis no-
tatum. *Anus* quadrangularis & nigra. *Pe-
des* pioximo descripto similes.

*Arist. H.
A. l. 9. c.
62. ed.
Scalig.*

Differen-
tiæ.
ex Mouf.

*Mouf. Th.
Insect. l.
2. c. 11.*

*Moufet. l.
2. c. 14.*

Huc spectant tres *Subdialium* species. In murorum rimis degunt. Sordidam & parvam telam texunt, & extra speluncam spe prædæ longè vagantur, eandemque correptam in antrum trahunt. *Maximus*, inquit Mouf. fusco est colore, caput illi quasi ovale, corpus globosæ ferè rotunditatis, utrumque latus duæ parvæ ac breves lineæ albæ exornant, circa medium dorsum colore est magis albicante: pedes habet ex nigris fuscisque maculis pulchre varios. *Medius* minor est tinctura *grisea*. Spinam albæ tres quasi margaritæ illustrent, quarum quæ collo proxima, major & longior. Tertiū *nigrior* videtur, dorso crucem gerens transversam, rectangularem altissimam, ideoque à quibusdam Sanctus vocatur. Eluporum hos esse genere conjicio, quia currunt cum saltu quodam, & voracitatem miram produnt, nihil enim in crastinum reponunt, sed omnes uno die prædas absument. Cinereum hujus generis vidit Gesnerus.

Mouf. l.
c. p. 234.

Ex variis sunt *Longipedes Nigri*, *Albi ex atro rufescentes*, & *Rubri*, de quibus idem Moufetus ita: Sunt præterea Aranei. *Longipedes* inordinatæ rudissimæque telæ artifices. Campestrem corpore ferè globoso & fusco, graminicolam, ovisequum, Angli Shepherd sive opilionem nominant, vel quia ovium consortio gaudet; vel quod agros illis refertos, pastores noxa & veneno carere (est enim & ipse tam intus quàm extra sumptus, animal innoxium) existimarent. Sunt adhuc plures Araneorum species. Est enim araneus quidam *niger* breviusculis pedibus, ovum sub ventre niveum secum portans & celeriter currens; rupto ovo araneoli multi egrediuntur, qui cum matre ad pastum omnes unà procedunt; vesperi verò parentis dorso conscenso requiescunt. Hunc verrucis asperum credidit Pennius, donec stipulæ contactu araneolorum descensum planè viderat. In putridis quoque & cavis arboribus Aranei nigerissimi, magno corpore, pedibus brevissimis, cum Asellis & Julis habitantes. Vidimus item (inquit Gesnerus) totos *albos*, compresso & latiusculo corpore, in flore Oreoselini, in rosis atque in gramine, pedes illis tenuissimis longissimi, os macula, latus verò utrumque rubicunda linea notatur. Venenatum credit, quia certopithecum ejuseu penè exanimem vidit, & vix oleo infuso liberatum. Novimus quoque oblongo corpore araneos & acuta cauda ex *atro rufescentes*, veluti etiam *virides*. Sunt & *rubri* duum generum. Unum majus in terræ cavernis tantum habitans, pectore miniato, pedibus ex rubro flavescentibus, cauda atque ventre ex fusco colore ad flavum nonnihil tendentibus. Aliud genus valde minutum, reduvio ovili minus, (intense veluti ex Cocco) rubens. Sex tantum pedes habet, ut

monstrum aranei referat: caput illi araneis simile, sed parvum valde. Intra terram habitat, rudissimam telam operans, & indigestam; quandoque foris oberrat, & in præda captanda magnam agilitatem monstrat.

Aldrovandus suos duabus, ut dixi tabellis expressit. In *priore* viginti & unum delineat. *Prior* è parvorum genere est, corpore crassiusculo ac oblongiusculo, pedibus octo instructus, totus cinereus, parvam texit telam, araneum lautum vocant. *Secundum* pictus minimorum generis, totus est viridis, Araneus pratenfis nuncupatus. Numero 8. Araneus est pedibus brevibus, totus subcastaneus, assultim ingreditur, arbitrorque eum esse, quem Pulicem Aristoteles nuncupavit. Ejusdem generis est, ejusdemque coloris, qui *quarto* numero datur. Ex minimis est *sextus*, campestris, rotunda alvo, alboque pectore vero castaneo, tribus albis notato punctis; cum totidem nigris notetur alvus: pedibus tenerrimis, longiusculis, telam texit oblongam, in medio, quo residet, rotundam. *Septimus* totus viridis, & ipse pratenfis, protenso corpore, & acuta alvo, lineis candidissimis quinque insignita. *Octavus* ex minoribus est, brevissimo corpore, alvo admodum orbiculata, crassissima proportionem corporis, pedibus mediocris longitudinis, totus nigricat. *Nonus* corpore maximo, at brevi & compacto, adeo ut vix pectus ejus sit conspicuum, figura marsupium æmulatur, totus ruberrimi coloris. *Decimum* lautum quoque dicunt, alvum habet bifidam, qualem in aliis non invenias, pedes verò qui hirsuti sunt, illius quam pictor expressit proceritatis ac crassitie. Color ei cinereus, maximè in pedibus, corpus enim nonnihil ad castaneum inclinât, & punctulis candidissimis undique maculosum est. *Undecimus* quasi triangulari alvo, totus flavescit, quemadmodum *duodecimus* huic postremo congener, totus candicat. *Decimus tertius* albo, & cinereo fusco varius telam texit, parvam, rotundam & subtilem ex mediocrium genere. *Decimus quartus* admodum exiguus, rotundus, coloris flavi, longissimos habet & subtilissimos pedes: agros colit. *Decimus quintus* corpus habet rotundum, videturque pectore carere, colore est subluteo & subviridi, maculis tortuosis, serpentium gyros æmulantibus varius. *Decimus sextus* idem forte est, licet paulo minor. *Decimus septimus* pratenfis est, corpore procero, pectore candido, alvo flava, pedibus crassiss, quorum penultimi cæteris paulò sunt breviores, nulla in omnibus apparent internodia; antennis caret. *Decimus octavus* sex tantummodo pedibus instructus folliculum texit candidum, sicuti in expresso hic mori folio videre licet, unde aranei generis esse vix credo, corpore Araneis simile animal-

Differentiæ ex Aldrov. Aldrov. de Ins. l. 5. c. 12.

animalculum est, cinerei coloris. Numero 20. expressus ex minimorum genere, colore ex castaneo, lineis duabus flavis per alvum notatus. Postremus in hac serie, capite, pedibus, & pectore aterrimis, alvo ex albo cinerea ad majorum genus redigitur. E phalangiorum genere videtur.

In *secunda tabella* novem sunt aranei. *Primus*, terrestris quoque dici potest, quia terram gabitat è Pulicum genere, salit enim. Corpus habet breve & breves etiam pedes, ex cinereo fuscus totus. Secundus hujus ordinis corpore est atro, albo variante, grandi capite, candicante, brevibus antennis, pedibus cinereis. Tertius exiguus, subalbidus ad luteum vergens, maculis variegatus nigris. Quartus araneus foemina prolem tergore ferens, sed ea orbata: corpore procerio, pedibus crassis, crassissimo item pectore. Quinto loco exprimitur ejus foetus. Sextus idem forte qui quintus, prole tam numerosa onustus, ut quadam hirsutie villosus esse videatur. Proliger dici potest, color ex leucophæo ad atrum vergit: *Septimo* & *octavo* loco pictus Araneus prono & supino corpore, ἀχρημύλας dici potest, atro enim & luteo variat. *Nonus* est ex minimorum genere totus flavus alvo triangulari.

Addamus hic *Indicos*. In Cumana adeò firmas telas texunt, ut difficulter disrumpantur. Alibi adeò virides ut serico ejusdem coloris æquari possint. In Hispaniola ipsi aranei pilas lusorias corporis magnitud. æquant, si Oviedo credimus. In *Brasilia* sex species observavit Marcgrav. *Nhamdúi* nempe, *Elegantissimum*, *Elegantissimo similem*, *Fabæ magnitudine*, *Muscar. magnitudine* & *Pisí quantitate*, quos etiam ita describit.

Nhamdúi Brasiliensibus, araneus magnitudine Cicindelæ, clypeum in dorso gerit triangularem, splendidissimum, in laterum circumferentia sex conis acutis præditum albi coloris, cui brunnæ maculæ immixtæ. Ad os habet denticulos duos & splendidi coloris, incurvatos.

Elegantissimus Cicindelam superat magnitudine, corpus vix semidigitum longum; anterior ejus sectio minor continet crura octo, duobus internodiis constantia, ferè digitum longa, ex flavo & brunno variegata. Posterior sectio major: prior tota argentea, splendens: posterior ad medietatem etiam toto argentea, & in hac ponendo posteriorem partem deorsum, quasi facies humana egregiè apparet, quasi sculpta & argento esset obducta: reliqua medietas quasi ex argenteo & brunno glaciata. Similis quoque mixtus color inferiori corpore. Inveniuntur & duplo majores.

Elegantissimo similis, major est eo. Anterior sectio corporis parva, magnitudine seminis cannabin. sed paulo longior; posterior avellanam majorem æquat: & an-

terior sectio ut & posterior ad medietatem argentei coloris splendidi, ultima posterioris medietas flavi & maculis duabus argenteis notata, in quolibet latere una; ceterum in flavo illo subtilibus lineis fuscis variegato, varia sibi imaginari quis potest. Crura octo variegata expallide flavo & fusco omnia in anteriori sectione: tenacula adhæc duo prope os ejusdem coloris. Telam facit more cæteris communi.

De *Araneo fabæ magnitudine* hæc habet. Araneus alius fabæ magnitudine, frequentissimus in ædibus: Prior corporis sectio subrotunda æquat pisum, altera longior & fabæformis. Crura habet octo, in quolibet latere quatuor, sesquidigitum longa, tribus internodiis constantia & quartum est insertio in corpus. Anterior etiam duos propedes habet, vix quartam partem crurum longos, quibus apprehendit: duos denticulos nigras, ut maximus. Totus est coloris ex flavo, albo & saturato rubro instar holoserici fusci detriti: pilosum corpus, uti & crura. In superiore corpore magnas habet maculas nigras: crura quoque per intervalla punctulis nigris notata. Hi quoque Aranei cutem exuunt, ut major ille. Foetus in orbiculari folle sub ventre progenerant. Noctu texunt. Reperiuntur & hujus speciei dimidiæ magnitudinis.

Araneus paulo major muscis vulgaribus, cinerei coloris, hirsutus instar holoserici. In lateribus nigro serico vestitur. Crura habet sex, brachia duo, quibus apprehendit, cinerei in totum coloris, punctulis nigris.

Araneus pisí quantitate, testa clypeata sexangula argentei coloris, cum maculis nigris elegantissimis tegitur. Capitulum & crura sunt nigra.

Placet & Hernandi Araneos proferre, quorum undecim habentur genera. *Primum* genus *Teacoltotatl* seu stercoreis araneus vocatur, mediocri corporis magnitudine & colore, inter nigrum & fuscum constans. *Secundum* quod majus, *tocamaxacualli* dicitur eodem colore. *Tertium* *tocalt zintlatlaubquei*, minus prædictis, ac nigri coloris, valde venenatum, & quod contusum admotumque dicatur lateris sedare dolorem. *Quartum* *tzintlatlauqui* nuncupatur, quod etsi toto fere corpore nigrescit, macula tamen rubea insignitur. *Quintum* dicitur *tocamaxacual* corpore magno, fulvo atque hirsuto, difficile sanabilia infligit vulnera, quæque (si cicatrice obduci contingat) aliis atque aliis locis renoventur, eademque non morfu aut ictu excitata, sed incessu, confricatione & redditis alvi excrementis. *Sextum* omnium maximum *tlal-hochetl* coloris nigri pallescentis atque cinerei est. *Septimum* *ocolototatl*, ita nominatum, quod tigris pellem colorum quadam varietate tenus imitetur. *Octavum* est

Hoitztocatl seu araneus spinosus, morfu dementat, superiore & media corporis portione ater cætera luteus, forma aculeata & similis tribulo, inde impetravit nomen *Hoitzli* spina est. *Nomum atocatl* seu araneus versans in aquis, rubro, aureo & nigro variatum colore telam ducens magna ex parte, vitamque agens juxta plantam vocatam ab incolis metl, levissimi atque innocentissimi ictus, mirum qua dexteritate opus peragat, filis hinc atque illinc distinctis, & in orbem velut circino quodam compositis staminibus, deinde verò intexto atque stipante subtegmine. *Decimum* excellit columbinum ovum *abochtocatl*. Alii *quitlahochocatl* dicunt. In tanta mole nullius veneni est. Aliæ apud Caribes aranæ exæquant dimidium malum citreum, sed cruribus exiguis. Dentes illis longi & acuti. Elaborant telam satis constantem (posset foeminis pro calanticis) & cum ora seu fimbria texunt. Ab lui potest & alba redditur. In aliquarum telis si passer incidat aut alia volucris, irretietur. *Undecimum* *Lavalava* Aranei parvuli sunt; aureique, & punctis rubris distincti. Vulnus est noxium, ictusque agit in insaniam, membrisque subinde stuporem inducit, non sine anxietate & dolore. Præsidium est rubæ prioris *tambalaguisæ* & *pilipoc* singulorum tres obolos tundere, atque ex vino palmarum resolutos deglutire; aut oleum cujus mixtionem narravit Franciscus Hernandus inter plantas novæ Hispaniæ, illinere vulneri. Cavendum tamen primis tribus diebus à potu; aut si bibendum sit, vinum palmarum aut nostratum, quod præstantius est, sumendum; præterea ab aëre & sole. Vivunt in pratis herbiferis Philippicarum insularum.

PUNCTUM III.

De Phalangiis & Tarantula.

Tantum de innoxiiis Araneis, *Noxii* Phalangia vocantur. Nomen accepit, quod internodia terna in cruribus habeant. *φάλαγγες* enim digitorum internodium propriè significat. Italiæ ignotum inquit Plinius: ac nunc tota meridionalis ora illis abundat. Singula in reti pariunt, & magno numero incubant: cumque ipsa proles increverit, matrem amplexa interficit & ejicit. Nec parcat patri si ceperit. Foeminam enim incubatu adjuvat. Pariunt autem & trecentos. Æstate duntaxat venenati morsus esse Alexander ab Alexandro prodidisse ait Moufetus: quod tamen de Tarantula duntaxat sumendum est. Circa specierum enumerationem haud

levis est inter Authores differentia. Plinius, similis *Formica*, *Lupi*, *Rhagionis*, *Asterionis*, *Tethragnatii* mentionem facit. Aëtius sex genera enumerat; *Rhagium*, *Lupum*, *Formicarium*, *Cranacalapteren*, *Sclerocephalum*, & *Scolecium*. Nicander illis quæ Plinius attulit, addit *Rhoga*, *Cyanei*, *Agrostis*, *Dysderi*, sive *Sphæcium* & *Formicarium*. Basilii decem Phalangiorum genera dicit, sed non describit. Avicenna, in *Aegyptiacum*, *Nigrum*, *Rutilum*, *Rachen*, *Album*, *Citrinum*, *Uveum*, *Formicarium*, *Cantharadeum*, *Vesparium* & *Orabaten* distinguit. Nos sedecem eorum genera, nempe *Formicarium*, *Venatorem*, *Rhagium*, *Stellatum*, *Cæruleum*, *Sphæcium*, *Tetragnathium*, *Cantharideum*, *Ervestre*, *Cranocalapteren*, *Sclerocephalum*, *Scolecium*, *Lanuginosum*, *Appulum* seu *Lentiginosum*, *Cretense*, & *Brasilianum* ponemus; iisdemque illa, quæ Moufetus minora phalangia vocavit, cum similibus adjiciemus.

1. *Formicarium*, seu *Myrmecion*, prægrande, est formicæ simile sed multo majus; ruffo capite reliquâ corporis parte nigra, albis intercurrentibus respersum guttis. Aëtius, cervicem cineream facit, dorsum veluti astris insigne. Ad ejus morsum adeò somno obruuntur ægri, ut in sempiternum *παραπνικτον* tandem incidant.

2. *Venatorem*, Nicander *ἀγρῶσεν*, Aëtius *λύκον*, quod Aldrovandus qui cum Pulice Aristotelis eundem credit, non probat, vocat. Muscas, vespas, culices, apes, tabanos, vespas venatur: & inde nomen sortitus est. Corpore est lato, volubili, rotundo. Circa os tres eminentiæ enascuntur. Partes circa collum incisuram habent. Doloris expertem plagam infert.

3. *Rhagium* ut Aëtius vocat, *ῥαγὴ* Nicandro, *ῥαγὴ* Æliano, ab acino uvæ nigrae similitudine dicitur. *Figura* est rotunda colore nigro, splendente corpore & globoso, pedibus brevissimis (apud Ælianus *μικρὰς πῆδας* lege) & quasi imperfectis, ore sub alvo dentato. Accumulatis pedibus movetur, & velocissimè incedit. Non multum ab Aristotelis *Mordace*, abludit. Ab ejus morsu exiguum quidem vulnus, sed genæ & oculorum inferiores partes rubescunt: totum corpus inhorrescit: urina emittitur, & semen profunditur. Æliano Lybicum duntaxat animal est.

4. *Stellatum*, idem cum Rhagio esset, nisi stellatis quibusdam & virgulis niveis, pinguibus illis & lucidis distingueretur. Solus ejus Plinius post Nicandrum meminit. Icti enervantur & elumbes fiunt.

5. *Cæruleum*, *Cyaneum*, Plinius lanugine nigra hirsutum sed perperam vocat: Nicander *πεδῆγοι*, quod sublimibus utrinque & longissimis pedibus incedat. Ictus ejus

Aëtius
13. c. 11.

Plin. H.
N. l. 29.
c. 9.

Aldrov.
l. c.

Ælian. H.
A. l. 3.
c. 36.

Plin. H.
N. l. 29.
c. 4.

Alexand.
ab Alex.
dier.
2. c. 16.
Differen-
tiæ.

ejus vomitum araneosum, lypothimiam, coma & mortem concitat.

6. *Sphecium*, Vespiforme, Nicandro *δυσδρεμ*, à crabrone rubicundo penna tantum differt, & vehementer rufescit. Solo tactu venenum ingerit: & speculum crystallinum levi transcurfu, Scaligero teste, confregit. Lento veneno tabem inducit.

Ælian.
H. A. I.
17. c. 40. 7. *Tetragnathium*, corpore est latiore, subalbulo, pedibus scabris. In capite duo prominent tubercula, unum rectum, alterum latum, ut videantur ora duo & maxillas quatuor habere. Magnus eorum circa Arrhatam in India numerus, exitio incolis fuit, ut *Ælianus* prodidit. Unum est cinereum, posteriore parte candicans, quod telas muscis in parietibus latissimè pandit. Aliud, cui caput medium linea una alba, & transversa altera distinguit. Locus ab eis percussus inalbicat, membrum ad articulos gracilescit. Cinereum Nicander morsu venenum infundere negat.

8. *Cantharideum* parvum est, specie Cantharidi simile, colore flammeo ruberrimo. Invenitur messis tempore in leguminibus. Pustulas excitat, mens perturbatur, lingua balbutit, &c.

9. *Ervestre*, quod in ervo provenit. Eadem quæ præteritum edit: & equos devorantes, juvenaque, siti exardescere, mediaque crepere censetur.

10. *Cranocalaptes* Dioscoridi *κισσαλοκρέτης*, quia prætereuntium capita ferit, seu per filum descendat, seu se præcipitem det. Phalænæ papilionis specie est, capite nutabundo, ventre gravi, corpore oblongo, colore viridante. Aculeum in summo gestat. *ἐν τοῖς φύλλοις τῆς περσέας πρέσθαι, καὶ τὴν πύλιν ἐχέει ἄνοιαν ἐν ταῖς κύστις φύλαις.* Unde Scholiastes nobis insinuare videtur, alatum esse. Quidam Tarantulam esse opinantur. Plinius lethiferum nimis ipsius vulnus ponit: Nicander & *Ætius* nullo negotio sanari

11. *Sclerocephalum*, caput habet saxi duritie: totius corporis lineamenta illis animalculis similia quæ lucernas circumvolitant.

12. *Scolesium* longiusculum est, & maculis quibusdam, præsertim circa caput, variegatum. Earundem cum *Cranocalapte* & *Sclerocephalo* virium.

13. *Lanuginosum*, grandissimo est capite: quo dissecto inveniri dicuntur duo vermiculi, qui mulieribus, corvinâ pelle ante sobolis ortum adalligati, præstant ne concipiant: estque hæc vis eorum annua, ut *Cæcilius* in Commentariis reliquit. An sit virulentum, nemo determinavit.

14. *Lentiginosum* Moufetus appellat, quod *Apulum* & *Tarentulam* à Tarentino agro, vel fluvio Thara alii. Reperitur quidem & in Calabria, Sicilia, Romanisque campis, æstivis mensibus: sed sine ullo ad saltandum incitante veneno. Aldrovan-

mus idem cum *Solipuga* facit. Multiplex est specie. Aliud est cinericium, albis nigrisque maculis: aliud dorso cinereo, rubris aut viridibus: quoddam mole majus, fibris nigris, excinerea rubroque emicantibus, aut etiam virgulis subinde undatim per corpus porrectis. Moufetus & fuscii meminit, cujus iconem Pennio ab Italo mercatore datam, damus; & *Crocei* clarique, quale *Ægyptum* dare scribit. Effigies à *Kircher* exhibitæ, *Francisci Corvini Pharmacopæi Romani Musæo* debentur. Visum & illas quæ ab Imperato habentur adjungere. Mira venenum ictu infusum *Symptomata* excitat. Alii perpetuò currunt; alii rident, plorant alii, alii clamitant, dormiunt, vigilant, vomunt, saltant, sudant, tremebundi fiunt. Nonnulli coloribus ita delectantur, ut iis conspectis, in lypothimiam, nisi potiantur, incidant. Exemplum *Kircherus* habet. Alii, verba sunt *Kircheri* accuratè ista exponentis, Musica incitati, in saltus prorumpunt gladio evaginato, vel alterâ armaturâ fulgidâ & corusca (quo fulgore vehementer afficiuntur) gesticulantes; variaque corporis agitatione, & ridicula prorsus gesticulatione, nunc eam dextera, nunc sinistra, nunc ore excipiunt; nunc in altum gladiatorum more projectam dexterè recipiunt, nunc in terram projicientes, pugilum more veluti duellum inituri adeò peritè tractant, ut in palestris publicis instructi, omnes artis regulas observare videantur; modo verbis quibusdam obmurmurantes, eam veluti incantare, nunc prono, nunc supino corpore super eam sese distendere solent & extensi sic aliquantisper, veluti novo *Enthusiasmo* excitati, ad novos conflictus, saltusque hinc inde lymphaticorum more debacchantes accingere solent. Alii, quæ res maxima admiratione digna est nunquam quiescere solent, nisi vitreum vas plenum aqua manu circumferant, cum quo eosdem gestus, quos glandiatores fecisse diximus, peragunt. Quidam ardentè videre desiderant in medio loco saltui deputato, conchas aqua plenas, circumdatas viridibus herbis, potissimum arundinum foliis, quibus uti & aqua maxime delectantur, intra quam brachiis & manibus quin & capite toto non secus ac mergi, & anates, concussione alarum aquam veluti ventilantes, sese identidem submergere solent. Nonnullos quoque non sine risu videas milites id duello conflictantes, quosdam temulentorum vario jactantium personas induere; alios Hispanicis verbis ad pompam & gravitatem affectatis nescio quem ducem & gubernatorem agere; visi sunt quidam, qui ex arboribus cruribus penduli hæreant, eaque pendiculatione multum afficiantur, hoc affectu laborant potissimum

Kircher.
Artis
Magnet.
3. parte
8. cap. 2.

num ii, qui à Tarantulis fila ex arboribus ducentibus feriuntur. Multi denique postquam aliquandiu saltarunt, sedentes manibus tam fortiter collidunt genua, ut aliquam gravem passionem calamitatemque suspiriis & voce miserabili egerere velle videantur. Alii etiam per terram extensi, tali impetu & vehementia manibus, pedibusque terram concutiunt, ut epilepticis ac lunaticis non multum sint ab similes.

Venenum principio parum sentitur: anno elapso, ad saltus violentos cogit: bimestri spacio, appetitus frustratio, febres ardentes, artuum dolores, *καχέξια*, ictericus dolor, &c. infestant. Unicum in Musica remedium: quæ pro diversitate veneni variat. Aliqui afficiuntur, *inquit Kircherus*, tympano quodam vulgo, (surdastro) plectris ligneis utraque parte pulsari solito, cui consonare faciunt, ut plurimum fistulam pastoritiam, vulgo (la Zampogna rustica de pastori) sonus autem multum à Turcico illo superius dicto participat & ob vocum gravium acutarumque jucundam commistionem multum auribus gratus est. Alii ut plurimum cantu recreantur, cui Auletarum, sive tibicinum strepitosa musica conjungitur: delicatioribus sonantur testudines, lyræ, cytharæ, clavicymbala simul concordata; mirum tamen est, quod non omni tono musicæ, sed certis tonis afficiantur, si enim tonus harmoniæ humori veneni pungitivo, vellicantique non fuerit proportionatus, patiens tantum ab est, ut aliquid inde levaminis acquirat, potius miserabiliter eum hoc improporcionado ad humorem sono torqueri contingat: quod satis insolitis suis gestibus ut oris oculorumque distensione, brachiorum, manuum, pedumque complosione, totiusque corporis in hanc, nunc in illam partem contorsione, similibusque gestibus quantum sibi istiusmodi musica contraria sit, demonstrat; qui tamen mox ubi ad amicam harmoniam converti ipsum contigerit, veluti ex tenebris in lucem emergens, agillimo motu in saltus pristinos, amico modulamini auribus oculisque admotis veluti applaudendo erumpit; durabitque spectaculum eo usque dum veneni vis frequenti saltu, pro isto anno excitata, aliqua ex parte sudore evaporavit: atque ita tandem unius anni spatio cum morbo constituuntur induciæ.

Harmonias apud eundem vide. Contrariari unam ratione Musicæ alteri Hispanus quidam Tarenti, nimis incredulus, suo exitio expertus est. Morsibus enim à colore & qualitate diversis, ultrò acceptis, cum remedium à Musica quæreretur, ab uno quidem medulo se ad saltandum sollicitari sensit, sed qui à contratio cohibe-

retur. Observatum in civitate Andria, palatio Ducali, & hoc, bestiolam ad proportionatum humori sonum saltasse. Quod si citharædi in plures incidere, nunc hæc nunc illæ tripudiare, pro ratione modulorum comperiuntur. Causa tantorum Paradoxorum apud Kircherum vide.

15. *Cretense* sic describit Bellonius. Infecta sunt, parva, admodum perniciofa, Araneo paulo majora, octo pedibus prædita, utrinque quatuor: singuli pedes seu crura quatuor articulis constant, binosque ungues habent incurvos: bina utrinque crura anteriora illis data sunt ad progrediendum, bina posteriora ad retrocedendum, obliqua in terrâ foramina inhabitant binos pedes alta, quæ retrocedentes ingredi solent, atque cibum ita attrahunt: aditum foraminum quæ inhabitant stramine muniunt, ne obturentur, sed aperta maneant. Corpore sunt superiore parte cinereo, binis rubentibus maculis anteriore dorsi parte insignito: inversa autem, nigris maculis notata conspiciuntur ea parte quâ singuli pedes corpore inhærent: venter flavet. Si quis autem scire cupiat quâ parte nocere queant, eorum os intueatur, & binos parvos nigros aculeos deprehendet, iis similes quos Scolopendra obtinet, quibus mordent atque cibum retinent: relas Araneorum more texunt, musciisque & papilionibus vescuntur. Circiter sexaginta ova ponunt, & pectori adhærentiæ fovere solent, pullosque exclusos ventri inhærentes gestant donec adolefcant. Piloso sunt corpore: quoniam autem magnitudine differunt, foramina pro corporum magnitudine excavant: variare autem inter se pro insularum diversitate observavimus. Immortale est dissidium inter exiguum hoc animal & Vespæ cujusdam genus à Latinis Ichneumon vocitatum.

16. *Brasilianum* Marcgravius depinxit, incolæ *Nhamdu Guacu* appellant. Araneus maximus sive Phalangium. Totum corpus tres & semis digitos longum & bisectum. Anterior pars major est & penè duos digitos longa, susquidigitum lata, subrotunda ac compressa: posterior magis orbicularis, nucis Muscatæ majores magnitudine & figura. Sesquidigitum longa. In dorso medio versus posteriora foramen habet umbilicale. Capite caret speciali, sed supra os in anteriori parte corporis ocellos habet minimos splendentes, instar punctulorum; & ad utrumque oris latus prominentiam unguiformem, semilunarem, semidigitum longam &, ita binos dentes, quibus pro dentiscalpiis utimur auro inclusis. Crura habet decem, utrinque quinque, priora duo prope dentes duos digitos longa, & præter duplicem articulationem qua corpori conjunguntur, quatuor habentia internodia,

Bellon. obs. serv. 12.

Marcgr. H. Brasil. l. 7. cap. 3.

ternodia, & in extremitate unguiculum curvum, nigrum, splendidum retrorsum versum. Secundi paris crurum, quodlibet penè quatuor digitos longum & præter duplicem articulationem propè corpus, alias quatuor habet articulationes. Tertium par tres & semis digitos longum, totidem articulationibus. Quartum per tres digitos & paulò amplius longum, cæterum ut præcedentia: omnia autem crura, in extremitate duo habent exilia cornicula nigra, & bisecta ut cancri. Prope anum habet duos processus semidigitum longos juxta se positos, fili crassioris crassitie, quibus nere solet. Totus araneus vestitur cute pilosa brevibus pilis, nigris ad visum, ad tactum instar holoserici. Per totam autem superficiem crurum partis posterioris, laterum & processuum, qui dentes continent, pili copiosi sunt insparsi, ex albo & gryseo rubidi coloris. Tota posterior sectio corporis in adultioribus plerumque nuda est pilis, & cutis ex albo incarnata. Vescuntur muscis & aliis insectis. Diu vivunt: nam ad biennium in scatula me aluisse memini, qui certo tempore, cutem exuerunt integram, dentibus etiam adhærentibus, nova subtus generata.

Ad *Minora* & *Phalangiis* similes bestiolas, refero, *Pulices*, *Phalangia parva* Bellonii, & *Tungam Brasiliensium*. *Pulices*, *ψύλλαι*, apud Ælian. sunt procaces, cacuminati, salaces, & assultim incedentes. *Pitheci* simiive nuncupantur. *Oribates* nonnullis, quod in arboribus, præsertim montanis reperiantur: *Hypodromi* etiam, quod sub foliis degant. Animalia sunt pilosa: ventre leniter inciso ut sectio notata filo videri possit. *Phalangia parva*, vel potius animalia phalangio similia, Bellonius in itinere à rubro mari Cairum versus observavit. Octonis erant prædita pedibus, id est, utrinque quaternis, & dum equorum crura conscendebant, mirum in modum eas divexabant. *Tunga* Brasiliensium, Floridanis *Nigua*, aliis *Ton*, Hispanis *Bicho* vocatur. Eadem cum pulicello Oviedi & Scaligeri superius adducto. Insectum est parvulum, inquit *Marcgravius*, figura pulicis, nigricantis coloris, duos cirrhulos in capite pro barbâ habens, in pulvere more pulicum generatur, & pedibus se insinuat, potissimum plantæ, digitis & sub unguibus imò & manibus aliquando vidi. Statim autem quando intravit pruritum excitat, qui certum indicium est, itaque *Tunga* statim acicula eruenda, nam si sinatur, tridui aut quatriidui spacio sobolem progenerat innumeram, lendum modo, quæ folliculo pellucido rotundo magnitudine pisi includitur, huic insidet *Tunga*; hic folliculus acu eruentus & manet in carne foramen rotundum ejusdem magnitudinis, quod spon-

te sanatur, vel inspergitur pulvis pyrius. Crepitant unguibus uti ut lendes. Familiarissimum malum, sed quod magis per negligentiam incrementum sumit quam per se.

CAPUT III.

De Insectis apteris duodecem & quatuordecem pedum.

ARTICULUS I.

De Erucis in genere.

INsecta aptera duodecem & quatuordecem pedum sunt *Erucæ* de quibus in genere & specie dicendum est. *Nomen* vel ab erodendo obtinere, quasi erodæ, quod frondes, olerum inprimis abrodunt: vel ab hærendo, ut Apulejo placet, quod pertinaciter adhærescant. Plinio, si Turnebum sequimur, dicuntur *Uruæ*, quod prata & arbores urant. Columella hirsutas, Ovidius *agrestes tineas* vocavit. Græcis dicuntur *κάμπαι*, ab undoso & arcuato gressu, quo se rependo curvant & attollunt, & *πρωξυλλίδες* ab erodendo. Fortè & *πρασσυρίδες* apud Hesychium, *πρασσυρίς*, inquit iste, est *ζῷον χλωρὸν κέρρον τὰ ἐν τοῖς κήποις λάχανα*: est animal viride rodens in hortis olera.

Magni omnes arbarum & herbarum heluones. Hinc Philippus parasitus, *erucam se thymo & oleris vefcentem* dixit. Aliæ frondem depascuntur, aliæ florem. Cum rodunt eduntve, sonum quendam qui *πρίσμος* dicitur edunt, ut Scaliger notavit.

Circa *ortum* dissentiunt authores. Aristoteles eas è virentibus foliis brassicæ nimirum aut raphani oriri tradit, semine scilicet milio formi, sub autumno ibidem relicto; unde vermiculi nascuntur. Ex his vermiculis trium dierum spacio erucæ fiunt; morituro vere; quæ auctæ satisque alitæ motu cessant, ac ineunte autumno cum Chrysalide formam vitamque mutant. Plinius rorem calore solis densatum in follis relinqui tradit; unde Erucarum genus speciemque omnem deducit; cui suffragatur Arnoldus. Alii earum originem papilionibus ferunt acceptam; quæ simul ac aureliis exiverint, supra vel subtus vicina folia: ova quædam (stercora vocant Barbari) excludunt, pro ratione sui corporis majora vel minora: horum aliquot testæ cœruleæ, aliorum flavæ, albæ, nigricantes, virides, rubentes, quatuordecim ferè dies fota solis calore, rupto cortice Eruculas excludunt, parvulis lumbricis similes, sed coloratas; quæ primo ortu famelicæ, foliis floribusque devorandis totæ incumbunt, præcipuè illarum arborum atque plantarum, quibus olim in ovo fuerant.

Aldrov.
H. Inf. l.
c. 4.
Nomen.

Turneb.
Adversar.
l. 18. c. 16.

Nutrim-
mentum.

Scalig. sup.
Throph. l.
5. de cap.
plant. c.

19.
Genera-
tio.
Arist. H.
A. l. 5. c.
19.
Mous. Th.
Inf. 2. c.
24.

Ego singulis his modis oriri posse non dubito : maximè vero humidis temporibus cum humor resedit , inprimis si acrior sol post uſſerit.

Natura.
Mouf. l. c.

Ubi devorandi tempus præterit , vagulæ huc illuc & jejunæ migrant, sensimque marcescentes fame, aliæ intra , quædam supra terram , locum idoneum quærunt, ubi sese vel filo appensæ in aureliam membranâ rectam, vel in nudam thecam transformant. Hoc media æstate si contigerit, post viginti quatuor dies rupto cortice evolat statim papilio: sin adultiore autumno, per totam hyemem durat aurelia, nihilque ante calorem vernalem excludit. Nec tamen omnes in aurelias abeunt, sed aliæ, *volvæses* nempe putrescunt, è quibus nonnunquam ova quasi tria excidunt, Cantharidum vel muscarum matrices. Quando serò papiliones coivere, ova ad verusque proximum depromunt, vitalia: ut in Bombycibus usu venit, quorum ova per uncias librasque vendi apud Hispanos notum.

Uſus.

Habent in *Medicina* locum. Oleraceas cum oleo inunctas, tutos à venenosorum morſibus reddere, *Ægineta* scribit. Tela & involucrum epotum, muliebrem fluorem sistit. Ligustrum depascentes non solum Cyprium piscem mirè hamo obductæ alliciunt, sed & earum fimus naribus inditus, Epilepticis ab utero mulieribus statim succurrit, si expertissimæ obstetrici, à qua Moufetus habet, credendum: Uſta & naribus indita hæmorrhagiam cohibet. Vesicas omnes excitant, & cutem deglubent. Equus si devoraverit, tumores surgunt, arescit induraturque cutis, oculi excaventur. Omnes hortis, pomariis, herbis & floribus sunt infestissimæ.

Damnum.

Remedia.

Remedia apud Geoponicos, & qui de re rustica scripsere, occurrunt multa. Pelluntur, felle tauri, si eo arbores illinantur; sulfure pauco, si cum stramine sub arbore accendatur; terrâ sub esculi arboris radice effossa, si in horto spargatur; scillâ, si in hortis seratur, aut suspendatur. Alii mentham, eryum, absynthium, in hortorum ambitu serunt. Fumum è vespertilionum stercorebus, vel fungis sub nuce arbore nascentibus, excitant. Multi in ficulneo lixivio semina præmacerant. Nec malè post pluvias matutinis horis arborum rami & frutices olerum succutiuntur. Decidunt enim nocturno adhuc frigore torpidæ.

ARTICULUS II.

De *Erucis* inſpecie, & primò de *Erucis Mouſeti*.

PUNCTUM I.

De *Erucis glabris*.

ERucarum differentia infinitæ ferè sunt, seu quantitatem, qualitatem, & partes corporis; seu etiam actiones, & alia observes. Sunt glabræ, hirsutæ, magnæ, parvæ, mediocres; virides, nigrae, variae, rigidæ, molles, cornutæ, excornes. Plurimæ in aurelias, hæ in papiliones abeunt: quædam non, sed cum omnia depasitæ sunt, ipsæ quoque consumuntur & intereunt. Quæ aureliæ sunt, aliæ immediate in eas abeunt, & hæ non texunt, aliæ prius ova pariunt. Quarundem aureliæ leves & æquabiles; aliarum hispidæ, rugosæ, acuminatæ, asperæ: quarundam, ut duriorum, nudæ: aliarum musco vel capillis sericis obductæ. Plurimæ ex ovis papilionum nascuntur: quædam in arborum foliis ex semine proprio ibidem in tela per autumnum derelicto, vel rore aëreve illi incluso & putrescente. Quædam foliis, aliæ floribus, nonnullæ fructibus vescuuntur. Undoso & celeri motu plurimæ gaudent, aliæ placidè & lentè incedunt. Aliæ leberidem quotannis mutant, aliæ non. Quædam texunt, quædam non. Illæ vel more araneorum telas faciunt; vel folliculos sæpè adeò compactos, & duros, ut ne acutissimo quidem telo rumpantur, &c.

Placet & hic tam Mouſeti, quam Al-drovandi differentias ponere & describere. Illi vel sunt *ἐπιτογνῆς* sive affines à papilionibus & aureliis satæ: vel *αὐτογνῆς* & consanguineæ, ex sua tribu profectæ. Utræque vel sunt *glabræ* vel *hirsutæ*. *Glabræ* in *Bombyces*, de quibus post agetur, *virides*, *flavas*, *vinulas*, *fuscas*, & *varias* distinguuntur.

Virides sunt quintuplices. *Prima* quod ligustro insideat, *ligustrina* dicitur, cui vultum, ambiens circulus pedesque omnes, & recurvum in caudâ cornu, ex rubro nigrescunt; maculæ lateribus transversim inductæ dimidio purpurascens albicant: rubescunt punctula: cæterum verò corpus undique virens videtur. Altera *Sambucina*, quæ non multum ab ea differt, nisi quod undique viret, transversis illis maculis albiſſimis, & punctulis quibusdam lacteis exceptis. *Sambuco rosea* inprimis vescitur. *Tertia Lactucaria* ubique viridis in thecam sese fuscā appetente autumno vertit; olera comedit molliora, lactucas præsertim. *Quarta Mespilaria* minor

Mouſet.
Th. Inſect.
lib. 2. c. 2.
& 3.

nor est, undeque virescens in thecam cineream maculis nigerrimis conspersam sese recipiens. *Quinta Quercina*, omnium minima, in arboribus (quercu præsertim) fila ducit, per quæ descendit in itinerantium capita vestesque & galeros illaqueat; notissimum æstate animalculum, & ubique obvium rudi tela sese implicat autumnino ingruente, & rubro viridi theca inclusa, moritur hyeme, decem duntaxat pedibus donatur, ut superæ omnes. *Flavescentes* dicimus, quæ maximam partem flavent. Tales hæc figuræ repræsentant; quibus servatur quicquid à nigro liberum: id si pallidiori flavo infeceris, Icones habes depictas. Vivunt mollioribus foliis, præsertim tilia. *Vinula* elegans mehercules *Eruca*, & supra fidem speciosa: in falice eam invenimus avidè pascèntem: labra atque os illi subflava, oculi anthracini, frons purpurea, pedes extremumque corpus herbacei, cauda bifurcata ex vinaceo nigricans. Corpus universum veluti crassiflore rubicundoque vino intinctum; quod à collo per scapulas decussatim transiens, ad caudam usque linea albißima, mirifice adornat. *Fusca Porcellus* *Eruca* dictus, ex fusco nigricat, major præsertim; in minore quos vides orbiculos, albicant: trifolii palustris foliis frequenter insident, eaque mira celeritate devorant.

Varie decem sunt, quæ conspiciuntur. *Prima* cærulea, oculi nigerrimi; corporis cuticula cæsia, nigris flavisque punctulis multum conspersa: in aurellam convertitur spadiceam, alba membranula vestitam, brassicas amat, & genus universum naporum. *Secunda* caput, pedes, caudamque nigerrima obtinuit, cancelli quadrati, flavi sunt: intus quæ pinguntur tessellæ, striis nigris glaucisque alternatim in longum ductis destinguuntur. Fœniculum amat, anisumque atque cuminum. *Tertia* ex albo viridis gibbosa in incessu graditur; est enim utrinque sepes duntaxat, sicuti omnes *Ureæ*. In aureliam echinatum mutatur, colore furvam: oleas absomit. *Quarta* draconium depascens viperam maculosam refert: incedit semper capite erecto, & pectore potissimum se sistit: amat juncos, & fluviis innascentes plantas pappiferas. *Quinta* descendentes costas si obsoleto minio infeceris, pauca in Icone habes quæ desideres. In *Sexta* quod album vides, ochra impleas: gaudet utraque populo nigra, eaque sese ingurgitat. Striæ in *Septima* ductæ ex flavo albescere debent: reliquum totum corpus fusci coloris in aureliam spadiceam se vertit. *Octava* cinerea videtur, ex nigricante undulata: thecam facit nigro-puniceam, è qua pulverulenta *Phalæna*. *Nona* varia quidem, & meritò cenferi debet: incisurarum orbes virent; cornu caudæ refle-

xum, cyaneum: sub qua miniata macula ad ornatum facit. Media incisurarum pars cinerem æmulatur: aurelia demum includitur *Xerampelina*, hanc in via publica invenimus: gaudet ranunculo pratensi. *Decima* glauconigra: quod enim hic album est, id glauco superinducto bestiam exprimet. In thecam spiralem transmutatur dilutè cæruleam, spiris subrubentibus, quæ ad buccini conchæ formam proximè accedit. In Solano sylvestri (quam Itali *Belladonnæ* vocant,) glabra eruca provenit, crocei viridisque coloris, cornu in fronte gerit digiti longitudine; quam se sæpius vidisse memorat Cardanus.

PUNCTUM II.

De Erucis hirsutis densius pilosis
Moufeti.

Pilosæ omnium maximæ maleficæ, vel densiore sunt pilo, vel rariore. Ex illis sunt, *Pityocampe*, *Ambulones*, *Coriaria*, *Polymida*, *Neustria*, *Tuberculosa*, *Mesoleaca*, *Urticaria*, *Brassicaria*, *Sepiaria*.

Pityocampes, id est pineæ piceæve, *Eruca*, digitum minimum crassitie æquant, tres digitos transversos longæ. Undecim incisuris inter caput & caudam constant, sedecimque (more reliquarum) pedes habent: nempe juxta caput utrinque tres, medio corpore utrinque quatuor, & ad caudam extremam utrinque unum. Priores vero sunt adunci & exiles, quibus viam tentant; reliqui latiores, & multis crenulis ferrati, ut foliis firmiter insistant. Caput formicæ; reliquum corpus *Erucis* vulgariibus simile. *Hirtæ* sunt pilis, villisque rectis undique obseptæ: pili in lateribus nati albicant; in dorso fulgent, cujus pars media maculis veluti oculis ornatur. Villis abrasis, cutis sub est nigricans; pili valdè exiles: pungunt ramen quàm utrica acrius, maximumque dolorem, ardorem, febrem, pruritum, inquietudinem adducunt: veneno scilicet subito sine sensu vulneris infuso, & ad partes visceribus proximas delato. Telas subtiles quales aranci texunt, prioribus pedibus fila ducentes, ac disponentes: has, veluti tentorium, nocte ingruente subeunt; tum, frigoris tum ut procellarum vitent incommoda: tentorii hujus tam tenax & subtilis materia est, ut nec ventos curet furentes, nec imbris inundet. Amplitudo item tanta ut vel millia plura *erucarum* facilè ferat. In ramulis *Pini* & *Piceæ* suprimis nidificant, ubi non solitaria, (ut aliæ) sed gregales vivunt. Quacumque iter fecerint nentes fila ducunt telaria: primaque luce (faveat modo serenitas) catervatim minores majores comitantur, ac viduatis fronde arboribus, (omnes

enim absumunt) textrinam strenuè colunt. Solæ pini piceæque pestes, ad alias coniferas arbores non accedunt. In Atho monte; nemoribus Tridentinis, atque transalpinis convallibus, (ubi frondis nutritiæ copiam) admodum abundant, ut Matthiolum testatur. Virulentissimæ profecto bellæ, sive extra premantur manibus, sive intus exhibeantur: tam certissimi veneni olim habebantur, ut Ulpianus legem Corneliam interpretans de Sicariis, in eorum numerum & poenam, Pityocampæ propinatore vocaret: Alium ff. ad legem Corn. de sic. Haustis Pityocampis dolor os & palatum graviter affligit; lingua, alvus, ventriculus ab erodente veneno valde inflammantur: Etiam ingens dolor excruciat, licet initio pruritus quendam jucundum passum videntur: insequitur æstus, cibi fastidium, & perpetua, sed irrita vomendi dejiciendique cupiditas. Tandem nisi occurratur, adurunt corpus, & ventriculo crustas inducunt, Arsenici ferè modo. Diosc. Æt. Plin. Celsus. Galen. item 11. simpl. cap. 5. & Avic. sos. cap. 25. Hac de causa Ætius & Ægineta mensas sub pino sternere, vel commorari, noxium dixerunt, ne forte cibi nidore jussulorum vapore, vel clamore hominum Pityocampæ suis sedibus motæ, in escas decendant, vel femina saltem æque lethifera demittant. Qui ab his læsi fuerint, ad Cantharidum antipharmaca respiciant: liberabuntur enim iisdem remediis: propriè tamen melinum oleum (quod è Cotonis & oleo temperatur) ad vomitum usque bis terve hauriendum est, ex Diosc. & Ætii præscripto. Generantur vel potius regenerantur (convolvulorum more) è semine Autumnali in tela certis vesiculis relicto, vel ex ipsis Volvocibus putrefactis ut Scaligero sentire visum est.

Ambulones dicimus, quibus incerta domus & esca: unde superstitiosulè peregrinantium modo vagantur, & (ut mures) semper comedunt alienum cibum. Quare Angli eos *Palmerwormes* appellant, ab erratica nimirum vita, (nusquam enim consistunt) quamvis ratione hirsutiei *Bearewormes* dicuntur. Certis foliis aut floribus non astringi se sinunt, sed audacter percurrunt delibantque omnes plantas ac arbores, & pro arbitrio vescuntur. Undecem ponuntur. *Primo*, quas vides in latere maculas albas, tales revera esse debent: corpus universum nigrescit, pili inferiores omnes subcrocescere oportet; superiores vero omnes in dorso positos canescere; tribus iis ordinibus exceptis, qui in collo juxta caput nascuntur: ii enim eundem cum ventris pilis tenent colorem. Ex cujus auriâ exit, quem hic vides papilio; cujus iconem coloresque & naturam superiorilibro descripsimus. Si *Secundo* collum, ventremque atque

ibi nascentes pilos flavos feceris, non est quod plura expectas. Theca ejus fusca videtur; ova pallida, papilionem inde nascentem superiori libro expressimus. *Tertius*, toto corpore pilisque è fusco flavus, nisi quod maculæ lateratim in unaquaque incisurâ obliquatæ lateant, caput puniceum furca quadam nivea ornatur. *Quarto*, venter atque inferiores pili infuscantur, dorsum atque superiores ex-fusco flavent. Linea in facie bifurca feri colorem vel lac dilutum refert. *Quinto*, vultus spadiceus, ventris latera canescentia; corpus pusillis varium guttulis subluteis, atque hæc supra, piceis: pili quasi radioli exeunt flavi, arguti illi quidem, & medio acuminatius crescentes: multum vicinas herbas & segetem lædit. *Sextus* colore est leucophæo, nisi incisuræ nigris lacteisque hic illic maculis essent infectæ. Setæ infra supraque natæ, & tanquam ferratim posita, hispidæ valde sunt & rigidæ, sed à colore corporis non recedunt. *Septimum* cute nigra, pilis autem nonnihil lutescentibus donatum, *Peniculum* vocare soleo, quia utrinque ex fronte atque etiam in uropygio peniculus erumpit mollis, colore coracino. Quas vero cuneiformes in dorso eminentias conspicias, radice lacteæ; cæterum, nigellæ videntur. *Octavus* murinum colorem exprimit, cujus in dorso cunei septimi illius respondent. *Nonus* coloris peregrini & rari; singulæ enim incisuræ variis ab invicem coloribus, sed mixtis invicem omnibus pinguntur; quas clavus, quamque argenteus pulcre adornat. *Decimus* inter naturæ luxuriantis lusus, non minus elegans quam rarus; nigris, cœruleis, viridibus, atque luteis liris, & nervis scabris striatus: quos guttulæ quædam aureæ mire efferunt. Pilos admodum molliculos gerit, miræ gratissimæque viriditatis, thecam habet purpuream, membrana munitam. *Undecimi* incisuras albicantes, prasinæ imaginare; vellusque & pilos medio virentes facito.

Corylaria undique cum virore pallet, tribus inter cuneolos maculis nigris exceptis, & cornu illo in ultimo dorso, & quasi uropygio crescente, quod rosaceum ruborem latè suscipit. Coryli præcipuè foliis insidet, unde *Corylariam* dicimus, duas illarum species vidimus; alteram saturatè; alteram pallidius viridem.

In *Polymitis* multiplex naturæ venustas resplendet: quibus licet faciem Æthiopis Maurivè tribuit, vestem tamen concessit *Polymitam*; vario opere, verò artificio fulgentem. In fronte pili, veluti in cirros nexi nodosos, antennas referunt; quales item in ultimo dorso; cutis iridis æmula, orbiculis splendet murice inebriatis, quos veluti latos clavos costis affixit natura. Vellere enati pili fulgorem solis repræsentant, oculosque oculato die perstringunt.

Neustrias è Normania duas accepimus. Majori vultus cœruleus, albis, rubris, caësisque surculis corpus liratū; pili aureo splendore coloreque grati. Minor convolutus, echinum exprimit: Caput illi nigerrimum, corpus glastinis quibusdam guttulis variè perfusum: pili croceum fulgorem imitantur. Tuberculosa pyri germina corrumpit, capite atrato, corpore nigris rubentibus, & lacteis quibusdam liris ornato; mediis quasi humeris, & ad finem ferè dorſi, tumuli sive tubercula assurgunt livida, albis punctulis conspersa. Ova è quibus nascitur, spadicea sunt; qui est etiam aureliæ, & pilorum color. Aliam vidimus congenere, sed duntaxat tumulo gibbosam.

Mesoleucam à capite ad dimidiatum dorsum, obsolete luteam, dein liliaceam peperit natura. Venter luteo cinereus, clavis medio tessèrato fixis ornatur.

Urticariæ pedes si fatisciente luteo leviter tetigeris, parum à naturali icon differet: rigidulos & erectos pilos habet spinatim crescentes. Levi tactu vulnerant; primumque blandum, sed venenatum pruritum, deinde vix ferendum dolorem superinducunt. Haud defunt qui eam Pityocampes malitiam malignitatemque vincere asseverant.

Brassicaria, eruca capite est cyaneo, corpore flavis surculis duobus utrinque lineato: interquos subcassia quasi area nigris quibusdam seminibus consita videtur: pili aureliæ (quæ cinerascit) colorem obtinent.

Sepiaria binæ offeruntur. Majori crocesceret vultus, nisi quem nasi loco triangulum videtis liliasceret. Corpus albis flavis rubrisque & nigris, (quas expressimus) maculis, nullo ordine locatis, variatur: pilis subluteis horret. Sepes populatur, & nudat frondibus: ubi tamen serici rudioris relicto glomo, in thecam spadiceam, quasi in Sarcophagum se recipit. *Minori* facies subcœrulea, uti & totum corpus, absque maculis quibusdam nigris albicantibusque esset: pilos cum prima concolores sortita est.

PUNCTUM III.

De Erucis rarioris pili Mouseti.

Rarioris pili sunt *Geranivora*, *Iacobæa*, *Antennula*, *Echinus*, *Rubicula* & *cornuta* illa bestiola, quam Germani *Porneworm* appellant.

Geranivore magnitudinem formamque ritè hic dedimus, & affabrè explicatam. Albas maculas, cingulos nigros ornantes, ferrugineas facere oportet; ventremque pedesque & album inter cingulos spatium porracea, viridi ornare. Camerarius ad Pennium hanc misit, cum hac Hypographe: *Eruca grandis*, hortis tantum agrestibus victitans, & potissimum *Geraniopallustri* *βυτταχουδῆ* infesta.

Antennulate corpus varium: à capite ad tertiam incisuram cretâ illitam diceret; quinque aliis sequentibus nigrocineream; tribus iterum postremis cerussatam: *Antennulæ* ex pilis veluti colligatis constant; quales item ultimo dorso, cristæ instar, se erigunt. Quatuor illi erecti in dorso cirri, è pilis quoque sunt dentatim ordine crescentibus.

Iacobæa sive Senecionem majorem depascens eruca, capite pedibusque obsolete purpurantibus, ventre pallidiusculè virente; corpus habet inamæno viridi fatiscens, & nigris flavis flammeisque maculis ornatum. Pilorum color ventri consonans.

Echinorum duas animadverti species; unam è cœruleo virentem, alteram *Mesoleucen*. Primus *Echinorum* tessellato prodit corpore, ex nigro flavoque varius: spinæ luteæ videntur; ineunte autumno in aureliam cineritiam vertitur. Secundus reverâ *Echinum* præ se fert; dorſi dimidia pars, prior nempe, ex flavo nigricat; posterior cum flavedine albescit; spinas gerit argutas valde & crassas, colore cæſio.

Rubicolam nigro cineream liris utrinque tribus pallidè flavescens pinxit natura: pilos rariores gerit, plane nigros.

Est & *Cerastes* cujus varia loca è luteo virent, pili medio dorso nati canescunt; cornu vero crenatum rubescit.

Varia item in verbasco, lupulo, *Scrophularia*, *Glycypicra*, *Solano*, *Alno*, *ulmo*, *ocymo* & *Tithymallo* nascuntur: imo quævis panè herba peculiarem habet erucam vastatricem: quas, ne infinitus videar, quasi notas pertranseo.

Gesneri fetida: *Eruca* cornutæ simillima est, sed & cornis, & colore aliquantum discrepans. In muro repentem cepi exeunte Augusto Anno 1550. Gravem spirat odorem, ut planè venenatam crederes. Iracunda perrexit capite cum anterioribus duobus pedibus semper erecto; cœcam puto: digitum longa & crassa, paucis sparsim pilis per dorsum & latera horrescens, dorsum nigricat. Ventr̄is laterumque color ex flavo subrufus: internodiis quatuordecim totum corpus distinguitur. Singula internodia sulcum insuper quendam ceu rugam per dorsum habent: caput illi nigrum, duriusculum; os forcipatum, denticulatumque vel ferratum: his forcipibus, quicquid comprehendit, mordet: pedibus 16. graditur, ut maximam partem omnis *Erucarum* natio proculdubio venenosa est. *Vergerus* *Pityocampen* putavit, alii *scolopendram*: sed pedum numerus non patitur *scolopendram* dici. Vix ferebam odorem, dum vivam describerem: duo hypocausta nimio & abominabili fœtore adeo infecit, ut manendo ferendoque non essem. Hæc *Gesnerus*.

ARTICULUS III.

De Erucis Aldrovandi.

PUNCTUM I.

De Erucis primæ Tabule.

Aldrovandus sex diversis tabulis nobis diversa Erucarum genera exhibet. In prima novem exhibet. *Prima* primæ tabulæ ex maximis est, & caudata, cauda nimirum instructa sursum revoluta: tota est lutea, annulis verò cœruleis, iisque triangularibus, inter quorum singulas singula ab utroque latere nigra sunt puncta. Os item nigricat. Cum eam aliquo tempore domi aluisssem, telam non texuit, aut folliculum, sed in Chrysalidem immutata Papilionem progeneravit luteum, eum quem in prima Papilionum tabulâ tertium exhibuimus. *Secunda* quæ ejusdem est magnitudinis, identidemque caudata, leviter lutescit, subfusca tota, nigerrimis punctis, ac annulis instructa. *Quarta* ex mediocrium genere, etiam caudata est, ad latera sublutea, per tergus flexibus arcuatis coloris elegantissimi miniacei decorata, annulis verò nigris, sed qui candidis notentur punctis. *Tertia* caudam habet in extremo acutissimam tota viridis, annulis nigris, pedibusque, qui sunt quatuordecim Brassicas, & olera infestat, ex hoc potissimum genere Papiliones illi exiguo corpore progenerantur, subvirides & albicantes. Papiliones enim erucarum suarum colorem ferè reserwant, ut Aristoteles quoque testatum reliquit. *Quinta* ex maximis est, colore flavo, & viridi, & lineis per dorsum latistriangularibus, viridibus, & punctis maculata purpureis. Caudam gerit semper erectam, & caput etiam erectum, quare cum incedit, incessum carnis quodammodo æmulatur. Cauda hirsutis quibusdam villis præmunitur, parteque infernè notabilem habet maculam nigram. Ligustri foliorum esu gaudet. Sedes habet quatuordecim. *Sexta* corpore major est, rostro, & pedibus exilioribus, colore tota eodem, sed dilutiori, lineis verò transversalibus flexuosis magis ad cœruleum quam ad viridem inclinantibus: Inter singulos annulos, singulis infrà notatur punctis nigricantibus, nam cætera puncta, quæ per supernum corpus conspiciuntur, ad purpureum vergunt. Supernè per tergus color magis est luteus, infernè ad pedes magis viridis. Degit plerumque in viti sylvestri. Cauda superiori similis. *Septima* toto est flava, infernè ad croceum vergente colore, lineis distincta supernè triangularibus ut in quinta, sed cœruleis, & quæ punctis consperguntur atris. Pedes

& rostrum nigricant. *Octava* admodum est exigua, caudata tamen, maximâ sui parte nigricans. In tergore lineas habet binas admodum exiles, luteas, inter quas altera est lata, viridis. Caput habet rotundum, pedes quatuordecim, in extrema alvo appendicem, quam per terram trahit; cauda pro corporis portione majuscula est. *Postremam* paulo rudius, quam par erat, pictor expressit: nam puncta illa candida, quibus modo majoribus, modo minoribus toto corpore conspergitur, obscurè admodum apparent. Tota colore ferè est ferrugineo, extremo alvi, cauda, pedibus, & capite rubris, rubra item linea lata à capite, ad anum usque per dorsum extensa fertur. Anterius corpus exilius est, quam extremum, extremumque exilius medio, sanguisugam dixeris.

PUNCTUM II.

De Erucis secundæ tabule.

Quæ in secundâ tabulâ dantur Erucæ, omnes ferè bicaudæ sunt: in quibus hoc notandum est, quod caudæ sint in extrema alvo, cum in iis quas pinximus in prima tabula, in extremo dorso sursum enascantur. *Prima* tota purpurascit, præterquam inter primum, & secundum flexum, ubi viridis est. Binæ item lineæ, eo quo pictor expressit modo à capite ad extremum usque alvi extenduntur, candicantes. Cauda utraque nigricat. Pedes habet quatuordecim. *Secunda* caudis duabus instructa minimis tota atra est sed luteis interstincta zonis. *Tertia* corpore est crasso, & compacto, ex luteo virescente zonis annulisve admodum viridibus, capite verò, quod exiguum est, & primo flexu coloris aurei. Pedes quatuordecim habet, nigricantes; caudas exiles, proceras. *Quarta* brevissimis est caveis; oblonga, sed exili, ac tenui corpore, tota ferruginei coloris, exceptis annulis semicircularibus, qui ab imâ parte flavi sunt, ab altera nigri. *Quintam* monstruosæ quodammodo figuræ, quod partim ex Eruca, partim ex Araneo constare videatur, *Ἀραχνοειδὴς*, sive Erucaraneum nuncupavi. Sex primum à capite ex primis corporis flexibus pedes Araneorum pedibus simillimos emittit, dein interpositis aliquot flexuum intervalis, alios octo more Erucarum, quas alioqui toto corpore refert. Tota ex cinereo ad luteum vergit, sed annuli coloris sunt planè castanearum, sicut etiam pedes, & alæ. Insolentis profecto etiam formæ est, quæ *sexta* in hac serie ponitur; capite scilicet, cum id contrahit, compresso, facie Muris, aut felis, sed nigra. Supra enim rotundam illam nigredinem linea est alba, sub qua puncta duo, nempe ab utraque ejus parte unum, nigra; velut aures efformant, in medio verò nigre-

nigredinis puncta alia duo oblonga nasum, qui illis animalibus admodum est compactus, tria denique alia sub his minima, aliquo rudi modo æmulantur. Tota est viridis, corpore pallidius, intensius annulis. A capite ad caudas usque porrecta linea alba per medium corpus transfertur. Caudæ eriguntur, & punctis atris consperguntur. Pedes numero quatuordecim, quorum qui posteriores sunt, admodum sunt crassi: *Septima* eadem est naturali situ procedens. Rursus *Octava*, à primo loco depicta differt tantum in eo, quod primo post caput flexu sit luteo, duobusque punctis nigro distincto: item, quod lineæ illæ, quæ per superiora feruntur, inter quintum, & sextum flexum; invicem conjunguntur: denique, quia in hac sub inferiori linea, inter singulos flexus, album sit punctulum. *Nona* eadem est cum secunda, bis per errorem depicta: infestum est hoc genus brassicæ. Habes *decimo* loco Scolopendram terrestrem parvam, sed de hac suo postmodum loco. *Undecimo* loco depicta exhibentur Erucarum ova lutea; simul conglomerata, exigua. *Postrema* Erucarum minima, in frumento inventa est. Insectulum hoc tam tenui, ac exili est corpusculo, ut potius fili cujuscumque particella, quam animalculum videatur: longum est digitum transversum. Maximum tantillo in corpusculo robur adverti, velociter movetur, & nunquam ferè à motu cessat. Pedes multarum Erucarum more habet quatuordecim. Capite nigricat, cætera cinereus. Sex integris diebus nihil edebat.

PUNCTUM III.

De Erucis tertiæ tabule.

Tertia nobis novendecim exhibet. *Prima* Echinata ipsius videtur Hippocratis, zonis luteis, & punctis nigris, & candidis variegatur: quam, vel saltem simillimam superiori ad me allatam æstate sic descripsi. Vermis est digitum, & medium longus, posteriore parte caudæ vicina latior, quam anteriore, duodecim constat annulis, sive segmentis, sive flexibus, qui supini nigro colorati sunt, linea medium dorsum secante castanea. Interstitia annulorum pallent. Caput duabus appendicibus velut corniculis armatur. Sex pedibus, tribus utroque latere ante instructus graditur; postica parte Erucæ instar arcuatur, quâ latior est. Quatuor in eo villorum in penicilli formam adunatorum ordines in singulis annulis conspiciuntur, bini singulo latere: unus superior ad marginem dorsum, alter inferior ventri propior, ille octonos annulos ultimos eminentibus penicillis ornat, hic novenos. In ultimo, quem caudam dicas, extant duo, colore omnes ferrugineo.

Convolvitur inglomum ad instar vertibuli; quemadmodum etiam, *quæ subsequitur*, quæ in orbem convoluta depingitur, simillima ex toto cum illa, nisi quod in hac inter singula interstitia puncta candida non sunt, quæ illic summam conciliant venustatem, contra in hac puncta iisdem locis nigra sunt, & semicircularibus maculis ex albo lutescentibus ambiuntur. *Tertia* tota aterrima est, sed castaneis tantum interstincta zonis & punctis. Supina parte, quæ quarto loco depingitur, minus nigrescebat. *Quinta* tota longissimis vestitur villis densissimis, fuscis, sed & ipsa eruca tota ad latera fusca est, supina lutescit, pluribus prædita annulis nigricantibus, à capite ad extremam alvum linea item nigricans defertur, mediam alvum distinguens.

Loco *Sexto*, quæ datur, ex minimarum genere est, quin etiam paulò minor quam pictor expressit. Nisi moveri, aut incedere videas, alvum à capite vix interstingues. Pedes habet innumeros. Toto corpore coloribus miniaceo, nigro, luteo, & albo varia est. Caput totum est nigrum, nigri item pedes, nigra capillamenta, dorsumque & venter tergus miniaceo colore conspicuum est: annuli nigerrimi, inter quas supra punctum est album, infra luteum. *Septima* paulò major iisdem ferè coloribus variat, sed pedes tantum habet quatuordecim. Totum corpus quadrangularibus punctis constat, primò (à tergo ad inferna descendendo) nigris, dein flavis, tertio miniaceis, quæ latiores sunt: quarto iterum nigris, quinto flavis, sexto nigris, flavis rursus septimò, ultimò ac octavò nigris. Caput totum, ut in præcedente nigrum est, pedes item nigri. Sed capillamenta ferè ferruginea. *Octava* murem montanum, qui vulgo Marmota nobis dicitur, facie æmulatur. Tota coloris est castancarum, admodum hirsuta, longa palmum. Color propè annulos dilutior est. Cum invertit se color inter annulos apparet niger holoserici instar micans, & cum ingreditur, capillamenta quæ sunt à lateribus, ad cinereum vergere videntur. Caput totum est nigerrimum.

Nona ex mediocrium genere est, corpulentior tamen, tota viridis, exceptis tuberculis, quæ per singula annulorum intervallela, tria habet, & quartum in dorso, ex quo capillamenta, enascuntur similitudine penicillorum, quæ coloris sunt planè aurei. Os nigricat. Pedes anteriores lutescent, posteriores virides sunt; omnes numero quatuordecim. *Undecima* similiter per dorsum habet tubercula rotunda cum suis penicillis, nec non inter singulos corporis flexus, sed cœrulea, rostrum item cœruleum, & pedes præter tres anteriores, qui minores sunt, & coloris ex castaneo rubicundi, quo colore corpus totum constat. Durum mihi peperit folliculum. Pedum nume-

numerus corpori, flexibus respondet. *Decima* tota etiam est viridis, tuberculis, & floccis cœruleis, rostro & anterioribus pedibus ferrugineis; reliquis nigris. In alvo maculam habet ferrugineam. Habes *duodecimo* loco hujusce decimæ Erucæ expressum folliculum coloris ferè ferruginei, admodum densum, & durum. *Decimo tertio* loco picta tota hispida est: Linea candida à capite exorta ad caudæ finem per tergus fertur. In dorso duodecim habet velut puncta, aut potius tubercula rotunda, sex ad singula latera colore mali punici; item quatuor alia à singulis lateribus ex nigro ad castaneum vergentia; ex quorum omnium medio capillamenta quædam exeunt numero quatuordecim, quorum octo magna sunt, parva sex. Cætera per dorsum cœrulea, supina pars, & pedes flavescent. *Decima quarta* colore est ferrugineo, supernè admodum diluto, & ad luteum vergente, infernè admodum intenso. Annulos habet nigros, & punctis ad latera maculatur exiguis candidissimis. *Decima quinta* inter minimas majuscula est, colore tota flavo, infernè ad aureum, supernè ad castaneum inclinante. Caput & alvi extremum nigra sunt. In dorso nigra etiam habet puncta, sed intus candida: capillamenta penicillorum instar distinguuntur invicem. Pedes habet exiguos ferrugineos. *Decima sexta* eadem est, ideo picta, quod tacta se velut in vertibulum contorquens stellæ figuram exprimat coronatæ. *Decima septima* rubra est, annulis nigris & albis, ubique maculis variegata, capillamentis exilibus, rubicundis. *Decima octava* capite est coloris aurei, corpore vero toto cœruleo. Linea aurea nigris conspersa guttulis, rotundis à capite ad anum, usque per superna fertur. Ab utroque illius lineæ lateribus, rursus aliæ maculæ sunt, seu potius puncta minima nigra ipsa posita, ut etiam lineas duas, hinc inde unam efficere videantur. Alvi extremitas acuta est, & nigra, nigri quoque pedes, numero quatuordecim, licet quatuor ab utroque latere in anteriori parte pictor pinxerit. Capillamenta habet subtilissima plenè aurea. Ova mihi peperit candicantia, quæ appinimus postremo loco.

PUNCTUM IV.

De Erucis quarta tabula.

IN quarta tabula quatuor duntaxat dantur. Quæ primo & secundo loco, ex maximarum genere est; Alvum habet bifidam, & ex dorsi extremo, caudam exerit erectam. Toto corpore ferè unicolor ex luteo fusca. A cervice ad quartam usque vertebra lata est linea aterrima, exiguis aliis una recta, cæteris transversis candidis insignita. Su-

premo etiam vertice atro est, facie anteriore flava, pedes habet monstrosæ magnitudinis. Supina parte ad cinereum vergit. *Altera*, quæ *tertia* est in hac serie, tribus constat coloribus, viridi, aureo, & nigro. Corpore nimirum undique toto viridi, sed annulis nigris aureis punctis distinctis. Inter annulos singulos linea est annularis item sublutea. Pedes habet quatuordecim virides. Fructum nè arboribus an potius folliculum cujuspiam Insecti dicas, quod quarto loco depingitur; id Frat. Gregorius Capuccinus Regiensis mense. Julio anni 1597. in abiete offendit. Folliculum esse arbitror: erat enim intus plenum telis Araneo similibus. Inerant & ova. Quare cum Erucas aliquot ova edere observaverim; Erucæ cujuspiam esse judicavi, eam hoc sibi fabricare operculum, ut ova ab omni externa injuria protegat. Figura, & colore maturas æmuletur olivas. Ejus exterior substantia erat cartilaginea, & variis exiguis tuberculis ceu punctis extuberabat.

Sed nunquid hanc Eruca ipsa texat, quod verisimilius est, vel aliundè Crabronum more allata materia conficiat, necdum didici. Fructum interim non esse abietis exemplo discimus, quæ conifera est; nisi quis dicat abortivum esse, quales multos observamus in quercu. Cùm reperiretur, non erat unicus, sed quatuor simul erant conjuncti: quatuor ni fallor Erucarum opus ac labor. Quæ in conjecturâ si fallar, lector boni consulat.

PUNCTUM V.

De Erucis quinta tabula.

IN 5. tabula sunt novem. Quæ primum locum habet, magnitudine est duorum digitorum transversalium, colore fusco, quaternis macularum nigrarum seriebus distincta: capite flavescente, toto corpore glabro; utrimque ad latera propè ventrem linea quadam flavescente insignito: subtus toto colore albicante. In brassica nasci rustici dicebant. *Secunda* descriptæ aliquo modo est similis, quo ad formam & glabritiem, sed minor tamen, coloreque castaneo magis diluto; capite duabus maculis nigricantibus insignitur. Ab eo ad extremum uropygium duobus macularum ordinibus, partim atris, partim luteis decorata est; & utrimque ad latera linea quadam rubescens per longitudinem fertur, cui in singulis annulis punctula quadam in medio candida, & in circumferentia nigra supersident. Parte supina tota dilutè lutescit. *Tertia* bina è lateribus frontis emittit cornicula exilia, & brevia: caput etiam habet parvum & nigrum. Toto corpore hirta est, & colore ferrugineo, annulis vero nigricantibus. Capillamenta

pillamenta penicillos æmulantur ubique, præterquam in cervice, & dorsi initio, ubi vix ipsa videntur capillamenta, quia rarissima sunt, & exilia admodum. Cauda etiam penicillis horret, quod nec dum in aliis vidi.

Quarta ejusdem cum secunda magnitudinis, colore est terræ illius, quam umbram pictores dicunt: Inter singulos annulos tria habet tubercula, ex quibus pili oriuntur penicillorum figura coloris castanei. Albicans vero linea per dorsum recta à capite ad caudam ducitur. Pedes anteriores magis, quam posteriores nigri sunt. Inter singulos quoque flexus à lateribus punctula sunt albicantia alternatim posita. Quod *quintum* datur in hac tabula, id dispari fructu nascitur. Celebre est apud Plinium aliosque probatos scriptores ad quartanam. Alibi de hoc insecto, hoc etiam prodidit loquens de remediis adversus dolores dentium. Is quoque vermiculus, qui in herba labrum Veneris appellato invenitur, cavis dentium inditus mirè prodest. Nam Erucæ brassicæ, ejus contactu cadunt. Idem mihi propriis ante multos annos manibus ostendit Cardinalis Paleottus: neque id amplius videre potui, licet multos fructus; diversis aperuerim temporibus; donec tandem an. 1592. sub finem Septembris cum fortè speculaturus, nunquid potius in maturis quam immaturis nascerentur, inveni illis, qui maturi erant. Longitudo digiti auricularis transversim dimens: sed cum nunc exactius descripturus id intuerer, offendi ex erucarum genere esse, nam quatuordecim progreditur pediculis. Caput atrore splendet, ut semen amaranthi æmulari quodammodo videatur: cætera albicat. Dioscorides etiam meminit, sed nemo veterum Erucam esse scivit. *Sexta* à lateribus leviter lutescit, infra, ac supra colore est castaneo, annuli quoque castanei caput nigrum, pedes exigui, sublutei. *Septima* pictura est induramenti cujuspiam Erucæ affabrè facti ex folio, quodam arboris, aliaque materia bomicina. Folium id extrinsecus multis velut laminis sericis albicantis coloris erat obvolutum; intusque quidem eodem modo, sed pluribus laminis intricatum erat. In centro, seu medio laminarum plurima ova, nigra, parva seminibus vel hyoscyami, vel nicotianæ comparibus, una cum foetibus etiam numerosis latebant. Ex quo docemur etiam Erucas esse, quæ & ova, & eodem etiam anno foetus edant. Aliud nidulamentum sive folliculus exhibetur loco *octavo*, figurâ pudendi humani. Inferna enim parte referebat quodammodo scrotum, superiore virgam, ac eò magis cum duabus, ut hæc instructum esse fistulis aut ductibus. Eo apertò vidimus rami frustulum, & folii pediculum figuram virgæ effor-

mare: hæc enim simul complicata Eruca filis obtexerat; sicut item folium, quod scrotum efformabat. Intus ut in proximè descripto, & ova & foetus delitescebant. Erant ambo isthæc nidulamenta ita undique clausa, ut ne hilum quidem aëris, ne dum pluvix admitterent. At cum ita undique clausa sint, quispiam quærat, quomodo ea ibi posuerit Eruca, cum hæc intus non reperiatur. Responderem ego texere quidem primo folliculum Erucam non totum, & in ea, quàm texuit parte ova edere, dein occludere, & abire, sed nunquid postmodum moriatur, aut in Aureliam convertatur, nec dum didici. *Postremo* loco depicta Eruca tota erat viridis punctis conspersa nigris, capite rubro.

PUNCTUM VI.

De Erucis sexta tabula

IN ultimâ quindecim depinguntur. *Prima* est tota viridis, lineis transversalibus, sed singulis tribus aureis punctis decoratis, quales in pluribus aliis observavi, annulis luteis, sub quorum singulis punctum est atrum: rostro etiam atro est, atris anterioribus pedibus, posterioribus viridibus. *Secunda* quoque est viridis, sed in hac lineæ nigræ illæ corpus ambientes latiores sunt, & binis tantum maculis aureis insigniuntur; præterea annulos habet nigros, & luteas, lataque velut è capite antennas emittit. *Tertio* loco habet figuram Cossi, de quo suo post loco separatim agemus, hic ideo positam, quod si posteriores haberet pedes, omnino esset Eruca. *Quartum* depicta Eruca glabra, ex minorum genere, toto corpore ex viridi lutescit, sed annulos habet nigros, & inter singulos puncta oblonga tria, itidem nigra. Caput rube- scit, retro; quod duobus minutissimorum punctulorum nigrorum ordinibus conspergitur. Pedes quatuordecim nigricantes. Habes *sexto* loco Erucæ suæ involutæ folliculo rubicundo Chrysalidem, sive Aureliam. Ad tactum tantum mobilis, & tota viridis est, & nigrum habet inter singulos annulos punctum, quod supra candicat. Habes deinceps aliquot Geometrarum icones, ideo hic adjectas, ut quomodo ab Erucis differrent, unico intuitu conspicias. (Geometras eas voco, quòd hominis Geometræ ferè instar incedendo agros dime- tiantur) Pedes enim in hisce animantibus contrario sese habent modo, ac in Erucis, quibus nimirum antèrius pauciores sunt, posterius plures (loquor autem de iis quæ habent quatuordecim) cum Geometræ sex habeant antèrius, posterius etiam totidem, in medio ventre nullos, quo fit, ut eo, quo pictura prima ostendit, modo incedant. Aristoteles huic Erucarum

generi nomen non dedit, sed appellat ^{ἑρucas}, hoc est, Erucas, quæ undatim incedunt. Parte enim, inquit, innitentes priore contrahunt sese, adducentes posteriorem, arcuatimque incedunt, & ex his scribit nasci ^{πινία}, & ^{ἀκία}, quæ Gaza vertens Acias, & superas dixit. *Prima* tota lutescit supernè, infernè ad ferrugineum accedit: A lateribus inter singulos flexus punctulis nigris maculatur. Quæ subsequitur eadem est extenso corpore depicta. Caput candicat, pedes nigricant. Nona in hac serie Geometra est omnium minima, tota viridis, vel potius coloris herbacei, excepto capite, quod rubicundum est. *Decima* pictura ejusdem est in spiram revolutæ: nam si tangas, eo modo se contrahunt, & caput celant, contra pericula, ac injurias. *Undecima* ex minorum genere est, corpore coloris ferè ferruginei, à lateribus lutei. Pedes, caput, & extremum caudæ habet nigra. *Duodecima*, rursus ex vulgatissimarum Erucarum, quæ brassicas infestant, tota herbacei coloris, exceptis annulis, qui lutescunt. *Decima* tertia ejusdem coloris herbacei, sed annulos habet aterrimos; serici instar splendentes; præterea inter singulos annulos rotundos habet velut oculos luteos, & in medio horum nigerrima puncta. Caput luteum est, punctisque nigris minimis maculatum. Quod *decimo tertio* loco depingitur insectum, corpore quodammodo Erucas æmulatur glabras, sed pedes habet ab utroque latere ternos, quanquam bini tantum à pictore expressi sint: toto corpore est nigerrimum. Epidauro id allatum mihi donavit Antonius Maria Alberghinus Philosophiæ & Medicinæ D. eximius, inquit illius pulverem ad strumas curandas remedio esse peculiari, ac præstantissimo. Ex minimarum genere est *postrema* Erucula, tota ferè cinerei coloris, annulis vero subluteis.

ARTICULUS III.

De Bombyce.

Nomen.
Aldrov.
Hist. Inf.
l. 2. c. 4.

Bombycis historiam separatim nos daturos supra diximus. Stamus ergò hic promissis, additurî insuper & de *Chrysalide* seu *Aurelia*, aliquid. Eruca ista ^{βόμβυξ} est Aristoteli, Hesychio ^{ἐλκμήτρα} seu ^{ἐλκμήτρα}, ut quibusdam placet; Ambrosio & Basilio *vermis Indus*; Alberto, *vermis lanificius*, Baptistæ Pieræ, *Erucæ bombicevora*; Scaligero *Ser*; Ausonio, *Ser vestifluus*: Pausaniæ *Seres*.

Descriptio.

Omnes septem habent annulos: Pedes quatuordecem, anteriores sex, qui minores sunt, posteriores octo, qui post tertium annulum incipiunt: postremæ duæ

omnium sunt maximæ, supra quas cauda est acuta & surrecta. Inter singulos annulos macula conspicua est nigra. In dorso inter eosdem annulos, quatuor sunt Semicicla literam G majusculam formantia, quorum priora evidentiora sunt postremis, quæ nempè tam sunt exigua, ut visum ferè effugiant. A capite ad caudam usque linea per dorsum medium fusca fertur. Rictus omnibus idem, porcorum ferè similis, oculi magni, & nigri, uropygium caudæ piscium ferè specie.

De generatione & aliis, hæc nos olim in Naturæ admirandis diximus. Vermis primo est, Folliculo inclusus emoritur informis. E folliculo denuo prodit alatus papilio. Itaque insectum reptile in volatile per medium Zoophytum motus atque sensus expers, admirabili metamorphosi commutatur. Exclusus enim primo vermiculus, alimenta quærit copiosa, quibus avidè depastis, capitis crebra arrectione cum veterno veluti luctans, tandem obdormiscit triduum vel biduum, pelleque interea exutus ad consueta redit alimentata. Cum quater pastus, quater obdormiens, quater renovarit, spreto deinde pabulo sublime petit, & virgultis conscensis, alvo rite purgata, lanificii rudimenta inconditis primum mæandris per ramos exercet, mox folliculo inclusus pellucido, indefessi laboris fructum è centro ad circumferentiam protrudit pilum album, viride, flavum, ovali figura, cum æqualibus veluti certans, novem dierum spatium: absolutoque operi immoritur. E folliculo loco subterraneo depositus, papilio post decimum diem prodit cornutus, sed alarum alimentique immemor, brevis ævi jacturam foetificatione reparaturus, molli impositus velleri, concubitu perpetuo per triduum, rarius quatrimum foeminae connexus, emoritur; nec multo post vidua, relicto post se instar granorum milii semine, centenario fere, mariti fata sequitur. Sed de his & aliis quæ circa bombyces occurrunt, accuratissimè egit, *Andreas Libavius*, in sua observatione, quam hic in gratiam Naturæ indagatorum appono.

Cum difficile sit singulorum auctorum sententias & experimenta ad amussim explicare, quæque illi diversis temporibus aut locis observavere, ad unam historiam revocare, proque hujus fide damnare vel astruere, quod quisque verum usu & notatione rerum deprehenderit: ubi forsan eveniet, ut nec Plinius, nec Pausanias, nec cæteri, qui videntur secus ac à nobis cognitum est, commentati esse, repudiandi existimentur: adjiciam specialem historiam bombycum domesticorum, quam anno salutis reparatæ 1599.

Roten-

Rotenburgi ad Tubarim ipse ex diligenti istorum cura & attentione ad naturum, & opera consignavi, vel utique in diarium conjecti. Si quid diversi in India, Græcia, Italia, & alibi aliis temporibus, ministerio, educatione, consuetudine, & cæteris, perspectum est: quanquam natura dicatur semper agere eodem modo, nec nisi accidentibus variare: id quoque conferent, qui notaverint, ut sic ex multorum experientia naturæ historia accipiat incrementum & absolvatur.

Circa vigesimum quintum Aprilis ova bombycum in charta simplici superiore anno procreata, & per hyemem in tepidario cubiculi servata exponebam Solis radiis per fenestrales orbes incidentibus. Quæ plumbea seu nigra erant non quidem omnia uno die in eruculam abibant, sed tamen ante finem ejus mensis cuncta, sub auroram potissimum vermibus erumpentibus, prout quisque perfectionem suam erat consecutus, relicta vacua testa seu putamine coloris albi, in latere orbiculo eroso, qua in parte extremitates nonnihil nigrescebant, propter terminum rodendo acceptum. Punicea, & citrea, sive puta, sive nigro puncto discreta, nihil edebant, quod vel intacta fuerant masculo semine, vel principium in eis suffocatum. Hæ eruculæ intra ovum nanciscuntur suam speciem, & in circulum convolutæ jacent, unde exesa testa primum nigrum splendentque caput exerunt, postea tractim prorepunt osculo, & pedicellis nisu suo, & in pavementum impactione, adminiculum præbentibus. Statim tunc notavi filamenta ab osculis dependere eaque tenuissima ut vix conspicias nisi obvertas luci. His sese librant, pendentque à foliis, aut etiam sicubi delapsæ ex altiore loco eum repetunt, vel experiendi gratia suspenduntur, multiplici flexu involvunt, atque ita sursum contendunt, more vulgarium erucarum arborum folia & flores depascentium. Vermiculus niger est & pilosus cum albo circulo, in confinio pectoris & cranii, & alio in ea regione, qua venter contingit pectusculum, eique cohæret, qui tamen ob pilositatem non est admodum conspicuus in prima ætate. In fine dorsi, ubi est alvi exitus, pinna quædam parva prominet: Et plane cætera forma eadem est cum bombycum specie, nisi quod hirsuties & nigredo per aliquod pellis mutationes in glabritiem splendentem, albedinemque transmigrant, & ex parvula bestiola fiat vermis, medium digitum viri mediocris tribus articulis junctis longus, crassus ferè auricularem, quanquam non omnium eadem sit magnitudo.

Invenias aliquas eruculas cum caudæ plectro triplici, aut duplici, ita ut majus furrigatur ex circulo ultimo dorsi: Minora

ex subjecta statim lorica caudæ. Unum vidi majus hinc inde binis stipatum minoribus, in quorum loco aliàs duntaxat sunt protuberantia puncta.

Progressio erucarum est ut bombycum. Nam caudæ fulcra pavimento infigunt, & postea tractim per circulos sese promoveant, sublatis primo partibus, inter caudam & pedes posteriores: postea his fixis interstitio inter pectus & pedes, donec ad pectus ipsum & pedes anteriores sit perventum, quibus hærentibus cauda vicissim tollitur & fulcitur gressus. Nam motus animalium fit aliquo quiescente & stabilimentum præbente. Natis statim præbui tenera mori folia, in quæ transtuli eas cultello levi, vel etiam fivi per se irrepere in folia, cum quibus eas cistellæ ligneæ demandavi, invadunt autem folia ab extremitatibus & planitie superius inferius. Non enim impediunt rostri appendices. Ita pascebantur ab Ultimo Aprilis, & circiter, usque ad Octavum Maji, quo animadverti primam senectam positam, quæ erat oscillum nigerrimum splendens cum exili nigra pelle. Solent autem aliquando ante quasi cunctari, & dormire somnum renovatorium, siquidem somnus est appellandus. Abjecta senecta, statim apparent grandiores, leviores, & nigredine dilutiore. Nam corneum capitis tegumentum, quod subnascitur veteri, secundum proportionem majus est. Detracta pelle, etiam intumescit reliquum corpus, quasi prius incrementum prohibuerit angustia corii. Idem tegumentum seu cranium capitis, cum recens est, albicat, postea cum firmatur itidem evadit nigrum, donec plures procedant mutationes; Sicut autem ante positionem leberidis abstinere esca, ita & post aliquantulum quasi pigrescere videntur: nam tenerius est instrumentum quam ut carpere folia possit. Dum percurrant folia, non raro altera alteram transit, idque patitur ea placide nisi nimis offendatur. Tunc enim sublato pectusculo capita concutiunt hinc inde motitantes, idque etiam bombyces faciunt. Semel atque iterum tunc prebentur pabulum, & angusto in loco degit multitudo. Cum satis comederunt, ad dormiendum inducuntur. Tunc videas eas instar statuarum, aut eorum qui catocæ laborant, pectusculis sublatis cum osculo in foliis quasi obriguiffe. Sed si pabulum novum injeceris, statim excitantur & comedunt rursum. Olfactu videntur folia deprehendere nova. Nam etiam nondum tangentiæ erectione corporis affectant. Fieri tamen edem etiam alteratione quadam qualitatis tactilis putes. Excrementum alvi tunc exile est, & nigrum instar pulveris pyrij.

pyrij. Decimo sexto Maji aliquæ secundo mutarunt pellem, aliquæ quieverunt, & sequentibus diebus exuerunt membranas. Rumpuntur eæ in capitis confinio hærentesque foliis manent, eruculis per circulos ordine motos sese expedientibus, oscillum etiam non statim cadit, sed pendet aliquanto spacio ab ore novo.

Tunc color niger in gryseum mutatur, & erucæ grandescunt magis. Pectus tamen album conspicitur, plenumque succi adeo, ut pellucere credas. Quoniam autem non uno die omnes mutant corium, si placet, potes pares ab imparibus segregare. Sed ego una reliqui, tantumque recentibus suppeditavi novam escam, cæteris in veteramentis adhuc conviventibus, & metamorphosin exspectantibus. Non enim tunc potes stabulum expurgare, sed differendum negotium est, donec evigilarint, & possint in folia pellici nova. Tertia mutatio incepit 22. Maji, quo dormierunt multæ, aliquæ etiam pellem devolverunt. Ea non amplius tam nigra erat, sed albedinem præ se ferebat cum oscillo, ipsique vermes exhibant candidiores, relicta fenestra, corrugata magis quidem ea, quæ non adhærebat foliis per filamenta, minus autem ea quæ affixa erat. Nam hæc in longum porrigebatur trianguli specie; ratione altitudinis. Etenim deorsum acutum surgit è medio, quod quidem ego fieri puto per caudæ apicem ea traductum & elevantem corium. Extremitas posterior hujus leberidis est instar caudæ piscium bifidæ. Pascebantur erucæ liberatæ rursus usque ad 25. quo somnum renovantem animadverti, & aliquas etiam eodem die novas: sed 26. dormiebant plures, aliquæ etiam 27. paucæ 28. & 29. ita ut jam majus esset discrimen. Quæ tamen dormiebant 27. eæ sequente mutabantur, & ad pabulum post cunctationem aliquam redibant.

Hac quarta mutatione ex erucis facti sunt bombyces glabri & albi, cum maculis tamen plumbeis, & oscillo albi cornu instar. Hic est mensis primus vitæ, & prima ætas. Sed cum in tertia & quarta renovatione cuticulæ omnia sint notatu facilliora, pateantque liquidius, uti observavi, accuratius paulo describam. Erucæ tertiæ & quartæ mutationi vicinæ, pellem habent subsquallidam aspectu, & rigidior quam vermis incrementum ferat. Itaque subtus nascente cuticula molli abscedit paulatim, & quia cohærent nerveis quibusdam vinculis utroque latere, qua sunt punctorum vestigia, hæcque non facile distrahuntur, major nisus est in exeuendo, & quies fere biduana.

Cum itaque foras contendunt, vetus oscillum corneum separatur à subnato novo, vermis ipse, siquidem affixa folio le-

beris est, pedes & cruscula convellit, modo contrahens modo remittens, donec exocreis vetustis eos extraxerit. Interim & cutis laterum corrugatur, corpore per squamas diviso in se contracto iterumque extenso. Sic toto corpore laxantur exuviae. Mox in anterieus sese promovet vermis, & lateralia vincula paulatim ducit, promotis ordine squamis iterumque reconditis ut fere initio dubites *πρὸς* an *ἐπί* exiturus sit vermis. Sed tamen isto modo vincula abrumpuntur. Primum juxta pectoris confinia observatur promotio. Ibi enim puncta secedunt, & duo in verme, duo in leberide apparent. Dum porro squamæ trahuntur, quasi linea violacea existit in latere utroque fenestræ, tum ob puncta, tum vincula intus applicata lateribus. Interim cauda rugatur, pedes exinaniuntur, prorepatque octava horæ parte vermis novus, vetus oscillum ori præfixum habens, ut mulus capistrum. Videas in extremitate caudæ etiam chordam albam trahi, qua pellis dorso cohæsit. Facilius enituntur effixi, solutis verò miris modis sese convolvunt in dorsum, latera, ventrem, donec tandem expediantur. Et horum leberis in globum fere coacta est, illorum vero extenta. Si duo extrema unguibus prehasas, & diducas, justam longitudinem recuperes, cum vestigiis pedum omnium & squamarum. Nihil enim deest præter oscillum. Longe autem candidior quartæ mutationis cutis est quam tertiæ, ut & cranium. Vermes ipsi jam bombyces sunt, modo recte & sedulo sint curati & enutriti, pingues candidique, quamquam alii aliis minus, adeo ut videantur nonnulli subflavi esse, alii ad plumbeum nonnihil accedere. Pedes & ora initio sunt mollia. Itaque & tactu foliorum & comestitu aliquantulum abstinent, hærent eis pertinaciter, & caudæ quidem adminiculo possunt retrahi & explicari, pedes autem posteriores obtusiores, crassioresque tribus quasi articulis constantes in medio nigrum punctum habent, quem ego puto esse prehensionis instrumentum, quod queat pro arbitrio, ut ungues felium, promi & recondi. Anteriores non tantum gradiendo inserviunt, sed & prensando folia, trajiciendo corpus, distribuendo fila & aliis usibus, partes secundum longitudinem à capite ad caudam in dorso sunt caput, gibbus seu tuber pectoris rugosum, octo semicirculares squamæ & tripartita cauda. Tuber pectoris in capitis confinio aliquibus albet, aliquibus distinctum est maculis duabus lividis, quas dividit linea flava, quæque diversis diversimode sese habent. Nam color aliis remissus, dilutusque & fere evanidus est, aliis intensior. Qua verò sese attollit ille gibbus, quatuor nodi conspiciuntur, quibus assistens

stens cutis rugosa efficitur. Sequuntur semicirculi; Hi junguntur membrana tenuissima tanquam linea viridante ex cœruleo. Ipsæ vero squamæ albent, quamquam in nonnullis aliquid plumbei subluceat: & cum jam maturi sunt bombyces serificio, spicei evadunt. Singulæ etiam in utroque latere insigniuntur puncto, quem ambit circulus parvus. Dixi ibi vincula esse, id quod etiam apparet in chrysalide. Deinde squama octava, aut duobus punctis lividis distincta est, aut semicirculis lunatis, quasi duas lunulas se mutuo respicientes cornibus inscripsisse. Veruntamen non sunt pares in omnibus. Nam alicubi magis sunt conspicui, alicubi evanidi, subtiliores, tenuiores, magis plumbei, magis albentes, &c. Hinc bini circuli leves post quos qui sequitur duos nodos habet, usque ad eum qui podici imminet, & apicem seu cuspidem furrigit. In majoribus observantur protuberantiæ in squamis singulis, sed tamen hæ sunt eminentiores in tertiis. Cranium ipsum corneum quidem est, sed divisum quasi in tres partes, dexteram scilicet & sinistram, quas putas oculorum notas esse, & deinde oris compagem, quæ iterum in appendices & maxillas suas, in quibus ferratæ dentium figuræ distinguuntur. Per totam dorsii longitudinem gula protenditur, usque ad fulcra caudæ, super quibus inter ultimam squamam est exitus alvi. Conspiciuntur etiam in dorso usque ad plectrum caudæ; quidam nervi continua diastole & systole mobiles, quo pacto moveri cor & arteriæ solent. Et hi nervi ex albedine flavent, cumque distrahuntur, viridem gulam, seu intestinum detegunt. Cohærent plectro, tanquam ibi esset respirationis quidam exitus, quamquam non respirent. Sed vitæ sedem ibi esse non est dubium, licet deprehenderim in nymphis partem quandam rubeam; ut infra docebo, palpitantem per se solam instar Cordis. Cum refecatur istud plectrum, exit humor liquidus subflavus, & vermes ipsi non quidem moriuntur, sed tamen moventur vehementius, seseque convolvunt, & reflectunt, ut judices dolorem exoriri acerbum, nerveo principio læso. Stercora cibum referunt, suntque sicca, sexangula, oblonga, quasi stellata, unde intestini vel alvi dispositionem quis colligere possit. Virent quidem ex esca, sed tamen quia stipantur dense, & exucca sunt, nigra apparent, sicut plus viridescunt humidiora. Fœminas à maribus distinguere hic jam queas si attentus sis. Evenit enim & in his, quod de aliis fœminis scripsit Philosophus, ut scilicet sint majores, & pinguiore, humidiores, molliore, condidioreque maribus, qui austeriores, maculis lividiore, tenuioresque. Si digitis attrectes, omnes frigere animadvertas; Sæpe se erigere so-

lent in pedes posteriores, & tanquam statuæ sic manere. Cum vesci volunt, foliorum margines, & venas protuberantes invadunt, contra ac erucæ. Puto obstare appendices oris, præstat tamen aliquit adjumenti pedum anteriorum in tenendo cibum officium. Excidunt autem folia circulariter, seu in orbem, ut lacuna maneat rotundi ambitus: Pasti secedunt, & conjuncti multi quasi cumulo quiescent, delectari puto mutua calefactione & tepore: ut dormientes à mutaturis pellem discernas, observanda erit nervorum in dorso systole & diastole. Nam in dormientibus par est vigilantibus motio, at in exuvias posituris tardior obscuriorque, ut intelligas tunc potius ægrotare. Deinde dormientes os habent simplex, sed senectam abjecturæ præferunt ossillum. Verum hoc non in bombycibus sed erucis adhuc locum habet, quidam jam quater renovati circa caput polluantur fulcedine, & tamen pergunt vescendo. Quidam non proficiunt admodum incremento, sed parvi manent.

Dictum superius est à Maji 25. quartam mutationem in pelle usque ad 29. ejusdem in diversis factam esse. Ab hoc itaque tempore usque ad Septimum Junii, & deinceps per octavum, nonum, decimum, undecimum, studiosè affectarunt pastum, itaque pingues & grandes evaserunt, fuitque ter die, & ultimis diebus quater, vel sæpius præbendus cibus. Nam cum serificio & maturitati sunt vicini, vorant contentius, invadentes folia cupidissime atque & nervos absumentes. Notabis autem circiter tredecim dierum spacium intercessisse inter renovationem quartam, & à cibo abstinentiam seu serificii meditationem. Respondent enim sibi tempora à 25. Maji ad 7. Junii, à 26. ad 8. à 27. ad 9. à 28. ad 10. à 29. ad 11. quo ultimam inclusi excepto uno parvo masculo qui diutius perseveravit in pascendo. Jam circa ultimos dies plerique incipiunt, spiceum colorem adipisci, qui à posteriore parte incipit evidentius apparere, hincque ad gibbum pectoris ampliari & progredi, quamquam aliqui magis & fere toti flavent, aliqui albi misto extulio manent. Cum fata instant secedunt ad latera capsulæ, nec adoriuntur folia ore, quamquam perreptent. Nonnulli ad angulos fila figunt, quasi jam exorsuri vestibulum: alii repunt per extremitates, & hinc inde speculantur, inquiruntque aptum latitandi locum. Inclusi plerisque cucullis chartaceis, quos alicubi commode disposui & affixi, in quibus rodendo, vellicandoque parietes aliquantum strepunt, sed postea alvi sicco & humido excremento (nam tunc duplex emittunt) projecto ex posterioribus parietibus chartæ affigunt ea tenacitate, ut glutine firmatam putes. Postea triduo continuo, occupati follicu-

lum pertexunt, quo absoluto, quintam ponunt pellem cum capite & cauda, transformanturque in nymphi; Aliquos non inclusi chartis, sed in capsula lignea dispositis ramusculis sibi sibi locum nidi eligere, ubi observes potissimum sequi angulos, & latebras, & plerumque multi eodem in loco bombycia faciunt, si fieri id possit; alii statuentes ea in rectum, alii in obliquum, alii in latum. Si locus est angustior, comprimitur à latere folliculus, nec plane ovalem tumorem retinet; est alius alio longior, amplior, densior, pro magnitudine & firmitate bombycis. Discrepant etiam colore. Sunt enim aurei, argentei, citrinique, & hi duplices. Quidam enim virorem referunt, quidam plus ad citrinum declinant, quamquam hi omnes ab aliis soleant virides appellari. Omnium prodromus, quantum ego observavi, albet, præter paucos, qui stupam subcitrinam præmittunt. Aurei aliqui etiam internam tunicam habent albam, nec est stabilis color citrinus. Nam cum explicantur ex aqua folliculi candidum fit filum, in lixivio flavescit, &c. Sed operæ pretium est, contemplari serici materiam, & quid sit id, quod tanta longitudine continuum præbet filum.

Cum itaque grandem vermem vagabundum conspicerem, funiculum collo injeci, & ad sectionem protraxi. Vixit pertinaciter etiam coarctata gula, exquisite sensit. Nam ad singulas incisiones dorsi, etiam vix applicato cultello, violenter se covolvit, quasi ore & anterioribus pedibus sibi opem laturus. Divisa cute conspexit longum intestinum, quale est lupi piscis, anteriore parte tumidum & capax, posteriore arctius. Ei intestino nervi seu arteriæ pulsatiles cum continua systole & diastole incumbabant, & desinebant in plectro caudæ. Hoc reciso, non tantum humor flavus perspicuus erumpebat, sed & capita nervorum; in motu inde sese exerebant, & agitatio fiebat languidior. Habet autem intestinum duplicem tunicam, unam externam crassam, alteram internam tenuissimam. Crassa sentit accurate, estque juxta gulam visciditate multa obductum, quæ postea fit materia alarum, & pilositatis in necydalo, sicut humiditas excrementitia externa in aureliæ putamen cogitur. Crassa tunica pertusa, exit intestinum, adhuc in vultum tenui, & multum cibi hesterni è foliis viridibus continet. Videre verò etiam est ex pelle secta, & crassa tunica intestini effundi liquorum sat copiosum & transparentem, quem ego puto pro sanguine esse, & mutari coctione in serici materiam, membræque bestiolæ. Capite præfecto extumescit initium gulæ, & plane exhibet obtusum nymphæ caput. Exempto intestino cum contentis fecibus in abdomine con-

spiciuntur specie lumbricorum concretiones quædam lentæ & glutinosæ, aliæ flavæ, aliæ albæ, & duæ quidem magnæ cæteræ parvæ, tam similes lumbricis ut nihil desit, nisi pellis & vita. Utrinque desinunt in acumen acutum. Situm autem in ventre talem habent, ut uterque apex versus sit ad caudam, corpus verò reductum & geminatum. Dico pensum esse complicatum. Si exordium filationis est ab apicibus, necesse est, ut ad os à cauda revo-centur. Existimo parvas & albentes portiones imbecillius sericum stupamque præbere, magnas verò firmitus. Exemi hos lumbricos, vidique in charta statim exsiccari, & fragilem duritiem induere, perinde ut bubulum gluten solet, ut tendines animalium & intestina, Homogeneum totum est, & pel-lucidum corpus hujus materiæ, quam nullus hominum queat in tam tenuia subtilia-que fila diducere, sed bombycibus hic labor est, ut araneis sua tela, relinquendus & solis dicandus. Corium exterius foris quidem albedinem plumbeo colore mistant habebat, sed intus subducitur cuticula partim livida, partim aurea splendente, ut in halece. Circa ventrem, ubi disponebatur materia serici, sat crassa substantia erat nerveis constans ductibus, & textura continente pinguedinem albam nerveis tunicis implicatam: talis postea etiam conspicitur in nymphis & necydalis, estque in his vulva & genitale membrum. Sub illa substantia plumbeæ sunt propagines in pedes dimissæ, tanquam tendines, aut chordæ. Pellis hæc manente matrice & genitali membro, intra bombycium exiit cum omnibus prominentibus membris: ita ut nympa & papilio inde natus nihil assument ex bombyce præter alvum cum intestino, & in his existentibus nervosis partibus. Humor autem in intestino & genitalibus subsistit sat multus. Unde postea & feminis materia, & excrementitia proluvies alvi. Veruntamen qui in intestino est humor, crudus adhuc est, & partim viret; partim flavet, crassus quadantenus, quadantenus aquosus. Si quis pinguedinem à verveis tunicis genitalium separet, & chartæ illinat, cum resiccata est, sebaceam friabilemque inveniet. Putes confereendam esse cum lactibus piscium. Patet ergo in bombyce foris quidem hæc membra esse, pedes triplices, squamosam ventris coarticulationem, pectus, caput, os, anum, pellem, caudam, plectrum: intus autem intestinum, vitales arterias, vel si mavis, nervos, carnem albam pectoris, genitalia, inter quæ & intestinum continetur, serici materia, & præterea panniculos membranasque nerveas, quibus continentur membra.

Cor habeant, nec ne, alius investiget. Necesse tamen est aliquod tale principium esse

esse, idque non in capite, nec alibi præterquam in confinio pectoris, unde vis vitalis per totum distribuitur. Et maximè tamen elucet motu nervorum, vel arteriarum (uti libet appellare) in dorso ventris, non pectoris, usque ad plectrum caudæ. De nymphis & necydalis posterius dicam. Nunc de praxi serici ducendi quæ observaverim addam.

Cum abstinent pabulo, & ut dictum est, locum folliculi construendi explorant, circa alvi exitum plerumque maculam virentem aut lividam habent, cætero corpore albo, cum virore, vel livore, vel spiceo. Vidi tunc etiam crebro consistere inter vagandum, & ore veluti hiscere, sicut ruminantes vaccæ, cum ex ingluvie revocant cibos ad masticandum. Consentaneum est bombyces tunc cornari materiam serici ad os convertere & protrahere. Si includas cucullo chartaceo, rosionis sonus subinde per integrum diem auditur, & tunc in conum cuculi demittitur excrementum primo siccum, pilulæ nigræ viridis, aut luteæ forma. Penultima pilula plerumque viret, ultima lutea est & flaviosa. Numerus pilularum pro excrementi copia est. Nam deprehendi in una charta modo duas pilulas, modo plures, usque ad duodecim diversicoloris, utpote nigras, virides, flavas, easque non stellatas, sed rotundas; Cum ultima pilula lutea exit aquositas item diversicolor & consistentia dispari. Alicubi enim crassior est, alicubi dilutior, habens aliquid punicei & flavendinis, virorisque.

Saniem tamen quandam dicas subcruentam vel fuscā, qualis apparet in charta pura, ubi tamen interdum notes etiam viriditatem pollutam flavedine, interdum quid cretaceum. In vitro lixivii faciem exhibet. Ne vero dubites, ore an alvo reddatur, scito, ore tantum expediri sericum, alvo excrementa, quamquam etiam ex ore emittant humorem tum moribidi, tum strangulati aut compressi. Deprehendi autem bombycem liberum è posterioribus utrumque excrementum reddentem. Ab aliquibus multus liquor excernitur, à nonnullis paucus. Qui multum vacuantur, videntur debiliores esse, & minus serici collegisse. Nam plerique parva bombycia texunt, non tamen omnes. Quali sericum sit futurum colore, ambiguum est. Nam contemplatione capitis, tergi, ventris, pedum facta, plerumque sum deceptus divinando. Nam non ejusdem coloris sericum ab omnibus ducitur, sæpeque stupa & postrema tunica albet, medium sericum aureum est. Putabam spiceos bombyces flavum, albos album reddituros, sed falso.

Nam album ab utrisque promebatur. Semel atque iterum scopum attingi, & vati-

cinatus sum, citrinam fœminam tale edituram filum; quale tamen etiam tractum est ab illo bombyce, cujus venter albo plumbeus erat, macula frontis flava. Vidi & fœmellam totam albam, album sericum fingere. In parvis angustisque chartis, juxta proportionem tamen vermis, minores fiunt folliculi, sed spissiores & minus stupæ. Notavi tamen in amplioribus etiam parvos folliculos. Qui non inclusi libere sibi locum eligunt, in stupa temeraria multum absument filorum. Unde jactura est in serico. Nam bombycia plerumque sunt minora, & minus dense stipata. Si velis attendere, rationem texturæ accurate cognoscere in his potes. Etenim postquam aliquamdiu vagati sunt, & modo hic, modo ibi exordium operis facere tentarunt (id quod sedulo corporis nisu præstant, dum hærentes pedibus posterioribus, caput & totum pectus fursum, deorsum ante retro, & ad latera, varie movent, sicubi sese offerat commodus bombycii affigendi locus, nec visu, sed tactu hoc peragunt: sunt enim hebetes oculis) tandem stamina producant, & firmamenta domus, eaque simplicia aut multiplicia, prout stabilimentum requiritur firmum. Si juxta pavementum id sit, posteriore parte inhærent huic, sin in alto, pendent eadem, seu à ramis, seu aliunde. Nam pectus & caput liberè vertunt, sique opus est, etiam posteriorum situm mutant. Ita conficitur vestibulum seu prodromus. Jam autem sicca excrementa ab alvo sunt reddita, vestibulo absoluto, ita ut jam vermis securus sit, tutusque ab insidiis externis: stercus ultimum excernit cum liquore, de quo ante.

Et hoc sæpe polluitur stupa, per quam tamen defluit, ad fundum. Exonerata alva, parumper quiescit textor, & nudat podicem quasi laboraret tenasmo. Tunc revocat veri serici materiam, eamque continuat usque ad extremum halitum, & bombycii absolutionem. Paulatim tunc stipat fila ex amplo, in angustum, ita ut fiat forma ovalis, in cujus capacitate sese possit verte- re. Os, pectus, & anteriores pedes in continuo sunt motu. Posteriora hærent, transferuntur tamen ad aliam plagam, cum ad basin vel apicem formandum sese accommodant. Qui in imo juxta pavementum folliculos texunt; videntur insidere pavimento nudo, sed paulatim sibi subtexunt fila, & universum folliculum pariter ubivis stipant, præterquam in acumine, ad quod in angustis non possunt pertingere. Itaque hujus fabrica magis ab initio fingitur, sed basis magis in fine, quanquam nec hæc negligatur in exordio.

Itaque cum fila explicantur retexendo, apex nudatur primum, & relinquitur interna

terna tunica forma digitalis tegumenti. Texunt ita ad diem tertiam : Et adhuc potes laborantes videre secundo, si folliculum foli vel luci obvertas. In cucullis chartaceis basis sursum versa est, apex deorsum : Et rarior illa apparet binis diebus. Tertio demum densatur : & tunc vermis exiit senectam, fitque nympa, id quod facile potest deprehendi; Nam cum adhuc texunt, adhærent, nec percipitur lapsus brutus. Cum vero nympa evasit, quasi lapillus inclusus esset, moto folliculo, nympa cadit : Et hic brutus casus durat, usque dum in necydalum mutata fuerit.

Tunc enim expletur capacitas iterum, & necydalus hæret folliculo exitum quærens. Unus autem vermis, sub mea cura unum folliculum texuit, cujus prodromus in inclusis chartæ, solida tunica est, in liberis variis modis ultro citroque dispositis & diductis constat filis. Alii vero animadverterunt in uno folliculo etiam duos quin & tres inclusos fuisse. Verum tamen cum angustior futurus esset locus, sectus illi folliculus communis tribus est, & in eo inventi bombyces coarctati, adeo ut speciem trium digitorum conjunctorum retulerint. Liberati postea singuli aliquid pensi, parum tamen denuo edidere.

Notandum est, animadversum esse, quosdam bombyces, in charta nullum sericum fecisse, sed statim in nymphas abiisse: quod illis evenire crediderim, qui lactuca pascuntur, licet non omnibus, aut quibus pabulum minus iusto datum est, aut qui morbo correpti non potuerunt colligere serici materiam, quam sicut adeps, ex sanguine abundante sepositus, fieri existimo.

Eveniunt & alia monstra, de quibus suo loco.

Omnium folliculorum oblonga quidem & ovalis est forma. Vidi tamen unum album, ferè exactæ rotunditatis, ita ut utrinque basin haberet sphaericam absque acumine. Erat parvus cum suo prodromo, sed tamen spissitudinis iustæ. Verum bombyx in eo non abiit in nympham, nec necydalum absolutum, ut mox exponam.

Illud videtur dubium esse, num sericum ex alvi exitu promant, an ex ore, quanquam semper ore & anterioribus pedibus distribuunt. Non leve argumentum est, quod juxta caudæ fulcra in imo ventre conspiciatur quodam rimæ vestigium, & extremitas utraque materiæ sericiæ in ventre respiciat illum locum. Adstipulatur & egestio excrementorum in ipso operis initio.

Sicut enim cum infantem inclusura est puerpera, quidquid fordium est in vesica & recto instino, id compressum expellitur, ita in bombyce, à serico foras centendente fieri quis existimare possit. Ita instan-

te labore venter tumentior apparet; à ventre incipit maturitas flavitie designata. Ea exit primum, ubi prius maturuit. Erucæ & bombyces insuper lanugine quadam filosa, circa pedes junguntur pavimento. Nonnulli inter texendum conspiciuntur à dorso initi, ut è ventre sericum extrahatur, & digeratur ore, pedibusque facilius. Hæc poterant afferri, pro prima sententia. Sed hanc falsitatis redarguunt alia firmiora. Nam ipse oculorum obtutus contestatur, quiescente ventre filamenta ore deduci, eaque viscositate sua adhærentia retracto collo, paulatim protrahi. Itaque non tantum in dorsum reclinati bombyces sic filum trahunt, sed & prostrati in ventrem, ubi tamen vermis totus libere sese vertit. Deinde nec ano, nec rima sub cauda exire potest. Nam ex serici loco ad intestinum nulla est via. Et rima caudæ, quæ designat genitalia futuri necydali, obducta est pelle. Insuper, antequam sericum exeat, crebro gannunt bombyces, quasi vomituriendo pellicerent ad fauces materiam. Nec intumescunt circa caudam, sed in medio ventris. In capsula etiam chartacea, cum nullum in pedibus appareret filum, solo ore vidi promoveri & affigi; quin secundo Junii, cum attente spectarem sibi machinantem bombycium, principium fili prehensum ex vermis ore, madens extrahi in iustam prolixitatem, pedibus & ventre plane à serico nudis. Ita eruculæ ab ore suspenduntur, inde emissio filamentum. Nec aliter aranei & campe arborum sua faciunt vellera. Et hæc quidem de hac questione.

Cum folliculus est absolutus, mutato bombyce in nympham, rapiuntur vellera, selectis prius ad instaurationem generis, maribus & foemellis ad arbitrium. Sexus discrimen aliqui ex colore bombyciorum dignoscere jubent, aliqui ex magnitudine: Et sane aliquid est in hac re argumenti. Nam quia foeminæ plerumque majores, etiam majus struunt domicilium: Veruntamen aliquando fallimur, quia feri potest ut mas firmus, majorem architectatur folliculum, quam foemina debilis. Et vidi pares quantitate, vidi etiam foeminarum alibi enutritarum bombycia longe minora meis masculis. Itaque concurrere signa ipsis bombycibus notata oportet, de quibus supra. Cæteri folliculi in aquam ferventem injiciuntur, nymphae intereant, vel suffocentur calore clybani, post exemptum panem, adhibita cautela ne comburantur. Tunc stupa detracta, famulæ, vel focii laboris præsto sunt, qui exordia florum expediant, quibus inventis injiciuntur plures in pelvim aquæ frigidæ, aut tepidæ, assidensque ministra instrumento tractorio continuo devolvit fila, triginta vel qua-

quadraginta aut etiam plura simul juncta. Si qua rumpitur stamem, socii est, requirere principium & reddere explicanti; id continuatur, donec usque ad interiorem tunicam perventum fuerit, quæ cum difficillime retexatur, exiccata discerpitur in stupam & carminatur.

Dum ita replicantur fila, pulverem multum in aërem emittunt, & cernere etiam in fundo vasis est quasdam sordes è staminibus prolapsas. Sedulo attentabam num una opera possem absque ruptura totum expedire folliculum abstracta stupa, quæ ob variam implicationem, infirmitatem & diversa principia non potest continuo ductu retexi. Affecutus sum votum tantum in medio serico; nam prodomo quod proximum est, etiam rumpi facile. Sed medium tenacius est. Ultima tunica pondere addito (nam tunc nymphea prolabitur) explicata à me est cautissime usque ad pelliculam parcam, quæ vix unguem pollicis adæquabat. Qui folliculi basi ad diametrum respondent apici, feliciter evolvuntur: Difficilius incurvati & gibbosi, & quorum apex stricturam habet. Nam hic filum hæret & implicatur, ut vix citra rupturæ metum cedat. Apex primum nudatur & devolvitur totus usque ad medium folliculi.

Unius bombycii filum continuum lineæ præscriptæ longitudinem septies millies, in alio octies implevit & amplius. Non tamen par est omnium densitas, & magnitudo, id quod etiam ex distractione in cuticulas videre est. Quædam enim vellera diduxi in duodecim quædam in octo plus minus exiles tunicas. Sylvestris bombyx prodomum habet simplicem tunicam & paulo crassiorem folliculum. Itaque etiam tenuiores facile cedunt prementibus digitis; densiores resistunt.

Cum fatiscit apex fere usque ad medium, unde sat amplum est foramen elapsuræ nympheæ, procidit cum senecta ultima, in qua caput & pedes omnes. Plerumque hujus senectæ caput apici folliculi obversum est, ut intelligamus eam exutam esse, dum vermis consummato folliculo per angustias sese stringit, vertitque sursum.

Nympheæ vertex respicit basin, cauda apicem: eumque bombyx plus quam duplo longior fuerit, nymphea ad parvam staturam contrahitur, ut vix impleat longitudinem internodii secundi in digito medio viri. Vivit illa vitæque indicia evidentia exhibet, motu reflexuque apicis seu caudæ cum tangitur. Si formam externam respicias, squamosum vermem dicas, ut qui caput velamento occultaverit. Squamæ sunt fusæ, tanquam fumo inquinatæ, octo numero usque ad confinia verticis. In singularum lateribus, bina sunt puncta umbilicalia, ex quibus tendines, seu vin-

cula ad necydalum pertingunt. In vertice est macula alba quasi ibi os necydali transluceret cum punctis tribus parvis nigris. Inde à parte anteriore typi pedum & cornuum sunt, à posteriore versus latera vestigia alarum. Si interiora quoque contemplari libet, quarto die ab occultatione, antequam transeat in necydalum, aperiri potes. Videbis nihil aliud, quam capacitatem unam communem, inque hactres distinctos humores, unum aquosæ dilutæque consistentiæ, coloris flavi. Hic per totum spacium æqualiter diffunditur. Alius rubet, sanguinolentum dicas: Hæret hic in parte superiori, qua futurum caput, & pectus est. Cordis rudimentum esse judices; quia postea in necydalo vidi talem quandam massam per se mobilem more cordis, si modo cor huic bestiæ est attribuendum. Tertius humor est albo luteus, refertque ovum gallinaceum in aquam ferventem injectum discussumque vel lac caseatum, si quid lutei addas. Ubi foris alarum pedumque cernuntur vestigia, latitat phlegmatica visciditas apta constituendis membranis.

Nulla videas membra distincta, vitam beneficio nervæ tunice proximè externo cortici subjectæ inesse puto. Nam & bombyx ea parte exquisitum exhibebat sensum, motumque arterialem & cordis; planè utriculorum humoribus confertum appelles: qui tamen collatus ad chrysalidem, postquam crepsit necydalus, longe est crassior, ut corticem dicas tunicis intus & visciditate renace vestitum. Inde postea est lanugo necydali, alæ, pedes, cutis, & cætera interna. Ita in gulam ventremque abiit bombyx, cujus unius cura antea fuerat detentus, nihil tamen hic viroris apparet, qui multus erat in bombycis jam texturi intestino.

Pars itaque excreta est ante folliculi exordium, pars mutata in alium succum. In apice caudæ etiam erat quiddam viscidum instar crudi albuminis. Rudimentum partium genitalium judicabam. Nam eo rejecta est matrix, & vasa spermatica, quorum principium conspicitur, etiam in bombycis ventre. Humores in charta pura excepti & arefacti nigredine infecti erant, quasi atramentum sutorum miscuisses. Sebacea tamen substantia albescebat adhuc, & alicubi enitebat macula subrubens, & crocens, cum albo puncto cretaceæ consistentiæ. Itaque colligere erat nigrorem illum duntaxat aquosi flavique humoris fuisse, qui etiam solus in charta, ubi densior concreverat, splendebat, ut nitens atramentum. Cæteras nymphas partim spoliatas omnium serico nudasque, partim simplici tunica adhuc inclusas, partim in toto bombycio salvas, nulla alia tractavi cura, nisi quod in cap-
psula

psula positas in fenestræ limine dimitterem. Destinexeram tamen loculamentis diversis, quas fœminas, & quos mares putaveram, nec me fefellit iudicium, excepto uno tantum. Ita à prima inclusione, usque ad exclusionem processerunt dies viginti sex aut septem, in musæo meo exposito Soli promeridiano, tempore æstuoso Junii, quale erat anno nonagesimo nono. Nam undecimo Junii sepulta fœmina, exiit necydalus octavo Julii. Qui mas nono Junii texere inceperat, quinto Julii evasit papilio.

Eodem duæ fœminæ exhibant in folliculis albis majusculis; & unus mas excitrino minore. Sexto Julii sub auroram (nam omnes mane prodeant) mas fuscus hirtusque ex mediocri alboque bombycio enisus est; fœmina vero alba teneraque ventricosa, cum magnis alis: ex folliculo citrino subviridi. Ita & ante, secundo Julii ex aureo folliculo mas prorepebat, & fœmina ex albo. Hi decimo Junii inchoa verant bombycium. Cum ex integris folliculis erupturi sunt necydali, non amplius movendo sentitur brutum pondus; & tunc frangitur, circa dorsum thoracis aurelia, postea multus humor limpidus, albusque, ore effunditur, & permadescit locus, qua sunt foramen facturi. Per hunc foras annisu quodam & labore contendunt. Vidi octavo Julii fœminam exeuntem. Ea tantum liquoris præmittebat, ut in capsulam decideret notabilis gutta. Tunc capite emicabat intus nixa pedibus. Post caput paulatim hos exerebat, statimque comprehenso pavimento sese fulciens, circulos alvi conando sensim protrahebat, ut primo extracto, cum vellet secundum proripere, sese contraheret tota parte anteriore, quasi sic prehensum circulum sequentem una evocaret. Veruntamen consentaneum est ista contractione dilatatum esse magis foramen: ut postea alvus minore cum labore prodiret.

Huc facit etiam varia ad latera conversio. Interim crassiores necydali, & plus humoris in ventre habentes, exprimunt aliquid inter eluctandum, & folliculum pertusum, tum intus, tum circa foramen fœdant alvi spurcitie marmorosa. Qui minus laborant & tenuiores sunt, purum relinquunt. Videas tunc caniciem totam nonnihil madentem à liquore ex ore effuso ad pertusionem facilem.

Solent etiam alicubi quiescere, & sæpius ventrem inflare, diducere, atque iterum contrahere, quasi luxata membra reponerent, & ad legitimum situm revocarent, Adeo autem diducuntque laxantque circulos, ut juncturæ emineant impletæ citreo liquore, quasi inflatæ essent. Nymphas nudatas, cum intus absolutus papilio est, triduo, vel biduo ante, sese videas

crebro movere, quasi rupturas vincula, quibus alligatur aureliæ necydalus. Earum unam tunc cultello, unguibusque aperui ipse ut viderem congruentiam extremorum lineamentorum cum suppositis membris. Id fiebat quarto Julii, cum jam circiter dies viginti à serificio præteriissent. Remota squama prima, juxta principium pectusculi in tergo prodibat; in conspectum circulus superior ventris tener, cutaneus, hirsutie humente tectus, brevi tamen & complanata ut vix pateret oculis lanugo. Sub dispositione alarum lateralium, quam in aurelia comparere omoplatis, veræ alæ necydali latitabant binæ junctæ, & altera alteri imposita.

Omnes erant breves, tenuesque, utpote nondum perfectæ quantitate. Inter alas thoracis posterior nodus eminebat, prolixiore pilositate utrinque stipatus, sed nondum plane tectus.

Alis & rubore hoc expedito, perveniebam ad deorsum flexas lineas superiores, sub his erant cornua: sub sequentibus vero in pectore pedes recumbebant, obliquè versus alvum compositi & directi. Sub alba macula in nymphæ vertice, necydali hirsutus vertex & pregma est, cui proxime adjacet aculeorum typus forma duorum punctorum atrorum. Hinc sequitur nota oris satis extans initio propter humiditatem, & speciem habet spongiosorum punctorum alborum duorum, quæ tanquam in Leonino labio fissura dividuntur: Alvus tota est instar fuci albi.

Pili in ea opprimuntur humiditate, & lævigati apparent. Constant circulis, ut & bombyx & nympa. Non autem expediebam totum necydalum, sed ipse seipsum suo nisu protrahebat ex reliqua aurelia. Videbam quo conatu sese absolveret à vinculis alvi, quæ instar albarum chordarum è punctis circulorum dependent, & in aurelia vacua relinquuntur. Hæret & podex arctius. Itaque apex aureliæ contrahitur versus pectus introrsum. Erat autem mas cum alis & villis imperfectis. Eum reliqui in capsula. Quievit usque ad diem sequentem. Tunc paulatim inalbuit, & hirsuties conspecta est exactius. Alæ quoque creverunt, & tunc alacrior paulatim factus, admissusque tertio die concubitus peregit strenue.

Necydalorum quæ species sit, tum ex dictis patet, tum superius satis est expositum: Illud addendum est, quod alvus in aurelia contractior sit, & foris distentione inflationeque crebra tertia parte fiat longior, & major. In aurelia est ruptura trifida à vertice per dorsum thoracis. Et ibi prodit necydalus. Cæteræ partes sunt integræ.

Omnibus jam necydalis natis reliquis ante decimum quartum Julii, duo folliculi integri remanserunt, quasi nihil reddituri, licet densi admodum essent. Unus masculus sphaericus parvus, alter fœmineus

neus duplo longior & satis amplus, paululum circa dorsum vermīs in gibbum elatus, uterque albæ stupæ, sed ferici subviridis in citrio; quanquam dilutior esset color in illo. Cum spæricum cultri acie dividerem, cadaver in conspectum prodibat semibombyx, & seminympa foris. Nam anterior pars planè bombyx erat, posterior nympa, siquidem non totam exuerat pellem, sed tantum ejus posteriorem portionem, quæ juxta aderat in folliculo.

Dispositio cadaveris; erat incurva, ita ut priores pedes in pectore fere tangerent posteriorum par primum. Hic enim inter primam posteriorum syzygiam & secundam ruptum erat corium, ita ut nympa esset galeata pristinis exuviis, in quibus caput pectusque cum sex pedibus, & portio ventris cum primoribus duobus. Remota pelle, & aurelia, intus absolutus stabulabatur necydalus mas, isque vixerat, argumento, quod dum conaretur exire biduo antequam secarem, folliculum liquore perfudisset; imo & jam 19. Julii cum liberarem penitus, motus indicia in ventre & pedibus luculenta præbuit: Causa cur non potuerit, sese exuere & prodire, deprehensa est in cranii bombycis pertinace cohæsiōe, ut & in pedum anteriorum, lorica firmiter connata.

Itaque licet in dorso thoracis rimam tam in aurelia quam senecta fecisset, tamen extrahere caput & pedes non potuit. Sic ergo paulatim elanguit. Animadverti hic naturæ ingenium. Nam cum in exunda senecta exarmentur priores pedes, & posteriores etiam plane secedant; tamen ibi relinquit vestigia, sub quibus postea renascuntur alii. In veterum autem bombycis loculamenta, alarum binnae insertæ erant, totumque necydali caput cum cornibus cranii galea includebatur. Talis mas erat. Fœmina omni vita cassa adhuc monstrosior apparebat. Perfecto opere fericii (quod erat bombycium majus, & duorum articulorum articularis digiti longitudinem adæquans, sed longe tenuius masculo; intus album & leve splendensque, foris subcitream villolum) exuere pellem bombyx conatus erat, indeque protraxerat totum dorsum, quod valde protuberabat, anterioribus in circulum contractis; sed ab oscillo se liberare ob pertinacem symphyisin non potuerat. Itaque ibi senectæ caput, nymphe vertex, & necydali conjuncta conspiciebantur; quæ conjunctio retinebat senectam in ventre, ne potuerit penitus avelli, & destrincti. Ideo & cohærebat, cum alvi acumine, non aliter ac si quis sacco fuisset inclusus; & circa caput astrictus; facto vero in tergo foramine dorsum extraxisset quidem, sed

adhuc hareret capite, & podice, ita jacens incurvus & exanimis. Sic se habebat senecta. Ex hac prominebat & aurelia, quod attinet partem superiorem. Ex aurelia vicissim necydalus fere totus eluctatus erat, fracto putamine in dorso, solutæque regione; sed capita cohærebant indivulsa, sicut & alvi extrema.

In ventre exorto magna copia ovorum conspiciebatur colore flavo. Nam fœmina statim etiam intra aureliam ovorum formam in sua, matrice absolvit, sed quæ sine maris aspergine sint infœcunda. Itaque etiam vidi ova parturientem eam, quæ nullum marem fuerat passa. Conspicuum hinc fuit, quomodo natura exuat primum veterem bombycis pellem cum forma; postea transeat in nympam, cujus aurelia vicissim exuta prodeat necydalus. Triforme hoc monstrum erat dignumque contemplatu. In eo notasses etiam aureliam ea parte, qua alæ erant designatæ, nigram fuscamque, quasi afflata fumo fervente fuisset: deinde quantopere conata fuerit fœmina necydalus exire, perspicuum erat ex ovis eminentibus ex interstitio circulorum squamosorum.

Cohærent aliis ventris circuli interveniente cuticula tenui, contigue. Sed in hoc adeo erant circuli disjuncti, ut Zona juncturæ latior esset circulo. Apex alvi, senectæ, & aureliæ, ad lucem transparebant, ita ut cernere exacte posses confinia. Ad dimidiam verò aureliæ capacitatem pertingebat extremitas necydali circa dorsum hirsuti, licet imperfectè, quemadmodum & alæ nondum assecutæ legitimum incrementum. Et hætenus de monstris.

Necydalo vegeto tenax vita est, præsertim in pectusculo. Nam & capite & alvo abscissis, alas motitat strenue, & pedibus discurret, idque usque in alterum diem aut amplius. Secta fœmina in alvo matricem exhibet ovis plenam, adeo ut post quadringenta jam edita, nihilominus superfuerint plura. Insistere & involuta esse subtilissimæ tunicæ videbatur.

Apparebant & nervosi quidam ductus, instar meatuum intestinalium. In medio ventris vesicula extabat; continens terreum succum coloris ravi seu fulvi. Hæc vesica per se continua systole & diastole agitabatur. Vitæ principum ibi tanquam in corde esse judicabam. Circa collum matricis; nodus geminatus albus, nerveus, qualis vesica animalium esse solet, durus splendensque cernebatur, idque intra ventrem. Nam de mammosis processibus externis postea. Nodulus unus major erat, alter minor. Collum vulvæ est instar tubi, cui succulento foris astant, utrinque flavi noduli mammarum instar. Circa collum ambitus cum retinaculis

corneis, latis, inque summo obtusioribus, quibus genitale maris vicissimprehendit. Pectus carneum est. Caput membranofum & corneum. Cornua triquetra eminente dorso albo, pennis vero utrinque demissis, ut fieret triangulus. Si vivis præfeces succus quidam translucidus ex dorso, seu culmo pennati cornu exit, intusque meatus apparet. Ita se habebat foemina quam vivam aperiebam. Mortua nihil in ventre exhibuit præter cavitatem notabilem alvi juxta pectus, deinde humorum illum vitalem. In vesica, quanquam nunc non amplius vividum; tandem matricis evacuatae reliquias nerveas & membranofas. Maris superiora congruunt cum foemineis. Ventrem si feces, rubeum humorem multum intus inveneris, & præterea liquamen quoddam nervis plenum, cui connectitur meatus genitalis.

Genitale autem habet peculiare, carens & cæteris quæ foeminæ sunt propriæ. Ejus historia hæc est. Sub cauda lanugine prolixiore stipata, foramen est notabile, cum ambitu membranoso duricie corneæ, in duos quasi dentes diviso. In hujus ambitus medio collum genitalis est trifidum, cum extremitatibus corneis. Circa hoc dispositi sunt aculei punicei (cornei processus omnes punicei sunt ad nigrum accedentes) duo superiores hamati, seu in uncis recurvati, ut sit forma videntia unci, ut cornua caprearum deorsum reflexi: inferior unus rectus. Hi aculei proximi sunt collo membri. Paulo citra in ambitus medio alii tres stimuli sunt parvi. Tot retinaculis comprehensam foeminæ vulvam attrahit, sibi que jungit adeo firmiter, ut si distrahere congressos velis, citius videatur ruptura ventris & circuli compages, quam remissura coitio, id quod sæpius attentavi. Sed & hinc pertinaciam conjunctionis æstimare licet, quod viderim totos dies æstivos una manere, & noctu, nescio qua hora, consentaneum, versus auroram, disjunctos perceperim, mane inventis ovalibus vermiculis pluribus, ipsis autem seorsim quiescentibus. Frigidæ aquæ injecti nihilominus cohærent, sale insperso & muria caudarum junctura durarunt: aqua chalcantina similiter addita non sunt divulsi. Immerfi marem aquæ, foemina in margine sicco relicta; etiam injecto atramento & sale in aquam; sed vixit, & coitum retinuit. Tandem ita reliqui per noctem in aqua, mane aliquot centuriæ ovorum in valis fundo erant, ipsi necydali natabant vivi. Alteri mari in congressu præcidebam caput; non avulsus est.

Divisi pectus à ventre; hic hæsit donec per vim abstraherem. Caput & pectus, ut divisæ muscæ diu vixerunt, diutius tamen pectus. Hic mas in coitu ita dissectus in

ventre similiter habebat humorum lutosum, spadiceum, cum quadam substantia intestinali, sublutea, membranosa.

Mas natus quarto Julii ob imbecillitatem quinto mortuus, sectusque nihil aliud continuit alvo. Alioquin vita necydali septem aut octo plurimumve dierum est. Ut enim dixi est pertinax; adeo ut cum confringerem quatuor ictibus principia alarum & pectus; post etiam alvum aliquoties, tamen vita manserit quasi inviolata, licet spiritu tandem dissipato, altero die ut plurimum ita tractati moriantur. Coitum mas ferventer appetit, parva mora post exitum ex aurelia; idque sæpius exonerato ventre, nonnunquam tamen etiam nullo humore emisso, & hoc evenit etiam in foemina. Qui vegetus est, post primi diei congressum, interveniente noctis quiete altero die repetite eandem foeminam. aut in quamcunque inciderit, adeo ut ter quater peragat coeundi vices. Foemina quoque toties marem admittit: quanquam non semper ova promat. Non enim gignit, nisi ova in se habeat, licet rore masculino concepto.

Post solutionem à congressu statim deponuntur ova ordine alterum post alterum, ubi videas quasi cum conatu & contractione alvi protrudi, excludique ex matricis collo exerto, adeo ut pavimento tangat. Numeravi quadringentis plura ex una foemina, ex aliis fere quadringenta, quæ tamen dissectæ adhuc multa in sua matrice habebant. Quod ergo Vidas de centenis scribit, id de macris parvisque necydalis potest intelligi, quales ego vidi evasisse ex neglectiore nutritione, aliis triplo fere majoribus. Quidam mares emittunt alvi proluviem ante coitum semel, & iterum post secundum congressum. Interdum mares soluri, nec dum satiati, incipientem ova ferere foeminam interpellant, & coeunt denovo, quanquam foemina per vim cohæreat, cupiatque contracta alvo & pedum posteriorum deterfione solvi. Ita una ante concubitum 17. emittebat, post primum soluta centum nonaginta quatuor & tunc iterum coiens; post quatuor horas revulsa, edebat 245. inde appetente mare humorem tanquam ex siphone ejaculabat, iterumque congressa, & liberata adhuc ova plura vicinis. Quæ ova quarto Julii erant edita colore citrino, septimo evadebant punicea, & inde plumbea. Detinebantur in capsula post fenestram pomeridiano soli exposita. Sterilia tamen colorem non mutabant, sed subsidebant duntaxat. In necydalis solutis observes aliquoties motum tremulum, qualis est à rigore & hortore febricitantium. Neque tamen febri laborare dixerim. Sed eam concussionem esse puto, ex alteratione & promotione seminalis materiæ, ex-

exhalante inde vapore & nerveas partes convellente. Ultimus necydalus pumilio vigesimo quarto Junii inter duo folia mori texens folliculum parvum prodiit decimo tertio Julii, in quo præterquam quod minimum fecisset bombylium, etiam hoc peculiare erat, quod non exiret in basi folliculi sed juxta apicem facto foramine, contra ac alii omnes, mas autem erat, qui non timebat conjungi cum fæmella jam ter marem passa & vix spiritum trahente. Bis autem coitu impleto postea projectus est. Alæ etiam videbantur pictæ aliter ac cæterorum. Nam cum reliquorum sint lineis in longum & latum distinctæ, tanquam limbis, hic quidem quatuor ejusmodi lineas plumbeas in latum acceperat, sed inter secundam & tertiam, versus sinus alarum extimos, interjectus erat parvus quidam circulus, non exactus, lividus, cum puncto albo in medio. Verum enim vero tam ingeniosa natura est in hoc insecto, ut cum plura observaveris, scripserisque, semper tamen restent noranda plura.

Quantum ad *Differentias* sumuntur illæ à loco & colore. Sunt *Indæ*, *Hispanæ*, *Calabræ*. Illæ pollicis humani magnitudinem excedunt, domus earum capitis. *Hispanæ* Italicis minores, majores & præstantiores folliculos texunt. *Calabræ* majores & plus serici largiuntur. Alibi quæ visuntur, magnitudine omnibus istis cedunt. *Coloris* ratione, sunt albæ, cineræ, subflavæ. Aldrovandus tribus tabulis eos depingit. In prima priori loco depicta fœmina est, & tota candicat, exceptis posterioribus pedibus, qui flavescent. *Secunda* tota est albo cærulea, mas. *Tertia* ex albo læviter flavescit, & pedes habet omnes candidos. Hic album texuit folliculum. *Postrema* ita picta est, sicut nonnunquam sese contrahunt, vel metu vel frigore. *Prior* folliculus totus erat candidus, & à candido bombyce textus. *Secundus* pariter candidus est, & bombycis fœminæ opus. *Tertius* totus ferè viridescebat, maris opus, postremus fœminæ, ejusdem coloris. Qui in secunda tabula ponitur quartus, gemellus est, à mare & fœmina una laborantibus factus. vulgus hoc folliculorum genus doppiones vocat. *Tertius* quodammodo lacertæ vel alterius animantis caput æmulabatur oblongum, deinde paulatim extenuatum in acutum declinabat. Primi aureo sunt colore, uterque etiam monstruosus, quoniam ovals non sint. Quorum unus amygdalam efformare videbatur, cortici suo etiamnum involutam; alter malum Armeniacum. Tales vulgo nobis Venturini dicuntur. In tertia tabula primo loco habes Bombycis jam serico gravidi integri iconem, secundo supina parte sectam, sericum velut quædam intestina demonstrantem, tertio sericum

exemptum, quarto, quinto, sexto, diversas figuras Chrysalidum, prout nimirum, magis vel minus perfectæ sunt. Septimo, octavo, & nono Bombycum diversa exuvia, decimo folliculos duos invicem cohærentes, undecimo folliculum planum, & compressum; duodecimo alium folliculum oblongum, ex quo Papilio jam jam erumpere tentat, decimo tertio Chrysalidem ex qua exiturus Papilio media sui parte propendet, decimo quarto folliculum, qui cerasum magnitudine vix excedit, postremo semichrysalidem, quæ ex folliculo pyri figura erumpit.

Usum in cibis invenere. Vir doctus, Germanos milites frixas comedisse scribit. Cohortales aves appositis impinguntur: apponi possunt, si de ægrè habentium salute desperaveris. De *Educatione* Aldrovandum consule. Sericum, de quo alibi, combustum, putrida vulnera mundat; cum sale mixtum, dentium rubiginem abstergit: cor corroborat: ideò confectionem Alkermes ingreditur. Funiculo ex eo facto, si viperæ suffocentur, in angina Medici feliciter utuntur.

Chrysalidos seu *Aureliæ* nomen, ovo Aristoteles tribuit. Omnes enim Erucæ, quæ folliculos texunt, cum se iis incluse-
rint, figuram prorsus mutant. Nam cum prius molles essent, pedibus instructæ & moverentur, ederentque: tum indurescent, pedes non apparent amplius, non moventur, nisi ad tactum, & veluti ovi speciem accipiunt. Mirum autem est ^{28^u Calides} à Philosopho vocari: cum plurima etiam sint viridia, nec pauca pallida. ^{Necydala} dici, alibi monuimus. Cum verò in Aureliam Eruca transiit, infantis fasciis involuti formam imitatur, facie humana propè, cum mitra & cornibus.

Aldrovandus quatuor Icones unica tabula dedit. *Prima* insolentis, & forsan monstruosæ est figuræ cum ob enormem magnitudinem, tum maxime, quod in capite annexam habet velut promuscidem. Tota aureo colore resplendet, sed annulos habet nigros. Ejusdem coloris sunt Chrysalides, sive Necydali Bombycum, ex quibus quoque unam depinximus, eam autem, quæ secundo loco posita est. *Tertia* coloris est viridis, nonnihil ad cæruleum vergentis, punctis toto corpore maculata atetrimis. Hujus generis Erucæ folliculos non texunt, sed in Chrysalides immutaturæ, eo quo hic pingitur, modo super aliquod lignum, foliumvè aut etiam lapidem extendunt, & solis ardore dein mutantur in papiliones, eos autem, qui ex albo viridescent. *Quarta* etiam viridis est, sed auri instar resplendet, depicta est pronè, & supine, item à latere.

Habet & novus orbis æmulum bombycis alium vermem, *temiçlli* dictum: qui se, postquam in justam magnitudinem adole-

Arist. 2.
de generat.
animal.
c. 1.

Aldrov.
H. Inf. 2.
c. 25.

Vide &
apud
Moufeta-
tum.

Nieremb.
l. 13.
c. 14.

Diffe-
rentiæ.

vit, in membranam feralem ab ipso filis in-textam condit; & deinde ac si parum esset; suapte sponte detrufum in carcerem exhalasse animam, se libitinamque suam à surculo aliquo suspendit, ut procedente tempore, in volatilem papilionem vertatur, ac insperatas subeat transformationes.

ARTICULUS IV.

De Curculione.

Curculio, quia in Papilionem abit, Erucis subjungitur. Nomen per ἀντί-συχον accepit; teste Varrone, quòd nihil penè aliud in eo quam gula videatur. Græcis est κῆς & μέδα, fortè & πρῶξ. Multa eorum vere prodeunt examina, ubi frumenta recens demessa, eaque madida, antequam occalluerunt, reponuntur, vel ubi granarii fenestræ Austrinis flatibus, sunt oppositæ.

Columella
R. R. 2.
c. 10. Inveniuntur tam in faba, quam in tritico. Unicum ortus remedium, frumenta benè & commodè recondere: & fabam, cum in area exaruerit, confestim priusquam luna incrementum capiat, excussam, inferre.

Columella
R. R. 12.
c. 2. Cato, areas amurcâ subigi præcipit: Columella eadem, parietes subactò luto, obliniri jubet, &c. Perimuntur falsugine in qua allium decoctum est, si ea pavimenta & parietes irrigentur. Refugiunt fabinam hederam, lupuli salictarii flores, juglandis folia, absynthium, abrotanum, nigellam, &c. Naporum semen miram in prosternendis vim habere, nostra & avorum memoria observatum est. Quia dulce & oleosum, appetitur: eo distenti, intereunt. Plura de iis vide in vermibus frumentariis.

TITULUS II.

De Insectis terrestribus non alatis
multipedibus.

CAPUT I.

De Asello.

Nomen. **I**nsecta multipeda non alata sunt, *Asellus*, *Scolopendra terrestris*, & *Iulus*. *Aselli* vocabulum insecto huic Latini imposuere, non quòd asino sit similis, sed quòd ad colorem ejus accedat. Quidam, *Cutionem* & *Porcellionem* vocant. Plinius *Centipedem* dixit. Aristoteli est ὄνικος, Medicis Græcis Theophrasto ὀνίνος, Dioscoridi κῆς ἀπὸς, Absyrto ὄνικος, Asiaticis, Galeno teste, κῆς ἀπὸς, seu à forma fabæ, cui similis dum se in globum contrahit: seu quòd è fabarum folliculis & culmis prodire soleat. Plinius τύλον, à cutis callo & duritie vocat: alii ἰνύλον sed perperam.

Insectum est parvum, inquit Moufetus, digitum transversum vix longum, semidigitum ferè latum, colore livido nigricante. Quatuordecem illi *pedes*, utrinque septem; singulis pedibus unica junctura, vix perceptibilis: duæ breves *antennæ*, quibus viam tentat: latera circa pedes serræ modo dentata. Tactus se in globum colligit.

Sub tegulis, & hydriis, planè asininum colorem refert; quatuordecim illi pedes utrinque septem; singulis pedibus unica est punctura; vix perceptibilis; duas habet breves antennas, ut viam tentet; tactus se in globum colligit; vel (ut Galenus loquitur) ad fabæ similitudinem, unde κῆς ἀπὸς nomen indidit: latera circa pedes serræ modo dentata: sub tegulis, vasis aquariis, in medulla arborum exesa, inter corticem & caudicem putrescentem nascitur; uti etiam sub petris, ex humido putrescente nati. Deinde coeunt, & à coitu ova deponunt (unde vermis) candida, splendentia; margaritulis similia multa, & eodem loco coacervata, ut anno 1583. observavimus: tepido humore vivunt, in rimis parietum aut ædium latebris hyemem transigunt. Ex ovis primum vermes duriusculi excluduntur, qui aliquantisper fere immobiles hærent & albicantes; tandem parentum more, liquorem atque rorem sugunt. In calidis regionibus & siccis etiam reperiuntur; sed ibi nocturno rore vaporeque resarciunt, quicquid per diem humoris fuerat exhaustum. Galenus hoc Asellum pacto describit. Ὅνικος κατὰ κίδους ζῶν ἐστὶ πολὺπὸν ἐν τοῖς ὑδατοῖς ἀγχοῖς, & ἐν τοῖς κοπρίαις γενόμενον; καὶ δὲ τὰς τῶν δακτυλῶν ἐπερίσσει σφαιρόμενον. Aristoteli fuisse eum cognitum id probat, quod pediculum marinum huic similitum dixerit, demptâ caudâ.

Usus eorum est in Medicina, multiplex. Aperiant, attenuant, discutiunt. Urine difficultati auxiliantur, si ex vino triti potentur. Calculum pellunt, si duo triti, cum stercoris murium & columbarum semidrachma, hauriantur. In rege morbo ex mulso Galenus propinat. In asthma ab Asclepiade, si combusti, cum melle fumantur, commendantur. Fidem Holle-rius & Agricola firmant. Oculorum ferè omnes morbos, ab adnatis vel innatis ortos tollunt, catarrhactâ excepta, si recentes benè contriti, ex convenienti liquore fumantur, vel extra adhibeantur. Nihil de aurium dolore, parotidibus & strumis dicam. Vivi *paronychie* applicati medentur. *Panos* cum resinæ terebinthinæ tertia parte tollunt. Unguentum ad hæmorrhoidas dolentes utilissimum, ex unguenti populei unc. j. olei rosacei, in quo decocti sunt aselli unc. j. f. croci gr. 4. paratur. Alii cum adipe & butyro coquunt, & ovi luteum addunt. Olei violacei unc. iij. in quo quatuor aselli ebullire, ad tertiæ partis consumptionem,

Descri-
ptio.
Moufetus
Theatri
Inf. 2. c. 9.

Genera-
tio.

Dioscor.
M. M. 2.
c. 37.
Plin. H.
N. 10.
c. 8.

ptionem, falsum humorem extra inunctæ reprimunt.

Hartman. Praxis chymiatr. pag. 160. De Calculo quod dixi, certum Laurembergius pronunciat: cui & Hartmannus adstipulatur. Sequitur post assumptum medicamentum totius corporis calor: sitisque molesta, & circa pubem dolor affligit. Preparationem apud Laurembergium peculiari tractatu vide. Comeduntur à lacertis aquaticis, ranâ terrestri, & serpentibus. Ad Asellos pertinent *Pollin* & *coyayahoal*. Mirificam vim excludendi spicula *pollin* habet. Insectum est parvulum, centipes: tritum & impositum, aculeos & sagittas ocyùs extrahit. Prædurus vermis est *coyayahoal*, aliis *tzinchoillin*, aliis *ichcaton* dictus, supernè fulvus, pede numerofo purpurascens. Arefactus, tusus, & aqua dilutus, maxillisque quotidie bisillitus, dolores dentium placat.

CAPUT II.

De Scolopendra terrestri.

Nomen. **S**colopendræ nomen ex eo datum, quod *σκολοπα* aculeum habeat *ἐν ἱδρά*, volunt nonnulli. Quidam, *Hepam*, *Centipedam*, *Millepedam*, *Porcum lutosum*, & *Multipedam* dixerunt. Aristoteli est *σκολοπενδρα*, Theophrasto *σκολοπία*, Dioscoridi à serpentum interitu *ὀφιοκτένη*. Varino & Hesychio *ἀμφιδεσφάγανον*, aliis *σὴψ*, nonnullis *μυρίπες* & *πολύπες*; vulgo Græcorum *σκολοπέτρα* dicitur. Nicandro ideò *ἀμφικάρης*, biceps, quòd parì facilitate prorsum capite, retrorsumque ducente cauda incedat.

Descriptio. Plurimos pedes habere, & pennis carere, Agricola scripsit, quod Julo potius debet coloremque eis æneum, corpus tenue, & latum, tres digitos aut ad summum quatuor longum addit. Aspleni folio similem Aldrovandus facit. Moufetus tantum à Julo differre vult, quantum locusta marina ab Astaco. Robertus Constantinus in cauda cornigeram comminiscitur.

Natura. In truncis arborum, aut lignis, vel palis terræ infixis, & gignitur & vivit. Amotis egreditur; aliàs plerumque latere solet. Circa radices gladioli reperiri apud Theophrastum habemus. Olim Rhytienses & Obterietes sedibus suis pepulerunt, si Æliano & Plinio fides est. Ex frequenti exitu; serenitatem aëris rustici præfagiunt. Ad *morsum* ejus, locus undique livescit, putrescit, intumescit, & vini rubri facibus similis videtur. Contra eum commendat, *intra*, salem ex aceto; Ægineta trifolium asphaltites cum vino: Actuarius nepetam cum eodem; Dioscorides, rutam sylvestrem, radicem dracunculi tritam; serpilli ramos & folia; Aëtius absynthium & mentham cum vino. Quidam morbum reme-

dia respuere credunt. *Extra*, locus scarificari, mox profundè incidi debet. Venenum per cucurbitas extrahitur. Tum succum centaurii minoris cum tertia parte vini dulcis, ad mellis consistentiam coctum imposito, & corium superligato, per octo aut quatuordecim dies; locum tandem cum spongia vino calido intincta fovero, & Scolopendræ morsum certò curabis. Reliqua apud Plinium & Dioscoridem vide.

Habent tamen & in *Medicina* aliquos usus. Oleo decocti capillos cum levi pruritu auferunt. Cimices suffiti interficiunt, &c.

Aldrovandus *Ophioctonem* diversam à volgari esse credit. De cætero, aliquot ipse species observavit. *Prima* est colore amethystino, albis ruberrimisque punctulis maculosa. *Altera* lutea, maculis obscuris insignita. *Tertia* minor, colore rubicundo, per tergus atro. *Quarta* vulgaris, aurei coloris ad castaneum nonnihil vergentis. *Ultima* viginti instructa pedibus, proceriusculis & longissimis antennis, colore subferrugineo.

Moufetus tres species exhibet. *Prima* est maxima, terrestris Scolopendra, ea quam vides crassitie & longitudine est, color totius corporis ex fusco nigricante splendens. Singulis incisuris pedunculus appendet luteus, id est in singulis lateribus sexaginta prorsum & retrorsum æqua facilitate promovet. Nam & caput versus ingreditur & in caudam; ideoque à Nicandro & Rhodigino *biceps* dicitur. Partem inter caput & alvum non simplicem sed multiplicem habet: quo fit ut præcisum hoc genus vivere possit. Irritatus hic Scolopendra tam acriter mordet, ut Ludovicus Atmarus (qui nobis eum è Libya dono dedit) quamvis Chirotecis duplicique linteo munitus, vix eum manu petentem ferre potuerit: altè enim in lintheum os forcipatum adegerat, diuque pendulus vix tandem excuti permisit. Horum alium ex novâ Hispaniolâ allatum linea quædam flammea medium per dorsum ornat, atque æneus later pilorumque color commendat: habet enim capillares pedes, atq; armatim se tollens celerimè currit. Hoc summa admiratione dignum est, quum natura huic animalculo caput minimum dederit, memoriam tamen, vimque rationis æmulam, neque congio, nec urceo sed amplissima quadam mensura tribuisse: cum enim innumeri adsint pedes, quasi remiges, & à capite veluti clavo alii permultum distant; novit tamen quisque officium suum, & pro imperantis capitis mandato, in hanc vel illam partem se conferunt.

CAPUT III.

De Iulo.

Mouf.
Theatri.
Insect. 2.
cap. 8.
Nomen.

Iulos Græci, mea quidem sententia, inquit Moufetus, non à lanugine, sed à nuncum juglandium atque avellanarum veluti caudis, quarum villi callo compactili infixi, Julos hos repræsentant: unde & ipsi ^{Ιούλοι} nomen sortiti. Ego Latine Julum dici nonnescio, sed triremem quoque dicere auderem. Quandoquidem Lycophron Paridis triremes numerosis utrinque scalmis celeres ^{ἰκαιοί} vocat. Eandem similitudinem Nicander Scolopendris applicat, unde pariformes esse Julum ac Scolopendram facile apparet. Hos Hispani Centopeas, Itali Centogambi: Angli (ex me forsan) Gally worme dicturi. *Numenius* Lumbricos terrestres nigros Julos item vocavit Athenæo teste libro 7.

^{Ιούλοι}
κέκλωται μέλανι γαίηφύγοι ἑντέρα γαίης.

Nihilominus nisi fuerint etiam multipedæ, in Julorum numerum nomenque non venient. Sunt autem Juli breves, (ut dixi) Scolopendræ pedum numero non asellum tantum atque Erucarum gentem, sed omnia alia insecta vincentes. Julorum *alii glabri*, cernuntur, *alii hirsuti*. Glabrum unum vidi in lactula capitata, parvi junci fluviatilis crassitie, atque ea quam videtis magnitudine: caput illi nigerrimum, dorsum aurea tinctum flavedine. Venter ex cæcio argentatus; incisuræ pedesque capillares totidem, ut oculos & memoriam facile fugerent. *Secundus* totus nigrescebat, alba linea excepta, quæ à capite ad caudam usque recta per dorsum ducitur. *Tertius* obfoletius flavescit; caput illi rubescit, uti & pedes; antennæ autem & nascentes juxta caudam setæ livefcunt. *Quartum* si corpore nigrius punicantem feceritis, pedibus autem & antennis levius, facile rem expedietis. Horum alios è musco arborum corticibus innascente prodeuntes, alios sub ollis truncisque putridis latitantes cepimus. In hirsutos non plures incidi quam duos. *Primus* hac figura & forma albicans, in muro repositus; pili brevissimi innascentes nigri fuerunt. *Secundus* ventre sublivido dorsoque inamœna flavedine maculato: est illi os punicatum, ocellus niger, pili canescentes. In arboribus effœtis, atque annosis inter corticem & lignum latitat, atque etiam inter saxa musco villosa ac

denso obducta. Omnes Iuli tactu se in gyrum colligunt & convolvunt.

An sint venenati equidem ignoro: sed si fuerint, sanè perbeatum Pennium, qui variè ipsis nuda manu irritatis ac læsis, immorsus sanusque evasit. Georgius Agricola ænei coloris Iulum, (sed is Scolopendram vocat) his verbis recenset: Scolopendra admodum exigua, in truncis arborum, aut in palis terræ infixis, (unde nomen invenit) gignitur & vivit; quibus amotis vel commotis egreditur, aliàs omnino latitura. Pennis caret, sed plurimos habet pedes. Si quando repit, corporis partem mediam, veluti arcum intendit: si bacillo alia vere tangatur, se contrahit: color illi æneus; corpus tenue, nec latum, tres transversos digitos longum, ad summum quatuor. Alia item specie, iisdem ferè locis reperitur, corpore exili & terete, fili ferè crassitie, spadicei coloris dilutè: pedibus adeo numerosis atque exiguis, ut eos numero complecti ^{ἐν τῶν ἀδυνάτων} sit, quatuor digitos transversos longa est: sub ollis degit & asseribus putridis. Avicennæ Scolopendra, (qui etiam Iulus) solummodo 44. pedes habet, palmam longus, tam exilis ac tenuis, aures ut intrare possit libro quarto Fen. 6. tractat. 5. capite 19. Hujus (inquit) aut nullum aut languidum venenum est, nec magnum dolorem excitat: qui floribus Asphodeli, vel sale cum aceto mixto statim sedatur. Iuli nostrates, (inquit Gesnerus) si in ædibus fuerint, ad Saccharum Thomæ, id est purissimum (ceu ad optimum caseum mures;) congregantur. Bruerus noster (peritus ac industrius naturæ explorator) Scolopendras se in Anglia vidisse, & habere referet noctilucas, in ericetis muscosis toto corpore fulgentes. Cui licet, mentienti nescio, ultrò credam: eò tamen magis, quod Oviedus idem, in nova Hispaniola per agros; & Córdus in Germania in cellis humidis observasse se scribunt. Mirum est quod Plutarchus refert, bestiolam asperam multis pedibus celeriter ambulantiem, multo cum semine ab Ephebo Athenis ejectam, libro 8. Sympos. probl. 9. Iulus cellarius in pulverem crematus, mirifice urinam provocat. Merula. Iulorum humor cum cruore ex asellis expresso, ad albuginem oculorum tollendam divinum & efficax remedium. Arnold. Brev. 1. capite 18. Atque hætenus de Iulis, de quorum natura Hesychii, Aristotelis, Nicandri, Lycophronis & Ardoyni varias opiniones prætereo, quia variæ non veræ.

129


HISTORIÆ NATURALIS DE INSECTIS.

LIBER III.

De Insectis Terrestribus apodibus.

CAPUT I.

De Vermibus in genere.



Nomen.

THÆC DE INSECTIS terrestribus pedatis volumus. *Apoda* sunt *Vermes*, *Teredo*, *Lumbricus terrestris*, *Tinea*, *Limax*.

Vermi nomen inditum, quod se in

multas partes vertat ac torqueat: vel quod verrat, seu ad partes oppositas se trahat, ut Isidoro placet: nisi fortè ab *ἔρτω* deducere malis, quod répere significat. Græcis est *σκωληξ*, aliquando *δερμίδις*.

Generatio.

Mater omnium non tam putredo est, ex humidi nimia abundantia, cum calido juncta exorta: quam semen vel seminale principium, quod idoneam materiam nactum, & à calore ambientis excitatum, sese exerit, & vitales operationes exercere incipit. Unde accidit, ut & in illis quæ putrescere nequeunt reperiantur: molitoresque dum suorum lapidum læviorem stylo castigant, vermes ibi natos reperiant.

Natura.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

Nulli generi oculos esse Plinius asseruit: levissimum quibusdam vestigium Galenus. Sentire, gustare datum. Percepto sonitu latefcunt. Amara refugiunt, dulcia requirunt & sugunt. Repunt, in arctum corpulculi sui partes colligentes, & posteriora attrahentes, quod *ἐκσπῶνται* propriè Græcis. Motu undarum moveri Galenus dixit. Nullum iisdem ingenium vel memoria. Unde quidam *obliviosos* dixere. Medio corpore dissecti, utraque parte vivere videntur, iisdemque aluntur, ex quibus constant.

Galen. de
Diff. puls.
l. 1.

Ufus.

Cedunt aviculis & aliis animalculis incibum, sed & ab Indis omnigeni comedi dicuntur. Crudos vorare, Lopezius testis est. Quæ de Schamir verme, cujus in findendis lapidibus ad templi Salomonici structuram usus, Iudæi scribunt, nugæ sunt.

Differentiæ.

Multæ eorum *Differentiæ*, sive magnitudinem, locum, colorem, sive alia attendimus. Sunt *parvi*, *mediocres*, *longi*, & quidem ita ut ad cubitos se extendant. Sunt *nigri*, *rubri*, *igneo colore micantes*.

Quidam rubicundo circulo propè caput insigniuntur. Habent alii caudam, carent eadem alii. Anno M.CC.LXXXV. Scorpionum instar caudati in Prussia vagabantur. Intra diem tertium puncti extinguiebantur. Author libri de Natura, *aurei coloris* quosdam esse ait, qui statim ac nati sunt à parentibus alantur, deinde absque cibo vitam transigunt, ut quasi immobiles jaceant. Constituto tempore reviviscere addit. Vestiuntur nonnulli pilis, quidam non item.

Apud Mechoacanenses, *Itzuagua* vermis, qui & *Sipantipe* dicitur, duobus corniculis rubris iter prætentat; nigro fuscoque variegatus. *Tlaxquipillin* Mexicanis seu marsupium terræ vermis quidam niger dicitur, cujus pulvis inspersis medetur lepræ. *Coyayakoal*, aliis *Tzinchoillin*, & *Ichaton*, prædurus vermis est, supernè fulvus, pede numerofo purpurascens. Arefactus, tufus, & aquâ dilutus; maxillisque quotidie bis illitus, dolores dentium placat. Anno M.C.IV. ignei vermiculi, incertâ specie, in Italia per aërem vecti, ceu densæ nubis objectu, solis etiam lumen humanis oculis auferebant, &c. Nos secundum subiecta, in quibus nascuntur dispescemus.

Nieremb.
H. Exot.
l. 13. c.
16. 21.
c. 22.

CAP. II.

De Vermibus in specie.

ARTICULUS I.

De Vermibus qui in plantis nascuntur.

PUNCTUM I.

De Vermibus arborariis.

Vermes alii plantis, alii animalibus, alii homini innascuntur. Nihil de lapidibus dicam. Plantarii vel sunt *Arborarii* vel *Fruticarii*, vel *Leguminarii*, vel *Frumentarii*, vel *herbarii*.

ARBORARII, quidam lignum, quidam corticem, nonnulli folia, flores, & fructus exedunt.

Ligni-perdes dupliciter distinguuntur, vel ab ipsis arboribus, vel lignis: infestant

Monf. Theatri
Insect. 2.
c. 19.

R

non-

nonnulli ficum, alii sorbum, alburnum, esculum, Cinnamomum, Platanum, Quercum, &c. Eorum qui in *ficis* existunt, alii ex ipsis nascuntur arboribus: alius item paritur, qui vocantur *Cerastes*. Quum enim vermium magna pars specie formave inter se differunt, discrimen tamen præcipuum in his est, quod in aliâ arbore fructuve nati, translati in aliud genus servari nequeunt. Cerasten autem & in oleo nasci, & in fico parere asseverant. Habet itaque & ficus suos vermes, & illos quoque emittit, quos alienos receperit. Omnes tamen in Cerasten figurantur, sonumque edunt parvuli stridoris. Syponinus duo illi cornua in capite assignat. Cum erodendo tantum loci excavaverit, ut semetipsum circumagere possit *ἀσπίς* *ἢ* *μύσχος*, aliud animalculum progignit, & unam speciem in aliam (erucarum more) transmutat.

Et *Sorbus* arbor infestatur vermiculis rufis, pilosis atque ita emoritur. *Mespilus* item in senecta vermes tales procreat, sed grandiores quam in aliis arboribus, ut Theophrastus refert. *Alburnus* vermem profert Thripiformem, ex quo Culices deinceps vel Phalænarum species nascuntur, *ἀχράδηναι* *ζωα* *πυρὰ* *ξύλων* *ἀγρῶν* Hesychio, quia Pyros sylvestres acriter infestant.

Vermiculus in *Esculo* arbore (*Galbus* à Suetonio dictus) miræ est exilitatis, unde qui primus Sulpitiorum Galbæ cognomen tulit, à summâ gracilitate ita vocatus est. Carabum *Platanus* producit, (testibus Hesychio & Aristotele) vermem cancris marinis similem, sed sex tantum pedibus donatum. *Κασσιόβη* *ὁ* *σκώληξ* Hesychii hoc modo nascitur: (Theophrasto autore;) ligni Cinamomi ramulos binum digitorum longitudine abscindunt; recentisque bovinis tergoribus insuunt; tum exinde lignis putrescentibus vermiculos nasci ajunt, qui lignum corrodunt, corticem nullatenus tangunt ob acrimoniam: lignum hoc in ædibus Pennii visum est, à vermiculo erosum, quod cinerei fuit coloris; non valde durum, insipidum prorsus, & inodorum, contra quam Lusitani aliquot mercatores, & medicastri simplicium, ignari, affirmant.

Raucae vermes *Quercus* radici innascuntur, iisque nocent. Olea (inquit Plinius) male ponitur, ubi quercus effossa fuerat: nam relictæ in quercus radicibus raucae vermes, ad oleæ radices transeunt, atque eos infestant.

Corticarii vermes pauci à veteribus nominantur. Decempedem illud *Clopt* dictum superius descripsimus.

Folia arborum & flores depascunt *Syrones* dicti, quorum crassities quantilla sit ex eo cogitare possumus, quod inter folii tenuissimi membranas fodiendo serpit, salva utraque epidermide. Post aceti lum-

bricos: (inquit Joachimus Camerarius) nullum vermiculum vidi adeo compressum. Cuniculi, quos agit, subtilissimas aliquando lineas & fibras referunt; folia cerali & mali maculata plurimum lædunt, atque post satietatem excidunt, & videntur ex multis feminibus peponum secundum latum conglutinati formati, nisi quod longè sint minores. Ab his emortuis aliud prodit insectulum, veluti & hiab alio.

Syronibus persimiles *ἀνδρο* quos Angli tam in lignis, cortice, folio, floreque & fructibus arborum, quam caseo & cераgenitos, mites id est minutulos sive atomos appellant; à Syronibus eo differunt, quod ex multis Acaris constare videntur. Acarus autem ipse globosum, album, sepes, & pedicillo simile est animalculum; tam nullius ferè substantiæ, ut inter digitos pollicemque fortissimè compressus, ob exilitatem lædi sentiri nequeat. Antigones eum & Aristoteles *ἀνδρῶν* *τῶν* *ἀνδρῶν* vocarunt, id est Jovis promum; eam fortè ob causam quod crassissima vini dolia rostro perforat. Et sane nisi Jovis ei aliquid inesset aut divinae virtutis, quomodo tantæ vires in tam pusillo & pænè nullo corpusculo cernerentur? In *fagi* quoque *foliis* tubercula parva reperiuntur, in quibus vermiculi exiles.

Fructus etiam arborum (ut Theophrastus loquitur) est *σκωληκίστρα*: etiam cum adhuc trusus est, ut in Sorbis, Mespylis, pyris, malisque cernimus. Oliva tam in cute quam nucleo vermes *κάρπας* vocatos patitur: unde haud contemnenda pestis Theophrasto dicitur, quæ non solum succum & oleum absorbet, sed etiam nuclei tam duri ossa exedit. In *Gallis* perforatis vermiculi etiam deprehenduntur, ipsa intima medulla geniti; è quibus postea muscarum & culicum quorundam genus oriri, Valerandus Doures Pharmacopæus Lugdunensis auctor est. In *Quercus* item glande & pomis illis fungosis vermes aliquando nascuntur; eoque anno famem & annonæ caritatem Astrologi prælagiunt. *Nucibus* avellanis vermes inesse notius est, quam ut de iis contendam: præsertim æstate humida, & vento ex Austro flante. Mirum est quod Ringelbergius libro experiment. scribit: Hos vermes lacte ovillo ad serpentis magnitudinem enutriri posse. Cardanus tamen idem confirmat, modumque nutritionis, septimo de rerum varietate ostendit. Vermiculi in *ficibus* arefactis similes iis qui in avellanis nascuntur, capite nigro, reliquo corpore ex luteo albicante, sed minores. *Conos cedri* vermibus esse obnoxios comperi, (inquit Bellonius) quemadmodum & pineos. Cecindela feminam crassitie referunt, digitum transversum longi, capite formicæ, sed magis compresso; incisuris duodenis; pedes *juxta* caput

caput utrinque tres, antennæ circulares binæ, venter crassus, cauda mucronata. In præduris quoque & lignosis *opali* pericarpis, semen inest latiusculum & sæpè, vermiculis exesum: quorum velutiaurelias ibidem reperies. Nulus denique fructus nominari possit, quem non tineæ aut vermis inficit: imo ipsum aliquando Manna (ut Poëtæ fingunt, Deorum; ut Scriptura asserit: DEI filiorum cibus) putredinem & vermem admisit, quum, præter Jehovæ mandatum in crastinum reponeretur.

Huc refer *Nopal Ocuillin*, seu Tunarum vermes, *Axocuillin*, & *Cuchipilutl* Indorum. De illis ita *Nierembergius*. Familiare est hucxutlæ, provinciæ Panicensis, tunarum genus, folia ferens longa, & angustiora cæteris, intra quæ solent vermes generari lineis candidis cyaneisque distincti, mirabilis facultatis in curanda infania, si bini tusi, & resoluti ex aqua semel intra fumantur; aut si inveteratus sit morbus, bis aut ter: inducitur enim è vestigio somnus, permissusque æger dormire, paulo post mente constans expurgiscitur, atque resipiscit. Sunt autem hi vermes innoxii, neque ullum inferre nocumentum solent, si intra corpus deglutiantur: quo fit, ut intrepidè possint propinari. Addunt, paralyticis atque epilepticis eadem mensura conferre.

De *Axocuillin* ita idem. Plurimum usum vilissimæ etiam naturæ hîc videbimus. Nascuntur inquit Franciscus Hernandus, in arboribus guampatli, aut aliis, quas nostri ob similitudinem prunos vocant (cùm tamen ad myrobalanorum Arabicorum pertinere genus alicui fortassis videri possit) vermes quidam hispidi, *axocuillin*, seu ferentes axin; pallentes, vix longi binos latos digitos, ac pennam crassi anserinam. Hos indigenæ ab arboribus deturbatos permittunt ad ignem ex aqua elixari ac discui, donec comminuantur, & adeps ejusdem coloris, axin nomine, supernatet atque emineat. Colligunt hunc ad usus multiplices incolæ, & conformant in globos, è butyro vaccino parari solitis haud apsimiles, olei odore & lenitate, & ad omnia, quibus oleum conferre solet, præstantissimos, non tamen in nutrimenti usum adhuc venere. Dolores, quamcunque partem corporis obsederint, sedant: nervos tenfos laxant, emolliuntque, discutiunt tumores, aut, si natura in id potius propensa sit, maturant: erysipelatis desinentibus conferunt, ulceribus ferunt suppetias, convulsisque, nec non enterocelis, addita resina ac picetl, collectionesque cujusvis generis brevi admodum minuunt atque discutiunt.

Cuchipilutl ita describit *Nierembergius*: Vermis genus est juxta moros aut falices versans, bombycis magnitudine, & pænè formâ, sese illius instar *Oëtrobri* mem-

se firma convolvens membrana, ac prodians Aprili, conversus in papilionem. Suspendunt hunc Indi infantium cunis, atque ita somnum illis conciliari credunt. Unde imposuere ei nomen. Idem in pulverem reductus, ac ex vino proprio, quod pulque vocant, totus potus, Venerem stimulat. Mexicanis agris provenit, & ex his quas dixi arboribus victum sibi quærit.

A lignis in quibus prodeunt sumptas differentias, si attendas, vel innascuntur virentibus truncis, qui *δῆνες* dicuntur: vel in aridis & exsuccis qui *ἐγξυλλὰ*, vel in solidis & siccis qui *Thripes*, vel in lignis calidioribus qui *Termites*: vel in solidis & siccis qui *Cossi*: vel in navium tabulis qui *Teredines*.

Δῆνες fortè ἀπὸ τοῦ δάκνειν nomen sumpserunt, adeò ut sæpè ad earum radices magna pulveris vis, mordent enim & mandunt vivas arbores, quasi ferratione facta, conspiciatur: caput huic deforme; varium, tegmine coopertum, quod exerere & contrahere pro lubitu potest. Pedes habet in posteriore parte caudam versus, sicut *Cossi* in pectore; reliquum corpus tunica arenosa tegitur, quasi putamine; qua exuti moriuntur, ut cochleæ testis nudatæ. Tempore à natura constituto, in thecam aureliæ similem obdurescunt, sed quæ bestiola pennata inde provenit, nondum animadvertimus. *Cosso* longe major ob nimiam edacitatem, & minus delicatus. Pici martii, aliæque ligniperæ aves rostro virentes arbores percutiunt, & sono concavitates investigantes, eo loci perforant & pertundunt, donec ad mordellas istas pervenerint, ipsasque deglutiverint. Valdè enim delectantur hoc cibi genere, ejusque gratia integros aliquot dies in perfodienda arbore insumunt.

Ἐγξυλλὰ in ligno furdo reperitur, & pumicoso, quod ne baculo quidem percussu sonum edit: Ceraistæ Theophrasti, & pityocampæ Medicorum valdè cognatus, nisi quod tres tantum utrinque pedes consecutus sit. Virosu illi & pertinacem odorem, & vim valde septicam tribuit *Gefnerus*.

Θρίπες à terendo dicti videntur, vulgares satis vermiculi ac frequentes, parvi, corpulculis albidis, capitibus nigricantibus vel ex rubro infuscatis, pedibus sex juxta cololum tenuissimis, exilibus, & cum rubedine non magna nigricantibus; vermiculo avelanæ nucis structurâ corporis persimiles, sed medio minores atque breviores; nigra ligna non amant, sed albicantibus duntaxat (qualia sunt *Alburni*, *Coryli*, *Betulæ*, *Cinamomi*, *Platani*) innascuntur: quæ jam arida solidaqua perterebrant, & absorpta humiditate cariem inferunt.

Termitem producant ligna solis nimio calore torrefacta; qui (*Servio* authore) ex

ipsa medulla genitus, matrem tantum absumit, ossæamque & corticeam substantiam non attingit. Ingratum sanè animalculum, tantoque aliis vermibus deterius, quanto cordi arborum, & vitali ipsi fonti perniciosius; vivunt enim aliquando cute & ossibus spoliata: atqui medulla absorpta, statim pereunt, nec mederi tanto valet vulneri natura. Corporis effigie Cossos referunt: sunt autem minores multo, & non parum molliores.

Cossi rugosi admodum sunt corporis, unde & Consules quidam Romani Cossi vocabantur. Majores Cossi fere minimum digitum crassi videntur, & tres digitos transversos longitudine adæquant; colore albicante, erucis majoribus ferè similes: quare à Plinio prægrandes Cosses dicuntur; pedes utrinque tres, non procul à capite penduli, breves, exiles, nigricantes. Corpus annulis duodenis constat, versus caudam semper minoribus & pellucidis; caput crassiusculum, colore nigro, duæ in frontelaminæ; juxta os sunt exiguæ quasi setæ aculeatæ, singuli annuli in lateribus, singulis punctis rubentibus modicè cavis notantur. Tardigradum valdè est animal, & motus vix perceptibilis; qua de causa ventricosos & desides cossos appellat Festus. Oculos habet parvos valdè, dorsum teres, ventrem nonnihil concavum, colore albicante dilutum; obefuli videntur & valde molles, lignis noviter sed intempestivè cæsis innascuntur; si verò diutius resecta fuerint, plurimamque humiditatem amiserint, minores oriuntur Cossi, magnitudine solum à majoribus diversi. Veteres in Ponto & Phrygia, (ut Plinius & Hieronymus tradunt) iis quasi delicatiori cibo vesci solebant, atque eum in usum farina saginabant, ut vermiculi quoque atiles fierent. In medicum etiam usum veniunt Plinio teste, sanant enim ulcera, lac augent, nomas illiti percurant; id quod Albertus quoque confirmat.

Teredines, capite ad passionem grandissimo, rodunt dentibus, perforantque robora, vel sono teste. Hæ tantum in mari sentiuntur (Theophrasto teste) nec aliam putant teredinem proprie dici. Horum alios tam longos in navibus Venetorum quæ diu in Alexandria portubus constiterant, repertos meminimus, ut cubitum longitudine, pollicem crassitudine æquarent. Quales etiam inclytus ille Franciscus Drakus, alter quasi Maris Neptunus, in nave sua orbivaga (canè jam penè spongiosa) domum reduxit. Vidimus alias Teredines unciam longas vermi farinario persimiles. His corpus teres, caput ex luteo splendente, parum rubens, os forcipatum, à cujus quasi labris parvæ spinulæ nascuntur; pedes utrinque terni, incisuræ corporis undecim, aliquantum rubentes: re-

liquum corpus dilutè livescit cum splendore; quo majores fiunt, eò ex phæniceo obscurius splendent; quò verò minores, eò intentius albicant. Itali Byssam, Hispani ab edulio Bromam vocant: exedit enim naves & perforat; unde Aristophanes in Equitibus triremem exesam, loquentem, introducit his verbis ὑπὸ τεριδόων σαπὲς τὰ ταῦτα καὶ γινώσκουσιν. Sic etiam Ovidius 1. de Ponto. Estur ut occulta vitiata teredine navis. Teredines non naves tantum, sed & ædium trabes infestare. (Pace Penni dixerim) ex Homeri Scholiaste (Odiss. 1.) constat, cujus hæc sunt verba: Melampus, cui Draco aures purgaverat, ut Brutorum sermonem intelligeret, ob boves Iphicli abactos in carcerem conjectus est. Ubi cum intellexerat ex Teredinum colloquio, parum superesse de trabe, efferri se jussit, ne illa decedente vitam finiret. Atque dum à viro & muliere sublimis factus efferretur, domo corruente, uterque reversus periit. Patet id etiam ex Comicorum Latinorum facile principe, quam Philolachen adolescentem his loquentem verbis introducit:

*Atque illud sæpè fit: tempestas venit,
Teredo ades ingreditur, & vermis malus.
Venit imber, lavit parietes, perpluunt
Tigna, putrefacit aër operam fabri, &c.*

Magnis hi præsertim nocent arboribus, nempe Quercui, pyris, malis, castaneis, larici, juglandibus, fagis, mespilis, ulmis & latifoliis salicibus: in quibus immaturè cæsis, & plantatis, pinguedo quædam mollis & mala oritur (alburnen & alburnum saluariis dictum) omnium Teredinum seges & fomentum. Quo sicciore, amariore, oleosiore, atque duriores sunt arbores, eò magis à Teredine liberæ creduntur: tamen aliquando cupressu, juglandi, Guajaco, & Tiliæ, Ebena etiam ipsi, vim facit. Modus autem generationis ipsorum in lignis hujusmodi est. Plerique innascuntur, non foris se inferunt; depascuntque sua principia, ut ex quibus constant, ex iisdem constare pergant. Materialis causa & conjuncta, est dulcis & alimentarius lignorum humor putredine infectus, quemadmodum ex pituita dulci lumbrici intestinorum nascuntur. Putrescit autem dulcis ille humor duplici de causa. Dyscrasia scil. vel continui solutione: per Dyscrasiam qualitas corrumpitur; per vulnera vero, non tantum innatus effluit, & se effundit humor, sed alienus quoque per pluvias caliginesque illatus putredinem efficit. In vetulis, raris, & siccatis per ætatem arboribus, maximi sunt vermiculi; tum quia humidum radicale magis minuitur, tum quod Dyscrasia colorque & humor peregrinus magis augentur: quemadmodum

modum & senes plerumque dira scabies, & fyrones acarique crebrius infestant. Sub lunâ exposita lignacitius vermiculantur, ob nimiam aëris humiditatem; sub sole autem calidiore, ob nimium ardorem. Qui verò innascuntur, hi omni tempore generantur: Illatitiis autem, & ex semine culicum, muscarumve natis, ver potissimum atque æstas amica sunt: hyeme enim congelati pereunt. Coelum quoque & solum magnam vim habent, ligna quippè Hibernica rarius putrescunt, ex Solis virtute; quemadmodum & Arabica, ex coeli.

PUNCTUM II.

De Vermibus fruticariis.

Moufet.
l. c.

Vermes fruticarii, Salicem, Ilicem, Juniperum, Cynosbatum, & reliqua infestant. In *Salice* humiliori, (præsertim quando gallæ tuberculosa erumpunt) nonnunquam quasi rosæ inveniuntur, quæ vermibus scatent, uti etiam in lentisci foliis accidit.

Illicis (inquit Quinqueranus) duo genera: alterum arborescens, alterum frutex exiguus, sesquipedali proceritate. Latissimè viret, foliis lævare præfulgidis, spinarum vallo ambitis numerofo, stolone asurgit in modum rosarii: à nostris Fagi appellationem sortitus, quamvis nullam fagi imaginem repræsentet. Provenit locis planis quidem, sed in altitudinem erectis, exilibus & sitientibus collibus, sed infœcundis. Vere medio roati imbris frutices, *Coccum* hoc modo ordiuntur. Ubi imus scirpus se in duo brachia sortitur, in horum medio primum omnium increfcit rotundum quiddam magnitudine & colore pisi; hoc Matrem vocant, quod ex eo cætera grana producantur. Matres porrò habet ut plurimum quinque quælibet cespitum familia, quæ ineuntè æstate æstuque minutissimorum vermiculorum catervam profundunt, fatiscuntque in summitate. In animalia prorepat nova soboles colore candida pro se quisque in sublime. At ubicunque vermiculi vel germinantis furculi axellis occurrerint, decident, & incrementis aucti Milii magnitudine fiunt. Inde liberius adolescentibus, albus color in cinericiu transit, jamque non animal, sed Pisum rursus apparent. Tuntque ea grana maturitatem adepta colliguntur, jam coloratis vermiculis foeta: dum asportantur mercatoribus, ambiens pellicula præ teneritate rumpitur. Vermiculorum quidem qui circa vaginulam habentur pretium in libram quamlibet, aureus solatus: in granorum vero quæ adhuc eorum partem retinet, hujus quadrans. Torpent interim vermiculi, ac immobiles jacent. Cæterum,

quum primum tempestivitas adest, in lintea præcipitati Soli exponuntur. Tum libato colore statim prorepunt, atque aufugere nituntur, sed à custode, qui continuus affidet, concussu lintei in medium cœusque rejiciuntur, donec emoriantur. Tanta quidem dum hæc fiunt, totoque mox triduo, odoris suavitate ac gratia, ut non Cibetæ, non Moscho, non Ambra, sed ne Citriorum quidem floribus concesserit. Si quæ verò grana legentis effugerint sedulitatem, ea mox alatorum animalium numerosum exercitum in auras effundunt. Observatum est uno anno ex campo lapideo, in Arc-latensi agro, hunc proventum undecim aureorum millibus æstimatum. Hæc Quinqueranus.

Similis Cocci parandi ratio; etiamnum meo tempore (inquit Carolus Clusius) in Gallia Narbonensi, atque etiam in Hispaniâ observabatur. Areas enim sub dio habent ad id destinatas eminente aliquantulum margine; quibus linteo panno instratis Coccum effundunt, custodibus cum bacillis summo fervore Solis perpetuo assidentibus, & extrema lintei concutientibus: ut vermiculos effugere properantes, in anteriorem lintei partem repellant. Verum Petrus Bellonius lib. I. obser. cap. 17. aliam præparandi Cocci rationem refert. Cocci baphicæ (inquit) proventus in Cretâ magnus est: Pastores & pueri eam colligunt. Inveniunt mense Junio in exiguo quodam frutice ex *Illicis* genere, quæ glandem fert, sine pediculo inhærens illius fruticis stipiti, colore ex cinereo albicante. Quoniam vero istius fruticis folia spinis horrent, uti Aquifoliæ; pastores ferulam sinistra gestant, quâ ramulos deprimunt & inclinant. Dextra falcem putatoriam, quâ ramulos demetunt; à quibus vesiculas rotundas, exigui pisi magnitudine auferunt, qua parte ligno adhæserant apertas & hiantes, plenas exiguis rubris animalculis lende minoribus qui per hiatum istum effugiunt, & vesiculam vacuum relinquunt. Pueri Coccum jam relictum ad Quæstorem deferunt, qui ex dimenso ab illis redimit. Is à vesiculis animalcula cribro segregat, deinde ea summis digitis leniterprehendendo in pilas efformat ovi gallinacei magnitudine: Etenim si nimium comprimeret, tota in succum resolverentur, & color periret. Itaque duo infectionis genera; unum pulpæ, alterum vesicularum, & quoniam pulpa inficiendo magis utilis est, ejus pretium quadruplo majus quam vesicularum.

In summis *Juniperi* furculis, exiles è croceo rubentes, Gesnerus observavit. In *Cynosbati*, sive rosæ sylvestris spongia vermiculi nascuntur albicantes, ex quibus Aristoteles Cantharidas provenire scribit. Post duos menses, (inquit Gesnerus) in hy-

pocaulsto servata spongia magnum numerum vermiculorum viventium reffudit. Spinaitem, & sentis, Rosa, Erica, Genista, Colutea, Rubus Idæus, Myrtillus, Capparis, uva crispa, Carpinus, Oxyacantha, ligustrum, vitex, glycyrriza, omnis denique frutex, & suffrutex à vermibus exeditur: neque Ricinus ipse (Jonæ, divino illi vati, nimium exæstuantum umbram præbens) ab hac peste legitur immunis.

PUNCTUM III.

De vermibus leguminariis & frumentariis.

Moufet.
Theatri.
2. c. 20.

Legumina sunt *σκαληνίδαι*: sed quomodo id eveniat incertum est. An quoties diffundi nequit humor ob æstum & squalorem, ut Theophrastus innuere videtur? An potius dicendum à sicco humore appeti, humorem autem illum refugere tanquam adversarium? Sic pendentes arido parieti videmus guttas. An calor nimius corrumpit naturalem, cum calorem, tum humorem intus contentum? Sanè eo modo putredinem induci, morbidissima Æthiopia testis est. Fabas depascitur vermiculus, Midas Theophrasto, Hesychio *νολις* vocatus *πρόξ* & *κνάρμα* *πρόξ* vermiculus leguminaris dicitur, sed præcipuè in Pisis versans, & ab erosione nomen obtinens: qualis etiam in Cicere, posteaquam pluviis ab eo elota fuerit salsugo; ut præter Hesiodi Scholiasten Phavorinus & Theophrastus statuunt; leguminibus dulcioribus sæpè innascuntur, tum ob alimenti aptitudinem, & Elementi verminantem naturam. Dulcia enim vermes citò generant, generatosque nutriunt & signant.

Frumentarii.

Frumentarii vermes, in genere *φόμικες* dicuntur: qui tritici, siliginis, panici, avenæ, orizæ, milii, & secalibus radicibus, stipulis, calamis, spinisque victitant. Eorum alii amylo vescuntur frumento, ut Farinarii: alii integro & mola nondum confrecto, ut *Curculiones*. Farinarios Angli Meale-wormes appellant, teredini similes, sepedes, capite parvo & spadiceo, corpore annuloso, & pro farinæ diversitate vario colore: proba enim & albissima farina, albos generat; vetustior flavos; macra & furfuribus immixta etiam fuscus. Cardanus eos *Blattas frumentarias* vocitat, sed (ut sæpè fit,) incogitanter. Furfure nutriti mirum est in quantam excrescant multitudinem, & ex decem trecentos brevi videas. Apud panni lanei textores quovis ferè tempore inveniuntur: hi enim ex furfuribus, aceto & axungia mixturam faciunt, undè copiosissime nascuntur. Integri frumenti, sive tostii, ut in *βόνι* Aëtii (quam Mault Angli, cerevisicæ matrem, appellant) sive crudi, strages curculio:

sic enim rectissime meus Comicus, et si Virgilius atque Varro Gurgulionem, & Curculionem scribant.

^{Kis} Græcis dicitur, Animal triosttrum. Triticum præcipuè sed etiam alia quæcunque vastat frumenta; præter cassam tenuemque membranulam nihil reliquum faciens; nam ut Georgicorum vates; populatque ingentem farris acervum, Gurgulio. Ad Scarabei minuti faciem formatus, rostrum habet sibi peculiare; & trifurcum. Corpus aliis nigrum, aliis subfuscum, aliis, & majoribus subviride, cujus medium isthmus coarctat. Bestiolæ tanta est siccitas ut primo quoque tactu levissimo in pulverem abeat. Vere maxime generatur paucorum dierum spacio, antequam examina faciunt apes. Nascuntur (inquit Theophrastus) ex alia grani parte; quod vero reliquum est, pro cibo utuntur: rustici nostri *στροφάλυον* hoc animal in parietum rimis ac inter tegulas ova ponere pro explorato habent, unde per procreationem nova soboles. Triade his bestiolis mira memorant. Primum, quod licet ab initio paucæ fuerint, brevi in infinitam sobolem propagantur. Secundo quod inter tegulas ac in rimis parietum triennium ac amplius ferè sine cibo vivunt.

Tertio, si una cum hordeo vel tritico per triduum submergantur, tandem exemptæ reviviscunt. Syliardus noster (diligens naturæ observator) *Curculionis* propagationem ita describit: Quum formicæ aristæ culmen exederint, ascendit curculio, & per exiguum illud foramen, ovum unum vel alterum, (rarissimè tertium) deponit, magnitudine fermè grani milii; oblongum fulvum, liquidæ materiæ & fulvæ plenum: ex quo de inceptus novus prodit Curculio. Datur in hoc insectulo uterque sexus; siquidem coeunt antequam hanc injuriam inferunt. Petrus Comestor ex fabarum corruptione provenire affirmat, cui præter Guillerinum de conchis nemo subscribit, ne curculionem cum Mida malè confunderent. Præter vulgo notum hunc Curculionem Joach. Camerarius è Germanorum horreis duos ad Pennium alios misit, ventre longe turgidiore; quorum unus subcineritii, alter viridis coloris. Est etiam in tritico (inquit Scaliger) Curculio quidam erosus, quem fortè Plinius Scarabei frumentarii nomine subintellexit.

Circa Lentzburg oppidum Germaniæ in agris reperitur Insectum, quod alii vepit, nonnulli Korne worme, quidam Kornevele appellant. Dicitur esse adeo venenosum & noxium, ut agricolæ aratro relicto obvium illud persequantur, & interficiant. Et rubro parvo nigricat inter segetes habitans, & grana comedens. Vermes in vitibus nati *Cocci* illos vermiculos æmulantur, quales in Pimpinellæ radicibus colligi

colligi putat, imo pertinacius instat Bras-
savolus.

PUNCTUM IV.

De vermibus Herbariis.

Herbarii nascuntur, in Violis, Cyna-
ra, Ocymo, Saccharo, Lupulo, As-
phodele, Pimpinella, Dyfaco, Carlina,
&c. *Violarum* vermes minutissimi conspi-
ciuntur, & nigri, celeri repentes cursu;
ut Jacobus Garetus, Pharmacopola diligen-
tissimus, & simplicium cognitione inter
paucos celebris, observavit. E radice *Cinarae*
prodit vermis Hexapus, eruciformis, al-
bicans, capite ex nigro rubescente. Cina-
rae radices qua rodit nigras reddit; ac
tandem interire facit: tales item Raphanus
producit.

Referunt, (inquit Cardanus) vermem
in ruta foliis inventum, lacte ovillo, eo-
dem modo quo Avellaneus, ad magnitu-
dinem non parvam enutriti. Vermiculus fi-
lius roris, Ocymique hospes, corpore ferè
erecto, posterioribus pedibus hæret, dum
prioribus locum, capret. Ex *arundine* sac-
charina, saccharum paratur, omnium qui-
dem salium dulcissimus, & (ut vulgus me-
dicorum existimat) putredinis omnino ex-
pers. Tamen fretus Scaligeri clypeo, in
saccharo pusillum vermem, longum, pu-
licis colore, & (si rostrum adimas) Cur-
cullionii persimilem nasci asseveramus, &
saccharinum propterea meritò dicimus. Hu-
jus item Bellonius mentionem facit.

Videtur etiam rara admodum generatio
ejus Insecti quod Germani (utor Camera-
rii verbis) Mayen-wormlein appellant.
Quippe mense Majo sæpè cadunt rores
insalubriores, qui si in lupuli folia incide-
rint, vertuntur in animalia, Hoppen dicta.
Eorum aliquot intermillia unum interdum
videris aliis longe majorem (quamvis ipse
pediculum obesorem vix superat) cui lu-
tei circa ventrem circuli, dorsum striatum,
cauda satis protensa, color maximam par-
tem corporis subniger. Huic cum ros de-
ficit alimentarius, reliquos sui gregis sigil-
latim devorat semper à proximo incipiens.
Bombycum instar cutem mutat demum ubi
totus ferè perlucet, deposita ultima tu-
nica, capite & pedibus per gluten quoddam
tenue folio affligitur atque ita emoritur:
Hunc vermem lupularium vocare quid im-
pediat?

In *Asphodeli* caule vermis gignitur
Asphodelis cum herbâ florere incipit; ex
hujus Scapulis alæ sensim excrescunt, at-
que tum volucris factus, lares deserit. In
Persicariae Siliquosæ & Cardui sylvestris
geniculis extuberantibus, vermiculi na-
scuntur albicantes, ut in floribus *Pseudoca-*
calie purpurascentibus sublutei, in *Pimpe-*

nelle radice miniati. *Aspio* foeminae vermes
lanuginosos; in *Fungis*, & *Brassica*, graci-
les, nigricantesque in Acori radice albidos
sæpè vidimus. In radice *Enulae* sive Hele-
nii virentis & crescentis, vermis albus de-
cem vel undecim articulis conspicuis ori-
tur, ad pennæ anserinae crassitiem; capite
parvo & nigro, pedibus sex brevissimis, &
colore anthracoco. Indorum reges (*Ælia-*
no teste) in planta quadam vermem re-
pertum igne tostum, secundis mensis ad-
hibent, & pro cibo suavissimo blandissimo
laudent.

In *Dyffaci* capite vel caule vermiculum
vidimus exiguum, capite parvo pedibus sex
nigricantibus, incisuris decem vel unde-
cim. Primum caulis medullam illam spon-
giosam depascitur, eaque deficiente, per
inopiam pabuli commoritur. Mensis Octo-
bris initio facilè invenitur, quamvis Mar-
cellus in Dioscoridem, insigni sanè auda-
ciâ, id denegat. Hic est ille, ni fallor, quem
Tatinum appellant veteres. Galedracon
vocat Xenocrates plantam leucanthemo si-
milem, (inquit Plinius) Caule ferulaceo,
alto, pinosque capite, & oviformi: in hoc
unâ cum ætate vermiculos nasci tradunt, in
dolore dentium perutiles. In radicibus
Carlinae, (quæ planta in excelsis Sabaudia
montibus luxuriat) vermiculus reperitur,
in quibusdam nascens, in aliis adolescens,
in plurimis alatus, & avolare paratus. Al-
bus est, in aliquot divisus articulos, o-
culis nigris conspicuus. Animalculi in poten-
ti herba geniti usus in re Medica forsan
eximius est: cujus curiosis secretorum na-
turae indagatoribus disquisitio commit-
tatur.

ARTICULUS II.

*De Vermibus qui in animali-
bus nascuntur.*

Vermes in animalibus qui exoriuntur,
superius quoque cum de pediculis a-
geremus attigimus: nunc omissa addantur:
de quibusdam duntaxat qui in piscibus &
quadrupedibus reperiuntur, agere placet,
Pisces quod concernit, *Mullis* ideo steri-
lis est, quod in ejus utero vermiculi, post-
quam ter peperit, inveniuntur, qui se-
men absument, si Athenæo credimus. *Cy-*
prini parvi nigrum sub branchiis aliquando
gerunt, qui eos in tabem deducit. Duode-
cem veluti uniones, inquit Bellonius, er-
vi magnitudine, carnosos tamen, candi-
dos, & calli duritiem habentes, in quibus-
dam *Cernuis*, (sic vocat, teste Gesnero,
percas fluviatiles) conspexi: quorum unus-
quisque vermem inclusum, gracilem, oblon-
gum ac teretem contineret: qui ex venis me-
saraicis dependerent inter colon & ileon,
ad

Athen.
Dipnos. 6.
c. 16.

ad eos anfractus, in quibus lactes esse solent. Circa Basileam omnibus dulcium aquarum piscium generi innascuntur, Leuciscis imprimis, quos Schwalen ibidem vocant. Albi sunt, longi, convoluti.

Æstate afficiunt: & ex ventris duritie, magnitudine, & albore deprehenduntur. Quatuor lumbricos, in secunda Leucisci Rondeletii specie Gesnerus invenit; vivos, candidos, latos, exigua crassitie. Major, digitos ferè decem longus erat, latus dimidium. Idem sub finem Maji, in Cypri- no lato, aliquot offendit, ad digiti longitudinem, unum albicantem. Sed & *Gobio* vermiculos in ventre gestat.

Ex *Quadrupedibus* laborant iisdem, Equi, Oves, Lupi, Capræ, Boves, Cervi, Canes, &c. *Equis* in quavis ferè corporis parte exoriri possunt. Paschalius ventris facit crassos & albos: gutturi, breves, rotundos, & crassos, qui etiam aliquando in intestinum rectum descendant: inter costam natos, longos, & capillorum instar tenuis. Ruinus quatuor *lumbricorum* genera in eorum intestinis exponit. *Crassos* & breves, in modum pistachiorum sanguinicos. *Longos* rotundos & albos, qui terebibus in humano corpore respondent. *Parvos* ac tenues, *Tarme* Italici, qui quandoque cum facibus egrediuntur. *Ascarides* fortè. Nam se foramini recti intestini copiosè ingerunt. *Breves* denique & crassos instar fabæ, pilosos, qui se interiori recti intestini parti applicant. *Brassavolus* in pullorum ventriculo, ingentem copiam rubrorum & seminigrorum Ferrariæ reperit, feminis cucurbitæ forma. Ruinus propè stomachum, in equis mortuis, plusquam centum, pistachii ferè magnitudine, sanguineos, qui prima stomachi membrana erosa, ad secundam pervenerant. In *ovium* hepate reperiri, nullum dubium. Adhærent & bisulcis eorum ungulis. In cava vena diebus canicularibus, Coiterus invenit. *Lupis* in vulneribus & ulceribus facillimè oriuntur. Ideò fortè lapides, ne lædantur, pertimescunt. *Caprarum* gregariorum caput, multis vermibus juxta cerebri basin naturaliter affici, scripsit Trallianus. *Boves* sub lingua, nec non inter cutem & carnem sæpissimè affligunt. In cerebro *Cervino* semina cucurbitulæ æmulantur, in aqua mortui videntur, in vino reviviscunt. Propè vertebam nati, iis qui carnes foedant, similes sunt. *Canes* sub lingua vexantur. *τίνα* vel *χίλια* Græcis. Alii, nervosam quandam congeriem dicunt, quæ canicularibus inflammata, rabiem concipere opinantur.

Huc pertinent *μύια*, qui in carnibus nascuntur: *Tarnia* qui in lardo. *Meldera*, qui in caseo. *Cleri*, qui in favis apum. Habent & *Locustæ*, postquam pepererunt, cir-

ca fauces suas, qui eas strangulant. Inveni & in phalangio duo. Qui id mortuis corporibus reperiuntur, vel ulceribus Chirurgorum aliquando incuriâ, *ἑλμῖν* Hippocrati & Plutarcho, *ἄσπερ* *vermina* Lucretio, *ναυὰ* *ἑλμῖν* Suidæ, dicuntur. Sunt vel caudatæ, vel caudarum expertes. Gallinæ utrisque vescuntur. Democritus eorum ex Oraculi consilio usu, & Theognosti Democratii ductu, à comitali morbo liberatus est. De *Fuga*, & quomodo occidantur, veterinarios vide.

ARTICULUS III.

De Vermibus qui in homine.

DE vivo homine res est. Nam ex cadavere exurgere certum: natumque aliquando ex medulla spinali serpentem, Camerarius author est. In variis verò illi membris reperiuntur. In *Cerebro* nascit, testantur, Hollerius, Thomas à Vega, Cornelius Gemma & alii. Frequens id olim in Hungaria & Germania: quique laborabant in phresin & maniam incidere solebant. Unicum in allio, quod cum vino sublimato exhibebatur remedium. Vir apud Benivenium robustus è dextra nare palma longiores ejecit. Prodiere ex *auribus* in peste, iique crassi sed non ita longi. Hinc *ἑλμῖν* Dioscoridi.

Vidit & Valescus de Taranta duos vel tres, granorum pini magnitudine, crassiores tamen. Sub lingua nasci, Montuus author est. In *Dentibus* Sinones à quibusdam vocantur. Battæo Syriæ Monacho ex nimia inedia, enatos fuisse, Sozomenus tradit. Per *oculi* iteriorem partem puellæ trimæ vermem semipalmarem, album, eductum, Amatus Lusitanus scribit: Stabulari aliquando in aspera arteria, Avenzoar; in pulmone, Aloysius Mundella, in vesica & renibus, Dodonæus, Rondeletius, Fernellius & Jocatius; in utero, Priscianus & Garzias Lopus, testes sunt. Ejectus ex pectore per tussim; egressus per penis meatum & quidem spontè unus: minxit quidam Perulinus parvos & latos: Italus quidam elychinii crassitudine, vivos & rubentes; vide & apud Moufetum exempla. Exiit per uteri collum magna multitudo. Prodiit & ex polyposis naribus postquam foliorum tabaci succo cruciaretur. De eorundem mictu, Tulpius consule. In brachiis, cruribus, suris, & cute reperiri, Dracontia puerorum, Niguar seu Toni Americanorum; & Indorum Orientalium, ostendunt. Quid plura? Nec cor fortè liberum erit.

Dari enim & in sanguine lumbriciformia animalcula, corpus exesura apud Plinium habetur. Cum semine ejectos, apud Plutarchum. Et qui non nascantur ibi vermes, ubi angues bifidi flagellati, ut in Appendi-

Ruin. de
morb. e-
quor. 4. c.
1.

Trallian.
l. 3. tr. 2.
c. 3.

Vincent.
l. 29 c. 6.

Holler. l.
I. cap. I.
Vega in c.
5. de locis
affectis
Galen
Gemma in
appendice
operis Co-
smocrit.
Beniven.
Exemp.
c. 100.

Mont. to-
mo 4 cap.
19.
Sozom. H.
Eccl. l. c.
34.

Lusitan.
cent. VII.
cur. 62.
Mundella
Dialogo
4. Dodon.
ad Beniv.
cap. 78.
Rondelet.
de dignos.
morb. cap.
17.

Moufet
Theatri
Inf. 2. c.
20.

Tulp. ob-
serv. l. 2.
c. 49. 50.
51.

Plin. H.
N. l. 26.
c. 13.

Appendice ad serpentes diximus, inventi sunt.

In intestinis qui hæere solent, sunt *Latii*, *Teredes* & *Ascarides*. Priores omnes ætates infestant, Græcis *ελμίνθαι πλατείας*, & *κηρία*, Latinis propriè *Teniæ*. Per tota enim aliquando extenduntur intestina, corollæ in se ipsam ductæ instar. Tricenum pedum esse notat Plinius, Platerus quadraginta vidit. Partes eorum non ita exactè semen cucurbitæ referunt, sed ubi abrupuntur, & moram aliquando jam semi mortui trahunt, pars quæ ad latera tenuior, putrescit: quæ verò in medio veluti nodus, figuram seminis cucurbitæ vel cucumeris refert. Quatuor historiæ apud Fabricium Hildanum vide. Ad hos illi, qui *σκουειδής* seu *cucurbitini* vocantur pertinent. Ideo quibusdam alterum *Teniæ* genus. Ex partibus multis, quarum singulæ semen cucurbitæ referunt, constant. Ex his illum fuisse putato quem Lusitanus describit, quatuor cubitorum, latitudine semiunguis exigui, albus, capite verrucoso, ex quo totum corpus procedebat, quem mulier Illyrica tussicula vivum. ejicit. *Teretes* *στρογγύλοι*, seu rotundi Græcis, si magnitudinem spectes, sunt aliquando, longitudine sesquipedali, quinque pedum sæpe, nonnunquam palmam non excedunt: si colorem, sunt, rubri, flavi, nigri, ex parte albi vel fulvi, & virides: si constitutionem, visus est rubro capite, pisi magnitudine, lanuginosus, cauda lunata: visus dorso lanuginosus, pilis rubris confito, &c. Platerus octodecem ulnarum exsiccatum habuit, quem Moufetus vidit. Trecentorum pedum longitudine ejectum, Plinius auctor est.

Ascarides *ἀπὸ τοῦ ἀσκήν*, quod mordicationem & pruritus excitent; vel ab *ἀσκαρίζω* moveo, dicuntur. Veteres *jumentarios* dicebant, quod sæpius in equis, & boum genere apparerent. Sunt lumbricis terrestribus similes, sed unciam raro superant. In extremo languore reperiuntur.

Dantur præter hos & *Monstrofi*. Benivenerius unum pedibus quatuor, cauda novæ lunæ instar falcata, digitorum duorum longitudine observavit: Gabucinus, nigrum & pilosum: Capriana, binis cornibus flexilibus, & centum utrinque pedibus subviridem, & qui mire progrediebatur. Rondelet. Scolopendræ similem, sine oculis. Schenckii filius variantem, rostello acuto sanguineo excrevit. Rusticus apud Wierum octopedem, rictu oris capiteque anati simillimum Anguillæ similem, &c. Plura apud Aldrovandum & Moufetum invenies.

CAPUT III.

De *Teredine* & *Lumbrico*
terrestri.

DE *Teredine* pedata, superius cum de vermibus plantariis ageremus, egimus. *Depedis* meminit Agricola, quem ab æneo colore *kupferwurm* vocat. Serpit, inquit, quia & pennis caret pedibus. Crassitudo ipsi quasi parvæ anserinæ pennæ, longitudo scolopendræ. Teres est, sub lignis putridis natus, & plerumque juxta scolopendram inventus.

Aldrovandus quatuor teredinum genera constituit. *Unum* Plinii & Theophrasti, quod dentes habet & duntaxat in mari in lignis reperitur. *Alterum* Vermiculus dictum; *Tertium* Thris, *Quartum* Cossium quem vermem multipedem in lignis quidam faciunt. Ipse observavit vermem pili longitudine in ligno nascentum, colore album, figura fere Erucæ sylvestris similem. Linea in dorso à capite ad caudam usque conspicua, more Erucarum repentem, fere, undecem in singulis lateribus, punctulis quibusdam castaneis, ore nigro ex duobus veluti introrsum se curvantibus dentibus confecto; qui admodum constringebantur, plusculis prope os pedibus. Ex ore succus quidam viscidus; lentusque emanabat. Hunc vermem *Cossium album* existimat.

Multe tamen sunt arbores quæ teredinem non sentiunt, ut tilia, quamvis corticis & foliorum succus dulcis sit; ob odorem; buxus, ob duritem; abies circa germinationes decorticata; Mori materiem æternam Theophrastus reliquit. Alexandri verò Magni comites prodiderunt, in Tylo rubri maris insula, arbores esse, ex quibus C.C. annis durantes inventas, & si mergerentur incorruptas. In eadem esse fruticem baculis tantum idoneæ crassitudinis, varium, tigrum maculis, ponderosum: & cum in spissiora decidat, vitri modo fragilem &c.

Lumbrici terrestres Græcis *γῆς ἕντερρα*, δῖον, *ἀλάκται*, Siculis *γαφᾶγα*, quod terram comedant; Latinis *Intestina terra*, Monardi *Oniculi* & *Nisculi* dicuntur.

Duo ipsorum genera Lumbricis intestinalibus quidam sunt similes; alii *Ascarides*. Illi colore sunt interdum subalbido, interdum subsanguineo: & pluviis cadentibus subito è terra prodeunt. Hos qui parvi, non unius ejusdemque coloris dicit Agricola. Sunt candidi, lutei, sæpiusque aratre excitantur. Vastant sata radicibus subsectis. Ad eos pertinent *Zuccarole*

S

Italica

Agric. de
animalib.
sub ver-
ram.

Plin. H. N.
l. 16. c. 41.

Aldrov.
H. Inf. l.
6. c. 5.

Plin. l. c.

Theophr. H.
P. l. 5. c. 5.

Lumbrici
terre-
stres.
Aldrov.
Hist. Inf.
l. 6. c. 6.

Plin. H.
N. l. c.
33.

Hild.
Obs. Cent.
2. 71. 72.
&c.

Amat
Lusit.
Curat.
Cent. 6.
Cur. 74.

Aldrov.
Hist. Inf.
6. c. 2.

Italici dicti, crassi, longi paulò minus digitum. Sub aëris æstum, è terta prodeunt. Terra pingui aluntur, & dulci radicum succo. Ex eodem nasci Gaudentius Merula scripsit. E terra egressos coivisse observavit Aldrovandus. *Tangunt se tandem modo, inquit, plusquam dimidia fere corporis parte, atque ita arctè sibi invicem adherent, ut nonnisi pedum duriusculo calcatu & frictione absistant. Videtur autem uterque cum coeunt, unus lumbricus in medio corporis paulo crassior ceteris.* Pluviam prælagiunt, si per-tusa quasi terebello humo, affatim foras erumpant. Terra namque ab Austro & aëre vaporoso madefacta, perfacilem iis transi-tum largitur. Inserviunt in esca piscibus, a-vibus, turdis inprimis & cornicibus. Sed & gallinæ iisdem victitant. Haud spernendi & in *Medicina* usus. Profunt ad ictericam tollendam si pulverizati in vino vel com-modo vehiculo exhibeantur: contra arthri-tidem scorbuticam vagam, si cum sabina, aristolochia, &c. exhibeantur: in nervo-rum vulneribus si triti imponantur: in cal-culo si ex vino passo bibantur. Mercuria-lis in lactis defectu nutricibus cum nucleis pini, amygdalis, semina petroselini, fe-niculi, rapis, &c. exhibet. Ex iisdem o-leum lumbricorum componitur. Lixivio, & amaris aquis occiduntur. Aqua verò, in qua semina cannabidis decocta sunt, ad su-perficiem prolucuntur.

CAPUT VI.

De Limace.

Aldrov.
Hist. Inf.
l. 6. c. 10.

Limacis nomen testudini terrestri perpe-ram Albertus imposuit. Distinguit & à Cochleis Plinius & quoties cochleas vocat, nudas adjicit. Nominis rationem locus sug-gerit. In limo enim nascuntur. Nec apud Græcos peculiare nomen habent.

De *Forma*, *Genere* & *Differentiis*, ita scribit. Aldrovandus. Limacum, seu nu-darum Cochlearum, aliæ magnæ sunt, aliæ parvæ: Magnæ Germanis à colore ruffæ di-cuntur (quanquam in hoc genere etiam ni-græ sunt) de quibus sentire scriptores qui-dam docti putant, cum ad medendum cochleas nudas postulant: Parvæ gregatim folia sectantur; & hortos infestant, cin-crei, aut fusci coloris, & hæ quidem sem-per nudæ sunt, quod sciam. Plin. Limaci magnæ similes esse scribit echinum. Sunt vero partium distinctiones, ut Scaliger an-notavit, in hisce animalculis admodum obscuræ, quæ hic exprimuntur primo lo-co; ex cinereo nigricant, albis per ter-gus maculis, cornicula exerunt, quatuor è ca-pite, quibus iter prætendunt. *Tertia* tota nigra: postrema cinerea albis maculis per

dorsum, iisque longis varia. Albertus in eorum extremo sitos habere oculos asserit. Plinius cochleas hæce nudas sive Limaces non tamen omnes in capite lapidem gere-re memoriæ prodidit, idque verum esse do-cuit quotidiana experientia: nonnunquam officulum, ut post patebit, idem Plinius no-minat. Cardanus Limacium lapidem vo-cat his verbis: Limacius lapis in capite Li-macis, quæ cortice non integitur, solet ge-nerari. Hunc ut ostendere possum can-dido colore, & aspera superficie esse o-portet, quod ex aquæ substantia coactus sit, & ob id etiam parvus, quod in parvo ani-mali inventus. Lapillus quem ego propriis manibus eximi è capite nudæ cochleæ, postquam in multis frustra quæsissem, al-bidus erat fabæ ferè magnitudine, multò tamen humilior, compressusque magis, modice transparens, inæqualis, admo-dum glaber, parte altera planior, altera velut in oculum protuberans durus, sed dentibus friabilis, ita ut in arenulas attera-tur. Venduntur, & alii lapilli multò majores, magis protuberantes, minus candidi, obscuri intus foveam habentes, sed ejusmo-di è nudis cochleis eximi non puto. Noctu potius, quam interdiu animalia isthæc ad pasqua exeunt, degunt autem non modo in campis & hortis, sed in cellis vinariis, la-rinis, cloacis & aliis subterraneis, uligino-sisque ædium locis.

De *Uso* hoc habe. In Africa quas-^{Ufus.}dam edi, si Brasavolæ credendum. Ex iis-dem in Medicina, sale gemmeo aspersis, & cum aqua Limonum infusa insolatis, donec quasi in unguentum abeant, Cosmeticum ad faciem lævigandam fieri. Illinitur, & mox aqua florum fabarum abluitur. Pro-sunt in *ulceribus pedum*, si vivæ comburan-tur, cinis cum thure & albumine ovorum superlinatur: in *hernia*, ruffæ inprimis, si emplastris illinantur: in *verrucis* & *ganglis* tollendis, si ex bene salitis liquor colliga-tus, iisdem affricetur. Producent in ju-mentis pilos ruffæ, si ex exenteratis & sale aspersus unguentum fiat. In iisdem, ex sero acido tepidè propinata, sanguinis per vesi-cam & anum excretionem cohibent.

Lapillus qui in capite, quartanam solve-re solet. *Officulum* quod in dorso reperi-tur, ad dentitionem alligari jubent. Inter duas orbitas inventæ, per aurem cum ebore trajectum, vel pellicula canina adalliga-tum, doloribus capitis medetur. Mizaldus stranguriosis prodesse scribit: nec non partu-rientibus, loca ipsa laxando.

Plin. H.
N. l. 30.
c. 15. l.
29. c. 6.

HISTORIÆ NATURALIS DE INSECTIS.

LIBER IV.

De Insectis aquatibus.

TITULUS I.


De Insectis aquaticis pedatis.

CAPUT I.

De Insectis aquaticis paucipedibus.

ARTICULUS I.

De Squilla, Locusta, Scorpione, Notonecta,
Cicada, Anthreno, Forficula,
Lacerta, Corculo.



NSECTA aquatica, in *Pedata* & *Apo-*
da distinguuntur. Il-
la vel paucos vel mul-
tos pedes habent.
Paucipeda sunt, *Squil-*
la, *Locusta*, *Scorpio*,
Notonecta, *Cicada*,
Anthrenus, *Forficu-*
la, *Lacerta*, *Corculus*, *Musca aquatica*, *Can-*
tharis, *Scarabeus*, *Tipula*, *Attelabus Arach-*
noides, & *Ligniperda* seu *Bellonii Phryga-*
nium.

Rondel.
de fluvia-
til. c. 37.

Mouf.
Theatr.
l. 2. c. 37.

Squilla primus, quod sciam, meminit
Rondeletius, sed crustatæ duntaxat. Pe-
des ternos utrinque habet Cauda in duo
longa & tenuia veluti fila desinit, caput
rotundum & compressum quatuor cornicu-
lis instruitur. At Moufetus plura genera
observavit, & icones expressit. *Squilla* in-
sectum, inquit iste, à *Squilla* pisce parum
differt, nisi, quod & breviores multò an-
tennas, colorem magis spadiceum vel ter-
restrem potius obtinuit. Horum alii te-
sta fragili obducuntur, alii plani sunt & nu-
di. Testacei in rivulis præsertim degunt,
arundinum vel gladioli radicibus adhæren-
tes; colore sunt subflavo, nonnunquam
autem albicante atque cinereo. Sex tan-
tum pedibus incedunt, reliqui hic appen-
dices pinnarum munere funguntur. Nudi,
vel molles sunt vel crustacei: Molles figu-
ra hæc constat satis, modo caput spadi-
ceum; reliquum verò corpus obsoleto
cinere tinctum imaginemur. Crustaceo-
rum genera omnia articulata sunt, sed

aliis globosi articuli, aliis alii: globosi
effigies graphicè hic repræsentatur, si ip-
sam leviori spadiceo mollius attigeris.
Talis *primi* & *secundi* non globosi color.
Tertia autem species dorso nigricat; ven-
tre fusco: at omnibus os forcipatum &
appositi pertinax. *Quartus* prioribus tri-
bus pedibus se movet, cæteris appen-
diculis pro remis utitur. Collum illi & an-
tennæ forcipesque minio dilutius illitæ;
corpus fuscum, vel magis cinereum.
Quinto caput longè nigerrimum; corpus
planè malicorio simile. *Sextus* autem vi-
detur, ea quam vides forma & colore cine-
reo. His omnibus oculi duri, picei, mem-
brana vitri modo perlucida obducti, qui
non minus continuo moventur, quam
quadrupedum aures. Assultant illi protin-
us, ut *Squillæ* pisces, in coitu, & ubi licen-
tia audacia crevit, implent famellam. Hoc
tempus speculatus index morsu levi signi-
ficat: illa ore compresso quicquid inclusit
exanimat, partemque socio tribuit: coeunt
enim ore, cancrorum more & locustarum.
Quem verò in Medicina usum sortiuntur,
nequeo ex scriptoribus vel Empyricis ullis,
quibus vel ignoti *Squillæ* vel despecti vi-
dentur, recensere. Id tamen constat, men-
se Aprili & Majo, nihil ad pisces inescandos
utilius haberi posse.

Locusta piscem imitatur. Colorem habet
pallentem cum virore. *Scorpionum* palu-
strium tria vidit, atque habuit genera Mou-
fetus. Primus nigricabat nonnihil; reliqui
arenam candicantem referebant. Mouf. l. 2. c. 34.

Notonecta non ventre ut alia, sed spina
innatant. Horum aliis oculi, scapulæ cor-
pusque nigricant; aliis virescunt, aliis py-
ropum, aliis picem referunt. Rarò duos
eiusdem videris coloris.

Cicada fluviatiles, & ventris latitudine &
pedibus natant, utrinque ternos habent, po-
stremi longissimi sunt. Hoc à terrestribus
differunt, quod capite sunt magis exerto, &
cervicis aliquid habere videantur. Rond. de
fluviat. l. 38.

Anthreno fuscum ubique corpus, oculis
piceis exceptis.

Forficula idem ferè color, sed magis fa-
turus; carere oculis videtur, sed intus con-
ditis cernit atque dijudicat objecta.

Lacerta varii coloris est, & piscatorum gaudet intuitu. Circa rupes Britannicas non infrequens, ubi piscibus insidiatur.

Corculus cordis effigiem, pedibus capiteque demptis, scitè exprimit. Ocellos habet perexiguos & nigros; tibiae sex concolores, duobus digitis instructos.

ARTICULUS II.

De Musca aquatica, Cantharide, Scarabæo, Tipula, Attelabo Arachnoide, & Ligniperda.

Rondel. de
fluvialil.
c. 40.

DE *Musca aquatica* ita Rondeletius. Muscas volantes, in aquæ extremitate sæpè vidimus æstate. Oculis sunt magnis pro corporis magnitudine, dorso rotundo, ventre plano, fenos habent pedes, posteriores majores ad corpus in aqua impellendum. Inter natandum geminas alas extendunt. Quare & in aëre volare, & in aqua natare possunt. Natant ventre in cœlum converso; contrario situ volant. Utrumque per vices faciunt. Venter lineis nigris & viridibus distinguitur, his pisces insidiantur.

Vide verò quæ de iis in Muscis diximus.

Aldrov.
H. Inf. l.
7. c. 1.

Cantharides, in paludibus circa lacum prope Bononiam, reperiuntur, quæ per superficiem (placet hæc & sequentia verbis Aldrovandi describere) aquæ modo irrequieto huc illuc circa eundem ferè semper locum miraceleritate se trajiciunt: nec in summo tantum, sed etiam profundius feruntur. Magnitudine, & forma Cimices referunt. Cruscula fena habent subruffa. Vaginæ è nigro virides, præsertim ad solem, & splendentes alas tegunt sed non penitus: ad caudam enim alarum extremitas prominet, quæ cum in aqua celeriter feruntur ut solent, mirabili candore, splendoreque conspicuo argentum vivum quodammodo refert: Unde, & *Pygolampides*, si quis appellat, nomen ipforum naturæ conveniens posuerit. In aërem si prorepserint, volare etiam possunt. Icon earum hæc est. Cum de *Scarabæis* ageremus, diximus etiam aquaticos dari. Eos audio esse majusculos corpore lato, compressoque, & à Germanis *Wassergugen* appellari, & in quarumvis aquarum fundis reptare. Sed videre eos mihi necdum licuit. Observavi verò Insectulum quoddam; vel ex *Scarabæorum*, vel ex *Cantharidum* genere: Rustici violam aquaticam dicunt *Cantharide* minor est, forma oblongiori, angustiorque utrinque in acutum desinens, atterrimo splendens colore, duas juxta rictum appendices breves habens, seu cornicula, fenos pedes colore ferrugineo. Observavi & aliud *Scarabæi*

aquatici genus; *Scarabæo* stercoreario minori per omnia simile, nigerrimum, coleopteron, gressu, corseve, celerrimum, saliens etiam dorso impositum, maximo nisu in aëra se vibrans, subsultim in ventrem se convertit: pedes habet inæqualis magnitudinis: priores breviculi ad gradiendum tantum apti sunt, duo postremi, cum ad natandum servire debeant remigum loco, multo sunt longiores: aliis verò illis communibus, æqualis pedum omnium est magnitudo. Hujus icon postea dabitur una cum *Tipulis*. Inveni & aliud in horti publici vasis aqueis, in quibus plantæ aquaticæ conservantur. Insectum è *Scarabæorum* genere, superiori in eo plurimum differens, quod anteriores pedes haberet duplicis usus, nimirum ad natandum & gradiendum. Sagacissima enim natura latissimos eos fecit in medio, haud aliter, ac avium aquaticarum pedes sunt, & ne latitudo (rotunda, ac cava) ad ingressum non esset inutilis, eosdem in extremo rursus fecit exiles, robustos tamen & hamatos, ut eis unà cum duobus subsequenter, qui contigui sunt, ac æque longi, ea carentes latitudine, ad progrediendum uti posset. Postremi pedes duplò sunt longiores, in extremo velut in pinnam molliusculam desinunt, in medio ventris siti, longè à primis; qui sunt in pectore. Horum quoque duplex est usus, ad natandum, seu potius ad natatum regendum, tanquam pinna aliqua, aut cauda, & cum cubat in dorsum, (apricatur enim libenter, & apricantem ego cepi) ad insiliendum. Salit enim cum in dorsum cubat, iis sese ad saltum à terra elevans. Cum cubat in ventrem, vel omnibus pedibus insistit, hocce posteriores tanquam ad incessum inutiles per terram trahit. Coleopteron est hoc insectum vagina tectum durissima, ventre quoque durissimo, ac propè osseo. color ejus ex atro ad castaneum nonnihil vergit. Antennas à lateribus capitis erigit adeo exiles, ut visum pene fugiant, castanei coloris. In summa elegans animal est.

Tipularum, quæ etiam *Macropedii*, *Pedones*, & *Gruinæ* à pedum longitudine, *Moufetus* quatuor, Aldrovandus duas observavit differentias. *Prima* *Moufeti* species est tibiis longissimis araneo sylvestri similis, corpore ferè ovali, cinereo albicante, alis argenteis, oculis nigerrimis prominentibus, antennulis duabus brevissimis, cauda mucronata: volat subinde (ut *struthiocamelus*) quasi gradiendo: aliquando tamen in aëre volat, sed nec longè nec diu. Lucis adeo est appetens, ut lucernæ amore sæpè conflagret: autumno in pascuis & pratis frequens cernitur. Sed hæc de mare. *Fœmina* conformis videtur, sed paulo nigrior, & caudæ mucronem quasi demorsum obtinet. Has Angli, Schep-

Mouf. Th.
Inf. l. I.
c. II.

Schepherds vocant : id est opiliones , quia ubi oves vescuntur ibi sæpius apparent. *Secunda* Tipula caput magis habet , oculos prominentiores , antennas quatuor exiles , corpus luteo nigroque colore varium , alas obscuriores. *Tertia* ferè similis , sed corpus totum luteum 6. vel 7. maculæ nigræ magis adornant ; habet item tam mas quam foemina caudam trifurcatam. *Quarta* species rara & perelegans videtur , capite & maxime ore furcato , scapulis turgidis , brevioribus pedibus , corpore duplo cæteris crassiore , dorso nigricante , ventre & lateribus croceis , cauda mucronata & nigra. In sepibus versatur æstate , rarius in campis reperitur. Coeunt dictæ tipulæ averfis caudis , atque ita volant ; recurvantur tamen quandoque velut in complexus. Aldrovandus bina Tipularum genera observavit. Prius in aqua stagnante scrobis , foveæve , cui cannabim macerandam immergunt rustici Bononienses , quæ ab eo usu Maceratolo vocatur , inventum , longum erat integrum palmum , colore fusco. Attelabo sive locustæ apteræ non absimile , nisi quadrupes fuisset. Antennas binas , sed articulatas , propè medium , extremo nonnihil deorsum reflexas , ac hamatas unico anicularum unguiculis simili , quibus obvia apprehendit , altera nempe articulo reliquæ antennarum longitudine annexas. Capitulum exiguum ante exigua appendice , velut corniculo acuto armatum , figura fere trigona , ocellis utrimque eminentibus atris ; ac splendidis immobilibus instructum. Alatum est pennis quaternis longis , & angustis , subtilissimis. Caudæ loco appendices binas longissimas filamentorum instar , statim ab ano dispartitas gestabat. Pedes quaternos , singulos tribus articulationibus distinctos , nempe ob longitudinem , sed imbecillimos , quales ferè Araneis sunt , anteriore corporis parte , pectore locatos. Unde cum in aquis degant , Belgæ & Germani , ut audio suo idiomate Waterspinnen vocant , id est araneas aquaticas. Collum à capite subest oblongiusculum , quod à ventre paulum latiore excipitur , & ipso tandem in acumen paulatim extenuato. Dorsum ei erat planum , quod alis tegitur , ac ferruginei coloris. Venter supinè utrimque in sulcum conspicitur exsculptus , prominente medio tereti , seu cauliculo herbx cujusdam , ut polygoni foeminæ internodiis , ac geniculis quinque quos annulos vocant , secto. Horum singulorum interstitiis macula , seu punctum nigrum conspicitur. Cum itaque quadrupes sit hæc Tipula , ab ea quam se pedem Festus esse dicebat , plurimum differt. Sed & hanc observavit. Mira corporis levitate , & pedum agilitate aquis quoque inambulat , oblongiusculum , & angustum , sed

priore multò minus , & multis ab illa partibus discrepans. Sepes est nec alatum , nigrum toto corpore , sine cauda , sed antennas exiguas , veluti filamenta subtilissima ante gerens , quibus etiam ingreditur nonnunquam. Est , & aliud genus inter hanc , & majorem medium Vere , ut Aprili aquis supernatans ; ac repens , corporis figura majori planè simili , sed & multò minus , oblonga caudæ appendice carens , & maculis in ventre , quarum loco in mediis alis nigris albidam terete gerit.

Attelabum arachnoidem nominat Aldrovandus insectum quoddam , Aranei speciem ferens , sed sex tantum pedibus dotatum , colore cinereo , ac vulvæ , seu fundi lutosi (in quo sese occultit , aut summa superficie ejus sedet , aliquando reptans , nonnunquam natans) adeò simili , ut nisi linceis oculis data opera diligentissimè intuenti eum deprehendere , aut observare non liceat. Rictu fere est Locustæ , ocellis utrinque altè satis extantibus , cætero corporis habitu non male araneum referens , alvo tota annulis pluribus secta , parte prona compressa , supina nonnihil rotunda , ita ut mediam quandam formam inter Araneum , & Attelabum , seu locustam apteram brevem habeat.

Ligniperdam aquaticam non videtur Aristoteles agnovisse. Etenim festucas , lignave colligere eam scribit , quibus sese induat , atque cum post iis spoliatur , emori , cum ejusmodi animal , quod Ligniperdam aquaticam nominavit , spoliatum suis festucis , quæ variis ex partibus herbarum constant , minimè moriatur , sed subinde novas festucas recolligat , in quarum vertice exiguum ligni , at non cujuslibet , sed quod levitate sua aquis supernatare cognoscit , portiunculam supra cervicem suam , ne mergatur , immiscere novit : alioqui à terrestri nihil vel parum admodum differt. Bellonius Phrygium vocare videtur , & sic de eo scribit ; Phrygium fluviatile æque , ac marinum dejectamentum , Galli Charree appellant , quod cinereum excrementis fit persimile. Pisciculus est , aut potius vermiculus , quo piscatores utuntur pro esca : sic appellatus , quod phrygana , id est , fremia , sive festucas , sive thecæ , aut tegumenti lateribus , filo tanquam araneæ ab ejus ore dependente (novit enim nere ut aranea) agglutinans circumponat , ex quibus augescens , casam ampliorem sibi construit. In quo pinnoterem imitaretur : nisi pinnoteres sibi ipsi domum facere nescirent. Senos utrinque pedes habet , quibus in aquæ etiam rapidissimæ rivulis incedit : nare etiam nescit. Estque animal tenue , oblongum parvæ Erucae simile , quem avidissime appetunt Truttæ. Est enim profluentibus aquis , ac torrentibus frequens. Eo etiam pisciculi , si sua theca , seu invo-

lucro nudetur, affatim capiuntur. Chrysippus Philosophus, inquit Plinius, tradit, Phrygium aligatum remedio esse quartanis: quod autem esset id animal, nec ipse descripsit, nec nos invenimus, qui novisset.

Quid eo sentiat Gesnerus, vide apud eum & Aldrovandum.

CAPUT II.

De Insectis aquaticis multipedibus.

INsecta aquatica polypoda sunt *Tinea*, *Pulex marinus*, *Pediculus marinus*, *Asilus aquaticus*, *Scolopendra marina*, & vermes in tubulis delitescetes.

Tinea vermes sunt perparvi, & quia convolvi solent, minores aliquando, colore albo; *pedibus* plurimis per totius corporis alveum contiguis, & mollioribus. *Cauda* oblonga in alveum definit. *Oculi* sunt perexigua puncta alba, cum centro longe minutissimo. Reperiuntur in fontibus bonis & frigidis; Martio præsertim mense. In terra propter pedum seu molitiem seu multitudinem (nam & ab ore veluti pedes prominent) progredi nequeunt: in aquis, corpore in latus alterum inclinato currunt; & nisi fallor, retrorsum quoque incedunt. Cum aqua epotæ ventrem inflant, & largo haustu vini pelluntur. Forte & therebintinæ, oleo, butyro, lacti & fero cederent. Gesnerus Gallis easdem cum Scrofulis, quas Agrovelles vel Escroelles vocant esse putat. Multipedes sane faciunt, corpusculo brevi, cauda reflexa, inveniri in fluviis, puteis & fontibus.

Pulex marinus, qui Aristoteli *ψύλλον θαλάσσιον* Rondeletio est tenui crusta intecta bestiola, quæ facie homines ridiculos pictos, aliis partibus locustas repræsentat: & tam parva ut particula corporis nisi ab oculato, discerni non possit. Gignuntur, inquit, in profundo mari tanta fecunditate, ut escam ex pisce confectam, si diu in imo manserit, totam corrodant. Aldrovandus hunc inter crustata refert. Niphus cum Scolopendra marina confundit. Kiranides minimum animal, quo piscatores utantur, esse dicit: salireque per littus. Moufetus Asellum marinum vocat, & sic describit: *Pulex* sive Asellus marinus squillam molliorem refert, nisi quod quatuor tantum pedibus (pace Gesneri dixerim) donatur, & frequentibus longisque saltibus se liberat, à numero pedum. Asellus dicitur à saltu, Aristotelis pulex: à dorso gibbofo, Scrofula nuncupatur: color illi lividus cum nigredine. Longitudo fluvialium digitum transversum: latitudo, semidigitum non superat: marinorum major dimensio, qui littore refluxente, & in aquis

dulcibus sæpe conspicitur. Venatoribus item spectatoribusque mirum agilitatis præbet exemplum.

Hunc cum Psyllio herba decoctum, & de collo suspensum rigorem tertianarum fugare; cum aqua marina aspersos, pulices pellere; tres in lapide psorite, qui & porus, sculptos, sub calamo viridi manentes, cum radice herbæ psylli reclusos, contra morbum comitalem, amuletum esse scribit Kiranides. Meminisse eorundem videtur Plinius, cum dicit: *Adeo nihil non gignitur in mari, ut Cauponarum etiam æstiva animalia, pernici molesta saltu, aut quæ capillis maxime cælat, existant: & circumglobata escæ sæpe extrahuntur: qua causa somnum piscium in mari noctibus infestare existimatur.*

Pediculus, qui Aristot. *φθίρ θαλάσσιος*, duplex ex Rondeletii sententia est. *Unus* qui in mari, quod à Cyrene ad Ægyptum, circa Delphinum est: qui omnium pinguis pabuli copia evadit, quæ à Delphino suppeditatur. *Alter* est, quem hic depinximus, majoris fabæ magnitudine & latitudine, scarabæo terrestri similis, corpus ex aliquot tabellis, veluti locustæ vel squillæ cauda constat: ante os duo cornua breviter habet: utrinque pedes multos, incurvos, in acutum desinentes. Piscibus ita hæret ut eripi non possit. Sugit ut hirus, nec prius abscedit, quam tabidum & exsuccum piscem reddiderit. Reperitur cervici mugilum, luporum, & saxatilium piscium affixus. Aristotelis esse demonstrat ibidem. Bellonius perperam Asillum seu Oestrum vocat. Octo utrinque pedes habere, octonis tabellis intergore lorricari; priorum pedum ungues ad caput, posteriorum ad pedes converti; *oculos* parvos, nigros, & aliquanto eminentes habere; Erythrinis etiam dentalibus ac fargis vesci; in orbem se contrahere; prægnantem denique plerumque inveniri, addit. Est & aliud animalculum marinum, cuius hic iconem appono. *Eptinu* quoque Numenii huc spectat, littoralis vermis & fossilis, longis pedibus constans, repens & inescandis piscibus idoneus.

Asilus marinus, quem Oestrum marinum veteres à naturæ similitudine, quæ ei cum terrestri communis, vocant, Ligures *Trusam* pro ore tubulum seu fistulam habet, pro corporis ratione longam. Utrunque sitæ sunt veluti manus duæ, quæ ad os flectuntur, sequitur alvus cum incisuris, cui affixi sunt sex pedes duo, qui in extremâ alvo sunt, crassiores sunt & longiores, qui sequuntur utrinque locati, paulo minores, reliqui duo, qui magis in lateribus sunt, omnium minimi. Ore sive fistula, scorpionis terrestris caudæ, pedibus, ejusdem brachiis similis est, alvo & magnitudine, araneo. Ut Polypi acetabulis, ita hic

Aldrov.
H. Inf. l.
7. c. 7.

Rond. de
piscib. l.
18. c. 28.

Aristot.
Histor.
Anim. l.
4. c. 10.
Rond. de
Piscib. l.
18. c. 27.

Mouf. de
Insect. l.
2. c. 39.

Rond. de
Inf. c. 8.

hic ore adhærent parti molliusculæ & pingui sub pinna ita tenaciter, ut avelli integer non possit. Sanguinem exugit hirudinum ritu, usque dum præ plenitudine decidat & moriatur. Cur in summo tantum æstu, & Caniculæ tempore pisces dictos infestet, id in causa esse puto, quod æstate tantum nascatur, autumno pereat. Cur sub pinna hæreat, in causa est partis mollitudo, pinguitudo, & sanguinis copia. Reliquo corpore Thynni cute quidem lævi integuntur, sed illi subsunt squamæ duriores.

Arist. H.
A. l. 2. c.
14.

Quantum ad *Scolopendras*, Aristoteles, παραπλοσίας τῶ εἰδηθῆαι χερταίαις, *aspectu terrenis similes* esse dicit; in saxosis locis gigni, colore magis rubro esse, pedum numero terrestres superare, gracilitatem crurum si excipias, serpentum more non in altis gurgitibus nasci, adjicit.

Rond. de
Inf. c. 2.

Rondeletius, duas species proponit. Prior minor est, colore planè rubro, do-drantali magnitudine, in saxosis locis degit. A capite ad caudam pedes habet plurimos: in flexus & volumina sese contorquet: nunc longior, nunc brevior, nunc gracilior, nunc crassior efficitur. Altera est superiore multò longior, utpotè quæ ad cubiti longitudinem accedat, tenuior, colore ad candidum vergente. A capite ad caudam pedes utrinque habet plurimos, veluti superior. Aldrovandus addit ex Gesnero tertiam, colore miniaceo. Gesnerus videtur quædam ex his in dubium vocare, dum Aristotelis descriptionem attendit. Minores terrestribus facere Aristotelem: Brasavolum verò ad se misisse duos pollices longam, apud se vix duos digitos æquare: Rondeletii longè majores esse, Marcellum Virgilium terrestribus longiores facere. Quod forma attendatur, longè aliam caudæ capitisque in terrestribus vidisse. Ut ut sit, in lacertorum marinorum, ut & acuum ventriculo sæpè eas reperit. Rondeletius: ita ut exinde, iisdem hos pisces vesci colligi possit: & quia in alto mari vivant, in littoribus aut littorum saxis easdem vivere, falsum sit. Appetere nidorulenta; hamum devoratum simul cum interaneis dejicere, dejecto, ista iterum intro recipere; piscatoribus quod si hamum attigerint, nullus piscis ad hamum post accedat infestam esse; attactam adurere; naturæ ipsius est. Moufetus in limosis stagnis, & ubi ostrea saginantur, latere scripsit. Nonnus psyllothrūm ex thuris, atramenti sutorii ana unc. ij. scolopendr. unc. iij. tritis, & cum calcis pulvere comistis commendat.

Mouf. 2.
c. 39.

Rond. de
Inf. c. 5.

De Vermibus in tubulis nascentibus, ita Rondeletius: Nascuntur in saxis marinis & super concharum vetustarum testas, tubuli vel Siphunculi testacei, rotundi, asperi, candidi, intus lævissimi, quorum alii recti sunt, alii contorti & replicati. In

his procreantur & vivunt vermes, qui foras se exerunt hauriendæ aquæ gratia. Hi colore, substantia, scolopendræ rubræ similes sunt, figura & magnitudine nonnihil differunt: longissimi enim digiti magnitudinem non excedunt. Pars posterior folii myrtei modo in acutum desinit. Priore parte utrinque pedes habent, veluti scolopendræ, unde fistula prominet in extremo obtusa tubæ modo, & perforata, qualem in asilo marino depingemus, eā aquam trahit. Horum vermiculorum testa Pharmacopæi nostri utuntur, in compositione unguenti citrini pro dentali. Huic similem testam etiam dentale vocant, quo in eodem unguento utuntur. Hujusmodi aliquot picturæ superiori aspersimus.

TITULUS II.

De Insectis aquaticis apodibus.

CAPUT I.

De Hirudine.

Absolutæ insectorum aquaticorum pedatorum historia, ad apoda progredimur. Hæc verò intra *Hirudines*, *Stellas*, *Hippocampus*, *Uvām marinam*, *Oripem*, *Lumbricum marinum*, *Setam*, *Vermem Indicum*, & alios consistunt.

Aldrov.
H. Inf. 7.
c. 11.
Mouf. 2.
c. 41.

Hirudinem quidam ab hærendo, quod corporibus hæreat, alii ab hauriendo Latinis dictam esse putant. Dicitur Latinis & *Sanguisuga*. Græci βέλλαν, & quidem ὑδατὸν, λιμναίαν dixere, sine dubio, à βέλλω, βέλλω, αἰμύλω, ἀπείζω, ἐμύζω. Hesychio dicuntur δερβελεῖς & βλέττες, & δρίανες, secundum Elienses. Eisdem βαίτυς βέλλα est.

Nomen.

Duorum est generum. *Marina* nempe, & *Lacustris*. Illa, Rondeletio describente, digiti est magnitudine, cervice graciliore, cauda paulò crassiore. Os & caudæ extremum Polyporum acetabulis similia sunt, ut eorum adhæsione sese trahant. Corpus insectorum modo ex multis annulis circulisve constat, sed duriore cute quam palustres, quod in causa est, cur non ita in globum se contrahere, nec ita se colligere possint, sed caudam tantum & caput proferunt, & retrahunt. Interna omnia continuo ductu producta & indistincta. In luto vivit, virus olet, cibo idonea non est: pisces tamen lutosi & litorales ea vescuntur. In oleo antiquissimo decocta aurium dolorem sedat. In oleo amygdalino, vel Chamæmelino, dolorem hæmorrhoidum. In vino, vulneribus nervorum & convulsionibus utilis est. Ustæ alopecias cum aceto curant.

Differen-
tiæ.
Rond. de
Inf. c. 7.

Lacustres circulis velut inter se colligatis constant, quorum opera quandoque in globum contrahuntur. Ossibus & pinnis carent.

carent. Os illis trianguli instar, id vulnus inflictum ostendit. Villanovanus fistulam in ore more culicis tribuit. Alii in majoribus acutius, in minoribus rotundum; in omnibus foramen in medio exile, observare. Ab ore ad alvum continuus est meatus. In mortuis longitudo circiter digiti. Lineis & punctis nigris notantur omnes, reliquo colore variant. Varias differentias fortiuntur. Sunt quæ caput magnum habent, coloris ruffi, variis filamentis distinctæ, lanuginosæ, & venenatæ. Sunt & aliæ tenuiores, capite brevi, ventre rubro; quæ in aquis puris habitant. Albertus Nigrarum & planarum; nec non quæ in dorso virgulas rubeas & aliquantulum rugatas habent &c. meminit. Apud Helvetios *Minores* sunt nigræ; *maiores* subvirides, striis per longitudinem subflavis aut ruffis, in quibus puncta aliquot nigricant. Visæ Venetiis *virides*, maculis hinc inde nigris respersæ. In fluentibus aquis, *albas*, perexiguas, ore utrinque in circulum lato, sed altero duplo latiore, quales vel piscibus nonnunquam adhærent, invenies. In Mauritaniæ quodam flumine septenum cubitorum, quæ per gulam perforatam respirant, inveniri, Strabo prodidit. In jecinatoribus boum similem hirudini lacustri vermem, alii. Mousetus in *perforatas*, quas Europa non novit, & *Imperforatas* distinguit.

Mouset. de
Insect. 2.
c. 14.

Ad *Naturam* earum pertinet, in paludosis & turbidis aquis ut plurimum, in saxosis, arenosis & clavis, rarò inveniri: ex putri nasci, nec scitur an coeant: autumnò condi, per hyemem latitare, circa Calendas Maij, aut paulò antè, & quidem nonnisi tepido aëre apparere. Eadem, sanguine victitant. Ubi corpori adhæsere, non citius avelluntur, quàm explætæ decidant: imò quantò magis trahuntur, tantò fortius insident; donec rumpantur. Caudæ & ori innitentes moventur. Cannæ inclusæ, retrorsum exeunt: & quia os valdè acuere & in tenuitatem se extendere possunt, per angustissima etiam elabuntur.

Ufus Hi-
rudinam.

Magni sunt in evacuando sanguine in Medicinâ usus. Fugiendæ ruffæ, magnorum capitum, virides, nigræ, & quæ in limosis nimis agunt. Laudantur, quæ ex aquis fluentibus ruffæ rotundæ, colore jecinatoris, parvorum capitum. Præstantissimæ putantur, quibus venter rubet, dorsum viret, præsertim si ex aquis fluentibus fuerint. In Germania præferuntur majores, ex nigro subvirides, striis per longitudinem ruffis, in quibus maculæ nigræ sunt. Applicantur in vulneribus venenatis, capitis, colli, jecoris, lienis, genitalium membrorum: &c. morbis.

De præparatione, & modo utendi, abundè apud Medicos invenies.

Huc spectat, *Lumates*, molestissima hirudinis species, inter herbas & montium arbores vivens, semidigitum longa, & impensè tenuis. Adhærent iter agentibus, subeuntque quosvis humani corporis meatus, etiam angustos & fœdos, neque prius discedunt, quàm humano satientur sanguine: tunc enim spontè cadunt, ac minus infestant Sole vigente. Remedium est, arundinibus quibusdam præacutis eas avellere, aut sese tueri intra aquas, confidendo faxis, si quæ fortè ad sunt, aut pyram construere, atque interponere ignem.

Nieremb.
H. E. 13.
c. 19.

CAPUT II.

De Stellis.

Datum Insecto huic *Stella* nomen, quòd stellas imitetur. Græcis est *ἀστὴρ*, Myrepso *ἀστὴρ*, modernis Græcis *σκαῦρος*, ut Gillius notavit, vel potius, ut Rondeletio visum, *σκαῦρος*, quod pali lignei infixi modo, radios habeant. Sylvaticus, Sydus marinum vocat: Cremonensis, Magiarastrum marinum.

Aldrov.
H. Inf. 6.
c. 18.
Nomen.

Os ipsius versus caudam, in medio radiorum situm, inque gyrum quinque digitos ostendere, author est Bellonius: Excrementorum nullum exitum, & ore excerni quæ supervacua sunt, Rondeletius. Duriore corio sive callo omnes integuntur, ideò Aristoteles cum aliis testaceis recensuit.

Descriptio.

In marinis littoribus sæpè conspeximus: vaganturque in mari, ut polypi, brachia deducendo, nunc antegradiendo, nunc in orbem convolvendo, & suctu acetabulorum, Echini modo, lapidibus adhærent. Conchas aggrediuntur & devorant. Quinque in dissecto ventre cochleas invenisse scribit Rondeletius, tres integras, duas cum testis suis confectas. Adeò fervida ejus natura est, ut quicquid sumserit, id licet illicò ab ea extrahatur, biscoctum, (*δίσκοτον*) appareat. Plinius dicit, tam igneum fervorem ei esse tradi, ut omnia in mari contacta adurat, omnem cibum statim peragat. Extra aquam torpescere, prodidit Bellonius: in aquam immerfas, & supinas instratas, promuscides in extrema plusquàm quinque millia exerere cernet, & in pronam partem moveri.

Rondel. de
Inf. c. 10.

Natura.

Arist. H.
A. 5. c. 15.

Plin. H.
N. 9. c. 6.

Esse quasdam in *cibis*, ex Bellonio colligimus. In *Medicina*, Hippocrates, nigras cum brassica & vino odorato adversus uteri strangulationem propinat. Apud Myrepsum inter suffimenta contra epilepsiam recensetur. Inter psilothra à Galeno numerari, certum: & Gesnerus, carunculam, in quibusdam edulem esse scribit, reliquam substantiam pilos deperdere. Lavem, ad peritonæi rupturam, cum ononide, felici cum successu applicari posse existimat.

Ufus

Rondel. de
Inf. c. 14.

Dis-

Differen-
tia.

Differentias & Genera si attendamus, sunt plura. Sunt parvæ, magnæ: sunt, quæ flavescunt, nigricant, cinerascunt: sunt aculeatæ, læves, longæ, breves. Optimè vero, in eas quæ quinque radiorum sunt, & quæ plurimum distinguuntur. Illæ *Cartilagineæ*, *Testaceæ*, *Læves*, *Pectinatae*, *Echinatae*, *Arborescentes*, *Solares*.

Cartilaginea pronè & supinè exhibetur. Supinæ partis marginibus puniceis, reliqua pars intima, & quæ hisce marginibus continetur, sanguineis maculis & albis, veluti in quodam marmoris genere, conspersa. Pronæ vero partis margines admodum sunt sanguineæ: quinque in medio rimæ, in singulas partes abeuntes, maculis autem cœruleis, ea pars, quæ margines undique contingit, insignitur: hæc aliæ sequuntur propè medium maculæ rubicundæ.

Testacea dicitur, non quod verè testacea sit (nam exsiccata, cum cortice teri manibus, quamvis ægrè; potest) sed quod duritie corticis, magis quam aliæ stellæ, quas unquam observavi, ad testacea accedat. Hæc corticæ candicat, spithamam longa quoquo versum dimensa, nempe ab uno radio ad alterum, qui è regione est.

Distant autem extremitates cujusque radii à proximis mediam spithamam at paulo amplius. Posset etiam non immeritò tuberosa, & verrucaria nuncupari, nam superiori parte in singulis radiis tubera, & verrucas habet.

Lævis est duplex: *Rondeletii* nempe, aculeis enim omni ex parte, atque asperitate caret. Radii longi sunt rotundi, flexibiles, murium caudis persimiles: eorum integumentum cortici serpentum simile est: & ob nigrarum albarumque macularum varietatem, spectaculum jucundum. In medio corporis trunco circulus cernitur, intra circumferentiam quinque maculis rotundis: & inter has stellulæ pictura distinctus, à cuius circumferentia quinque radii exoriuntur. Oris compositione à cæteris non differt, nec victus ratione. Brachiorum longitudine, & vario flexu celerrimè natat. Et *Aldrovandi* qui duas ponit. *Prima* est, pronâ parte & supina colore Lapidis lazuli: in medio punctulis nigris, & circulis aureis novem radiorum, ac totius corporis ea magnitudo est, quâ cernitur. Prona pars variis coloribus delineata, cujus medium, & colorem, & figuram pentaphylli æmulatur.

Secunda multo præscripta minor, undique colore ferruginea, sed nigris aspersa maculis mediam spithamam, aut amplius longa.

Pectinatarum quinque sunt species. *Prima* *Rondeletii*, primæ ejusdem similis, iis demptis, quæ sequuntur. Radii circa rotundum corpus dispositi, in exortu suo an-

gulum acutum non constituunt, sed obtusum. Aculei, quibus latera muniuntur, rari, recti, pectinatim dispositi, unde pectinatam stellam appellavit *Rondeletius*.

In totius corporis centro stellula quædam expressa est, à cuius ambitu lineæ quinque per medium radiorum ad extremum usque protensæ sunt, radii initio satis lati sunt. Rara est hæc species, ore, dentibus, moribus, facultatibus aliis similis est. *Secunda* cujus figura exprimitur (folio 748.) marginibus albis pectinatim non rectè, sed obliquè dispositis: interius sanguineis undique conspersa maculis in centro stellulam habet admodum rubram, sed radiis constantem, tota pedem longa est. *Tertia* nulla elegantior, ejusdem cum prædicta magnitudine, colore, ac tuberculis spinosis admodum varia. Nam in medio est os, instar echini, quinque denticulis vix conspicuis constitutum, hoc continet stellula septem radiorum, quæ interiori parte nigra ferè est, exteriori verò cærulea, hanc circulus ambit albus, seu area alba; quam alia ruffa, seu carnea, hunc deinceps circulus circumdat ex undecim tuberculis constans in supremâ parte acutis. Singuli autem radii tres habent tuberculorum ordines singulos vigintiquinque, aut triginta tuberculis constantes.

Quarta est haud dispari cum præcedenti longitudine, radiis albo cœruleis, marginibus pectinatis ferrugineis: in medio stellula est, ex sex punctatis radiis constituta.

Quinta quæ quinque radiis inæqualibus & hirsutis constat.

Echinata est corpore exquisitè rotundo, parvoque constat, & radiis quinque, sed brevioribus, unde fit, ut minor sit cæteris. Illi è parvo circulo, in quo crucis figura delineata est, veluti è centro, exoriuntur tenues frequentissimis aculeis horrentes, quâ de causa echinatum *Rondeletius* nominavit, in lateribus dispositis. Radiorum flexuoso motu, serpentum ritu, repit hæc stella, & sicco posita eos movere nequaquam desinit, quousque in partes disjecerit, quæ separatae etiam moventur per flexus: ut *Vermium* partes, & *Lacertorum* caudæ abscissæ. Os habet ceratum.

Reticulata est duplex. *Rondeletii* & *Aldrovandi*. Illa à retis sive Cancellorum figura reticulatam, sive cancellatam nuncupamus, & quia inter distinctiones, retibus, vel cancellis similes extant tubercula quædam rotunda, tuberosa etiam vocari potest. Inter majores stellas reponenda est, brachia enim ad pedalum longitudinem perveniunt, crassiora sunt aliarum stellarum radiis. Aculeis parvis utrinque eadem munita sunt. Os habet cæterare modo. Eleganti illa & reticulata distinctione spectabilis est, & inter anathemata collocanda.

T

Hæc

Rondel. de
Inf. p. 122.

Hæc tuberculis rotundis cæruleis gemmæ Turcoiæ æmulis, radiorum marginibus hirsutis & pectinatis: quilibet radius supina parte apparet conus pinus ideæ oblongior. Prona autem parte fertis, tum luteis tum cœruleis. Singuli radii habent cauliculum tenuem per medium transeuntem.

Arborescens à frondium & ramurum multitudine. Hujusmodi duas vidit Rondeletius. Unam permagnam apud Guihelmum Pelicerum Monspeliensem Episcopum, ad Lerinum iselam captam, alteram ex Italia ad ipsum delatam. Ab aliis omnibus stellis plurimum differt. Radios quinque, sive truncos habet, in medio os cum quinque appendicibus, quæ multis parvis dentibus horrent, pars ea depressa est, & submissa, ambitus tumet, in quolibet radiorum intervallo foramen, seu rima conspicitur. Quilibet radius statim in binos finditur, hi rursus in binos ramos dividunt, atque ita deinceps, quousque ad tenuissimos, & capillorum tenuitatem referentes deventum sit. A quolibet oris angulo linea albicans prodit, & per omnium ramorum medium producta est, alioqui tota stella nigricat, & tenui, atque admodum durâ, sed asperâ cute tegitur, ramuli omnes intro flectuntur; quod argumento est hos tanquam cirros ad cibum captandum conditos esse, quibus undique dispositis in orbem præda elabi non potest. Id spectaculum aliquando Rondeletius in mari studiosè contemplatus est. Stellam parvo filo alligatam in mare demittebat, in quo expansis ramis natabat, sed prædam aliquam appropinquare sentiens, brachiis omnibus contractis amplexabatur urticæ ritu. Rara est hæc stellæ species, & propterea inter anathemata suspenditur.

Solaris Sol marinus Rondeletio, qui solis refert picturam. Differt à stellis quod in his è medio corporis trunco veluti è centro radii enascuntur, in hoc vero ex corporis rotundi circumferentia, breves, minime asperi superiore in parte, sed veluti ex squamis compositi, in lateribus verò parvis aculeis rigentes, albi ad extremum usque gracilescentes. Corpus illud rotundum in medio rosæ pictæ figuram expressam habet. Ore victu, facultate à stellis non differt.

Aldrov. de Insectis l. 7. c. 18. *Stellæ quæ plurium sunt radiorum, vel sunt septem radiorum, vel decem vel duodecim.*

Septemos quæ habet, parte gibba colore ferrugineo obscuriore, spinosis, & parvis quibusdam tuberculis scabra, ac inæqualis, radiis in extremo lævi distortionem inflexis, parte concava ochræ ferè dilutum colorem exhibet ad ferrugineum minimum quid tendentem. Extremi laterum, quibus cum medio corpore, tum brachiis juxta eorundem longitudinem sectis committitur, margine crenis, seu denticulis quibusdam albicantibus sunt asperi. Longitudo totius, ac

latitudo in peripheriam æqualis est, palmi unius cum demidio. Singuli verò radii tres propemodum digitos sunt longi, quilonissimè à se mutuo palmi unius intervallo diffiti sunt.

De illâ quæ *decem brachia* habet ita *Columna*; *Nova* & perelegans hujus stellæ forma, ab aliis omnibus differens, nec adhuc descripta: nostro littori frequens, ita ut nec ulla retrahantur retia quin ipsis implicata, & simul cum piscibus in foro etiamnum invehatur. Hæc admodum fragilis est, ut viva ne ab rete excipiat potius frangi patitur, ita illi se implexa cirris continet. Non vis ulla in extrahendâ stella est adhibenda, cum radii sunt geniculati, atque genicula jungens cartilago sit admodum tenuis, quæ de re facillimè genicula dissolvuntur, nec quamvis radii omnes sint disrupti, emoritur, nisi longo post intervallo. Hujus color subrubens est; forma vero ab aliis stellis dissidere videtur. Hæc enim parvum admodum corpus habet: radios quinque sed singuli in binos dividuntur, ita ut decem prima facie, videantur: semipedem longos, nec majores huc usque vidi: stellæ diametrem pedem æquat. Radii vero omnes geniculis parvis constant, atque singula genicula formam trianguli habent, lineæ quidem secantes nunc in dextram, nunc in sinistram partem conjunguntur, spirarum modo, quæ alternatim angulos oppositos conficiunt. E singulorum vero triangulorum basi, cirri etiam, ut bases quoque utrinque alternatim producuntur, simili modo geniculati, minimi digiti longitudine, & canabini fili crassitie, quibus maximè implicatur, graditur, & apprehendit: Horum superiores parum longitudine, sicuti & crassitie alios inferiores ad extremum usque superant. E centro ipsius alii tenues cirri fili etiam crassitie, & eodem modo geniculati, majores digiti longitudine exeunt, quorum superiores inferioribus minores sunt, atque contrario modo, quo radii majores curvantur, quibus escam apprehendere, atque mos adducere censeo, in quorum umbilico visitur inesse, ex adversa parte corpus conspicitur rotundum, læve molle, cujus interiora propter tenuitatem considerare nequivi: ipsa verò facillimè disjungitur à stella: lævis est tota, sed aspera tactu videtur propter geniculorum, & cirrorum multitudinem crusta integitur duriuscula, ita ut osseis geniculis, sed non admodum duris, compacta videatur. An splendeat; ut alia noctu, cum vivam domi habere non possem, experiri non potui. Hæc Fabius Columna.

Postrema duodecim habet radios qui quidem singuli singulos habent caules cœruleos per medium transeuntes, à quorum utroque latere sunt striæ, seu lineæ transversæ, sanguineæ frequentes: in medio

diò quoque circulus ejusdem coloris, undique radiorum margines denticulati, coloreque albicante. Tam variæ, & multiplices stellarum formæ conspiciuntur, ut quærendi & contemplandi nullus sit futurus finis.

CAPUT III.

De Hippocampo & Uva marina.

*Aldrov.
H. Inf. 6.
cap. 16.*

Hippocampo, ab ἵππος & κέρη nomen datum est. Repando enim est corpore, & in arcum se curvante, erucasque cauda maxime refert: reliquo verò corpore, equum imitatur. Marcellus voce ἵππος, magnitudinem denotari putavit. Nonnulli *gallum marinum*, quidam Salamandram marinam dixere.

*Rondelet.
de Inf. c. 9.*

Ita eum nobis Rondeletius descripsit. Hippocampus toto corpore incisuras habet, dodrantalem magnitudinem non superat, sæpè minor reperitur, pollicis est crassitudine, rostro oblongo, tubuli modo cavo sine scissurâ, ab inferiore ejus parte operculum foramini opponitur, ad claudendum, vel demittitur ad aperiendum: oculos habet rotundos, satis prominentes, in capitis vertice pili erecti sunt, qui adeo tenues sunt, ut non in mortuis & exsiccatis, sed in viventibus tantum Hippocampis, & natantibus appareant, quemadmodum & qui in reliquo sunt corpore. Toto capite, collo graciliore, ventre protuberante, equo valdè similis est.

Post oculos quo in loco in cæteris piscibus branchiæ esse solent, pinnulæ duæ articulis similes sunt, maxime ob situm, utrinque unica. Branchiæ vero nullæ sunt, neque tectæ neque detectæ, sed supra dictas pinnulas duo sunt foramina sursum spectantia. Sub ventre rimulas duas habet. Ex una alvi excrementa, ex altera ova foras emittuntur. Cauda reliquo corpore tenuior est, quadrata, cum exochis aculeatis, toto etjam est corpore similiter aculeato, veluti ex cartilagineis circulis compacto, ex quibus aculei extant, membranulis intermediis, ut nulla caro appareat. Colore est fusco punctis albis notato, ventre albican-

te. Ventriculum pro corporis ratione satis magnum habet, hepar rubrum, similiter ova rubra, cor exiguum. Caudam quovis modo inflectas, & qualem vivo figuram tribueris, talem mortuus & exsiccatus servat.

Venenatum, sed solo ventre Ælianus prodidit. Qui ex vino decoctum bibit, primò singultit, mox sicca tussis afficitur. Venter superior intumescit; per nares aquosa pisculenti odoris egeruntur: oculi sanguine suffunduntur, &c. Qui evadunt, aquam, mente capti, summo studio prosequuntur. Remedium, acetum in quo sepia suffocata est, Aëtius ponit, Veneficæ eum in amatoriiis usurpant.

Usus eorum singularis in canis rabidi morsu est, ut apud Ælianus habemus. Plinius leporis marini venenum restinguere potos; alligatos Venerem concitare ait. Galenus, ustos alopeciiis prodesse scribit. Vehementer vermes, si torreantur & cum aqua absynthii propinentur pellere Rondeletius ex Græco quodam habuit.

De Uva marina ita Aldrovandus: Piscatores nostri, inquit Rondeletius, ova sepiarum racematim compacta à pediculo uno dependentia, earundem atramento asperso Uvam marinam nominat. Est etiam Uva marina zoophyton, diversum sane ab eo, quod nobis depinxit Rondeletius, cujus imaginem, cum de zoophytis agimus, tradituri sumus: de hoc loquitur Plinius cum scribit. Rerum quidem non solum animalium simulachra (mari) inesse, licet intelligere intuentibus uvam, gladium, ferras. Nos vero & hocce egregium aspectu animal Insectum potius, quam alterius cujuspiam generis Uvarum racemum verè referens in Oceano deprehensum damus depictum, & ad vivum delineatum, ea magnitudine, qua depictum videtur in hac tabula: acinis sane undique refertissimum, quorum alii cœrulei: alii amethystini: alii rubentes, capite duobus corniculis Limacis instar præmunito, movetur motu progressivo.

Et tantum de Insectis. Si quid interim scitu dignum observatum fuerit, addi poterit impofterum. Quia verò ita Historiam Animalium absolvimus.

*Ælian.
H. Anim.
14 c. 16.*

*Plin. H.
N. 32. c.
6 7.
Galen. l.
11. simpl.
cap. 41.*

*Rondelet.
de Inf. c. 25.
Aldrov.
H. Inf. 7.
cap. 17.*

SOLIDEO ESTO GLORIA,

in sempiterna secula, Amen.

I N D E X

I N

HISTORIAM NATURALEM

de INSECTIS. prior numerus Histriocæ descriptionis paginam, posterior Tabulam Iconismi demonstrat.

A Nelytra Bipennia. Pag. 45.
Deteipennia. p. 1.
Quadrupennia. p. 1.
membranacea. p. 1.
farinacea. p. 28.
Anthrenus. p. 95.
aquaticus. p. 139.
Apis, Nomen, p. 1. t. 1. Descriptio, Locus, p. 2.
Generatio, p. 1. Vitis, p. 3. 4. Volatus, Sonus, Odoratus, Auditus, Antipathia, Morbi, p. 4. Ingenium, p. 5. Usus, p. 6. Differentia, p. 6.
Apis amphibia. p. 8.
Aqua multa. p. 10.
Araneus, tab. 18. Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, Generatio, p. 97. Antipathia, Ingenium, Nocumenta & remedia, p. 98. Usus, p. 99. Differentia, p. 99.
Ascarides, p. 137.
Asellus, Nomen, Descriptio, Generatio, p. 126. 87. t. 23.
Asellus arvensis, p. 95.
Asilus, t. 8. Nomen, Descriptio, Natura, Differentia, p. 56.
aquaticus, p. 64. 144.
Attelabus. p. 140.
arachnoides. p. 141.
Aurelia Aldrovandi. p. 125. t. 22.
Axacoulin. p. 131.
B Estiola alata Moufeti. p. 65.
Blatte, Nomen, Descriptio, Usus, Differentia. p. 82. t. 15.
Bombylius. p. 43. 44.
Bombycis amulus Temidli dictus. p. 125.
Bombycum historia. p. 114.
Bombyx. p. 114. t. 22. 23.
Bruchus. p. 64. t. 11.
Buprestis, t. 14. Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, Venenum, Differentia. p. 78. 79.
Buprestis Dodonæi vera. p. 66.
C Antharides, Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, Generatio, p. 14. t. 76. Nocumentum, Differentia. p. 77.
Cantharides aquatica. p. 140.
Cera, Nomen, p. 14. t. 2. Descriptio, p. 14. Locus, Natura, Differentia. p. 15.
Chrysalis. p. 44.
Cicada, Nomen, p. 22. t. 10. 11. 12. Descriptio, p. 22. Locus, Vitis, Generatio, p. 23. Etas, Cantus, p. 24. Natura, Usus, Differentia. p. 24. aquatica. p. 139. t. 10.
Rondeletii. p. 65.
Cicindela, Nomen, p. 80. t. 15. Locus, Generatio, p. 80. Usus, Differentia. p. 81.
Cimex, Nomen, p. 89. t. 17. Descriptio, Locus, Generatio, p. 89. Fuga, Usus. p. 89.
Cimices sylvestres. p. 25. t. 16.
Genera varia. p. 25. 26.
Congener Tauri volantes Brasil. p. 75. t. 15.
Corculus. p. 139.
Coffi. p. 131.
Coyayhoal. p. 127.
Crabrones, Nomen, p. 20. t. 1. Descriptio, Locus, p. 20. 21. Vitis, Generatio, Antipathia, p. 21. Usus. p. 22.
Cucujo. p. 79.
Cuchipilul. p. 131.
Culex, Nomen, p. 57. t. 10. Descriptio, Locus, Cibus, Generatio, Natura, p. 58. Remedia, Usus, Differentia. p. 59.
Curculio. p. 126.
E Phemerom musca. p. 57.
Eruca, Nomen, p. 105. t. 19. 20. 21. Nutriminum, Generatio, Natura, p. 105. Usus, Damnum, Remedia. p. 106.
glabra Moufeti. p. 106. t. 19. 20.
hirsuta densiores pili Mouf. p. 107. t. 19.
rarioris pili Mouf. 109.
Eruca Aldrovandi Tabula primæ, p. 110. t. 21. secundæ, p. 110. t. 21. tertiæ, p. 110. t. 21. quartæ, p. 112. t. 21. quintæ, p. 112. t. 21. sextæ, p. 113. t. 22.
F Orbicinz. p. 93. t. 16.
Forficula. p. 83. t. 15.
Formica, Nomen, p. 84. 85. t. 16. Descriptio, Locus, Vitis, Generatio, Natura & Ingenium, p. 84. 85. Antipathia, p. 186. Usus, Damna & Re-

media, Differentia. p. 187.
alata. p. 84.
Fucus, tab. 1. Nomen, Descriptio, Generatio. p. 16.
G Ryllus, Nomen, Differentia. p. 64. t. 10.
Gryllotalpa Moufeti, Nomen, Differentia. p. 64. t. 10.
H Herbivora, p. 53.
Hippocampus. p. 146. t. 28.
Hirudo lacustris. p. 143. t. 27.
marina. p. 143. t. 27.
Holtzpercht Tigur. p. 63.
Humifuga. p. 53.
I Nsecta aptera octo pedum. p. 95.
duodecim & quatuordecim pedum. p. 105.
aquatica. p. 139.
apoda. p. 143.
multipeda. p. 142.
paucipeda. p. 139.
pedata. p. 139.
Insecta Coleoptera f. Vaginipennia. p. 60.
Terrestria apoda. p. 129.
pedata non alata. p. 85.
paucipeda. p. 85.
multipeda non alata. p. 126.
Involulus Plauti. p. 179.
Ips. p. 179.
Julus. p. 128. t. 23.
K Hypertuum. p. 137.
L Acerta aquatica. p. 139. t. 25.
Lendes. p. 93.
Libella, Aldrovandi: Moufeti. p. 26. t. 17.
Ligniperda. p. 146.
Limax. p. 138. t. 24.
Locusta aquatica. p. 139. t. 25.
Locusta tab. 10. Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, p. 60. Generatio, Actiones animales, Usus. p. 62.
Aldrovandi. p. 64.
Moufeti. p. 61.
Lumbrici terrestres. p. 137.
aquatici. t. 27.
M Ajalis Scarabæus. p. 74. t. 13.
Mantes Africana. p. 137. t. 10. 11.
Italica. p. 137.
Mel, Nomen, Descriptio, p. 9. Electio, p. 9. Usus in cibis, p. 10. in medicina, p. 11. Differentia. p. 14.
Moloës Paracelsi. p. 74.
Mullum. p. 12.
Musca in genere, tab. 8. 9. Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, Generatio, Sympathia & Antipathia, Etas, Volatus, Ingenium. p. 45. Usus, Differentia. p. 46. 47.
Musca Aldrovandi Tabula primæ, p. 48. t. 9. secundæ, p. 48. t. 7. tertiæ, p. 49. t. 9.
Musca Moufeti aquatica. p. 50. t. 9.
terrestres. p. 52. 53. t. 9.
militares Luciano $\sigma\pi\alpha\tau\iota\alpha\tau\epsilon\delta\epsilon\varsigma$. p. 53.
strutioptera. p. 54.
erinoptera. p. 54.
chelidonia. p. 54.
seticauda Moufeti. p. 54.
unifera. p. 54. t. 9.
bifera. p. 54. t. 9.
bipiles. p. 54. t. 9.
tripiles. p. 55. t. 9.
quadruples. p. 55. t. 9.
Musca rarioris speciei. p. 56.
scorpiura. p. 56. t. 9.
quadrupennes. p. 56. t. 9.
Musca Chrysopis dicta. p. 56. t. 9.
Tabanides. p. 56. t. 9.
Musca terrestres Moufeti $\zeta\alpha\sigma\phi\alpha\gamma\sigma\iota$. p. 52.
 $\alpha\zeta\alpha\sigma\phi\alpha\gamma\sigma\iota$. p. 53.
Musca aquatica. p. 140.
N Hamdii. p. 101.
Notonecta. p. 139. t. 25.
O Estrus. p. 56. t. 8.
Orfodacna. p. 25.
P Apiliones in genere, Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, Generatio, Natura, p. 28. Usus, Differentia. p. 29.
Aldrovandi Tabula primæ, p. 29. 30. t. 4. secundæ, p. 30. 31. t. 4. tertiæ, p. 31. 32. t. 4.

quartæ, p. 32. t. 4. quintæ, p. 33. t. 4. sextæ, p. 33. t. 4. septimæ, p. 33. 34. t. 4. Octavæ, p. 34. t. 4. nonæ, p. 35. 36. t. 5. decimæ, p. 36. t. 5. undecimæ. p. 37. t. 5.
Papilion es Moufeti. p. 37. t. 6.
diurni, magni Mouf. p. 40. t. 6.
medii. p. 42. t. 6.
minimi. p. 43. t. 6.
Papilio Bombycum. p. 43. t. 22.
Indicus. p. 29. t. 4.
Pedeculi alati. p. 84.
Pediculus, Nomen, Generatio, Usus, p. 89. Differentia. p. 90.
marinus. p. 142. t. 25.
Perle vulgò dictæ, Differentia. p. 26. A 17. 4.
Phalangia. p. 102. 26.
parva Bellonii. p. 105.
Phalangia magnæ Moufeti. p. 37. t. 6.
mediocres M. p. 39. t. 6.
minimæ M. p. 40. t. 6.
Pinguiculus Agricolæ. p. 74.
Pollin. p. 127.
Portapefo Insubr. p. 72.
Propolis. p. 15.
Proscarabæus. p. 74. t. 13.
Psechodopheca. p. 19. t. 2.
Pulex, Nomen, Descriptio, Vitis, Locus, Ortus, Natura, Fuga, Differentia. p. 92.
marinus. p. 142. t. 25.
Puplices. p. 105.
Q Uici Brasil. p. 68. t. 13.
R Eduvius. p. 91.
Ricinus. p. 91.
S Carabæi, Nomen, Descriptio, Locus, Vitis, Generatio, Natura. p. 66.
Scarabæi Aldrovandi. p. 70. t. 14.
Moufeti majores Cornuti. p. 67. t. 13.
minores non cornuti. p. 69. t. 13.
Scarabæus aquaticus. p. 140. 74.
Scolopendra terrestris, Nomen, Descriptio, Natura, Morfus, Usus, Differentia. p. 127. t. 23.
marina. p. 143. t. 27.
Scorpio, tab. 18. Nomen, Descriptio, Natura, & mores, p. 95. Locus, Vitis, & Generatio, Venenum & medela, p. 96. Antipathia, Usus in medicina, Differentia. p. 96. 97.
alatus. p. 84. t. 15.
palustris. p. 139. t. 25.
Sphondylis. p. 94.
Gordi. p. 66.
Squilla. p. 139.
Staphylinus. p. 95.
Stellæ, Nomen, Descriptio, Natura, p. 144. Usus, Differentia. p. 144. 145. t. 27. 28.
Syrones. p. 89.
T Abanides musca. p. 56. t. 9.
Tabanus, Nomen, Descriptio, p. 56. t. 8. Differentia. p. 56.
Tagliadizzo Ital. p. 79. & 78.
Talpa Ferrantis Imperati. p. 95.
Tambeiya Brasil. t. 15.
Tarantula. p. 102. t. 26.
Taurus volans Brasil. p. 74.
Tenamaznanapaloo, p. 64.
Teocuilin. p. 78.
Teredines. p. 132.
Teredo. p. 137.
Termites. p. 131.
Thripes. p. 131.
Tineæ. p. 91.
Tinea. p. 142.
Tipula, Wafferbucher. p. 140. t. 3. & 25.
Tunga Brasilienf. p. 105.
Tryxalis Moufeti. p. 65.
V Ermes, Nomen, Generatio, Natura, Usus, Differentia. p. 129.
arborarii. p. 129. t. 24.
fruticarii. p. 133.
Leguminarii & frumentarii. p. 134. t. 24.
farinacei. p. 134.
Herbarii. p. 135.
in animalibus nati. p. 135.
Homine, p. 136. t. 24.
tubulis nascentes. p. 143. t. 26.
Vespa, Nomen, Descriptio, Locus, p. 17. Vitis, p. 18. Etas, Usus, Differentia. p. 18. 19.
Uva marina. p. 146. t. 28.

F I N I S.

Apes



Fuci

Bombi



Vespa

et

Crabrones



Cicadae



1808


THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES
SMITHSONIAN INSTITUTION
WASHINGTON, D. C.

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES
SMITHSONIAN INSTITUTION
WASHINGTON, D. C.

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES
SMITHSONIAN INSTITUTION
WASHINGTON, D. C.




Cera seu fauus

Fang

Vespetum


Vespetum



Tab. IV

Papiliones Aldrovandi


Tab. 1



Tab. 2



Tab. 3



Tab. 5




Tab. 6



Tab. 7



Tab. 8



| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



山陰縣志


卷之四








Aldrovandi figuræ numeris notatæ sunt



Tab. 2



Tab. 3



Vide


Muscas Moufeti Table 4. x. Culices.

Tancken





Ad. Tab 2 Aldro



Ad. Tab. 3 Aldro




Culices





Locustæ Aldr
Tab. 1.



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Locustæ

Aldr.

Tab. XI.


Tab. 3.



Locusta Asia ac India.



Tab. 4.



Tab. 5.



Mantes

Mantes

Grylli Moufet

Gryl. domest.

G. L. Femina

Gr. Campestris mas.

Cicada Aquat

Gryllotalpa

Grylli

Aldrovandi.



1845

1846


1847

1848



Locustæ

Indicæ



Grilli



Grillotalpa





Scarabæi ex Moufeto
Capricorni

Quicq



Scarab. Buceros Nasicornis 1



Sc. Pilularius

Clusj

Fæmina

Sc. Melolonthes Mas.



Scarabæi Minores





Proscarabæus supine



Proscarabæi

Prosc. Mas.

Prone










Formicarium
alterum



Formi:
carium
feu
Nid,
Formi:
carum

Cimices

falsi



Cantharis






Table of numbers or characters arranged in a grid, likely a calendar or a list of items.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note.

Cimices

Cimices



Aldrov

Libellae







Vermes arboreæ Xylophthori Aldro.

Musca



Plants of the ...



Erucae

Mouf

Er. Polymita

Er. Corilaria

Er. Neustria Minor

Er. Neust. Major

Er. Mesolence

Er. Talerentola

Major

Er. Sepiaria

Er. Brassicaria

Er. Urticaria

Er. Geranicola

Er. Antennulata

Echrius 1

Er. Jacobaea

Er. Rubicola


Ptytiocampe Vergeri

Alia

Erucae








Erucarum Aldrov.

Tab. 6.




Aurelice Aldrov.



Bombyces

Mouf.



B. serico exempto.

Bomb. supine sect.



Bomb. Mouf.

Papilio Erupturus

Folliculus Bomb.

Papil. Erupturus

P. Eruptu



Papilio Bombyc.

Follic. inclusus Papil.



B. Gravid,



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.


Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.









Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.



B. fese Contrabens





Asellus Mouf.



Scolopendra Mouf.
Scol. Maxima Terrestr




Scolopendra Terr. Aldro.



Iulus Glaber Mouf.




I. Hirsutus




Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



Handwritten text below the first row of shapes.



Handwritten text below the second row of shapes.



Vermes Arborum

Mouf.

Cosbus. a



Vermes Fructuum et Leguminum Mouf.





g

Vermes Hominum


Aldr.



Limaces



Handwritten text in a cursive script, likely Urdu or Persian, covering the majority of the page. The text is arranged in approximately 12 horizontal lines. The ink is dark and the paper is aged and slightly discolored.



Handwritten text, likely a title or header, possibly starting with "The" and "of".

Handwritten text, possibly a subtitle or introductory phrase.

Handwritten text, possibly a list or series of items.

Handwritten text, possibly a list or series of items.

Handwritten text, possibly a list or series of items.


Handwritten text, possibly a list or series of items.

Handwritten text, possibly a list or series of items.

Handwritten text, possibly a list or series of items.

Handwritten text, possibly a list or series of items.

Insecta Varia ad loca sua referenda



Vermis fari-
nae.




Teredines.




Mar.






Hirudines Marinae




Hirudines Marinae



Lumbricus marinus



Lumbrici Aquatici seu Marini



Stella marina Aldr



Marinae



Stellæ



1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

Stell.

Marina

Aldr.



Hippocampus

Mouf.

Hippocampus

Mouf.



Vua Marina

Hippoc. Aldr.

Aldr.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

RECEIVED

U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D.C.

THEATRI UNIVERSALIS ANIMALIUM

PARS SEXTA.

S I V E

HISTORIÆ NATURALIS

D E

SERPENTIBUS

LIBRI II.

Cum Enumeratione Morborum, quibus Medicamina ex his Animalibus
petuntur, ac Notitia Animalium, ex quibus vicissim Remedia præstan-
tissima possunt capi,

C U R A

HENRICI RUYSCH,

M. D. Amstelædamensis.



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS,

Anno MDCC. XVIII.

THEATRI UNIVERSALIS
MULLINUM

AD 1712

1712

AD 1712

1712

REPERTIBUS


1712

AD 1712

1712

REPERTIBUS

AD 1712



AD 1712

AD 1712

AD 1712

ENUMERATIO MORBORUM,

Quibus petuntur Remedia ex Serpentibus.



| | |
|------------------------------|---------------|
| Angina | Pag. 10. b. |
| Aurium dolor | 6. a. |
| Casus pilorum | 6. a. |
| Cutis Humana ut extergatur | 6. a. |
| Cutim detrudens | 10. b. |
| Dentes eradicantia | 6. a. |
| Dentitio puerorum | 10. b. |
| Epilepsia | ibid. |
| Fistulæ | 6. a. |
| • Foetus | 6. a. |
| Gingivarum foetor | 6. a. |
| Gutturis affectus | 10. b. |
| Hæmorrhoides | 6. a. |
| Impetigo | 10. b. |
| Lepra | 6. a. |
| Lithiasis | 29. a. |
| Lues Venerea | 6. a. |
| Morsus Venenatus | 10. b. |
| Oculorum claritas | 6. a. 33. b. |
| Odontalgia | 6. a. 29. a. |
| Partus | 10. b. |
| Partûs difficultates tollens | 6. a. |
| Paralyfis | 6. a. |
| Pestilentia | 19. b. |
| Phtisis | 10. b. |
| Podagra | 6. a. 16. b. |
| Serpentis Morsus | 10. b. 16. b. |
| Suffusiones diuturnæ | 20. b. |
| Strumæ | 29. a. |
| Vertigo | 10. b. |
| Visus | 10. b. 16. b. |
| Vitam prorogantia | 10. b. |
| Ulcera | 33. b. |

NOTITIA

SERPENTUM,

Ex quibus Remedia Præstantissima capiuntur.



| | |
|------------------|-------------|
| Contia | Pag. 20. b. |
| Anguis Æsculapii | 23. a. |
| Aspis | 16. b. |
| Cæcilia | 19. b. |
| Dracones | 33. b. |
| Hydrus | 29. a. |
| Serpentes | 6. a. |
| Vipera | 10. b. |

HISTORIÆ NATURALIS

DE

SERPENTIBUS:


L I B E R I.

De Serpentibus Vulgaribus, seu Minoribus.

T I T U L U S I.

De Serpentibus in genere.

Nomen.
Ambros.
de Ser-
pentibus
lib. I. c. I.



Erpentis vocabulum, vel à serpendo, quòd occultis accessibus, non occultis passibus, animal hoc progrediatur; vel à Græco *ἐρπετα*, nisi Festus fallit, descendit. In genere sumptum, omnia illa, quæ vel citra usum pedum repunt, vel tam exiguos habent ut repere quam incedere videantur, complectitur. Dicitur etiam priscis *Serpula*, si Festo credendum; aliis *Coluber*, seu quod in lubricos tractus flexibus sinuosis labatur: seu quod umbras colat, ut apud Virgilium legimus: quamquam alii pro serpente domestico accipiant; alii pro serpente aquæ, ut Theophrastus, Gaza, & Ponzettus fumant. Dicitur & *Anguis*, quod semper quasi angulosus & plicatus conspiciatur: quanquam Servius, aquaticis duntaxat hoc nomen tribuit, alii etiam terrestribus. *Thyrum Echydnam* & *Draconem* vocari, passim apud authores invenies. Græcis veteribus est *ὄφις*, modernis *φίδ*, sine dubio *παρὰ τὸ ὄφτω*, seu quod acutum cernat; seu quod oculis apertis dormiat: Hesychio *ἀργυρ*. Arvivorum Dialecto. Unde Pausanias Mercurium *Argiphontem* dixit, quod sit *ὄφιοκτόνος*, id est serpenticida.

Lacertis valde sunt similes. *Caput* quibusdam leve, grave aliis; quibusdam latum, angustum, album, nigrum, nonnullis flavum variegatum. Sunt qui illud tam velociter in utramque partem vertunt, ut intuiti bicipites vel amphicephali videantur. *Aures* etsi habeant, non eminent tamen; recte cavernas ad audiendum, Plinius vocavit. Sed nec meatus narium, *nares* recte appelles, quod non ita explanati sint. *Oculis* sunt durioribus. *Palpebras* superiores non movent, inferiore tantum connivent. *Collo*

carent. *Dentes* pectinatim coeunt. *Cortice* tanquam pelle teguntur. *Caudam*, ut insequentibus agemus, variam gerunt.

De *Internis partibus* & *Anatomicis* ita habet Ambrosinus: Primitus *caput* serpentis osse unico tegitur coni retusi figura, sicuti astruit Cardanus. Imo in hoc osse oculorum foramina natura non insculpsit, quod ideo factum est, ne facile læderentur, dum humi serpunt. *Dentes* habent ferratos, & acutos, quemadmodum paulo ante in descriptione, hujus animalis fuit exaratum. Sed ut notat Edoardus Wottonus duo sunt in suprema parte, dextra, levaque longissimi, tenui fistula, instar aculei Scorpionum perforati, per quam postea venenum, data occasione, ejaculantur. *Lingua* serpentum tenuis, longa, atroque colore referta est; ideoque longius potrahitur: In summitate vero est bifida, & secundum nonnullos pilosa, seu potius exilis instar pili, ut in capite de lacertis fuit explicatum. Plinius linguam serpentum *trisulcam* vocavit, quanta celeritate illam vibrant, ut triplicem linguam exerere videantur. Sub lingua in quibusdam cuticula invenitur, quæ tanquam *vesicula* dentes operit, in qua venenum occultatur, quod postmodum mordendo per cavitatem dentis communicant. *Cor* exiguum longum, & figuram renum repræsentans, postremæ adhæret arteriæ, & natura valde calidum est: Ob hanc causam tradebat Galenus Serpentes inter cæteros animantes maxima audacia esse refertos. *Arteria* est admodum longa, & juxta os suam trahit originem, ita, ut sub lingua esse videatur. Imo linguæ quodammodo videtur præminere, qua ipsa contrahitur, neque eodem loco, ut in cæteris animalibus, permanet. Hæc postea defertur in *pulmonem* quo angues ad differentiam piscium, utuntur: Quo circa notabat Plinius,

Card. I. 2.
rerum va-
rietat. c.
29.

Edoar-
dus Wot-
tonus I. 2.
de differ.
Animi.

Galen. in
libro de
Anato-
mia vivo-
rum. 2.

Virgil.
Georg.
I. 3.

Descri-
ptio.

ex terra serpentes, paulo ante Darii expeditionem solum mutare coacti sunt, Herodoto teste: & Amyclas, Italix inter Terracinam & Cajetam civitatem, à serpentibus ex vicinis paludibus prognatis, deletam, Plinius asserere ausus est. In corpore humano nasci, in Historia de Homine dicemus. Ex sanguine quarundam avium confuso, Democritus prodidit, referente Plinio: ex salvia in sterquilinio putrefacta alii. In solido & vasto marmore inventum fuisse, Martini v. Pontificis tempore, ex Baptista Leone apud Pareum habemus: Causam Cardanus reddit. Ex cadaveribus humanis nasci, & corrupta spinæ medulla, apud Camerarium invenies. A tali ex plumbeo feretro profiliante, Avenionensem opificem læsum, apud Pareum legimus. Modum generationis aperuit ex Aristotele Plinius. Coeunt, inquit, complexu adeo circumvoluti sibi ipsi, ut unus existimari biceps possit. Contacta ova in terra idcubant, & factum sequente excludunt anno. Continuata illa serie contexta, ut monilis instar videantur. Quidam & animal pariunt. Fætorem in congressu edere, apud Ælium legimus.

Vox ipsis est sibilus. Obtusum testudines, longum serpentes reddunt, stridere id Luciano: *ῥιζεν* Apollonio in Argonauticis. Erectos ante lapsum incessisse, imaginantur nonnulli: serpere, quis non novit! Flexuosis impetibus incedunt, & caput, reliquo corpore quiescente, ob vertebrae cartilaginosas vertunt: sicque corpus suum longum & angustum in partes adversas respicientes, melius tueri possunt. Squamis quasi unguibus, & costis quasi cruribus inniuntur. Græci de hoc motu verbum *ἰλυσσάσθαι* usurpant.

Inimicitiam cum hominibus, plantis & animalibus gerunt. Quantum ad homines, omnibus contra serpentes inest venenum: feruntque ictos saliva, ut ferventis aquæ contactum effugere. Crates Pergamenus in Hellesponto circa Parium; genus hominum fuisse tradit, quos *Ophiogenes* vocant, serpentum ictus contactu levare solitos, & manu imposita, venena extrahere corpori. Varronis tempore, pauci ibidem erant, quorum salivæ contra ictus serpentum medebantur. Similis & in Africa gens *Psyllorum* fuit, ut Agatharchides scribit, à *Psyllo* Rege dicta, cujus sepulchrum in parte Syrtium majorum est. Horum corpori ingenitum fuit, virus exitiale serpentibus, ut cujus odore sopirent eas. Mox vero liberos genitos, protinus objiciendi sævissimis eorum, eoque genere pudicitiam conjugum experiundi, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Simile & in Italia Marforum genus durat, quos à Circes filio ortos servant, & ideo in-

esse iis vim naturalem eam. Idem apud Strabonem invenies. Inter animalia gerunt inimicitias cum *avibus*, *quadrupedibus*, & *exanguibus*. *Avibus*. Nam aquilæ lapidem ætitem in nido deponunt, ne pulli à serpentibus lædantur. Eadem in montibus regni Morfilianguibus vescuntur. Notum, quam gratitudinem Aquila à serpente Spiritis arctissime complicata, rustico liberatori præstiterit, apud Ælium. *Pavonis* clamore terrentur, *Ciconie* in Thessalia maxime immunes, quod serpentes interimant. Eiusdem in Italia pulli tribus annis continuis aliquando devorati fuere. Huc *accipitres*, *ibides*, quorum pennas timent, *vultures*, hirundines *galli*, & *gallinae* pertinent. Ex *quadrupedibus* sunt *Elephanti* qui Spiritu cervorum ritu, serpentes è cavernis evocant: *Leopardi*, quorum odorem vitant, *Cervi*, qui seu tanquam medicamento, quod Isidorus tradit; seu tanquam pabulo, quod Belluacensis; seu levandi senii ergo, & ut pilos mutant cornuaque deponant, quod alii, serpentibus vescuntur. *Sues* etiam angues inventos edunt. Per eas ager Plombinensis à quodam serpente purgatus est. *Asoricibus* brumali tempore infestantur, quod tum languore quodam laborent. Cum iisdem, testudo, ichneumon, lacerta, & *Chamaeleon*, ut propriis locis est dictum, congregiuntur. Catum quoque eis infestum, apud Aristotelem habemus. Ex *Exanguibus*, Locustæ species quædam *Ophiomachus* dicitur, quod cum serpentibus prælietur, eosque gutture arrepto interimat. Albertus *O-pimatum* vocavit. *Cancris* serpentes ad Ephesiam metropolim, forcipibus arripiunt, dum paludes juxta Ephesiam tranare conantur. *Aranei* sub umbrosis arboribus apricantes, ictu inflicto vertiginosos reddunt: quod tamen melius de lacertis sumferis. De *plantis* hoc habet. Nec umbras quidem fraxini arboris ferre: ideo hæc prolixo naturæ beneficio, antequam è latebris egrediantur floret; postquam delituere, folia demum deponit. *Smilo*, in Trachinio solo, si appropinquaverint, interire. Foliis quernis injectis, si Geoponicorum auctori credimus, perire. Octobrem florentis uvæ aversari, nec tum temporis in vitibus inveniri. Vetonix circulo inclusos flagellando, quia exire non audent, sese perimere. Odore alii deterri: rutæ, vero Lybicas inprimis, animo linqui. Taceo trifolii quandam speciem, ut Plinius voluit, absynthium, artemisiæ, abrotonum, libanotidem nepetham viticem, quam mulieres in Thesio-phoriis pulvinaribus substernebant; Helenium denique seu Enulam Campanam, cujus ideo Ælianus meminit. Therionarca in Cappadocia & Mysia nascente, omnes feras torpescere, fabulatur Plinius. Ab igne abhorre apud Cardanum habemus.

Symp-
thia.
Plin. in
proæ-
mio.
Arist. H.
A. l. 2.
cap. 1.
Plin. H.
N. l. 16.
cap. 34.
Plin. H.
N. l. 20.
cap. 23.

Amicitiam colunt *inter se*, quia in caver-
nis sæpe conglobatim inveniuntur: cum
anguillis, ut Gesnerus exemplo cujusdam
pueri docet: cum *vulpibus*, quia in cryptis
communem vitam degunt: cum *Cattis*,
quia aliquando secum colludere visi sunt.
Hederam serpentum frigori gratissimam, ut
mirum sit ullum honorem habitum ei. *Fæ-
niculo* degustato, senectutem facilius exuunt:
& succo oculorum aciem, in latibulis fere
amissam, recipiunt. Circa *sabinam* semper
obversantur.

Natura
& Mores.
Plin. H.
N. l. 2.
cap. 63.

Naturam & *Mores* sequentia exprimunt.

Arist. H.
A. l. 2. 8.
c. 15.
Gal. l. 2.
de locis
affectis.
Plinius
H. N.
l. 32. c. 5.
Arist. H.
A. lib. 5.
c. 17. &
l. 8. c. 17.

Terra serpentes homine percussio non am-
plius recipit, pænasque etiam inertium no-
mine exigit; venenum secundum quos-
dam, in cauda habent, quod in vesicam ori-
vicinam deducatur; quæ, priore etiam eje-
cto, intra diei naturalis spacium alio im-
pleatur. Quatuor frigidissimis mensibus
latent, nec quicquam comedunt, imbecilli-
tum adeo veneno, ut impune tractentur:
Urgente canicula adeo æstuant, ut nun-
quam fere quiescant: Plinius, cum sol est in
cancro, torqueri dixit. Vere, dum è late-
bris prodeunt, exuvias deponunt; quas qui-
dam *syphar*, alii *senium*, *ῥῆγας*, nonnulli ad
Plinii mentem, *vernationem* vocant. Inci-
piunt à capite ut quasi, à deciditibus ob-
cæcentur: diei naturalis spacio devolvun-
tur ad caudam, totumque aufertur spo-
lium, ut Aristoteles prodidit, pro ut fætus
membranarum involucris liberantur. De-
gustato fæniculo in hominis conspectum
prodeunt. Genuina ne hæc pellis, an ex
muco & sordibus per hyemem contractum
spolium, ad Disquisitionem causarum per-
tinet. Diuturnioris etiam sunt vitæ, seu
quod exuvias deponant, seu quod parci-
sint cibi, seu in comparatione ad alias be-
stias. Diei noctem pervigilem conjungere,
dum apertis oculis somnum capiunt, alii
prodiderunt. Prudentia in eo notatur à
quibusdam, quod totum corpus periculo
exponant, ut caput illæsum servant. Illud
facile pristinæ sanitati vulneratum reddi-
tur; hoc attacto, moriuntur facile. Arun-
dine percussi, mortuorum instar jacent: si
frequenti ictu petieris totis viribus morde-
re conantur. Stercus serpentum bene ole-
re, facile concedi potest, si verum est, in-
ter Calecutum & Cranganon inveniri, qui
ab Ore suavissimum & mosci instar spirent
odorem.

Venenum.
Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.

Huc *veneni* consideratio spectat. In cysti-
fellis istud, secundum Plinium, residet: in
vesica quadam sub lingua, qua disrupta li-
quor quidam biliosus emanat & corpus in-
ficit, secundum Grevinum. *Tot eorum vene-
na quot genera, tot perniciæ quot species, tot do-
lores quot colores*, Isidorus dixit. Diversa ta-
men operatio. Mares fæminis, senes ju-
nioribus, magni parvis, jejuni saturis, o-

mnes, æstate quam hyeme, sunt pernicio-
siores. Deposito senio magis formidolosi
feruntur. An aliquando veneno carcant,
disquiritur. Præ dolore ob amissum dis-
rumpi, quæ Vincentii mens est, falsum.
Breviore an diuturniore temporis spacio
icti intereant, partim veneno, læso par-
tim, adscribi debet. In Indiis Orientalibus
sues vel canes à quibusdam admorsi, sex
duntaxat horis supervivunt: homines diem
naturalem: remediis liberati, periculo va-
cant si postea admorsi fuerint. Alibi, vel
ipse halitus prætereuntes interimit. Quen-
dam interiisse, cum se in aqualignis prope
serpentis cavernam excalescentis, lavasset,
Ponzettus author est. Scaliger Paravici-
num quendam, non procul Dertona, ser-
pente, in venatione hasta occiso, mortuum,
prodit. Mathiolus in agro Tridentino vac-
carum custodem in periculo, & morti pa-
ratum, nisi theriaca & aliis refocillatus fuisset.
Habet & *locus* aliquid. Ferociores iis
qui in plano montani, qui inter Arabica
balsameta minus nocere creduntur. Vul-
nere inflicto, stupet primo æger: mox vul-
nus dolore afficitur, color mutatur, in-
flammat, rubet, livet, nigricat, & æ-
ger totus ardet. De *Remediis* multa habentur.
Vulcani in Lemno antistes, Umbro
de gente Marubiorum apud Virgilium,
Atyr apud Silium Italicum, virtutem Ser-
pentum morsus sanandi possidere crede-
bantur. Mira de Psyllis Lybicus Ælianus.
Non valde si doluissim puncti, sola Saliva
sanasse: ubi dolore premebantur, colluto
aqua ore, bibendam tanquam salutarem
dedisse: si nec hoc juvisset, accubasse ægro
& corporis sui contactu infregisse vene-
num. Certiora remedia sunt, quæ aliunde
sumuntur. Laudatur capræ nigræ lac, si lo-
cum affectum eo foveris. Puella quædam
caseo capræ recenti ulceri imposito sanata
est. Medullâ cervi perlinitus, ab eodem o-
prime defenditur. Vegetius in jumentis
demorsis, stercore suillo recente utitur.
Dioscorides finum bubulum vehementer
commendat. Quid si ipsemet serpens suos
ictus sanet? Herbarum huc facientium ca-
talogum, apud Ambrosinum vide. Ma-
phæum si sequimur, sunt in India arbores
Copaiba dictæ, balsamum fundentes, quo
læsi à serpentibus sanantur. Idem arbores
ex nucum genere, si Plinio fides, faciunt:
nec non in Græcia frutex, Epipactis no-
minatus, alii Embolinen vocarunt. Ex
Compositis, Theriaca Andromachi intra,
extra, Confectio Hermetis, Emplastrum
Epigonum, Oleum scorpionum, & di-
vinum, de quibus Ambrosinus, laudan-
tur.

Ambros.
de Serp.
p. 40.

Scaliger
Exerc.

Mathiol.
l. 5. in
Dioscor.

Wotton.
de Differ.
anim. l. 6.

Veneri
remedia.

Ælia. H.
A. l. 16.
c. 28.

Maphæ.
Hist. In-
dic. l. 2.

Plin. H.
N. l. 27.
c. 11.

Vescebantur iis olim, Troglodytæ, &
Æthiopes, si Herodoto credimus; Can-
dri, qui & Ophiophagi inde, si Plinio; A-
rabes,

Usu in
Cibis.
Herod.
Hist. l. 4.

Ælia. H. rabes, si Solino. In Brasilia, carnem quorundam, qui brachii humani crassitudine, concidunt, & inter apparatus reponunt. Plin. H. N. l. 6. In Cuba, inter regios apparatus censentur. Ova comesta per murænam redduntur innoxia. A. l. 11. c. 34.

Ufus in Medicina. In Medicina magni sunt usus. Totum si spectes; capite & cauda truncatis, interaneis abjectis, deglubiti, carne bene lota, & cum vino cocta, jure aromatibus condito, in lepra commendantur. Suffitu inveterati in mensibus provocandis Plinius utitur. Quidam cum floribus herbæ paralysis in oleo ad podagram decoquunt. Cinis combustus in fistulis sanandis vehementer commendatur. Baculus quo rana ab angue excussa est, parturientes adjuvat. Quantum ad partes, Oculum dextrum utiliter ad epiphoras alligari, dummodo serpens dimitatur, Plinius alicubi, author est. Cor si mordeatur aut alligetur, in odontalgia efficax perhibetur. Iecur qui degustaverit, si credere fas est, à nullo serpente tangetur.

M. Paulus Venetus. l. 2. c. 40. Fel tosti Paulo veneto, demorsos, à cane rabido sanat; parturientes, degustatum, felicissime juvat; & hæmorrhoidibus illitum opitulatur. De sanguine, ex lib. innotati, prodit Ambrosinus, pallida prælabia rubicunda reddere, faciei inunctum ab omni macula fervare; dentibus illitum gingivarum fæctorem auferre. Pinguedinem aliis ad luem veneream curandam Matthiolus admiscet: eadem, cum butyro majali lento igne cocta & percolata, ad paralysis & podagram conservatur. Pessis ad sterilitatem tollendam, cum felle tauri, Hippocrates miscet. Carnes ad extergendam cutim humanam valere, Porta persuadere conatur. Abensina in lepra easdem inhumat donec vermes enascantur: mox cum his exsiccat, & drachmam pulverizatarum cum syrupo de melle leprosis exhibet. Tagautius, strumis & elephantiasis iisdem medetur: Porta vulneribus & nervis incisis quod dissecti brevi temporis spacio coalescant. Spolium insignium virium esse credidere antiqui. Ad casum pilorum conducere, ait Galenus; ad claritatem oculorum, si eodem fricentur, Plinius: ad odontalgiam in aceto decoctum, & dentes eradicandos iidem. Aurium dolori, seu in vino seu in oleo, coctum, prodesse Dioscorides & Theophrastus; cum capitibus papaveris Archigenes. Suffimentum partus difficultates solvit. Ex sententia Plinii, lumbis parturientis alligari debet. Villanovanus suffitu ex eodem, cum opoponace, myrrha, galbano, Castoreo, stercore columbino vel accipitris facto, fætum mortuum & vivum educit.

Tagaut. l. 1. Inffit. Chirurg. Porta Phytog. l. 5. c. 12. Galenus Euporist. l. 2. & l. 11. de simplic. medicin. Dioscor. M. M. l. 2. c. 17. Plin. H. N. l. 28. c. 1. l. 29. c. 6. l. 30. c. 7.

Ufus in variis.

Olim iisdem in puniendis parricidis utebantur. Ægyptii in foveam serpentibus plenam eos conjiciebant: Romani, culeo,

cum semia, gallo gallinaceo & serpente infutos, in mare projiciebant. In India, teste Linschotano, à circulatoribus circumferuntur, qui eosdem ad instrumenti musici sonum tripudiare cogunt. Annibal, injecta magna vi serpentum fictilibus inclusorum in Romanorum classem, effecit, ut Antiochus victoriam reportaret. Adipe veterinarii ad equorum stranguriam utuntur: aucupes carnibus ut aves citius pennas mutant. Albertus multa ex partibus, sed nugatoria, conficit, quæ apud Ambrosinum vide. Ovum quidam eques coram Claudio litigaturus, spe vincendi gestabat: deprehensus, tanquam venificus, interfectus fuit. Senectam tanquam amuletum, in armillis quidam ligare solebant. Cardanus ad nescio quæ non, in certis constellationibus adhibet. Plinius cum sale, & serpillio tritam bobus in fauces, uvæ maturescence injicit, ut per totum anni curriculum valeant. Wottonus in armariis & cistis reponit, ut vestes à tineis immunes fervet. Alii ejus pulverem inspergunt, ut apes ad alvearia revertantur.

Differentia serpentum multæ sunt, Primarias ad sequens caput rejicimus, secundaria, à quantitate, colore, loco, odore, noxa, aspectu, & aliis accidentibus sumuntur. De quantitate nota, Marem foemina semper minorem. In plaga septentrionali, ineunte æstate, parvos reperiri, qui regem cristatum habeant, eodemque occiso dissipentur. In Thessalia parvum & hirsutum, si Belluacensis fides, quem Incolæ sacrum vocent, alium, sola voce animalia interimere. In India quoque magnitudine aliis longe inferiores, ποικίλος τῇ χόαν versicolores, & ὑπερὶν φαρμάκων καταγράφοντας, quasi pigmentis distinctos. Alibi maximi sunt. Megasthenes scribit, verba sunt Plinii, in India serpentis tantam magnitudinem adolescere, ut solidos hauriant cervos taurosque. Metrodorus, circa Rhyndacum amnem, in Ponto, ut supervolantes quamvis alte perniterque alites haustu raptas absorbent. Nota est in Punicis bellis, ad flumen Bagradam, (nunc Megerada) à Regulo Imperatore balistis, tormentisque ut oppidum aliquod, expugnata serpens, cxx. pedum longitudinis. Pellis ejus maxillæque usque ad bellum Numantinum duravere Romæ in templo. Huc Seneca respexisse videtur, dum scribit, Lenis & privata perniciæ non solas urbes movet. Quod late fure caput, & omnes appetit, undique configitur. Serpentes parvulæ fallunt, nec publice consequuntur; ubi aliqua solitam mensuram transit, & in monstrum excrevit, ubi fontes potu infecit, & si afflavit, deurit, obteritque, quacunque incessit, balistis petitur. Circa mare rubrum longitudine x l. cubitorum, crassitie eidem proportionata olim

Egnat. ver. histor. l. 6.

Sueton. in Histor. l. 6.

Differentia.

Belluacensis. Speculi. l. 20. c. 11. Æl. H. A. l. 17. c. 2. Plin. H. N. l. 8. c. 14.

Val. Max. l. 1. c. ult.

Seneca de Clement. l. 1. c. 25.

Ælia. H. A. l. 17. c. 1.

olim observati sunt. In loco quodam Macra, visus, qui jugeri longitudinem æquaret, crassitie, si credere fas est, tantâ, ut equites ex utraque parte adstantes, seipso in-
 tueri non possent. Posidonius id retulit. Porus Indorum Rex ad Augustum decem Cubitorium misit. In Malaber octonum pedum inveniuntur, puerorum amatores. Jacentes anguina esse facie dicuntur; sur-
 gentes, eam adeò dilatant, ut ad humanam effigiem propius accedere videantur. Novem pedum pellum apud Clusium in-
 venies. Tantam & Ambrosinus apud magnum Hetruriæ Ducem vidit. Ideò non inepte forte Gillius scripsit, suum magni-
 tudinem Calcuti æquare: cum præsertim edicto regio, ne occidantur caute sit. Circa fluvium Senegæ capras, alibi cer-
 vos devorare dicuntur. *Colorem* si spectes, in septentrionalibus regionibus variegati vagantur. In India, si Ælianum sequimur, vittis à capite ad caudam pertinentibus, aliis æreis, aliis aureis & argenteis conspi-
 cui sunt. Thevetus quosdam rubescentes, cum squamis versicoloribus, alios instar fo-
 liorum lauri virides facit. Hujus coloris & apud Valesianos inveniuntur. Hesychius *Sauritas* vocat. A loco sunt aquatici, terre-
 stres, quorum alii montosis, alii planis, alii quercetis, alii latibulis circa fagos, & corylos delectantur, & amphibii. Obser-
 vavit Bellonius circa Abydenum portum genus quoddam, rubore in leucophæo re-
 fulgens, quod interdiu in mari vivebat, no-
 ctu continentem, quietis causâ, petebat. *Odoris* ratione sunt quidam ex iis moscati, ut serpens Æsculapii, & *Cusso* Cypriorum, capite magno, & corpore exosse. Inte-
 grum agnum devorat: hoc absumpso, ad arborem se tamdiu fricat, donec ossa ex-
 cussit. *Noxam* si attendas, in Hispanio-
 la innocui versantur: circa regiam Perua-
 nam Cusco, incantationibus ligati, nihil damni, postquam ferè integrum exerci-
 tum delevissent, inferunt. Inter hos Ni-
 cander *Moluros* reponit. *Aspectu* sunt vario. Alii habent oculos prægrandes, ut Lybici: alii parvos & locustis similes: nonnulli san-
 guineos & luteo colore suffusos. Ad *acciden-
 tia* pertinet, quod quidam sunt ore acu-
 to, quidam vasto. Nonnulli cono tan-
 quam crista in vertice superbiant: nonnul-
 li cornua habeant: quidam denique alas. Huc pertinent monstrosi, qualis unus bi-
 ceps, in Musæo Bononiensi videndus, al-
 ter latissimi corporis, & compressâ caudâ, quorum icones damus.

TITULUS II.

De Serpentibus in specie.

CAPUT I.

De Serpentibus terrestribus.

ARTICULUS I.

De Vipera.

Primaria ferè Serpentum Differentia est, in quantum in *Terrestres* & *Aqua-
 ticos* & *Dubios* distinguuntur. *Terrestres* sunt, *Vipera*, *Ammodites*, *Cerastes*, *Hamor-
 rhous*, *Seps*, *Aspis*, *Dipsas*, *Scytale* & *Amphis-
 bena*, *Cecilia*, *Cenchrus*, *Acontia Dryinus*, *Elaps* & *Anguis Æsculapii*. His *Indicos* adde.

Ambro-
sin. de
serpent. l.
I c. 2.
Nomen.

Viperam quidam ab eo quod vi pariat, nomen sortitam putant: quasi à fætu ex-
 eunte, alvus matris laceretur: alii, & qui-
 dem verissimè, quasi viviparam, & per con-
 tractionem *viparam* & *viperam*, quod ova in-
 tra alvum concipiat, deinde fætum vivum
 enitatur. Græcis est aliquando per excel-
 lentiam *ἔρις*, ut in Oppiano animadverte-
 re est, communiter *ἔρις* mas, & *ἔρις* fæmi-
 na, *παρὰ τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὴν γὰρ αὐτὴν ἀρετὴν*, quod
 ad interitum usque fætum contineat, cui
 fabulæ apud veteres fides data; vel *παρὰ τὸ
 ἔχειν ἐν αὐτῇ τὸ ζῆν*, quod animal intra alvum
 contineat; quod verissimum. Hodierni
 Græci Echendras, teste Bellonio, nomi-
 nant. Itali Marassos. An rectè, alibi disqui-
 retur. Sueffanus *Scorzonem* vocat: Nico-
 laus Florentinus Scorzonem; quod voca-
 bulum, apud Italos, omnibus serpentibus
 commune est. Arabes *Thyri* vocabulum ipsis
 imponunt. Unde Andromachus viperinos
 pastillos, ferinos appellavit, à Græco *τῆρ* seu
τῆρ. v. *Nepam* non esse, certum.

Arist. l. t.
de gene-
rat. Ani-
mal. c. 10.

Serpens est venenosus longitudine cu-
 bitali, sæpè prolixiore, colore subflavo, plu-
 ribus maculis consperso, *Mari* caput angu-
 stum & acutum, collum crassius, corpus
 tenuius. *Cauda* ritu aliorum serpentum gra-
 cilescit, non tamen acervatim ut fæminæ.
 Squamis circa extremitatem asperioribus
 tegitur, quas ira percita erigit. *Meatus*
 excrementorum in cauda est ventri pro-
 pinquior. Canini *dentes* duo, fæminis plu-
 res. *Galenus*, fæminas subflavi coloris, ad-
 modum agiles, collum maximè porrigen-
 tes, oculis subrubentibus, inverecundis, &
 ferini intuitus facit. *Aëtius*, multis notis
 instar rotarum exornatas, magnitudine
 Cubitali cauda acervatim in tenuitatem
 desinente, alvo sinuosiore, & quæ caudæ
 innixa gradiatur. *Cardanum* si sequamur,
 erit præstantissimis viperis caput latum,
 erectum, & cavum, figura rhombi, oculi vi-
 vaces, breve corpus, & ad motum alacre. *A-
 matus Lusitanus* in Hispania cubitalem esse
 scribit, capite presso & acuto in quo verruca

Deser-
ptica

Galen. de
Theriaca
ad Pifo-
nem.

Strab.
Geogr. l.
15.

Ælian.
H. A. l.
17. c. 2.

Aristot.
H. A. l.
2. c. 14.

Ambro-
sin. de
serpent.
pag. 6.

conspicitur, dorso veluti quadam catena depicto.

Anatom.
Ambro-
fin. Hi-
stor. Ser-
pent. l. I.
c. 2. pag.
117.

Anatomica ipsius Ambrosini verbis exequemur. Sic autem ille: In dissectione viperini capitis *cerebrum* subnigri coloris conspicitur, & adeo pusillum, ut vix quantitatem quatuor granorum milii adæquet, propterea hoc animal à quibusdam calidum, & siccum esse creditur: quod immodicus calor cordis à frigiditate cerebri temperari nequeat. *Auriculis* viperæ carent, sed earum loco quasdam cavernas habent: Etenim Plinius tradidit animalibus fætum vivum parientibus aures inesse eminentes, exceptis cartilagineis, vitulo marino, Delphino & viperis quæ quibusdam foraminibus pro auribus, utuntur. Quoad *dentes*, Gesnerus tradit quosdam viperinum caput secantes, quatuor oblongos dentes in superiori mandibula spectasse; cum alii dentes tam superioris quam inferioris maxillæ, ob parvitatem, non appareant, sed maxillam acu fricando asperitatem, & stridorem percepisse; Hos pusillos dentes, tam in vivis, quam in mortuis viperis, nisi auferatur *vesicula*, in qua conduntur, nemo unquam in tueri poterit. Baldus Angelus Abbatijs quatuor dentes caninos tam mari, quam fæminæ viperæ attribuit, cum hoc tamen discrimine, ut mas duos habeat deciduos: Ideoque non admirandum esse putat, si interdum maris dentes duos tantummodo esse conspiciamus. Quamobrem Authores Nicandrum secutos proculdubio hallucinari statuit, quando pronunciat, demorsos à vipera mare, duo tantum ulcuscula, & à fæmina quatuor reportare: cum duos dentes maribus, & quatuor fæminis semper inesse crediderint. Et tamen vipera mas, antequam illi duo dentes cadant, quatuor etiam vulneribus possit patientes afficere. Hæc autem sententia si sit vera nec ne, indigit animadversione; quandoquidem nostri circulatores viperas quotidie pertractantes, duos tantum dentes tam in mare, quam in fæmina se observasse referunt. Nos igitur decocto viperæ capite, & carne diligenter à craneo separato, duplex dentium genus conspicati & sumus: unum, quo hæc bestia se tuetur, & mordendo venenat; alterum quo ad mordendum utitur. Hi autem sunt dentes quatuor supra triginta ab Antiquis non descripti: cum in gingivis occultati non appareant. Horum autem talis est ordo; nam præter quatuor caninos nominatos, duodecim in superioribus maxillis, nimirum sex in utroque latere conspiciuntur; suntque ad instar serræ versus gulam, & aliquanto majores dentibus armantibus inferiores maxillas. Inferiores dentes sunt viginti duo, nempe undecim in quolibet latere, quocirca quando authores memorant vulnera à dentibus vipe-

rinis inflicta, eos de caninis dentibus verba facere opinamur; Cum cæteri dentes horum animalium illis ignoti fuerint. Quandoquidem veteres, harum ferarum *caninos* tantummodo dentes, descripserunt, quos vidimus perforatos, & vesicula veneno plena munitos, quæ novo toxico quotidie repletur, dum primum in ictu consumptum fuerit. Etenim quemadmodum in singulis animalibus aliqua semper generantur excrementa, quæ per partem determinatam extra corpus trudentur: Ita etiam viperæ venenosum excrementum per dentes evacuant, dum se defendentes, mordendo cætera animalia venenant. Hoc etiam præstat scorpio, qui in cauda aculeum perforatum instar dentium anteriorum viperæ possidet, & sub aculeo habet vesicam veneno plenam, quod punctis animalibus communicat. Neque mirandam est viperas caninis dentibus ad tutelam tantum sibi met à natura comparasse: siquidem accidit idem pisci pistrici rostrum hinc inde dentatum possidenti, quos dentes huic animanti non nisi ad tutelam natura impertita est. Quod autem nostri viperarum venatores pronunciant, se tam in mare, quam in fæmina duos tantum dentes conspiciatos fuisse, inde natum esse credimus: quoniam cæteri in gingivis latentes non videantur: deinde hoc genus hominum tanquam rude, & imperitum nunquam anatomen harum bestiarum exercuit. *Pulmo* in viperis veluti vesicula oblonga membranosa, variisque meatibus plena, & aëre turgens observatur. Item *cor* grandiusculum apparet, & mobile in pericardio; hocque quando animal alexipharmaco necatur concitatus movetur, quam si ferro interimeretur, ob repugnantiam alexipharmaci ad venenum. *Jecur* est oblongum vena admodum crassa per medium percurrente, quæ dimanans à corde ad extremam usque caudam serpentis progreditur. Ibi etiam visuntur *vena* seu *arterie*, quæ à corde & hepate ad gingivas, seu vesiculas dentium ascendunt: cum in *vesica fellea* tanquam in propria lacuna contineatur hæc materia venenosa, quæ inde ad dentes defertur. Possumus autem necessario attestari hanc venenosam materiam in cysti fellis residere, quoniam neque hepar, neque cor, neque sanguis viperæ venenum participant. *Ventriculus* sub jecore latitat, qui *æsofagus* adhæret cum aspera arteria ad pulmones usque descendente. *Splen* colo intestino annectitur. *Colon* flexuosum est, & in latere sinistro terminatur. *Rectum* autem intestinum à fundo ventriculi dimanare videtur.

Et tantum de viperæ anatomia Ambrosinus. *Severinus* in vipera à se secta sequentia observavit: Oblonga omnia *viscera*, item & ova. Primum exerto spolio ad cervicem,

Severinus
Zoo-
tom:
part. 4.
pag. 359.

vicem, aspera arteria per longum annexa pulmoni eodem ductu. *Cordis* substantia alba tota, nisi quantum auriculæ rubent, quarum sinistra amplior. Aqua in pericardio: Cor triangulare complanatum. *Fellis vesicula* non hepatis affixa, sed Ecphyssi. *Renes* oblongi duo ex multis quasi renibus conflati, inferiores hi visceribus omnibus, & prope anum. *Testes* oblongi, forma æmulantes Pineæ semen. Reperti in utero tres *catuli* viperini, qui à matre biduo jam mortua superstites inventi sunt, caudis micantes. Ad hæc *ova* multa ad vasa spermatica utrinque: hinc autem descendunt recte per medios renes. Intra caudam vesiculæ duæ plenæ viru illo. *Intestina* rubra, carnosa præsertim superne convoluta in quosdam veluti nodulus. In *ventriculo* & intestinis herbaceum alimentum. *Ventriculi* tunica interne rugosa, rugæ autem rectæ, quæ postea diducta utraque tunica facile explicantur. Differentia sexus in hoc genere: Mari cauda longior; fæminæ brevior & latior. Mari sub caudam vasa quædam oblonga, interne spinosa; genitalia non dubito. In multis inveniuntur regionibus, Italia, Hispania, India, Melita, Cypro, Chio, circa Amyclas, ubi insanabilis earum morsus, & alibi. Aristoteles tamen in Creta nasci negat. Cordus in Germania nunquam conspicatus est. In insula Syagro Arabiæ promontorio vicina, magnæ reperiuntur, Marfi populi qui impune veperas tractabant, alibi generari negavere. Delectantur imprimis locis montanis: ideo circa Haliacmon Macedoniæ fluvium, & in Euganeis Patavinis montibus inveniuntur: aquis, populeis arboribus, & locis, quarum carnes Galenus pro antidoto reprobatur, quod ægrotantibus sitim intolerabilem faciant. Hyeme latent, non tantum sub faxis, immotis fimo præsepibus, ut Aristoteles & Virgilius prodidere, sed etiam statu lapideis, & terris. Rustici sane Itali, dum lignibus profundiora terræ tentarent, simul glomeratas sæpissime invenere.

In montana Phænicæ parte herbis vesci, & quasdam radices vorare, Pausanias prodidit. Non tantum herbis, sed & erucis, buprestibus, Cantharidibus, phalangis, mure araneo, stellionibus, scarabeis, bufonibus, Galenus: scorpionibus Aristoteles: picæ pullis, Albertus, Circulatores furfuribus in pyxidibus & capsulis alunt. Venatores quidam decimo quinto quoque die potum cum herba quadam præbent. Vino delectari aliis visum: diu à potu abstineri, Bellonio. Frigidus videtur Aristoteles facere, quod hyeme latitent: calidas, Galenus, Dioscorides & alii. Hyeme minus tales esse, facile exinde colligas, quia non mordent: æstate, & præsertim sub ortum Caniculæ vehementer æstua-

re, quia fervorem quendam præseferunt. Ex capite Cerberi natus, antiquitas olim fabulata est. Ex cinere vel putri materia oriri posse vel exinde colligitur, quod Julio Obsequente prodente, bello civili inter Augustum & Antonium durante, Pado effuso, ingens viperarum copia proruperit. Ex congressu maris & fæminæ progni, tam certum, quam falsum, cum murena pisce congregi, vel maris caput à fæmina post congressum morsu avelli, quod apud Plinium legimus, cui Herodotus, Nicander, Plutarchus, Solinus, & alii ad stipulantur. *Ova* prius unius coloris & mollia, instar ovorum piscium concipiunt, & quidem superne versus præcordia: tempore parturitionis, catuli sine ullis membranis quandoque quod eas scindant, aliquando iisdem obvoluti, prodeunt. Vere postquam concepere, fætum ad mensem Augusti gestant. Viginti, una die, & quidem singulos parere, apud Aristotelem habemus. Tres supra viginti ab una in pyxide servata prodire, quarum quæ à matre separata erant, inertes reddebantur, Johannes de Saviis pharmacopæus auctor est.

Cum multis occultam inimicitiam exercet vipera. *Sputo humano*, si hoc in ipsius ventrem penetret, interficitur. *Mulieri gravidæ* si occurrat, abortum inferre creditur. Sola voce facit ut *mures* musculos suos alio deportent. Cum *osifraga*, & testudine dimicat, Illa sibi herba soncho simili providet: hæc origano vel ruta medetur. Cum *scorpione* congregi, & mutuo se conficere, Caspar Wolfius observavit. *Alii*, scordii, & alliarie odorem vitare, apud Theophrastum habetur. *Arum* radix manibus affricata morsus viperarum arcet, si Avicennæ credimus. *Sinapi* iisdem adversari, idem affirmat. Ramulo *fagi* leviter contactæ obstupefcunt, si Lacunæ fides est. Inter folia *fraxini* & prunas constitutæ, igni se potius credunt. *Solani* succo Galenus manus contra easdem madefaciebat. Rhases viperæ oculos *smaragdum* intuentes liquefieri, & mox à capite effluere, reliquit.

Ad *Naturam* spectat, quod vere & autumnino spoliū deponunt: tempore vernali oculos fæniculo affricant, ut visus in cavernis contractam hebetudinem tollant; & quod gravissimum odorem spirant. Fæminæ, quæ pinguior mare, acerbior morsus est.

Venenatum animal esse, superius diximus: signa varia occurrunt. Aulicus quidam apud Rhodiginum in colorem porraceum incidit. Purpurascens vel amethystinum aliquando contrahi apud Grevinum habemus. Excitatur aliquando singultus, quod ventriculus veneni acrimonia vellicetur. Semper fere

Ælian. H. A. l. 9. c. 96. Plin. H. N. l. 10. c. 62. Ælian. H. A. l. 1. c. 24. l. 15. 16. Arist. H. A. l. 5. c. ult.

Arist. H. A. l. 5. c. ult.

Antipathia. Ælian. H. A. l. 2. c. 24.

Natura. Arist. H. A. l. 8. c. 17.

Venenum.

Locus. Solin. in Polyhist. Arist. in Mirabil.

Martial. Epigr. l. 4. 59. Arist. H. A. l. 10. c. 62. Virgil. Georg. l. 3. Martial. l. 3. Epigr. 16.

Vitus. Pausan. in Bæot. Galen. in Theriaca ad Pisonem.

Temperamentum. Arist. Gener. animal. l. 1. c. 9. 10. Galen. de simplic. medic. facult. l. 1. c. 2. Generatio.

corpus intumescit, pustulæ ambustis similes erumpunt, sitis infestat, gingivæ cruore suffunduntur, jecur inflammatione vexatur, biliosi vomitus succedunt, vertigo, sopor, tremor, & urinæ difficultas, ut Dioscorides & Ægineta reliquit, oboriuntur. Ubi vero virus totum occupavit corpus, ungues ob caloris defectum livefcunt & corpus grandinem congelantem sentit. *Remedia* varia habentur. Amatus Lusitanus partem ictam scarificari jussit: emplastrum ex alliis cum theriaca eidem imposuit, & drachmas tres theriacæ in vino meraco propinavit. Ex animalibus laudantur Caro viperina quæ interaneis abjectis cocta, virus ad cutem pellit; cervi maris genitale, mustelæ venter salitus; cancri fluviatiles vel marini; sanguis fulicæ cum oleo potus; testudinis marinæ cum aceto; patientis urina hausta; sterus caprinum in aceto decoctum, vel in vino tritum, butyrum denique vetus. Inter *plantas* plurima quoque occurrunt. Anchusa manducata & in fauces projecta easdem perimit. Abensina radicem, folia, & corticem Aristolochiæ laudat; Crollius, aconitum cum vino tepido: Alii bistortam, quæ contortis suis radicibus, convoluti serpenti figuram repræsentat: Matthiolus Bryoniæ radicem, Citri semen & succum Rhamnis: Ferulam & juniperi baccas Dioscorides. Plinius Tragoriganum: Claudius Imperator, taxum arborem: semen viticis Ægineta: acetum calefactum & potum. Dorotheus Helius. Ex *Compositis* sunt plurima, inter quæ præcipua, Theriaca Andromachi, & Antiochi Philometoris; Antidotus Apollodori, rustici medici, Avicennæ & Galli, quam ex Arabia redux Cæfari obtulit. Pulvis viperinus quem nobis Medici describunt, plurimum quoque prodest. *Extra* applicantur, humani dentes in pulverem redacti: urina humana calida: Caput viperæ amputatum, & impositum: emplastrum ex ranis: fimus caprinus in aceto dissolutus, & pellis recens ab eadem detracta: herba de Corso nuper apud Hispanos inventa, quam Cantabricam quidam autumant: radix ebuli in vino elixata: fraxini cinis cum succo foliorum permixtus: furfures cum aceto & ruta decocti: lignum colubrinum in Malabar nascens. Ideo ab incolis per arva decurrentibus, circumfertur. Laudantur etiam, melissæ folia eorumque succus: origanum viride contusum, radix personatæ in vino elixata: pix liquida cum sale: decoctum pulegii: serpillum cum aceto, & cætera, quæ in Ambrosino vide. Pareus theriaca antiqua in aqua vitæ dissoluta, usus est. Sunt qui cantus tibicinum pro remedio ponunt. Amatus Lusitanus cujusdam fontis mentionem facit, in quo si ægri demergantur, eva-

dunt. Fallopius observavit, (*verba sunt Ambrosini*) dum ruri versaretur, filium agricolæ à vipera in pede demorsum. Unde pater senex ad clamorem filii accurrens, arcto vinculo pedis digitum vinxit: deinde digito scarificato cum non mediocri sanguinis effusione, jussit sibi locum ostendi, ubi à vipera filius percussus fuit: quo cognito, ut læsum pedem ibi natus figeret, imperavit; postea ducendo ferulam circa pedem, illius figuram obsignavit, & sumpto gladio, cretam intra vestigii lineam radens, in vino dissolutam, filio propinavit: quo præsidio juvenis, vomitione & alvi fluore correptus, tandem sanatus est. Virus quoque à vesiculis gingivarum exitum & fel ejusdem inficere, Gesnerus author est, qui puellam quandam, quæ carnem cui viperina permixta erat, gustaverat, in opistotonum & alia gravia symptomata incidisse scribit. Fel confestim animi deliquium generat. Semen citri saccharo conditum, scordium, cornu cervi, lapis bufonites, hyacinthus, sapphirus, smaragdus, inter præservativa recensentur. Et olim & nunc in mensis habuere locum. Ægyptii, Troglodytæ, & Arabes, passim eas conquirebant. Cirni Indi ultra flumen, & qui montem Athon incolunt, Æthiopes, Macrobiani, & Seres iisdem alebantur, ideo ad centum quinquaginta annos vitam proragabant. Athenæus ritu piscium conditas apponit. Nunc in Italia à mulieribus ob pulchritudinem expetuntur.

In Medicina multus earum usus, ex iisque pulveres, sales, olea, extracta, tincturæ, & vina, parantur. *Caput* collo appensum contra gutturis affectus, & anginas celebratur. *Cerebrum* in pellicula ligatum dentitionem promovet. *Jecur* coctum à venenato morfu præservat. *Ossa* in purpurea sindone ligata, & portata, epilepsiam & vertiginem amoluntur. *Spolium* medicamentis ophtalmicis miscetur: ex sententia Hippocratis, in delenda impetigine commendatur. *Pellis* ad facilitatem partus valet, si dextro parturientis femori alligetur. *Pinguedo*, si diligenter præparetur, ad oculorum suffusiones, ambusta, coercendum pilorum sub alis exortum, cutis eminentias, in paralyti, commendatur. *Carnes* quidam ad vitam prorogandam facere scribunt, quibus Renodæus refragatur. Alii cum fœniculo decoctæ juscule, visum imbecillum firmant. Ejusdem esu, servus Cratetis Medici, cui cara ab ossibus in morbo abscesserat, sanatus est, si Porphyrio fides. Plurimum siccare, & excrementa ad cutim detrudere, ideo elephantiacis, & aliis qui cutaneis morbis laborant, summe proficuum, apud plurimos Medicos invenies. Galenus aliquot exempla prodidit, qui cum vinum in quo

Fallop. 1.
de tumo-
ribus.

Ælian.
H.A. 1.4.
c. 7.

Usus in
Cibis.

Plin. H.
N. 1. 7.
c. 2.

Athen.
Dipnos.
l. 8.

Usus in
Medicina.
Galen. de
simpl.
fac. 1. 6.
Porta.
Phytogn.
l. 6. c. 11.
Plin. H.
N. 1. 29.
c. 4.

Galen. 1.
7. de
Comp.
Medic. f.
loca.

Porphyr.
περί ἀπο-
γῆς.
Oribas. 1.
3. de
morb. c.
62.
Galenus
Simplic.
Medicin.
l. 11. c. 1.

Remedia.
A.
matus
Lusit.
Curat.
Cent. 1.

Plin. H.
N. 1. 22.
c. 20. &
21.
Crollius
de signa-
turis.

Dioscor.
M. M. 1.
3. Plin.
H. N. 1.
20. cap.
17.

Galen. de
simpl.
medic. 1.
6. c. 10.

Pareus 1.
20. c. 16.

vipera extincta bibissent; liberati sunt. Cardanus eadem phthificos curavit. Fuere qui Gallinas nutriebant, donec deplumarentur, quas postea ægris exhibebant. Matthæum de Gradibus, & Gattinarium id fecisse proditum. Alii ex tali pastu ova propagandæ vitæ idonea, sibi pollicentur. Pulveres & alia quomodo darentur, vide apud Ambrosinum, qui ex authoribus colligit. Pulverem sitim excitare, ipsi experti sumus. Ad aquas hydro picorum exsicandas adhiberi, apud Petræum invenies. Cinis inter caustica à Fallopio censetur. Aquam Galleii pharmacopæi ibidem vide. Baldus Angelus in dolum vini injectas, corruptum pristino nitori restituere, idque in cella Cardinalis Ursini accidisse, scripsit. Ad theriacam singulari ratione præparantur. Primus Andromachus adhibuit, Antoninus Imperator revocavit. Galenus egregie descripsit. Consule si placet Ambrosinum, sed & nos ante non ita multos annos, in schediasmate ad Theriacam Andromachi exposuimus, cum ejus Lesnæ in Polonia dispensationi præessemus.

Viperarum differentias, *Color*, & *magnitudo* dabunt. Ratione *Coloris*, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, rubras, rufas, albas, & nigras observavit. Cardanus rubræ crassæ & brevis. *Milort* ab Italis dictæ meminit: sed Matthiolus, innocentissimum animal esse, domibusque familiare, addit. *Magnitudinis* respectu, in Hispania, nonnisi cubitales inveniuntur, si Amato Lusitano credimus. In regione Troglodytica, longitudinem decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiacarum pelles tomento replæte duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico unico in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in syn-cipite, capite latiore in compressiore esse, & à ceraistis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem illum, qui *Escurzo* Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipalmari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiantes, lingua nigra & mucronata, & tarde incedit, in viperarum censum referri non poterit. De *Viperis Chiappa* ita *Nierembergius*: Genus viperarum Chiappa nutrit magnum, simile putrido ligno, pestilentem spiritum quatuor narium fenestris fundens. Quædam morfu equum intra diem occidunt, fuso per omnes juncturas sanguine. Sunt aliæ variegatæ, aliæ nigrae & prolixæ. Quemcumque momorderint, perimunt: crescente luna mitescunt, decrecente irritantur. Aliæ sunt pallidæ,

nigris distinctæ lineis, interstinctæ maculis albis; morso ab iis decidit per frustra caro. Aliis tanta pestis superest, ut si fuste contingantur, subeat virus usque ad brachium. Aliæ hujus sunt conditionis, ut si mordeant mane, morsus evomens sanguinem pereat; sub vesperum, non sunt lethales. Visus ibi serpens, in cujus utero inventi triginta & unus fætus.

ARTICULUS II.

De *Ammodyte*.

Refertur hic tum ratione figuræ tum partus ad viperarum genera. Vocatur à Latinis *Ammodytes* vocabulo à Græcis desumpto, qui & ἀμμοδύτην, φαρμακιδύτην, ἀμμοδιότην, per ypsilon; & ἀμμοδίτην per jota appellant: ibi ἀπο τοῦ ἀμμοῦ & τοῦ δότιον quoniam arenam subeat: hic ab ἀμμος & δορύτλη perfodio. Aëtio est *Cenchrias* vel potius *Cerchnias* ab asperitate miliari, quod cauda ipsius instar granorum milii dura sit. An ἀμμοβάτης apud Lexicographos sit ab eo diversus; vel ἀμμοβάτης apud Suidam difficile est dicere. Nonnulli Ammoditem, Centriam, aut Centritem, ob duritiem caudæ dici debere innuunt. Cum κέντρα quædam lignorum & lapidum vitia dicantur ut apud Theophrastum videre est: & Plinius, in quibusdam arboribus veluti in marmore, centra quædam, id est, durities clavis similes, & feris inimicas esse asseveravit. Ut ut sit, *cornutum* vocavi, quod eminentiam quandam cornu æmulantem supra nasum gerat; & *viperam Cornutam Illyricam*. Quod in illa regione frequens sit, *monoceron* denique, propter callum qui summam oris partem exornat, certum est.

De ejus forma & Descriptione ita *Ambrosinus*. Olaus Magnus scriptis mandavit quosdam esse serpentes arenacei coloris, longitudine cubitali, maculis nigris distinctos habentes supra dorsum linearum vestigia: Deinde inter hæcce serpentium genera Ammoditem commemorat. Quamobrem Lucanus colorem arenaceum hujus serpentis contemplans canebat hunc in modum. Concolor exustis atque indiscretus arenis Ammodites. Est igitur fera hæc viperæ perquam similis, capite tamen ampliore, & maxillis latioribus, & in superiore parte rostri, eminentiam quandam acutæ verrucæ similem gerens. Propterea vulgares, non injuria, cornutum serpentem vel cornutam viperam nuncuparunt. Aëtius quoque Ammoditem cubitalis magnitudinis, & arenacei coloris esse statuit. Immo *pellem* maculis nigris præditam, & caudam præduram ei assignavit: Has autem condiciones lector in icone, quam exhibemus melius & commodius meditari poterit.

Nomen.
Ambros.
fin. l. 1.
c. 3.

Theoph.
H. P. l. 5.
c. 3.

Descrip-
tio.

Ambro-
sin. de
Serpentib.
p. 162.

Galen. de
Antid. l. 2.
de
Theriacâ
ad Piscic-
nem, &
alibi.

Differen-
tiæ.

Porta
Phytog. l. 4.
c. 28.

Amat.
Lusitan.
in Dioscorid.
Æl. l. 9.
c. 33.

Bell. ob-
serv. l. 2.
c. 30.
Alpin. de
Medicina
Ægypt. l. 4.
cap. 8.

Nierem.
H. Exot.
l. 12. c. 3.

Locus.

In Lybia teste Solino, in multis Italiæ & Illyriæ locis, comitatu imprimis Goritienfi stabulatur. Quadramius observavit in Circulatorum capsulis, catulos ritu viperarum eniti.

Venenum.

De *Veneri* signis & remediis, ita *idem Ambrosinus*. Olaus Magnus describens signa veneni hujus serpentis ea esse protulit, quando particula demorsa non solum ingenti dolore & tumore afficitur, verum etiam quando virus à vulnere effluit, & propterea si patiens tertia die non perit, quandoque ad septimam usque diem vitam protrahit. At Inter cæteros Authores, clariora hujus veneni signa assignat Matthiolus, dum percussos ab Ammodite, festina morte opprimi scribit, & à vulnere eorum, qui tam brevi tempore non obeunt, sanguinem primo dimanare, labiaque vulneris intumescere, deinde paulo post sanium effluere, capitisque gravitatem, & animi deliquitum generari. Imo addit homines etiam robustos ab hoc serpente ictos triduo interire, & celerius qui à fæmina sauciantur. Quamvis observaverit nonnullos ab hoc serpente percussos ad septimam usque diem vitam protraxisse.

Remedia.

Præsidia hoc venenum castigantia, imprimis communia laudat Abensina; deinde tanquam Alexipharmaca, castoreum, cinnamomum, & radicem centaureæ cum vino exhibet. Item radicem Aristolochiæ longæ, & Gentianæ probat, postmodum pro emplastris parandis, mel exsiccatum, & tritum, radices gracatorum, centaureæ, semen lini, harmel, lactucæ, & volubilis præscribit. Verum Matthiolus admonet primo appositis cucurbitulis ambitum vulneris scarificandum esse, injectis tamen vinculis arctissimis partibus superioribus. Deinde tanquam præsidium peculiare mentam ex aqua mulsa potam, castoreum, casiam, & succum artemisiæ, cum aqua commendat. Præterea theriacam in potu exhibet, eademque vulnus linit, & tandem emplastris atrahentibus utitur. Imo in hac affectione cataplamata nomis, & ulceribus serpentibus conferentia summopere celebrat.

ARTICULUS III.

De Ceraſte.

Ambros.
l. 1. c. 4.
Nomen.

EXcipit hic Ammodytem serpens, quod in locis etiam arenosis libenter stabuletur. Nomen à duabus eminentiis, ἀνδρὶ καὶ κέρατι, quæ in fronte cochlearum instar, sed solidiores habet, sortitus est. Aristoteli *Thebanum colubrum*, dici placitum est Bellonii. Olao est *Cristalis*, Alberto M. *Ceristalis*, *Sircalis* & *Triscalis*.

Bellon.
obf. l. 2.
c. 54.
Descriptio.Plin. H.
N. l. 8. c.
23.

In *Descriptione* veritatur. Plinius corpore Ceraſtis eminere cornicula sæpe quadri-

gemina scribit: quorum motu reliquo corpore oculato sollicitent ad se aves: Totidem & Solinus habet. Albertus octo. Bellonius duo instar granorum hordei supra oculos, gemina minuta cornua imitantia, ponit. Addit, *dentes* viperinis similes, *dorsum* lineis quibusdam puniceis variegatum habere. *Aëtus* cubitalis magnitudinis, longissimum, duorum cubitorum, corpore arenacei coloris, juxta caudam desquamato, partibus ventris per ordinem squamatis, reliquit.

Solin.
Polyhist.
c. 40.
Bellon.
Obf. 2.
c. 54.

Invenitur in Lybia, cujus medi terranea arida & fabulo referta sunt. Olim in Ægyptum migrasse, & magnam regionis partem inhabitabilem reddidisse, prodidere quidam, & ex his Lucanus. Bellonius dum Cairo in montem Sinai iter faceret, copiosos conspiciatus est. In viis per quæ plaustra aguntur, frequens stabulatur, obviosque aggreditur & perimit.

Locus.

Lucan.
Pharſal.
l. 9.
Bellon.
obf. l. 2.
c. 56.
Natura.

Duo ipsis congenita adscribit Bellonius, nempe, quod ritu viperarum foetus edant vivos, & quod inter omnia serpentum genera diutissime sitim tolerant. Gressu flexuoso volutari, quoniam breves & crassi sunt; mole corporea arenis obruta, exertis cornibus aviculas allicere, ut superius dixi: Pſyllos populos non attingere, adjici præteritis potest.

Ælia. H.
A. l. 16.
c. 28.

Demorsus à Ceraſte, parte affecta intumescit, & duritiem quandam instar capitis clavi cum pustulis experitur. Mox sanies modo nigricans, modo subpallida effluit: mens alienatur: visus hebescit, inguina & poplites dolent. Tensis genitalibus convulsus obit. Inter *remedia* ponit Dioscorides membri præcisionem. Ægineta & Aretæus scarificari & ferro ut inuratur jubent. Celsus rutam ex aceto coctam, & nepetam cum sale & melle permixtam laudat. Plinius pice cum polenta quandoque utitur, interdum Castoris testibus cum panace & rutam in vino. Quomodo id Pſylli frangant, apud Ælianum habemus. Cornu ad præsentiam viperæ, napelli, aut fellis Pardi exudare, Grevinus & Petrus de Abano affirmant.

Venenum.
Dioscor.
l. 6.Ælian.
H. A. l.
19. c. 21.

Datur apud Nicandrum genus Ceraſtæ *mutilum* vel quod cornibus careat; sed sic Ceraſtes appellari non posset: vel quod non tam patenti habeat: & quidem grandioribus quam alii maxillis instructum est, *Maxillare* vocatur. Forte illud quod superius ex Matthiolo in Illyrico inveniri diximus, Thair Ægyptiis dictum, & quod in theriaca, ut Prosper Alpinus scripsit, adhibent. Herodotus circa Thebas Ægyptias cornutorum serpentum, parvi corporis meminit, qui sacri dicuntur. Sed quia innoxii, ad Ceraſtas referri non possunt. Nos duas hic in Iconibus species exhibemus. Secunda ad

Differen-
tia.

Sere-

Serenissimo M. Hetruriæ Ducem ex Lybia allata est, una forte ex illis, de quibus *Falconerius Anglus ad Gesnerum* ita scribit: Allati fuerant ex Cairo tres serpentes ad nobilem quendam Venetum, qui diligentissime in vitro magno & arena prope focum servabantur. Tres numero erant, quorum unus ferme erat triplo reliquis major, isque *femina*, quæ tum forte quatuor, aut quinque ova in ipsa arena edidit magnitudinē fere ovi columbini; longitudo erat trium pedum, crassitudo ferē brachii: *caput* duos digitos latum, idque compressum. *Oculorum* pupilla nigra, reliqua parte albo quorum ciliis utrinque prominebant cornicula duo brevia non carnea ut in quibusdam aliis, sed vere cornea. *Collo* erat pro magnitudine corporis tenuissimo, & satis longo. Totus parte superiore testus erat *squamis* cinereis. Suprema squamarum parte nigricantibus, *cauda*, in extremo extenuata, & subfusca. Aliis duobus eadem erat forma, nisi quod cornua adhuc non extabant. Dixerunt esse filios illius majoris.

ARTICULUS IV.

De Hæmorrhoo.

HÆMORRHŌUS, Græcis & fæminine *ἡμorrhόη*, & masculine *ἡμorrhόη* ἀπὸ τοῦ ἡμᾶ, & ῥέω, quod ad ejus ictum sanguis ab omnibus corporis humani meatibus effluat. Isidoro est *Aspis hæmorrhōis*, Arnaldo *Afrodus*, Sylvatico *Asudus*, Avicennæ etiam *Sabris*, & *Alfordus*. Olaus tria differentia genera esse putavit. *Thonium* Nicandro dici, quod locis illis Ægypti, quibus Thonis imperavit, delectaretur, Rhodiginus author est.

Descriptionem hujus serpentis, apud Ælianum, Nicandrum, & Paræum habemus. *Corpore* est pusillo. *Oculis* igneo quodam fulgore ardentibus, *Cute* splendidissima, *dorso* multis albis & nigris notis maculato, *cervice* angusta, *Cauda* prætenui, cum corniculis supra oculos. Avicenna ei *dentes* æquales tradit. Nicander ita describit:

*Unum longa pedem, totoque gracillima tractu,
Ignea quandoque est, quandoque est candida forma,
Constrictumque satis collum, & tenuissima cauda.
Bina super gelidos oculos frons cornua profert,
Splendendum quedam radiorum albertia luce
Sylvestres ut apes, populatricesque locustæ.
Insuper horrible ac asprum caput horret, &
instar*

*Ipsius obliqua sua parvula terga Cerastræ
Claudicat, ex medio videas appellere dorso,
Parvum navigium terit imam lubrica terram.
Alvus & haud alio tacite trahit ilia motu
Ac per arundineum si transcat illa grabatum.*

Locus. In Ægypto & illis locis quibus Thonis

imperabat, vivere superius dictum. In India reperiri, ex Diodoro Siculo colligi potest. Is enim in eo tractu quo Alexander Porum persequabatur, inventos fuisse serpentes, parvos equidem, sed quorum alii æreis virgis specie erant simillimi, alii densam & hirsutam cristam arrigeabant, ad eorumque morsum toto corpore sanguineum sudorem dimanasse, scribit. Particularem locum si attendamus, saxorum cavernas incolere solent.

De *Natura* hoc occurrit, segnem admodum in incessu & pigrum esse: naturaliter, non aliter ac navis dum mare sulcat, incedere; more undæ, quæ assurgit & deprimatur: & fæminam à mari gressu ita distingui, quod hæc cum interne circa caudam firmet, cum mas ventri tantummodo innitatur, & collum serpendo extendat. Quæ de obliqui incessus causâ, & Canobo Menelai gubernatore veteres nugantur, apud Ælianum & Nicandrum vide. Nemo alias hujus fabulæ meminit.

In ejus morsu, (*verba sunt Mathioli*) color loci percussus sit cruentus, ex quo ab initio nihil præter aquosum quoddam, effluit: ventriculus dolore afficitur: deinde sanguis non solum ex foraminibus morsis, sed etiam ex naribus fluit: spirandi difficultas subsequitur, & si quæ in corpore obductæ fuerint cicatrices, recrudescunt. In *morsu fæminæ*, anguli oculorum & radices unguium sanguinem fundunt: immo sanguis ab omnibus corporis meatibus manat, & tandem dentes, putrefactis gingivis excidunt. Eadem Nicander, Galenus, Lucanus, & Ælianus prodidere. Immedicabiles quibusdam ejus morsus, alii partem scarificatam candenti ferro inurunt: quidam statim præcidunt; deinde cataplasmatibus valide attrahentibus utuntur. Dioscorides ad sistendum sanguinem emplastrum ex foliis vitium coctis & cum melle tritis primo imponit, post portulacam cum polenta antequam sanguinea urina prodire incipiat. Mathiolus allium & vinum dilutum, cum theriaca, exhibet: vulnus aqua frigida abluit, & demum, regionem vesicæ spongiis calidis fovet. Plinius, flores & mora rubi commendat.

Circa Differentias nihil fere occurrit præter ea quæ Nierembergii de *Indico hæmorrhoo*, & *Kokob* scribit, Piso & Marcgravius de *Cucuracu*, ille de *Ibiracao* habent. De *Hæmorrhoo* ita Nierembergii: Habet novus orbis suum hæmorrhoom, *Abucyati* dictum, similem teutla cotzuchqui, nisi quod sonalibus careat, majorem hæmorrhoo antiqui mundi, sed ejusdem veneni. Per omnes corporis meatus & cicatrices profundunt sanguinem morsu. Est alius qui etiam per juncturas prodige cruorem facit. De *Kokob* sic idem: Offenditur in agris Jucatanensi-

Ælian.
H. A. l.
9. c. 43.

Natura.

Ælian.
H. A. l.
15. c. 13.
Nicander
in Theriacis.
Venenum.
Mathiolus
ad Dioscor.
16. c. 50.

Galen. de
Theriaca
ad Pisonem.
Lucan.
Pharsal.
l. 9.
Ælian.
H. A. l.
9. c. 43.
Nicander
in Theriacis.

Differentiæ.

Nieremb.
H. E. l. 12.
cap. 2.

Nie-
remb. H.
E. l. 12.
cap. 49.

nenfibus, quidam serpens ad hemorrhoi-
nostratis pertinens genus, quatuor longus
dodrantes, fusco colore, sed cyaneis & ru-
bescentibus maculis consperso. Hujus
ictus adeo pestilens est, ut intra horæ unius
spatium cogat ictum hominem sanguinem
rejectare, & intra diem unum ex omni cor-
poris parte effundere, atque ita demum
mori. *Antidotum* esse inquit siliquastris
succum liquori tabaci permixtum, ex quo
alia contusa atque resoluta sunt, epotum-
que. Saxorum colit cavernas, & in his cu-
bilibus educat prolem. Egressus antrum,
cum strepitum audit, impetum facit in
obvios.

Marcgr.
H. B. l.
6. c. 14.

Cucurucu Marcgravius vocat, quem Piso
Cucurucu Brasilianis dici scripsit. Ille novem
pedes longum facit, squamis flavescenti-
bus, ac per dorsum maculis nigris grandibus
variegatum. Nimirum, in toto flavo
macula est grandis, in nigro duæ flavæ, in
quibusdam nigris etiam unice flavæ, & sic
continue. *Cl. Piso*, amicus & condiscipulus
noster, qui per aliquot annos illas oras lu-
stravit, ita describit: *Cucurucu* est anguis
crassus, cineritii coloris interius flavus,
externis maculis nigris distinctus, & iis-
dem ut *Cascavel* squamis vestitus, novem
& interdum duodecim pedes longus. Ma-
xime est venenatus, & plurimum metuen-
dus, licet caro ejus præparata à Barbaris
comedatur. Præcipuum illi venenum in ca-
pite, ideoque Brasiliani intercepto quan-
tocius caput amputant & cooperiunt hu-
mo: Ab illo ictus, corripitur vertigine,
tremoribus, torminibus, animi deliquiis,
febris ardentibus, quibus sudor frigidus
ac ipsa denique mors, intra diem natura-
lem, aliquando & celerius succedit. Præ-
ter enarratas qualitates, peculiare est huic
serpenti, quod morsu ejus virulento, venæ
erodi videantur, tantamque inflammatio-
nem & ardorem efficiat, ut sanguis bulliens
mox è naribus, auribusque, imo manuum
& pedem unguibus promaneat. Huic
malo si quæ Medicina detur, ipsius serpentis,
qui morsum intulit, caput emplastri
forma, vulnere applicatum: Tum & Folia
Tabaci recentia, leviter tantum ab ignis
flamma tacta, mirabiliter prosunt, caute-
rii loco. Idem præstat contra hujus, alio-
rumque Serpentium morsus radicis *Capia*
decoctum. Deinde succedunt sudorife-
ra, vel ipso statim initio convenienter ex-
hibita, ut sunt radices *Jusepebæ*, *Urueu*,
Malvisco, *Jaborandi*, &c.

Piso loco
citato p.
43.

De *Ibiracoa*, ita idem. *Ibiracoa* Brasilien-
sibus serpens est variegati coloris, albis, ni-
gris, rubrisque maculis insignis. Ejus mor-
sus est admodum venenosus, & pessima
symptomata infert, haud secus, quam *Cu-
curucu*, ut à Brasilienfibus accepi: quippe
sanguis quantocyus à morsu, ex auribus,

naribus & oculis profluit, & nisi statim sub-
ventum fuerit, moritur vulneratus. Si vi-
rus nondum ad cor abierit, carne ipsius
anguis cocta cum radice *Jusepeba*, *Jabo-
randi*, *Malva Isco*, *Caapeba*, *Capypuba*,
additis summitatibus *Nhambi*, ex vino
interne exhibitis vulnerati restituuntur.
Addatur externum remedium, ex capite
ipsius feræ contuso, & cum *Ærva de Co-
bre*, aliisque ejusmodi ante enarratis præ-
paratum.

ARTICULUS V.

De Sepe.

SEps, quibusdam, non male Sepes, Græ-
cis σήψ, & quidem fæminino genere
dicitur. Sine dubio *σέρπας τὸ σήπειν τὰς πληγὰς*,
quod vulneratorum ab hoc serpente ca-
ro, statim putredinem concipiat. Ideo
nonnulli ex Scaligero, non male *Putriam*
vocare. Dicitur & σήψας, quamvis Ni-
cander Sepis & Sepedonis diversis locis
meminerit. Nec vel iste diversas Sepis &
Sepedonis descriptiones habet; nec mor-
sus Sepis symptomata ab Aëtio recitata,
ab accidentibus Sepedonis ictus, quæ a-
pud Nicandrum leguntur, differunt. Ideo
Gesnerus, & Crevinus pro synonymis sum-
mere. Avicenna *Selsir* vocavit.

Ambr. de
serpent.
l. 1. c. 6.
Nomen.

In *Descriptione* variatur. *Abensina* cum
capite lato, collo parvo, cauda brevi, ven-
tre rotundo, tergo lineis diversi coloris
variegato facit: *Ætius* duorum cubitorum
longitudine, ore acuto, albis notis macu-
latum. *Ælianus* eidem quatuor dentes,
quos *Volaterranus*, recurvos facit, qui tu-
niculis quibusdam occultantur, adscribit,
Pausanias cinereum colorem, & macula-
rum ποικιλότητα, alvum majorem. *Nican-
der*, colorem hirsuti tapetis assignat, quem
Scholiastes varium, *Grevinus*, pallidum
interpretantur.

Descri-
ptio.

Ælian.
H. A. l.
16. c. 24.

Nicand.
in The-
riac. Gre-
vin. de
Venen. l.
1. c. 13.

Locus.
Pausan. in
Elien.

Ælian.
H. A. l.
16. c. 14.

Venenum.

Invenitur in regionibus Syriæ & Arca-
dia. Legimus namque apud *Pausaniam*,
Ægyptam *Elati* F. *Arcadiæ* Regem,
incautum ab eo interemptum fuisse. Dum
currit, brevior cauda videtur: quem ta-
men obliquo majorem tramite ducit. Co-
lorem in eorum quæ attigit similitudinem
mutat. Venenum, quod ad morsum illico
tabe destruit, ex dentibus ejaculatur. Ossa
cum corpore dissolvere, *Lucanus* scripsit.
Dicitur *Nicandro* σήψας, vel quod sit ξηρός, vel
quod faciat σήψαν τοῖς πληγόμενοις: vel ob siccita-
tem, vel quod percussis sitim adferat. De
signis veneni ita *Lucanus*:

Lucan.
Pharsal.
l. 9.

*Mors erat ante oculos, miserique in crure Sabelli
Seps stetit exiguus, quem flexo dente tenacem
Avulsitque manu piloque affixit arenis.
Parva modo serpens, sed qua nonnulla cruenta*

Tan-

Tantum mortis habet ; nam plagæ proxima circum

*Fugit rupta cutis pallentiaque ossa retexit :
Iamque sinu laxo nudum est sine corpore vulnus.
Membra natant sanie ; suræ fluxere , sine ullo
Tegmine poples erat , femorum quoque musculus
omnis*

*Liquitur & nigra distillant inquina tabe.
Disiluit stringens uterum membrana , fluuntque
Viscera , nec , quantum toto de corpore debet
Effluit in terras , sævem sed membra venenum
Decoquit ; in minimum mors contrahit omnia vi-
rus.*

*Vincula nervorum & laterum contexta , cavumq;
Pectus , & abstrusum fibris vitalibus omne
Quidquid homo est , aperit pestis. natura profana
Morte patet ; manant humeri , fortesque lacerti
Colla caputque fluunt ; calido non ocyus Austro
Nix resoluta cadit , nec solem cera sequetur ,
Parva loquor corpus sanie stillasse perustum ,
Huc & flamma potest , sed quis rogos abstulit ossa ?
Hæc quoque discedunt , putresq; secuta medullas ,
Nulla manere sinunt rapidi vestigia fati.
Cyniphias inter pestes tibi palma nocendi est :
Eripiunt omnes animant , tu sola cadaver.*

Diosco-
rid.
Plin. H.
N. l. 29.
c. 5. & 6.

Inter remedia , portulaca & acetum mul-
sum à Dioscoride ; à Plinio , cortex & bac-
cæ lauri , oxymel , piscium falsorum cibus ,
dummodo vesperi vomitu rejiciatur ; ab
Aëtio , spongia aceto calido imbuta , & mor-
fui applicata , laudantur.

Differen-
tia.

Inter Sepem & Sepedona , ut supra di-
ximus , vix aliquid est discriminis , etsi
Scholiastes Nicandri , Sepi colorem cocci-
neum , Sepedoni varium assignet. Videntur
tamen reperiri serpentes qui ad eundem
referri poterunt. Meminit Aristoteles cu-
jusdam pusilli , quem quidam *sacrum* vo-
cant , quem & reliqui serpentes , etiam ma-
gni vitant. Hujus morfu omnia putrescunt.
Legitur quoque apud Ælium , virum
quendam solo serpentis attactu periisse , &
vestem ægri paulo post putruisse. Huc &
Aguaſen pertinet , de quo ita *Nierember-
gius* : Subita pestis *Aguaſen* serpens duas
spithamas longus duntaxat , fusco colore ,
lato capite atque compresso : adeo vero le-
thali est ictu , ut intra dimidiæ horæ spa-
cium interimat , decidente carne vulnere
vicina , ac misere putrescente. Versatur
montosis locis , editis , atque arentibus.
Alexiterium ejus *Pangaguaſen* , Nascitur in
Philippicis.

ARTICULUS VI.

De Aspide.

Ambro-
fin. de
Serp. l.
1. c. 7.
Nomen.

Serpenti quem Aspidem vocamus no-
men , vel ab aspergendo , quod venena
morfu aspergat , ut Isidoro placet ; vel ab
asperitate cutis , ut Arnaldo ; vel ab aspi-
ciendo , quod acutum intueretur , nisi co-

rum oculi à quibusdam carunculis compri-
mentibus impedirentur , ut Abensinæ ; vel
à σπείζειν , quod est , more serpentis bestię
sibilare , & se gyrare , propter acutum nem-
pe sibilum , vel ejus corporis longitudi-
nem , ut aliis ; impositum est. Quidam Ser-
pentem Niliacam & Ægyptiam dixere ,
quod Ægypto sit peculiaris : Propertius
sacrum colubrum , quod in simulachris Isidis
adhiberetur , dixit , alii *Hypnalin* à somni
inductione. Quatramius Marassum voca-
vit , quod viperarum instar , vivos catulos
pariat.

Descriptionem apud Nicandrum habemus.

Descri-
ptio.
Nicand.
in The-
riacis.

*Tam procera , (inquit) extensa queunt quam
brachia duci*

*Tantaque crassities est , quantum missile telum ,
Quod faciens hastas docta faber expolit arte ;
Protrucium horrifona taurorum , & cade leonum.
Squalidus interdum color albet , sæpe virenti
Cum maculis sæpe est cineres emitante figura ;
Nonnunquam ardenti veluti succenditur igne
Idque nigra athiopum sub terra , quale refusus
Nilus sæpe lutum vicinum in Nerea volvit.
Præterea geminæ calli instar , fronte caruncle
Hærent sanguineis scintillant lumina flammis
Turgida squallet item cervix , grave sibilat ipsa
Bestia , dum certam vomit iracancita mortem
Quatuor hinc intra maxilla concava dentes
Radices fixere suas quas juncta quibusdam
Pelliculis tunica abducit , triste unde venenum
Effundit , si forte suo hæc approximet hosti.*

Belluacensis ei cæruleum colorem , den-
tes extra labia , ut in apro , exporrectos , ad-
scribit. Agricola longitudinem & crassi-
tudinem mediocris anguillæ , Wottonus
fenum pedum , assignant. Plinius , duos
dentes in supera parte dextera lævaque
longissimos , tenui fistula perforatos , ut
scorpionum aculei , venenum infundentes.
Ælianus tenuissimis quibusdam tunicis in-
dui scribit , quibus inversis venenum ef-
fundatur , effuso , illæ ad pristinum statum
redeant.

Plin. H.
N. l. 11.
c. 37.
Ælia. H.
A. l. 9.
c. 4.

In Gallia nullas divagari Bellonius au-
thor est : plurimas in Hispaniæ insulis Chri-
stophorus Andreas. Calidiore aëre gaude-
re certum , ideo Africam , & ripas Nili in-
primis incolunt. Olaus in septentrionali-
bus regionibus observavit , scabrosa cute ,
cinereo colore , oculis scintillantibus ,
longitudine trium vel quatuor cubito-
rum.

Locus.

Sympa-
thiæ &
Antipa-
thia.
Nicand.
in The-
riaca.

Umbrosis locis delectantur. Ideo Sene-
ca , ad umbram exfurgere dixit. Abhorrent
ab Ichneumone , Argolis anguibus , rana-
rum fatibus , cimicibus , aro , & halicaca-
bo. Ichneumon ova ejus conterit , & mor-
dente dente laceffit. Bellum , quod & a-
pud Ælium invenies , Lucanus ita egre-
gie descripsit :

Ælia. H.
A. l. 3. c.
22. & 6.
38. & 10.
47.
Lucanus
Pharsal.
l. 4.
Arist. H.
A. l. 9. c.
5.

C

Aspe-

*Aspides ut Pharias cauda solertior hostis
Ludit, & iratas incerta provocat umbra,
Obliquasque caput vanas serpentis in auras
Effuso tuto comprehendit guttura morsu,
Lethiferam citra saniem tunc irrita pestis
Exprimitur, faucesque fluunt pereunte veneno.*

Suidas.
Agricola
de anim.
subter.
Porta
Phytogn.
l. 7. c. 24.
Plin. H.
N. l. 21.
c. 31.
Athenæ.
H. A.
l. 4. c. 54.

Argoli serpentes aspides interimunt, ideo jussu Alexandri M. Alexandriam deportati fuere. Ranarum fætus cauda insignes persequuntur. Gallinæ ea die qua cimices comedere, ab iis non tanguntur. Fumo ari ita inebriantur, ut torpidæ evadant. De Halicacabo ita Plinius: Nec illud præteribo aspidum naturæ Halicacabum in tantum adversam, ut radice ejus propius admodum, soporetur illo sopore enecans vis earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur. De amore aspidis maris erga anserum custodem puerum, & fæminæ rivalitate commotæ erga eundem odio, vide Athenæum.

Natura.
Isidor.
Orig.
l. 12.

Ad *Naturam* pertinet, quod Isidorus scribit, ad incantatoris vocem alteram aurium premere alteram cauda obruere: nunquam marem nisi comite fæmina è spelunca egredi; alterutrum ab aliquo occisum, occisorem etiam in turba quærere, quo aliqui affirmant; visum imbecillum ob carunculam, de qua superius, seu tubercula fronti adhærentia habere; & levissimo strepitu audit, quasi ex somno excitatas sese erigere, quod apud Nicandrum legimus. In iracundia præcipitibus tumet collum. De *ovorum* natura prodit Bartholomæus Anglicus, parva, rotunda, livida, viscosa, fatida, summe venenosa, & filamentis quibusdam conglobata esse, quæ si à Rubeta vel alio venenoso animali foveatur, vermen procreari, qui visu & halitu more Basilisci, primo foven-tem, deinde alios etiam animantes perimat. Mansuefieri, apud Ælianum legimus. Cicurantur cibo; cum infantibus vivunt, & crepitu digitorum vocatæ ex cavis prodeunt. Mensam etiam, in qua temperatæ vino & melle farinæ ipsis apponuntur; circumstant, ac reliqua omni spira in terra relicta, caput allevantes circumlambunt, sensimque explentur. Egregie de illo *Plinius*: Unicus huic tam pestifero animali sensus vel potius affectus est. Conjugæ ferme vagantur: nec nisi cum compare vita est, itaque alterutra interemta, incredibilis alteri ultionis cura. Persequitur interfectorum, unumque eum in quantolibet agmine populi, notitia quadam infestat, perrumpit omnes difficultates, permeat spacia, nec nisi ab amnibus arcetur, aut præceleri fuga.

Venenum.
Nicand.
in Ther.

Ictus Aspidis tam subtilis est, ut visum effugiat: ideo mors Cleopatrarum difficilis erat cognitu. Tumor circa vulnus nullum; post ictum statim sopor insurgit, oculi ca-

ligine suffunduntur, facies pallet, frons refrigeratur; icti assiduo hiant, & tandem convelluntur. Actuarius ægri colorem in viridem & herbaceum permutari asserit. Inter remedia, Aristoteles & alii solam partis mutilationem ponunt. Visum haud paucis, si centaurium in vino tritum æger evomuerit, periturum certo; victurum, sin secus. Mercurialis plagæ exustionem suadet; Pareus, quod sanguinem in venis & arteriis congelari putet, tenuiorum partium, medicamenta, si pars nigricet amputandam censet. Tentari tamen remedia tam *simplicia* quam composita possunt. In *illis* sunt, origanum virens cum vino tritum; allia cum Zytho; aristolochia cum rosas; apium cum mero. De aceto ita *Plinius*: Nuper cum ab aspide calcata percussus, utrem aceti ferens deposuisset, sentiebat ictum alias illæso similis. Intellectum ibi remedium est, potuque succursum. De Citris videri Ælianus poterit. Objecti aspidibus rei, evasere quod id pomum comedissent. Huc urina impubium, quam Plinius laudat, fel mustelarum, stomachus ciconiæ, urina & sanguis testudinum, lapis Malacensis & histricis pertinent. Ex *Compositis* sunt, Theriaca magna Andromachi, Antidotus Antipatri, & alia. Quidam compositionem ex foliis tapfi barbati, caryophyllatæ, leucoii rubri, pari pondere sumptis, quæ in aceto acerrimo & urina hominis sani decocta, parti extra applicantur: Aëtius pro fomento aquam marinam adhibebat; quandoque post scarificatas cucurbitulas, centaurium cum myrrha & modico opio apponebat.

Marsis in *Cibis* inservire, capite abscisso, & cauda ad digitos quatuor, interaneisque exemptis, cute detracta, & corpore aqua abluto, Galenus prodidit. *Medicinam* si spectes, Plinius ad visum clarificandum ejus membranam cum adipe alterius animalis permiscet. Galenus emplastri Andromachi meminit, ad discutiendas strumas & podagras, quod ex aspidibus vocatur, quod cinerem ipsarum recipiat.

Differentiæ Aspidum apud authores sunt variæ. Apud Galenum est *χερσαία, terrestris*, quæ loca mediterranea incolit, *χευδαία, hirundinaria*, quæ hirundinem colore æmulatur, & circa Nili ripas excubat: *πνυαία, sputatrix*, quæ sputo animalia interficit. Prioris longitudinem quinque cubitorum æquant. Chelidoniæ colore albo & nigro refertæ sunt; Ptyades cinereo ad aureum inclinante asperguntur. Illæ quatuor horarum spacio in animalium perniciem operantur. Istæ, instinctu quodam naturali, cum flumen debet crescere per dies triginta alta petunt, & momento interimunt. Hæ cineræ & virides præter morsum salivam habent venenosam, & adeo tenuem, ut

Plinius
H. N.
l. 23. c. 1.

Ælian.
H. A.
l. 3. c. 5.

Plinius
H. N.
l. 28. c. 6.

Ufus.
Galenus
ad Glauc.
l. 2. c. 10.
Galenus
de Composit.
medic. f. g.
l. 6. c. 14.

Differentiæ.

Galenus
l. de Theriaca
ad Pisonem.

ut angustissimos etiam cutis poros penetrare possit. Galenus, exprorecta cervice, & certa intervalli longitudine venenum exspuere scripsit: quod & apud Porphyrium invenitur. Ab his admorfi, motu privantur post continuos saltus soporantur, & cum torsione colli, spasmo, pulsu inordinato, & absque dolore vita privantur. Bellonius in Italia apud Brutios serpentem callum in fronte tuberculi instar gestantem vidit, quem aspidem veterum esse putat. Dioscorides unam tantum aspidem describit. Strabo duas Ægyptiarum species facit, quarum una, spithamalis sit longitudinis, & οξύδαυλαρῖπα, chelidonia forte; altera, unius orgyæ, sub qua pyras & terrestres sine dubio continetur. Apud Ponzettum tres sunt, *Sicca* nempe, & longior quæ oculos carbonis instar micantes habet. *Caput elevans*, & constrictis dentibus sputum ejaculans: & *Hirundinaria* quarum icones exhibemus. His addere placuit, *parvam*, coloris ferruginei; & alteram colore subviridi maculoso insignita, quæ Italici *aspido tormento* quod morfu tormentum adferat. In America quoque inveniuntur, quæ caudæ aculeo feriunt. Prope Bononiam ejusque villam Malalbergo dictam, habentur varii coloris, quæ dentibus vulnerant, & oblongo caudæ aculeo ferire nituntur. Rustici faucii partem tumefactam ligant, & adhibitis præsiidiis tridui spacio liberantur.

ARTICULUS VII.

De Dipsade.

Aspidem sequitur *Dipsas*, quam Solinus inter species aspidum numeravit. Nomen à siti quam ictu suo infert promeruit. Unde Isidorus *Situlam* vocavit. Dicitur etiam *μεινδρα*, à nigra cauda; ἀμυβάρης, quod per arenam incedat; *πρωτήρ* quod ictus ejus veluti flamma adurat; *κίυσ*, ob eandem rationem. Videtur tamen inter *Presterem* & *Dipsadem* aliqua esse Differentia, ut Agricola prodidit. *Præster* percussus immobilem veluti quadam syderatione, menteque alienum reddit: mox pilis defluentibus, & urgente pruritu, alvi que fluxu, patientem absomit: quod de *Dipsade* scriptum non invenias. Dioscorides solam nominum causam differentiam ponere credit.

Isidorus tantæ exiguitatis esse credit, ut non videatur, dum calcatur. At Aëtius *longitudinem* cubitalem, quæ paulatim ex crassa in tenuem definit, *corpus* albicans, sed simul maculis rufescentibus partim nigris variegatum, ei assignat. Solstrates *caudam* duabus lineis nigricantibus insignitam: *Abensina collum* magnum, & *tergum* ad extremitatem nigricans, & *caudam* valde tenuem.

Nascuntur in Africa & Arabia, ut Ælianus prodidit: in Lybia & Syria vagari apud Lucianum & Abensinam legimus. Plerumque apud Garamantas Philiis finitimos inveniri, Galenus autor est.

De *Natura* hoc occurrit, inter ova *Struthionum* in arenis condita stabulari: sic *Garamantas*, qui illis fictilium & pileorum loco utuntur, adoriri. Acri quoque ardere siti & fere inextinguibili. Ideo os siccum habere fertur: & veneno suo totum in corpore humorem absumere. Aulus Tuscus Catonis miles nullo aquæ potu, nec etiam proprio sanguine satiari potuit.

De *Signis* veneni, nimia inprimis & inextinguibili siti non est quod multa dicamus, quia jam de ea egimus. Aqua nec per lotium, nec per sudorem exit, sed intus detenta, abdomen ita tumidum reddit, ut hydropem mentiatur. Reliqua symptomata cum iis quæ à morfu viperæ conveniunt. Lucanus eleganter de iis:

*Ecce subit facies letho diversa fluenti,
Nasidium Marsi cultorem torridus agri
Percussit Prester: illi rubor igneus ora
Succendit, tenditque cutem, pereunte figura;
Miscens cuncta tumor toto jam corpore major,
Humanumq; egressa modum super omnia membra,
Efflatur sanies late torrente veneno.
Ipse latet penitus congesto corpore morsus,
Nec lorica tenet distenti corporis auctum.
Spumeus accenso non sic exundat aheni
Undarum cumulus, nec tanto carbasa Coro
Curvavere sinus, tumidos jam non capit artus
Informis globus & confuso pondere truncus:
Intactum volucrum rostris, epulasque daturum
Haud impune feris non ausi tradere busto,
Nondum stante modo crescens fugere cadaver.*

Morsum immedicabilem esse, Dioscorides prodidit: posse tamen ad inustionem partis affectæ & scarificationem procedi. Galenus Theriacam Andromachi vehementer laudat. Abensina vomitum provocat, & diuretica commendat; exterius vero, emplastrum ex sale, calce, & oleo componit. Plinius decoctum ex foliis lauri laudat: nec non fassamentorum cibum mero subinde hausto, ita ut circa vesperam, vomitu subinde reddatur.

De *Differentiis* nihil fere occurrit. Solinus aspidis speciem esse putat, Dioscorides toto genere differre existimat. Aëtius ad illud viperarum genus reducit, quod in maritimis locis stabulatur. Grevinus à viperæ maculis parvis in cauda, & quod citius mortem inferat distinguit. At Marsi populi Aëtio accedunt, & degentes in solo uliginoso, viperas; in salso, *Dipsadas* nominant.

Locus.
Galenus
l. 11. de
simplic.
medicin.
facult.

Natura.

Lucanus
Pharf.
l. 9.

Venenum.
Diosco-
rid. l. 6.
c. 50.

Plin. H.
N. l. 23.
c. 8.

Differentia.
Grevin.
de venen.
cap. 14.

Galenus
l. 11. de
simplic.
medicam.

ARTICULUS VIII.

De Scytale.

Nomen.
Ambro-
fin. l. I.
c. 9.

Serpens Latinis Scytale dictus, Græcis quoque *σκυτάλη*, *σκυτάλις*, aut *τὸ σκυτάλιον* seu à forma *τῆς σκυτάλης*, quæ vox baculum significat, seu à longa & terete figura, quod *σκυτάλην* lorum coriaceum aut baculum æquet; dicitur. Quidam *Caciliam* vocant, quod incunte vere ex antro egressus, fœniculum fugiat, ne visum recuperet.

Descri-
ptio.

Forma est tereti & ita æquali, ut ubi caput vel cauda sit, discerni vix possit. Magnitudinem ligoni terrestri Nicander comparat, Quidam in tergo varia macularum *ποικιλότητι* distinguunt tradunt. Unde pictum serpentem Mantuanus vocavit. De ipsius & Amphibænæ discrimine ita Nicander:

Nicand.
in The-
riaca.

*Bifronti similem reperis scytalem Amphibænæ,
Pinguior est tamen, & cauda qua nulla fere exit,
Crassior, ut quantum solita est comprehendere
lignum, (nem,
Curva manus strictum, quoties tenet ipsa ligo-
Tam prolixa, vagans, pluvio quam reptile cælo,
Quod fecunda genus sua gignit viscera tellus.*

Natura.

In descriptione ejus errat Lucanus, & Solinus forte ex eo. De *Natura* hoc duntaxat habemus, tergo fulgere, forte, ut quia tarde progreditur, spectatores alliciat: primum nondum dissipato brumæ rigore egredi, & spoliū deponere: ne visum recipiat, à fœniculo abstinere: (Gillius tamen oppositum scribit) nec ictu mortem inferre. Inflammationem duntaxat infert, qualis ab apum & vesparum aculeis prodire solet.

De *Differentiis* nihil occurrit. Olaus M. cum Amphibænâ confundit.

ARTICULUS IX.

De Amphibænâ.

Nomen.
Ambro-
fin. l. I.
c. 10.

Amphibænæ nomen ab *ἀμφὶ* & *βαῖνω*, quod geminum ut caput ita incessum habeat, venit. Dicitur alias Amphicæphalos. Hesychio *ἀμφίκεφαλον* Ethymologo *ἀμφίκεφαλον*, Alberto *Amphifelene* & *Armene*, Latinis quibusdam Utrimque grada.

Descri-
ptio.

Descriptionem apud Nicandrum habemus.

*Post hanc exiguum tibi subdimus Amphibænâ
Duplice conspicuam (monstrum mirabile) vultu,
Cujus perpetua cæcum caligine lumen
Quod latas utrinque genas, porrectaque menta
Plus aliis alto serpentibus agere tendat;
Terreus est illi color, & densissima pellis,
Plurima quam varie distinctam signa figurant.*

Exiguam dicit, quia parvus & imbecillus serpens est. Hesychius cubitalem & decurtatam caudam habere scripsit. De duplici vultu ingens est controversia, Ælianus, Plinius, Lucanus & Mantuanus affirmant, Matthiolus negat, Hesychius dubitari ait. Daretamen bicipites serpentes in *Differentiis* dicemus. Color terreus illi est, quem Græci *φαιόν*, Latini pullum appellant. Cæcum addit, quia tam latas habet genas, ut oculos quodammodo premant. Notis in tergo pictam, nemo classicorum authorum dixit; & in Nicandri textu, pro *περιστῆς*, *περιστῆς* legendum est, quod idem est quod *περιστῆς*, Circulatis enim tractibus serpit.

Æl.H.A.
l. 9. c. 23.
Plin. H.
l. 8. c. 23.

Reperitur in Lemno, sed in Lybia maxime, si Luciano credimus. Germaniæ ignotam Agricola fecit.

Locus.

De *Natura* hoc occurrit, mulierem gravidam si Amphibænâ transierit abortire: & ante cuculi cantum egredi, & sibilo etiam interficere. Quidam ore eniti febulari sunt. Ælianus, caudæ loco alterum adhibere scripsit.

Natura.

Morsum ejus ea quæ è punctura apum proficiscuntur, insequi Aëtius; quæ à vipera ictu, Dioscorides prodidit. Id forte in principio fieri solet; hoc, temporis successu: Remedia ex capite de vipera peti possunt. A vite citissime interimi, apud Rhodiginum habemus. Alii semen papaveris & Castoreum laudant.

Venenum.

De Ufu egregie scripsit Nicander.

Rhodig.
Anti-
quat. l. 6.
l. 26. c. 33.
Ufus.

*Hæc ubi jam crevit cadentes ligna coloni
Sectam deglabrant oleastri ex arbore vingam
Quale pedum strictis præbenti pellibus anguis.
Insertam obvolvunt, quas certis deinde diebus
Exarere sinunt, cantantes ante cicadas
Utilis hic baculus frigentibus artubus esse
Fertur, ubi ex animis digitos torpedo fatigat.
Tunc quia constrictos & eorum vincula nervos
Calfacit immisso fovet, extenditque calore.*

Quod de nervis scribit, proditum est etiam Plinio. Ælianus vero habet, corium fugandis serpentibus & venenatis infervire. Dantur quædam in India Occidentali, quas incolæ *Maquizcoatl*, & *Tezaubcoatl* vocant, quasi angues abusus, quod raro conspiciantur, sesqui digitum longi, & minimi digiti crassitudinem æquantes. Coloris sunt argenti, nitidi, ac veluti translucidi. Gradiuntur in utramque partem. In Brasilia quoque est serpens *Ibyara* Brasiliensibus. *Bodty* Tapuyis, dictus. Vulgo fertur duo habere capita sed falso: inde autem error promanavit: quia tam caudâ quam ore ferit & inficit suo veneno: nec facile cauda à capite discerni potest, quia ejusdem sunt figuræ & magnitudinis: Minimi digiti crassitiem æquat, & longitudine unum pedem

Æl.H.A.
l. 8. c. 8.

Differen-
tiæ.

Nierem.
H. E. l.
12. c. 10.

Marcg.
Hist.
Braf. l. 6.
cap. 13.

dem & duos digitos circiter. *Color* est albus splendens instar vitri, & annulis & elegantibus lineis notatur, coloris brunni aut ærei. *Oculos* habet minimos & vix conspicuos, hærent in cute, instar punctuli acuti facti. Non procul ab extremitate *caudæ* anum habet, instar reliquorum serpentum. Contra venenum illius nullum dari remedium affirmant Lusitani. Sub terra vivit & illam fodiendo eruitur, victitat formicis.

Ambros.
lib. cit.

Huc spectant tria hæc quæ apponimus serpentum genera. *Primum* Brasilianum, quod biceps est, & cancri modo incedit. Alterum caput tam est amplum ut toti corpori adæquetur; alterum proportioni corporis respondet, ut Josephus Acoſta prodidit. *Alterum* Taprobanense apud Ramusium, quadrangulæ forma, s. quatuor capitibus instructum, ut unum orientem, alterum occidentem, tertium meridiem, quartum septentrionem spectet. Unicuique oculus inest, & quo se unum gradiendo convertit, eo & alia feruntur. Animal est multipedum, sanguis vulnera citissime consolidat, *Tertium* in Hungaria reperitur, breve, duorum palmorum longitudine, nulla cauda, & æquali per totum corpus crassitie, ut olim Vitus Hungarius Gesnero narravit. De *Amphisbena marina* in mari Anglico capta, refert idem, bina capita, geminis ornata oculis habuisse, quorum unum ab altero vix distinguere poterat. Quatuor, addit, lineæ coloris amethystini totum corpus exornabant: quæ quidem lineæ, undiquaque flosculis quibusdam erant decoratæ pulcherrimis, instar florum pseudosycomori.

ARTICULUS X.

De Cæcilia.

Nomen.
Ambros.
l. i. c. ii.

Nomen *Cæciliæ* à cæcitate inditum est. Albertus & Isidorus Cæculam vocant. Niphus Cæriallam. Græcis dicitur τυφλωφ & τυφλίνος, Hesychio καφίας, quasi surdaster, quod hebetis sit auditus. Nicander ἀπλήμαντον vocavit, quod nullam noxam inferat. Germanis est Blindtschleiche, modernis Græcis Tephloti, Tephleti, & Tephlini, prout annotavit Bellonius.

Descri-
ptio.

Fusci & obscure maculosi est coloris, cum subrufo exiguo vix notabili. Color hic ad latera magis varius est, cum nigricantibus maculis diluta purpura distinctis, tanquam in marmore porphyrite obscuriore. Totus *venter* atro colore saturo nigricat. Sub collo & parte proxima color est glaucus, maculis quibusdam nigris variegatus. *Dentes* minimi, asperi, & qui vix apparent, in inferiori mandibula plures & magis conspicui. *Lingua* bi-

Gesnerus
de Ser-
pentibus.

fida. *Oculos* an absolutos habeat, explorare in mortua non potuit Gesnerus; observavit tamen, totum oculum ab inferiore palpebra tegi, cujus foramen in comparatione ad reliquum corpus, erat perexiguum. *Ælianus* *Caput* murænæ simile habere scripsit. *Fœmina*, aliquando capta ex Gesneri descriptione, erat dodrantalis, crassitudine scytalis, cute admodum nitida. Meatus in medio ventris apparebat, quo compresso, ova velut immatura exhibant. Infra ad caudam meatus erat excrementi; Oculorum cavitates magis quam oculi conspiciebantur. Deinde squamæ mujusculæ magis caput quam reliquum corpus tegebant.

Tam velociter repit ac lacerta Chalcidica. Fætus vivos more viperarum enitur. Percussa una à Gesneri uxore, fætus vivi ejecti sunt. Præ multitudine fætuum, uterum ipsis aliquando dehiscere, Plinius & Aristoteles prodidere. Virus bubus esse lethale apud Columellam legimus, Remedio caro ciconiarum, quæ Cæciliæ vocant.

Natura.
Aristot.
H. A.
l. 6. c. 13.
Colum.
R. R.
l. 6. c. 17.

In Medicina adhibuit Osvaldus. Theriacam namque ex Cæciliis & aqua theriacali paratam, pro sudorifero in pestilentia exhibebat.

Ufus.
Gesnerus
in Epist.

Bellonius in *Terrestrem* & *Aquaticam*, sed nullo argumento nixus distinguit. Potest in *Vulgarum* & *Crassiorum* dividi, quarum icones damus. Lusitani *Cegæ* nomen, serpenti indiderunt, quem Brasilenses *Ibyara*, Tapuyæ Bodty vocant, Crassitiem minimi digiti æquat, longitudine unum pedem & duos digitos circiter. Color est albus splendens instar vitri, & annulis & elegantibus lineis notatur, coloris brunni aut ærei. *Oculos* habet minimos & vix conspicuos, hærent in cute, instar punctuli acuti facti. Non procul ab extremitate caudæ anum habet, instar reliquorum serpentum. Non facile cauda à capite discerni potest, quod ejusdem sint & figuræ & magnitudinis. Tam cauda quam ore ferit. Sub terra vivit, & eam fodiendo eruitur. Victitat formicis. Contra venenum illius nullum remedium dari, affirmant Lusitani. Videtur mihi inter Cæciliam & Amphisbænā ambigere.

Differen-
tiæ.

Marcgr.
H. B.
l. 6. c. 13.

ARTICULUS XI.

De Cenchro.

Cenchri nomen Latini à Græcis desumpsere. Dicitur enim his κερχίδης, ut apud Dioscoridem legitur, κερχίνος, & κερχίος, ut apud Nicandrum: κερχίνος apud Varium: κερχίος, & κερχίος, ut apud Lexicographos. Dicitur vero ita à milio, seu quod quibusdam notis milii instar exornetur:

Nomen.
Ambros.
de Serp.
l. i. c. 13.

ARTICULUS XII.

De Acontia seu Iaculo.

Serpens hic ^{ἀκοντίας} Græcis ^{ἀπὸ τοῦ ἀκοντα} Nomen. Ambrosio. fin. l. 1. c. 13.
 quod jaculi instar se vibret. Hefychio est ^{ἀκόντις}, Nicandro ^{ἀκοντίλη}, Varino ^{ἀκοντιζέας}. Latini *Iaculum* vocavere; Author libri de Natura, *serpentem volentem* ob celerem motum; Aëtius *Cenchritem*, *Cenchriam*, & *Aspidem acontiam*; quidam *Chersydrum*: Sylvaticus *Acoran*; Abensina *Cofezati* & *Altarrat*. Lemni incolæ *Sagittarium*.

Is quem Bellonius vidit, erat tres palmos longus, & digitum crassus. Colore cinereo, sub ventre albo, juxta dorsum squammatus, juxta ventrem laminis munitus. A cervice nigra duæ albæ lineæ per longitudinem dorsi ad caudam usque percurrebant: deinde, maculis nigris oculi figuram æmulantibus distinguebatur, ut bene lenticularis à quibusdam dictus sit. De eo cujus icon in Musæo Senatus Bononiensis habetur ita Ambrosinus: Est crassitudinis baculi, longitudinis trium circiter pedum. Caput habet magnum coloris cinerei, reliquo corpore fusco præter ventrem, qui ad colorem minus obscurum vergit.

Non inveniuntur in Germania, ut Agricola prodidit. In Ægypto & Lybia reperiri, Lucianus & Marcellinus prodidere. Visi & in Norvegia ab Olao Magno, à Bellonio in Lemno & Rhodo. An in Calabria & Sicilia occurrant, quod Mathiolo relatum, dubium. Qui inde à circulatoribus deferuntur, & Boæ ac Serperigenæ nominantur, pinnas longas & acutas à capite ad medium usque corpus gerunt, quibus sese in altum attollere possunt.

Morsum majora quam viperinum ictum symptomata insequuntur; putredo inprimis & carniū defluxus. Remedia ex capite de vipera peti possunt.

De *Natura* hoc duntaxat constat, tam in locis viarum publicarum abditis, quam in arboribus, capite intra frondes occultato, degere: jaculi modo serpendo ruere, & quidem tam valide, ut spacium viginti cubitorum transfiliat; & humi jacentem, antequam infiliat, primo sese contorquere.

Fel ejus habet in Medicina usum. Aëtius ex eo cum lapide scythico trito collyrium parat, contra diuturnas suffusiones.

Albertus duplicis generis esse scribit. Alios mortem sine sensu inferre. Alios diuturno dolore fatigare. Ut vero hoc incertum, nec cujusquam autoritate probatum; sic certum est, non unius generis esse. *Texmineni* enim, quem & *Micoatl* vocant, serpens est apud Quanahuacenses, prælongus & tenuis, cujusmodi etiam caput cernitur, ventre livido, dorso fusco.

Nicand.
in The-
riaca.

Descri-
ptio.

Lucanus
Pharsal.
l. 9.

Locus
Nicand.
in The-
riacis.

Venenum
& Reme-
dia.

Plin. H.
N. l. 20.
c. 22.

Natura.

seu quod tempore tantum milii appareat, ut Ethymologus reliquit: seu quod florente milio sit perniciosior, ut Aëtio placet: seu quod calorem milii plantæ referat, ut Avicennæ & Olao Magno placuit. Ideo ab aliquibus *Miliaris* appellatur. Nobis prima derivatio placet. Nicander eum ^{λέοντα} vocat, vel quod squammæ ejus instar Leonis Lybici sint variis notis distinctæ: vel quod cauda crecta, more leonino se ad pugnam paret: vel quod more leonis sanguinem humanum exsorbeat. Quidam *Jaculum* dixere, sed perperam, ut in sequentibus apparebit. Avicennæ est *Famusus*, *Aracis*, & *Aspis diversicolor*. Alberto, *Arachis*, *Centris*, *Miliaris*, & *Falivifus*, An *Serpa Serena* serpens Siculus, subalbidus, longitudine humanum corpus, brachium circa carpum crassitudine æquans, venenosus ut Massarias ad Gesnerum scripsit, referri ad eum possit, difficile est dictu, cum nullas notas apposuerit.

Longitudine est duorum cubitorum figura crassa in tenuem abeunte, & colore viridi, ad luteum tendente, qui maxime juxta alvum apparet. Lucanus marmor serpentinum Thebis advectum pluribus maculis æmulari scribit. Nicander quoad crassitiem & longitudinem nihil determinat, quod & grandior & minor reperitur: totum vero maculosum esse ait.

Inveniuntur in Lemno, & Samo, in qua mons Mosychlus. Hinc Nicander:

*Atqui cum rapidis fervescens Solibus æstus
 Ardet in horrida se sylvarum devia confert,
 Imbellesque rapax venatur prædæ bibentes:
 Percelsive Sai juga, frondosive Mosychli,
 Sub viridis quando frigentibus abietis umbris,
 Securi recubant, grege circum errante magistri.*

Morsum Cenchri symptomata quæ in morsu viperæ occurrunt, excipiunt: sed inprimis aquæ in ventre inferiore, qualis in hydrope generari solet collectio, ut Nicander notavit: ut Dioscorides & Ægineta, putridum primo ulcus, post partium tumor, tandem lethargus. Erasistratus jecur, intestinum colon, & jejunum ingenti putredine corripit credidit. Remedia ex illor. Censu sunt, quæ viperino morsui adversantur. Commendantur præterea, satureja sylvestris, radix menthæ saracenicæ, gentianæ, & aristolochiæ: maxime vero Ciconiæ caro, & reliqua membra.

Maximo æstu per montes vagatur: rubos & spinas fugiens per rectum tramitem incedit: & animalia cauda implicat, aperisque jugularibus venis sanguinem sorbet.

Descri-
ptio.
Bellon.
Obser-
vat. l. 2.
cap. 16.

Locus.
Lucan. in
Dialogo.
de Dipsa-
dibus.

Venenum.

Natura.
Ælia. H.
A. l. 8.
c. 13.

Usus.

Differen-
tiæ.

Nie-
remb. H.
E. l. 12.
c. 29.

fulco. Vibrat se ex arboribus in homines & hominum oculos. Virulentus est, nec ultra cænum assurgit. Recta incedit, corpus minime in spiras convolvens. Ille quoque qui in agro Tigurino rustici brachium ita læserat, ut carne nudaretur, baculi crassitudine, & trium vel quatuor pedum longitudine ex genere Jaculorum erat. Bononiensium etiam Acontias à jaculo Bellonii differt, Ambrosinus alterum vocat. In Hungaria quoque qui *Decurtati* vocantur, de quibus superius quædam, in homines eminus, jaculi modo insiliunt. Apud Indos in campis & locis subterraneis inveniuntur, qui velocissimis saltibus serpunt, & homines eo potissimum tempore, quo prolem educant, aggrediuntur. In Hispaniola habentur perexigui, coloris viridis, qui sola cauda arborum ramis hærent, reliquo corpore propendentes, prætereuntos lædunt. Apud Sabæos versantur coloris rubicundi, longitudine palmi, qui in homines insiliunt, nec tantum ictu, sed & tactu nocent. Scholiastes deniq; Nicandri sub nomine jaculorum non tantum hos de quibus egimus venire scribit: sed & illos, qui celerrimi & innoxii sunt. Huc pertinet serpens *Polpoch*, de quo ita *Nierembergius*: In agris provinciæ Jucatanensis offenditur monstrificum quoddam serpentium genus, tres dodrantes cum maxime longum, brachium crassum, aut fusco exsaturatoque tinctum colore, sed à capite ad quinque unciarum longitudinem nigro & candenti varium, lato & compresso capite, oculis magnis & splendentibus, & cauda quæ reliquo corpori crassitudine non cedit, non dissimilis scorpioni, nec unguium terrore ælurorum magnitudini cedit. Nec vero uno tantum modo maleficum est animal, sed cauda pungens, & ore mordens. Visuntur magna ex parte hi serpentes arbores amplexi: cum vero ictu virus jaculari volunt, si solo consistant, visum hominem è longinquo insectantur, cauda supra caput contorta atque convoluta se rotantes in eum, atque ita brevi saltibus attingentes; Cum vero arboribus inhærent, ita caudam capiti adjungunt, ut arcus representent figuram, & jaculi sagittæve more, sese non sine strepitu qui sentiri possit, jaculentur atque contorqueant. Ictus est exitialis intra tres dies ictæ partis carne decidua atque putrescente: ossibus vero nudatis, & in colorem fulvum vergentibus, & adeo fætido odore exhalante, ut omne rapacium avium genus invitetur ad carnificinam. Ajunt indigenæ ictu ejus non inferri vehementem dolorem, sed universi corporis sensum potius hebetari atque torpescere, atque ita ictum hominem velut temulentum mori. Sibila edit cothurnicum cantui haud dissimilia, quæ præterquam quod longius audiuntur, nomen serpentis, quod

polpoch esse diximus, exprimunt, non sine vehementi formidine atque fuga indigenarum.

ARTICULUS XIII.

De Dryino.

A Contiam excipit Dryinus, tum quod ejus icon cum jaculo Bellonii belle conveniat: tum quod Scaliger eundem à jaculo ob similitudinem non discreverit. Nomina plura obtinuit. A Scaligero & Greveno dicitur *Querculus*, aliis *Illicinus*. A Græcis, vocatur *δρυῖς*, & *δρυῖς* à *δρῦς*, seu quod in quercubus lateat: seu quod à crabronibus vexatus continuo in quercum confugiat: seu quod squamis cortices quercus æmulantibus tegatur: *χελυδρῖς*, quod aspera cute ad instar testudinis sit munitus, *αλιδρῖς*, *Alidrat* cuidam scriptori seu *Cherisdal* qui addit fumum à terra excitare, & nonnisi in interioribus Africæ reperiri, *Andrias* Olao: *Durissos* Abensinæ, *Glandosa* Alberto, *Dendrogali* modernis Græcis, ut Bellonius prodidit. Quidam & *Bryinum*, & *Hydrum* seu *Chersydrum* dictum esse volunt. *Bryinum*, quod relictis interdum muscosis locis (*βρυὸν* villosum) illud in arborum truncis dicitur) prata petat humida, ubi moluridas locustarum species, & partus ranarum imperfectos venatur. *Hydrum* quod per humecta convallium loca libenter divagetur.

In *Descriptione* in diversa abeunt auctores. Nicander *Caput* ei Natricis capiti æquale assignat, *tergus* album. Agricola longitudinem & crassitudinem mediocris anguillæ, *tergus* cinerei coloris, in capite convenit. Wottonus illi tribuit longitudinem duorum cubitorum, *Corpus* obesum, squamas asperas, in quibus parvæ muscæ nidulantur; colorem tergoris subatrum, *caput* hydro æquale sed latiusculum, nec ita acuminatum. In tantam aliquando molem crescere Bellonius scripsit, ut sacco impositum rusticus per duo milliaria, quin interdum quiesceret, ferre non potuerit. Idem spoliū fœno replevit, quod humani cruris crassitudinem adæquabat.

Veneri proprietatem accurate descripsit Nicander, his verbis:

*Quod si cui prehensum Dryinus talumve pedemve
Luserit, à toto se spargens corpore fertur
Tristis odor, surgunt quæ nigri, quæ plaga tumores,
Comprehensam morfi quadam calligine mentem
Mæstaque tristitia, & lacrymabilis opprimit angor
Et periens nimio flaccescit forma dolore:
Usque adeo pascens absomit membra venenum,
Quin etiam obfusca obducit lumina nubes
Et misere affectum perdit lethaliter agrum.
Sunt etiam ejusdem qui morfi dentibus anguis,
Instar balantum soleant clamare caprarum*

Nomen.
Ambros.
l. 1. c. 14.

Ælian.
H. A.
l. 9. c. 42.

Bellon.
Observ.
l. 3. c. 51.
Nicand.
in Thera

Agricola
de Anim.
subter.

Wotton.
lib. 6. de
Differ.
Anim.
cap. 20.

Bellon.
Observ.
l. 3. c. 51.

Sive.

Ælian.
lib. cap.

Nierem.
H. E. lib.
12. c. 48.

*Sive ovium, & gravibus torticruciatibus angi.
Pallidus urina liquor it, torpensque veteris
Ingruit, & crebris quasi singultibus egri (tum
Nunc similem felli vomitum, nunc sanguinolentum
Ejiciunt, ipsumque malum facit arida labra,
Postremoq; gravem fundit per membra tremorem.*

Ælia. H. Symptoma illud de balatu, ab Aëtio, A. l. 4. c. Ægineta, & aliis confirmatur. Ælianus omnes illos affectus Dryini morsui adscribit, qui in Chelydro occurrunt. Videntur ei quercuum radices resistere. Inflexæ enim hæ & circumvolutæ, à summo ad imum sensim deficientes, corpus gradientis Dryini imitantur, ejusque characterem ferunt. Dioscorides Aristolochiam cum vino laudat: Grevinus origanum contusum & morsui impositum, lixivium cum oleo, & theriacam probat.

ARTICULUS XIV.

De Elape seu Elaphe.

Ambrosin. H. S. l. 1. c. 15. Nomen. **E**Lops seu Elaps inter innocuos serpentes à Nicandro ponitur. Quidam *δία τὸ ἐλλείπειν τὸν ὄπα*, quod visu destituatur dictum opinantur: & fortasse cum Cæcilia confundunt. Alii ab *ἐλαφ* Cervo deducunt; seu quod more Cervorum sint meticulosi seu quod celeri cursu ferantur. Bellonius cujusdam serpentis in insula Lemni meminit, quam *Laphiati* vocant, eundemque cum eo qui veteribus Elaphis arbitratur. Facit & Fallopius cujusdam quem *Cervonis anguem* vocat mentionem; ut & *Cerveri anguis*: sed cum illum Caprimulgum, hunc Anzam, quo nomine apud Patavinos anguis Æsculapii venit, vocet, diversos ab isto concludendum est.

De Descriptione ita Ambrosinus: Monachi qui commentati sunt in Mesuem promulgarunt serpentes quosdam cervinos similes esse nigris illis, qui multis in regionibus, & potissimum in Apulia sunt notissimi, neque multum veneni participant: quapropter per hos forte Boas intelligere voluerunt. Nos in Musæo Illustrissimi Senatus Bononiensis, quod olim fuit doctissimi Ulyssis Aldrovandi, invenimus coloratam iconem serpentis, longitudinis trium pedum circiter, cujus venter lutei est coloris, & tergus coloris Leucophæi, cum tribus lineis nigris à capite ad caudam usque percurrentibus: sub icone hæc nomina extant scripta. Elope, vel Elape, forte Nicandri, Elaphis quorundam, Laphiati, incolis Lemni insulæ apud Bellonium. Elephantias, forte & Cervone. Quamobrem ut lectores hujus animalis figuram contemplari possint, illam hoc in loco exhibemus.

Plin. H. N. l. 32. c. 5. Morsum ejus volvulosa tormina sequuntur, si Aëtii Elaps, cum nostro idem

est. Contra cum, communia auxilia, illa in primis quæ urinam cient, profunt. Nec non falsamentorum cibis.

ARTICULUS XV.

De Angue Æsculapii.

Ambrosin. H. S. l. 1. c. 16. Nomen. Ælia. H. A. l. 8. c. 12. **A**Ngui Æsculapii nomen à tutelari Æsculapii nomine inditum est. Dicitur & *Anguis* simpliciter & quasi per excellentiam: quod forte solus inter serpentes beneficus & innocuus sit. Æliano est Pareas, Græci *παρεία* & *παρεία* scribunt, seu *παρὰ τὸ πεφουριμένως & μεγάλας παρείας ἔχειν*, quod maxias quodammodo turgidas habeat seu à *πάροςον* quæ vox aliquanto *πρᾶον* mitem & mansuetum significat. Lucanus Phariam vocat: nonnulli Pagerinam. Apud Hesychium & Varinum legitur *πυρίπας* à colore sic dictus, quem cum hoc eundem esse vehementer dubito.

Descriptionem si spectes, oblongus est sublutei aut potius porracei obscurioris coloris, sed magis circa tergus nigricantis, Pars inferior albescit paulo in se subviridis. In quibusdam nota quædam forma crucis ex squamarum ordine apparet, si aliquibus credimus. Ælianus lato ore esse dixit; Ovidius illum qui Romæ pestilentie tempore cristis insignitum, poetica forte licentia. Maxillæ dentibus utrinque multis valde acutis armantur. In cervice duæ parvæ eminentiæ conspiciuntur, inter quas locus vacuus. Sceleton hic exhibemus. In eo sequentia M. Aurelio Severino observata. *Larynx* nulla, sed *arteria aspera* caput teres, & tonsus, ut fistula, ubi linguæ radix inde inchoans, in confinio scilicet terminantis maxillæ inferioris. In tunica peritonæide, vesiculæ plurimæ oviculorum instar. *Hepar* multo superius ventriculo. Huic quidem finienti non illi adhæret *vesicula vellis* è vena cava descendens. Alterno latere splen pusillus, pisum referens, ruber. *Ventriculi* fundus corpus universum determinat ferre. *Renes* infimi utero proximi, his cava quinque binos insignes ramos mittit. *Intestinum* fere unum, quamvis Baldus Angelus Abbatius colon distinguit. *Uteri* cornu cavæ applicitum. *Glandula* oviformis supposita lien, fundo ventriculi adhærens; glandulæ autem cholidochus, perforans ipsam ad intestinum.

Invenitur plerisque in locis, Germaniæ, Italiæ, Hispaniæ, Poloniæ, &c. in Asia etiam Africa & America. In Italia tam familiariter cum hominibus vivunt, ut & in lectis inveniantur. Idem sæpe & in Lemno insula accidit, ut apud Leonem Allatium habetur.

De Natura dici potest, benignum quidem esse, & mitem, sed qui irritatus feriret. Plinius per mensem luna instigari scribit, Am-

Locus. Allat. ni l. de opinionib. Græcorum.

Natura. Plin. H. N. l. 29. c. 4.

Ambrosinus juvenis cujusdam exemplum adfert, qui cum eum complicare in nodum conaretur, ita admorsus est, ut copiosus sanguis proflueret. Excrementa ejus moschi odorem spirant: vix tamen omnium, aut omni tempore. Romæ in domibus olim pascebatur. *Nisi incendiis semina exurentur, non esset fecunditati eorum resistere inquit Plinius.*

Plin. l. c.

Usus.

Plin. l. c.

De Usu ita Plinius: Prodest virus comprehensus, & in aqua contusus, si forteatur ita morsus. Quin & inesse ei remedia multa creduntur, & ideo Esculapio dicatur. Democritus quidem ex his monstra quadam conficit, ut possint avium sermones intelligi.

Differen-
tiæ.

Duplicis sunt generis. Alii pallidiores: alii, nigredini perfusi quorum icones damus. Wottonus totidem Syriacorum facit. Alii æris referunt colorem: nigricant alii. Morsum tumor duntaxat & levis inflammatio excipit. In Africa, ejusque in Mauritania monte Ziz qui vagantur, prandii tempore micæ de mensis cadentes legunt. Tales & apud Pyrenæos Bigerones haberi, testatur Scaliger. In Norvegia vaccino aut ovino lacte aluntur, & plerumque in infantum cunis, fidi ipsorum custodes dormiunt: verum si quando incendio domus deleantur, aut pestilentia incolæ pereant, in antris conditi ita se propagant, ut incolis graves sint. Hujus generis ille fuit, quem Marsus quidam Venetiis circumferebat, à Gesnero descriptus. Capite erat eleganti & subflavo, corpore nigricante maculis purpureis distincto. In lateribus linea quædam secundum longitudinem conspicua erat, quæ paulo supra caudam terminabat, & infra caput, per spacium palmi incipiebat. Longus erat dodrantes quatuor cum dimidio, ex plaga orientali delatus. Venenatum non fuisse inde patet, quod circulator, caput ejus ori indere soleret. In Angue super omnes tenuissimo quem propter innocentiam Neapolitani dicunt *Angioleta*, Bononienses *Bisognola* sunt hæc singuluria. Cor cum cæco quodam angulo ad basin assurgens, qui cum toto corpore & alligato vase figuram refert calcei. Hepar bifidum, tum in longum, tum in latum. Uteri cornua sicut & in caprimulgo angue, talis etiam vulva & vesiculæ duæ spermaticæ hinc atque hinc ad eam formam.

Scaliger
in Exerc.Severin.
Zootom.
Demo-
crit. pag.
368.

ARTICULUS XVII.

De serpentibus terrestribus Exoticis, Indicis imprimis.

PUNCTUM I.

De Boicininga, seu Teutlacocauhqui.

EXotici serpentes varii sunt, quos hic sub sex punctis trademus. Sub primo

ponimus Boiciningam, quæ & Boicinininga & Boiquina Brasiliensibus, Ajug Tapuyis, Lusitanis *Cascavela*, & Tangedor, Belgis *Katcl-flange* / Mexicanis *Teutlacocauhqui* dicitur. Tres ipsius descriptiones dabo, quia Icones variant, *Marcgravii*, *Pisonis*, & *Nierembergii*. Marcgravio est serpens quatuor pedes & tres digitos longus, Corpore in medio crassiori, versus utramque extremitatem vero attenuato; in medio autem ubi crassissimus, brachium humanum prope cubitum crassitie æquat. Venter illius est planus: Caput compressum, sesquidigitum longum & latum. Oculi parvi: lingua teres & bifida. Inter ceteros dentes, quatuor habet reliquis longiores, falcatos; albos, acutos instar spinæ, quos retro condere & gingiva occultare potest. In pelle squamas habet, verum haud talis duritiei. Totum dorsum insignitur catena pallide flava; hamulis illius figura cubica constantibus, fimbriatis nigro: spatium autem intermedium inter quemlibet hamulum fuscescit. Lateralis corporis flavescentia cubis nigris ordine positae variegantur: nimirum duplex ordo cuborum nigrorum in quolibet latere, & cuilibet angulo hamuli catenæ dorsalis, respondet cubus unus lateralis unius seriei; alter alterius seriei respondet, interstitio duorum hamulorum catenæ dorsalis. Venter squamas habet grandiores reliquis, quasi parallelogrammas, pallide flavescentes. Cauda autem in extremitate adnatum est corpus parallelogrammum, paululum compressum; constans quasi hamulis catenariis singulari modo invicem aptatis, ut cymbali modo serpens sonum eo edat, & è longinquo audiri possit. Quot annorum serpens, tot partes habet crepitaculum hoc. Serpens decem annorum habet crepitaculum hoc longum duos digitos aut paulo plus, latum quoque plus quam semidigitum. Substantia constat lævi, glabra, pellucida, sicca, coloris ex albo & cinereo subfuscescentis. Serpens est apprime venenatus, nec Antidotum cognitum contra illud virus.

Marcg.
Hist. Bras.
Gl. l. 6. c.
14.

De eodem serpente ita Piso: Primo serpens ille Bocinininga, quem *Cascavel* & *Tangedor* Hispani nominant, propterea quod sonitum instar tintinnabuli cauda edat, in triviis juxta ac deviis locis cernitur, tamque celeriter proreptans, ut volare videatur. Huic tam pernicioso colubro, benigna natura, cautionis quasi gratia, nolam addidisse, ut illius sonitu, admonitus quilibet tempestive sive caveat à vicino hoste. Brachii est crassitie, longitudine interdum quinque pedum, lingua bisulca, dentibus longis & acutis, colore fusco, & ad flavum vergente. Quotannis articulus, quo infestare solet, in cauda crescit, cujus extremitate in anum hominis immissa, mortem infert

Piso de
Med.
Bras. l. 3.

fert confestim; venenum autem quod ore vel dentibus infert, multo lentius viam tollit. Ex vulnere mox sanies cruenta effluit, caro livet, ulcusque paulatim serpit. Ad remedia extrahentia, vulnus dilatantia, scarificationes, cucurbitulas, & si pars læsa intercipi possit, ad vincula festinandum, idque junco Jacape cui remedio maxime fidunt Brasiliani; sin minus, cauterio utendum est. Interim dum veneni qualitas ad cor penetrat, curandum ut interius præmuniatur Tipiocæ hauſtu, sudoresque evocantibus insistendum. Præsentissimum præ cæteris remedium, quod Barbaris, contra hujus aut qualiscunque serpentis morsus restat; est ipsius nocentis caput, quod contundunt, contusum emplastri forma vulnere calens applicant: cui remedio simul addunt, in omni fere morsu, salivam hominis jejuni, quæ perpetuo partem affectam demulcent. (Plinius l. 7. c. 2. Galen. l. 10. simplic. Scaliger in Histor. Animal. l. 11. c. 18. hanc salivæ vim quoque agnoscunt). Adeoque his duobus Antidotis nituntur, ut desperent, si in illis voti compotes non fiant. Ego hæc & similia remedia, quæ longa illis experientia dictavit, jubente necessitate, lubenter sumimitatus. Non intermittendo tamen ea quæ à veneranda antiquitate & authoribus nobis sunt relicta. Ne nimium temere hisce novitiis, aut pertinacius veteribus viderer adhærere.

Nierem.
Histor.
Exot.lib.
12. c. 1.

Nierembergii *Dominam Serpentum* vocat, & hæc de ea habet: Non sine naturæ usu reptilia sunt: nec minus majestatem creatoris humilitate sua exaggerant, non minus bonitatem peste sua. Scit pessimis Deus juvare, scit veneno mederi: liberalem medicina opem è noxiis istis usurpat. Exordium occupet atrox serpentum genus, *Teuthlacokauhqui*, seu *dominam serpentum* Barbari vocant, *viperam* Hispani, sive ob similitudinem capitis sive pestis. Anguis hic quaternos pedes aut amplius longus, & humanum, ubi mediocriter crassus est, latus: *dorso* eminenti, *viperino capite*, *ventre* ex albo palleſcente, *lateribus* opertis, candentibus *squamis*, fasciis tamen pullis per intervalla intermixtis, *dorsum* fuscum est, luteis tamen lineis sese in ipsa spina secantibus insigne. Multæ sunt ejus serpentis *differentiæ*, non plurimum inter se distantes, & ictu mortem inferentes, nisi celerissime præſidiis occurratur. In spiras, irritatus, aut contrectatus ac inæqualiter caput contorquet, sed ita sibi undique cavet, ut nulla non parte se vindicet ab injuria. Excogitatum est icta humare membra terraque obruere, & ita manere donec omnino cesset dolor, aut morbus sit curatus: prospero magna ex parte eventu. Per saxa fertur celeri cursu, at per terestria plana que (quod mirum videtur) non adeo:

Ob quod Mexicanorum quidam à *vento* nomen indidere, vocantes *Hoacoati*. Quot annos natus est, tot accedunt caudæ perſtreptia sonalia, posteriore in parte caudæ vertebrarum instar connexæ. *Oculi* sunt nigri, mediocris magnitudinis. *Dentes* habet superna maxilla caninos, quibus jaculatur venenum: utroque autem latere oris quinque parvi dentes supernæ maxillæ insunt, sed qui facile conspici à quolibet aperto ore queant. Et sinuose graditur, ictus, toto corpore hiantibus rimis fatiscit, & viginti quatuor horis transactis à morsu animam dicitur agere. Apprehensos cauda, Indi, qui eos venantur, tuto tenent appendentes: tamen torquentes collum, perſtreptes sonalibus, corpus illuc hucque jactantes, ac nihil non molientes, ut pænas de venatore sumant. Narrant multi, qui eum serpentem domi alere solent atque educare, annum integrum durare absque cibo ullo potuque, ab se ipsumque caput decem aut amplius dies ferunt apud Panucenses in femoris crassitudine, & longitudinem incredibiliter adoleſcere. Norunt cicurari posse permulti, qui eos domi alentes habent in deliciis. Venenum jaculatur caninorum tubulis; cavi enim sunt. Nec desunt, qui affirmant, vivum parere etsi falso, quemadmodum ex aliorum narratione constat. Cum læsus irascitur, sonalibus concussis vehementer perſtrepit, erigitque collum non sine adstantium timore, nec tamen mordet, nisi compressus aut incitatus. Caninis in usus medicos servatis, pungunt Mexicani Medici collum cervicemque, doloris capitis placandi gratia, pinguedineque animalis omnium fere nocentissimi, lumbos perungunt, sedando illorum dolori, aliasque corporis partes dolore infestatas, ac discutunt præter naturam tumores. *Edunt* Indi eorum carnes, ac verissimum esse statuunt; corticalium carnibus, esse præstantiores, ac gustu gratiores. Linteo convoluta quantum velis, tenui raroque, ita tepescit illa feritas, ut vel à puero quolibet circa formidinem, aut noxam ullam deferri possit. Ajunt *caput* hujus serpentis alligatum collo, instar viperini, gutturi morboſo ferre suppetias; Febrientibusque medentur puncturæ serpentium omnium, quibus natura appendet sonalia, humano stercore duarum unciarum pondere, ex qua congruenti propinato, aut commanso, *picietl*, & admoto vulnere, item corniculis ejusdem arboris vulgaris novi orbi tuis, atque applicatis. Est etiam huic malo convenientissima Chipato ac provenit in calidis locis Novæ Hispaniæ ubique fere. Est & alius serpens *teut lacoutrauhqui* quoque nuncupatus, quinque dodrantes interdum longitudine superans, & humerum crassitudine,

ne, nec dissimilis alteri ejusdem nominis tum forma, tum veneni atrocitate, præterea etiam & sonalibus, in quæ finitur cauda: sed hujus color pullus est, vergens in luteum, pallidis maculis (quod alteri quoque contigit) oblique sese interfecantibus. Ajunt eam esse veneni hujus vim, ut non ictu tantum, verum contactu quoque officiat: unde fortitum nomen.

PUNCTUM II.

De Ibiboboca & Boiguacu.

Marcgr.
Hist. Bra-
sil. 1. 6. c.
13. Pifo
Med.
Brasil. 1.
4.

I Bibobocam & Pifo & Marcgravius describunt. Ille ita de ea: *Ibiboboca* Brasiliensibus; anguis pulcher, Lusitanis *Cobre de Corais* appellatur, duos pedes longus, pollicem autem crassus, colore niveo, & nigris, rubrisque maculis variegatus. Morsus illius venenatissimus, non extemplo vitam depascitur, sed tarde se promoyet. Sanatur emplastro è capite serpentis concinnato, & efficaciter appposito. Pulvis plantæ Nhambi, tum & succus foliorum Caapeba, & Cajatia, vulneri instillatus, extrahit virus.

Exactius paulo Marcgravius suum depinxit. Ita enim de eo: *Ibiboboca* Brasiliensibus; *Cobra de Coral* Lusitanis: serpens duos pedes longus & pollicem humanum fere crassus, ubi crassissimus; nam versus posteriorem partem teres est, & acutus, instar subulæ. Totus venter est albus & splendens: dorsum & latera tincta. Caput habet squamulas albas cubicas, ad oras nigras, hinc cinnabria sequitur macula, cujus squamæ per oras nigræ, & ita semper rubra macula est, hinc sequitur nigra, hinc alba, iterum nigra hinc rubra & sic deinceps. Rubra macula plus uno digito est longa, duæ albæ & tres nigræ simul sumptæ sesquidigitum longæ, æquales inter se: nigræ autem maculæ totaliter sunt nigræ, albarum autem oræ nigræ, venenatus est serpens.

Marcgr.
Hist. Bra-
sil. 1. 6. c.
13.

Boiguacu aliquot species habet Marcgravius, quas ejusdem verbis exhibemus. *Boiguacu* Brasiliensis *Cobra de Veado* Lusitanis. Erat pellis septem, & semis pedes Rhynlandicos longa, in medio corpore undecim digitos lata, sensim versus caput & caudam in angustiore latitudinem vergens, ita ut eo loco quo caput abscissum, tantum circiter quatuor digitorum latitudinem haberet, & in caudæ extremitate paulo minorem. Tota autem pellis squamis erat tecta certa serie dispositis in ventre majoribus in dorso minoribus, ut in omnibus serpentibus: Elegantissime autem erat variegata; nempe per medium dorsum secundum longitudinem maculis nigris, quam catenæ cujusdam majoribus partibus constantis figuram quasi referebant, ad latera autem utrimque palmum inter se distantes maculæ nigræ rotundæ fere, in qua-

rum centro albo macula itidem rotunda, magnitudinem autem hæ maculæ habebant majorem imperiali: inter hæc, attamen extra illarum ordinem, versus ventrem iterum utrinque duæ series minorum macularum nigrarum discurrebant. Ejusdem coloris & similibus maculis accipiebam Septimo Augusti 1638. Sed majorem priori, crassities enim corporis medii erat tredecim digitorum, longitudo autem octo pedum & supra. Ejusdem speciei unum accepi vivum tertio Augusti 1638. similibus maculis; longum quinque pedes & quatuor digitos; crassum vero, ubi crassissimus, semipedem. Carnem habebat albam anguillæ similem. Cor exemptum è corpore per quadrantem horæ subsiliebat. In postica parte corporis, septem digitorum intervallo ab extremitate caudæ duos breves unguis habebat quasi avium, circa anum nimirum. Duplicem ordinem dentium acutissimorum, in utraque maxilla. Caput latum & supra oculos in duo tubera elatum.

Ejusdem speciei ingentem accepi sexto Octobris 1638. inquit Marcgravius, cujus longitudo erat octo pedum & semis; crassities ubi maxima, quindecim digitorum: eratque valde nigro & albo variegatus. Carnem habebat albissimam & pinguem. Carnem sepelivi, & ossa post quadrimestre spatium exemi pro sceletto. Pellem tomento replevi. Spina autem dorsu ossibus constat, & costæ dura spina. Duplicem ordinem habebat dentium in utraque maxilla, quæ itidem duplex erat. Dentes sunt acutissimi, paulum incurvi, acus pectinum referentes, splendide albi coloris, instar matris perlarum politæ. serpens hic vocatur à Brasiliensibus Boaguacu, id est magnus; nam vidi qui integram capream deglutiverat. Non sunt venenati & caro illorum comeditur.

Alterius speciei mihi allatus decimo quinto Novembris 1639. cujus longitudo erat quatuor pedum & unius digiti crassities, ubi maxima, quinque digitorum. Squamis in ventre argentei coloris splendidissimi, reliquo corpore, nigro & albo variegati. Cauda quasi è sex annulis composita erat argenteis. Sex acutos dentes habebat in utraque maxilla.

Habui etiam ferrei plane coloris & in ventre albi, longitudine trium pedum aut circiter, crassities ubi maxima, duorum digitorum. Habitant in ædibus & ova gallinarum exsorbent. Sæpius inveni in ædibus & extra plane virides, duos aut tres pedes longos, crassities digiti articularis. Amplum his os & nigra lingua: suntque admodum venenosi, vocantur à Brasiliensibus Bor obi.

Pifo eundem serpentem paucis nobis ita exhibet: *Boiguacu* sive *Iboya*. serpen-

Pifo
Med.
Brasil. 1.
3.

pentium omnium facile maximus, pectus fere ut hominis crassus, Lusitanis *Cobre de Veado* dictus, quod Dorcades integras devoret, idque sugendo potius, quam masti- cando. Ex horum genere quidam octode- cim vel quatuor & viginti pedes reperiun- tur longi: Cineritio, spadiceo variegato sunt colore. Non æque veneno, ut multi alii turgent. Carne eorum non solum Indi- genæ & Nigritæ, sed & nostrates vescun- tur. Famelicus hic anguis vel ex dumetis profilit, caudæque suæ nitens, horrende se erigit & strenue cum feris & hominibus lu- ctatur, & sibilat irritatus, vel ex arbore in- fidiose in viatorem desilit, eumque validis- simis cingit amplexibus, ita ut vel sola com- plexione interimat: nec minus validi at- que feroces existunt duo ingentes illi *Arabo* & *Cucuraciu*, hominibus æque ac capreis in- fidiuntur. Quippe omnes hujus generis so- lidis vertebis & costis præditos ex Anato- me animadverti. Ictus eorum vix censetur venenatus, & per se aliquando, etiamsi nullo vel leviori saltem adhibito remedio, curatur. Ita ut hi inter non venenatos ser- pentes, de quibus passim auctores multa testantur, debeant numerari: quibus Ca- ninana, Macina, & Vocia annumerare li- cet, quod nihil vel parum saltem homini- bus noceant.

Nierem.
H. E. l.
12. c. 43.

His similes sunt serpentes in Regno Se- negæ, si Aloysio Cadamusto credendum est. Duorum enim pedum mensuram exce- dunt: alas, nec pedes habent ut serpentes, alioquin immensi, & tantæ quidem va- stitatis, ut integras capras hauriant, nec lancinent, solide devorent. Ferunt inco- læ, serpentes hujusmodi congregari sta- tis anni diebus, & migrare in loca quædam, ubi formicarum est vis magna, quibus & color albicans quæ suapte natura humiles quasdam casas instar specus serpentibus extruunt.

Nam ore terram portant, & ferruminant absque calce. Diceret clibanos aliquos vel rusculâ in ordine disposita. nam ex hu- jusmodi casis videbis centum & quinquaginta continenter subordinatas, ut alte- ram sequatur altera, miro naturæ ordine. Sed & contumax viribus serpens quidam est Thema, *cuilcabuilia* enim idem est, at- que cum quinque pugnans; in obvios e- nim impetum facit, eaque vi oprimit, ut si collo semet se advolverit, strangulet in- terimatque, aut salvo homine ipse colu- ber disrumpatur suo obnixu. Qui hujus na- turam novere, eum deludunt, opponen- tes arborem aut aliud cujus nexu disrum- patur, putans comprimere hominem, ut ita tandem convulsus intereat.

Nierem.
H. E. l.
12. c. 41.

PUNCTUM III.

De Boitiapo, & Iraraca.

Boitiapo Brasiliensibus; Lusitanis *Cobra* *decipo* serpens septem aut octo pedes longus, brachium humanum crassus: Te- res ac in postica parte instar subulæ acumi- natus; coloris olivacei, in ventre flavescens. Vestitur *squamulis* elegantibus quasi trian- gularis. Victitat ranis; Est venenatus. *Ira- raca* brevis est hic serpens raroque semicubi- ti longitudinem excedit, venis quibusdam in capite prominentibus instar viperarum, & haud aliter quam ille stridens: rubris & nigris maculis insignis, cæterum terreo co- lore: Ejus morsus venenatus non minora adfert symptomata, quam vel reliquorum serpentum, exceptis iis qui lente & clam vitam depascuntur. Ipsa fera postquam vul- nus inflixit, à cute, cauda, capite & intraneis repurgata, & in aqua radice Jurepeba, cum sale, oleo, porro, anetho & similibus cocta, à vulneratis comeditur, magnoque illis solet esse præsidio. Convenit denique præ cæteris, *Caatia*, quæ merito *Herva de Cobras* dicitur, quod foris & intus exhibita, hujus aliorumque serpentum morsus facile restituat. Idem feliciter præstant acini arboris Suibira, contusi & moribus appli- cati.

Marcg.
H. Bras.
l. 6. c. 14.

PUNCTUM IV.

De Caninana, Serpente mansuefacto, *A- pochtycoatl*, & *Alatis*.

Caninana Serpens, ventre est flavo, *Piso.* *dorso* autem viridi, octo circiter pal- *Med. Bras.* *l. 3.* mos longus, inter minus venenatos habe- tur: ovis victitat & volucribus: Capite & cauda resectis, ab Afris & Americanis come- ditur. De peculiari illius Antidoto, nihil ad- huc certi affirmare possum. Vulgaribus a- lexipharmacis sive Europæis, sive indigenis supra enarratis, malum siquod infert facile expugnatur. Familiare autem illud deco- ctum antidotale, ex radice Jurepeba, cum pauxillo salis huic aliisque moribus vel puncturis venenatis sæpe applicandum est, nec non fructus Ananas viridis, isque in cataplasmatibus modum contusus. Denique si necessitas ulterius urgeat, pars læsa scarifi- cetur, moxque vivus gallinaceus pullus imponatur.

Alii vidimus ab Indis, ait Franciscus Hernandus deliciarum gratia, *colubros* *Nierem.* *H. E. l.* *12. c. 40.* quosdam *virides*; qui allati ab agris, polli- cari tantum magnitudine, in femoris crassi- tudinem amplicentur & adolescent. Ubi pro antro est illis dolium stramento indul- gentiæ gratia emollitum, ubi magna ex par- te quiescunt, vivuntque, nisi cum edendi est

est tempus. Tunc enim egressi cubile, aut humeros heri amice conscendunt, benevole terrifici animalis amplexus tolerantis, aut è pistillis, in medio contracti in spiras, rotamque magnam æquantes, innocentissimi vescuntur oblatis, atque quiescunt.

Nierem. H. E. l. 12. c. 45. Serpens quidam est apud Pamerenses quinos prolixus cubitos, & quatuor digitos latus, Squamius nitidis, albo nigroque variantibus colore: *Apachycoatl* vocatur, & morfu minime exitiali.

Nierem. H. E. l. 12. c. 36. *Alati* serpentes in Florida reperti alis eatenus instructi, ut posse tolli è terra & volare demisse viderentur. Americus Vesputius quoque invenit Indos piscatores, qui serpentum alatum craticulæ lignæ impositum assabant. In tuguriis complures ejusmodi serpentes vivos habebant, quorum pedes vinculis alligati, faucesque funibus constrictæ erant, ne quid hominibus noxæ inferrent.

PUNCTUM V.

De Bojobi, Tetrauchcoatl, Tleoa seu igneo, sanguineis & Trinhutili.

Piso. Med. Bra. l. 3. **B**ojobi Brasiliensibus, Lusitanis *Cobre Verde*, ulnæ est longitudine & pollicis crassitie, coloris porraci & pulchre micantis. Aedificiis gaudet, neque ulli nocet nisi irritanti: morsus tamen illius venenatus, remedio quamvis eximio vix cedit. Radix autem illa nodosa herbæ Caapia contusa & ex aqua pota, summopere prodest, cæterisque herbis Antidotalibus, facile palmam in hoc casu præripit. Miles quidam gregarius anguem hunc inter arbuſta latitantem, dum pede forte conterit, ab eo in femore demorsus, paucis post diebus, toto corpore tumefacto & livescente, deficiente radice Caapia, cæterisque remediis frustra adhibitis, præsentibus commilitonibus, quam miserrime expiravit. Idem videtur cum illis de quibus supra ex Hernando.

Nierem. H. E. l. 12. c. 35. *Tetrauchcoatl* serpens est tres dodrantes longus, ac digitum crassus, cujus ictus pestilens est, *dorsum* nigrum, *venter* candescens ex pallido, & rubescens inferna cauda, venter autem & cauda punctis nigris conspersa, *caput* nigrum, ac torque circumcinctum luteo. Remedium morsus est, ictum locum fugere, sed commanso prius picietl, ne venenum noceat præsidium adferentibus, quod etiam velut egregium antidotum admoveere expedit vulneri: nec solum adversans illatæ noxæ, sed ipsis quoque serpentibus insensum & inimicum.

Tleoa seu *igneus coluber* anguis est sesquidodrantem longus, ac digitum crassus *squamis* albis, nigris, fulvis, fuscisque distinctus. *Caput* est viperæ nostratis capiti simi-

le, caudaque juxta finem subito attenuata, intervalloque binum tantum digitorum, quæ desinit in sonalia. Lethalem infert morsum, urentemque unde evenit ei nomen. Cum incedit, in latera utrimque se convolvit, ac lento procedit gressu. Contra ejus morsum ajunt conferre tusam radicem herbæ, quam vocant ancota. Idem auctor scribit de thecoatl, seu ignito serpente: Coluber est sex dodrantum mensuram adolescens, triumque digitorum crassitudinem. Vivit montanis locis, & lethalem infert morsum: color est fulvus, sed dilutior circa ventrem, ac vergens in cinereum sinuose incedit, in utraque sese latera contorquens, vivit in montibus Teportlanicis.

Sunt tamen *alii serpentes*, qui aspectu referant ignem, octo pedibus longi, colore sanguinei, qui noctu inflammati apparent, ut ignis aliquis videatur, quemadmodum Antonius Herrera prodidit. Scribit quoque Franciscus Hernandus vocari *cumcoatl* colubrum, qui nocturnis tenebris splendeat, qui & letifer morfu, quatuor longus cubitos, & brachium crassus.

Serpens est Panucinus, longus ac latus, albis & nigris distinctus maculis, trinhutili vocatus, quod cauda, quæ præacuta est, lethaliter pungat.

PUNCTUM VI.

De quibusdam Veterum serpentibus.

Pærer hæc quæ jam enumeravimus serpentum genera, sunt & alia apud veteres obvia, quæ difficulter ad jam explicata referri possunt. Facit Ælianus cujusdam *Hyenæ* dicti mentionem, quem utriusque sexus participem esse narrat. Altero anno marem, altero foeminam observari. Ad stipulatur eidem Orus. Nicander quasdam Libyas angues inter innoxios recensuit. Suidas scribit de *Argolis* serpentibus, quos Alexander Argo Pelasgico Alexandriam deferri, & in flumen proextinguendis Aspidibus conjici curavit. Gesnerus *Mergolos* etiam nominat, ex Africa delatos, sed qui & quales sint, non addit. A Hesychio & Varino *ἡλιόφιλος* nominatur.

Clitarchius etiam, referente Æliano, serpentes in India sedecem cubitorum generari scribit: alios etiam multo minores pigmentis distinctos. Vittas enim à capite ad caudem pertinentes habere, alias æreas, alias argenteas, nonnullos rubras, alias aureas, easdemque celerrime pestifero ictu interimere. Meminit & alterius, punicei coloris, quem forte *Torphyrum* Ælianus vocat, Strabæ, apud Indos dodrantali magnitudine, capite candido, dentibus nullis, quem venatores in montibus meridiei obversis, ex quibus Sardius eruitur,

Nierem. H. E. l. 12. c. 31.

Nierem. H. E. l. 12. c. 32.

Nierem. H. E. l. 12. c. 46.

Nicand. in Theriacis.

Ælia. H. A. l. 17. c. 2.

indagant. Non mordet, sed vomitu, conspersus locus subitam contrahit putredinem. Quapropter, cauda suspensus, duplex veneni genus eructat; alterum nigrum & speciem electri referens, quod à vivo ejicitur: alterum simpliciter nigrum, de ore animantis prodit. Illud grano sesami exhibitum, cerebrum per nares excutit: hoc talem inducit.

CAPUT II.

De Serpentibus Aquaticis.

ARTICULUS I.

De Hydro seu Natrice.

Ambrosi.
l. 1. c. 17.
Nomen.

Athenæ-
us H. A.
l. 8. c. 13.

Tantum de Terrestribus serpentibus, sequuntur *Aquatici*, nempe *Hydrus* seu *Natrix*, *Natrix torquata*, *Natrix rubetaria*, *Boa*, *Hydrus marinus*, *Scolopendra marina*, & quidam *Exotici*. *Hydrum* ἀνδρὶ τὸ ὕδωρ ab aqua nempe dici, clarum est. Cretensibus est *ναποδὶς* aliis *ἰνυδρὸς*, quod nomen generale est de illis quæ in aquis vivunt; Nicandri interpreti *χέρουδρὸς*, quod in aquis & terra divagetur. Latini vocant *Hydrum*, masculum, *Hydrum* foeminam, cujus nomen *Ælianus Dryinio* imposuisse videtur, dum ait *Hydras* in *Cercyra* genitas, maligno flatu hominem persequentem reprimere; *Natricem* à nandi peritia; *Colubrum aquaticum*, quem tamen *Plinius*, dum jecur colubri aquatici & hydri tritum lithiasi subvenire scribit, ab *Hydro* distinguit; *Lutricem*, denique, quod apud *Gazam* legitur. *Belluacensis* & author libri de natura rerum, *Naderæ* serpentis *Germanici* meminit, crassitudine brachii, colore ventris luteo, & dorso virenti, halitu adeo noxio, ut in cortice virgæ recenter cæsæ, & ori admotæ, vesicæ felleæ excitentur; imo fulgens gladius lingua veneno inficiatur, quod ad summitatem usque gladii deferatur. Pede hominis vulnerato, venenum statim in totum corpus penetrat. Ideo ictus confestim suspenditur, ne ascendere possit.

Descri-
ptio.
Plin. H.
N. l. 29.
c. 4.

Pulcherrimos serpentum in orbe terrarum *Plinius* facit; sed nullis serpentium inferiores veneno. *Nicander* caput planum & humile adscribit, & dum terrestrem squalidum prodit & decorem, videtur aquatico pulchritudinem vindicare. Alioquin aspidem forma referunt; cervicem si excipias, quæ non ita lata conspicitur. Cinereo quoque sunt colore, & quibusdam maculis spectabiles, *Linguam* bifidam habere, (falso duas ponunt) commune ille cum aliis serpentibus.

Locus.

Stabulantur in *Cercyra* teste *Æliano*, in lacu *Mycleo*, circa *Terracinam* in Italia: in palude *Agnani* inter *Puteolos*, & *Neapolim*, quos ipsi vidimus; in aquis calidis

& *Thermalibus*. Ideo redemptores balnearum ad *Limagum lacum*; laminas ferreas crebris foraminibus pervias emissariis obdunt, ne alveos subeant. In aquis etiam corruptis plerumque reperiuntur. Adventante hyeme subterraneas cavernas eligunt, in iisque ad vernum tempus latent. In aquis autem præcipue versantur; exsiccatis terram petunt, victus conquirendi gratia. Extra aquas etiam ova parere, *Aristoteles* prodidit.

De *Victu* hoc tradit *Virgilius*, piscibus & ranis vesci, gulososque esse. Unde *Nicander* *λίχυνος* vocavit. *Virgilii* verba sunt:

*Est etiam ille malus Calabus in saltibus anguis;
Squamea convolvens sublato pectore terga,
Atq; notis longam maculosus grandibus alvum.
Qui dum amnes ulli rumpuntur fontibus, &
dum*

*Vere madentudo terræ ac pluvialibus Austris,
Stagna colit, ripisque habitans hic piscibus atram
Improbis ingluviem, ranisque loquacibus explet.
Postquam exhausta palus, terræque ardore dehi-
scent*

*Exilit in siccum, & flammantia lumina torquens
Sævit agris, asperque siti, atque exterritus astu.*

Recte ergo *Aratus*, ranas hydrorum cibum dixit. Fallitur tamen sæpe ab *Ægyptiaca*, quæ *Chersydrum* eminus conspicata, frustum arundinis transversum arripit & gestat ne deglutiri possit: nec ille tam aperto ore ut utrumque absorbeat.

Ad *Naturam* duo spectant, *venenum*, & *lapis* quem in capite gestat. De veneno abeunt in diversa authores. *Cardano* nihil venenati habent, si per viperas undam incolentes, *Chersydrus* intellexit *Cælius Rhodiginus* in terra sæviorem, minus in aqua facit. At *Ælianus* ex *Apollodoro* tam perniciosum scribit, ut & cadaveris ejus contactus perimat. *Plinius* nulli hac in parte serpentum generi inferiorem dicit, ut supra allatum. *Columella* denique, exsiccata uligine, in qua *Natrices* morabantur, cæcos sæpe morbos contrahi, quorum causas *Medici* perscrutari minime possint, addit. Ut ut sit, *Dædalus* & *Euridice* *Orphei* uxor, ictu *Chersydri* periisse traduntur. *Lapis* à deglubito evomii creditur. Quidam eum cauda suspensum foliis lauri suffiunt, & per Deum ut lapidem ejiciat, orant, quod non minus superstitiosum quam blasphemum est. *Hollerius* vas aqua plenum suspensum subicit; lapis ejectus totam absorbit. Sed de eo alibi.

De veneni signis ita *Nicander*.

*Pessima quas fecit plagas hæc signa sequuntur.
Arida tota cutis circum putret horribilemque
Elevat aspectum, magni ignitique dolores
Tandem hominem interimunt, mox plurima
Pustula surgit.*

Gesner.
de ser-
pentib.

Arist. H.
A. l. 1.
c. 1.
Vitis.

Virgil.
Georg.
l. 3.

Aratus in
Phæ-
nom.

Natura.

Rhodi-
gin.
Ælia. H.
A. l. 8.
c. 5.

Colu-
mella R.
R.

Veneni fi-
gna & me-
dela.

Ac

*Ac alia ex alia bulle se parte rependunt
Et miserum diris turbant affectibus agrum.*

Adde his, vomitum cholerae fatidæ, quem vel tertia hora, vel tertio die mors excipit: vulneris dilatatio & nigredo, ex qua nigra & fatida sanies extillat, quod apud Aëtium & Abensinam habetur. *Morsui* Dioscorides origanò trito & cum aqua subacto; vel Cortice Aristolochiæ, radiceve querna, occurrit: Ægineta, nasturtio sylvestri, aut asphodeli fructu, vel semine fœniculi: Plinius ipsorum hydrorum jecore & eryngio: Apulejus verbenaca: Aëtius theriaca, mithridatio, & drachma nucum cupressi, cum æqua portione baccarum myrti, & melle aut vino: Celsus, panace, prasio, & satireja: Abensina, emplastro ex calce, calamintha montana, Cortice radicis quereus & oleo parato. Pareus in quodam admorso, qui cum manu ori admota, vulnus fuxisset, in tumorem quoque linguæ, & brachii, cum dolore ingenti & syncope inciderat, theriaca ad sudores, & vulneris elotionem feliciter usus est.

Ufus in Medicina. Magni est in Medicina *Ufus*, si veteribus, & recentioribus credimus. Ex *dente* dentiscalpium odontalgiam sedat, si eo scalpentur. Duo superiores superiorum, totidem inferiores inferiorum dolorum mitigant, alligati. *Adipe* Niliaci peruncti à Crocodilis non tanguntur. *Iecur* lithiasi medetur. *Spolium* suffitum uteri prolapsui & sedis prodest; quod ab Encelio proditum. Cinis in olla luto probe circumlita, igne sarmentorum vitis cremati, cum oleo permixtus ad strumas à Sylvio laudatur. *Lapis* hydropi vehementer conducit, si genuinus est. Talem esse scribit Gesnerus, si conchæ æneæ aqua plenæ circumligatus, quotidie còtylas duas, seu uncias decem ejusdem absumerit. Venenatos vermes fugare, Camillus Leonhardus Pifauensis prodidit. Sumptum lapidem vesicæ perfringere fabulantur quidam.

Camillus
Leonhard. l. 3.
de la pidi-
bus.
Differen-
tia.

ÆL. H. A.
l. 16 c. 42.

Pauca de Differentiis occurrunt; Alii sunt *Vulgares*, quales sunt illi qui circa thermas Porrectanas versantur, & interdum ab ore fontis cum aqua exeunt. Aut sunt plane innocui: aut si nocent levem duntaxat tumorem aut inflammationem morsu inferunt. Alii sunt *Venenati*, & magnitudine pro ratione locorum differentes. In flumine enim Argade ad Persicam Sittacem sito, copiosi sunt, capite albo, reliquo corpore nigro, quatuor cubitorum longitudine inveniuntur, qui interdum sub aqua latent, noctu aquantibus exitio esse solent. In lacu insano, qui ter singulis diebus saporem mutat, primo amarus, mox falsus, tandem dulcis evadit, vicenum cubitorum conspiciuntur. Anno M. CCC. XCIX. die vegesima quinta Maji, sub

Pontè Ursæ amnis vicenum cubitorum visum, Gesnerus ex Chronicis Tigurinorum M. SS. author est. In lacum Anianum mense Junio multi invicem permixtorum globi, se præcipitant. In Lybiæ desertis tam perniciosus est hydrus, brevis ille, cauda tenui, circa collum gracilis, ut omnino partitis læsæ amputationem requirat. Agricola Boam, domesticam natricem appellavit.

Agricola
de Anim.
subter-
ran.

ARTICULUS II.

De Natrice torquata, & Rubetaria.

Natrix torquata nomen à circulis quibus tanquam torquibus superior animalis pars circumdatur, invenit. Scholiastes Nicandri πολυσεφείας vocat, seu multis coronis insignes: alii & μυδρῆς seu μυδρῆς quod muribus vescantur, & ὀροφείας, quod circa domorum recta versentur, vocant. Apud Aristophanem, ὄρεσι ὑπεκρεῖ, domuum custodes dicuntur. *Nerophis* est modernorum Grecorum vocabulum, *Serpens niger* à Matthiolo impositum nomen. In Italia aliqui *Carbonarium* vocant.

Ambro-
sin. H. S.
lib. cit.
c. 18.
Nomen.

Descriptionem ex Ambrosino dabimus, de qua ille ita. Aëtius Myagrum veterum describere videtur, dum inquit, hunc anguem ex crasso in tenuem caudam abire, lato capite esse præditum, & mures comedere, neque morsu necare, sed inflammationem tantum inducere. Hujus natricis iconem ad vivum expressam servamus in Musæo Illustrissimi senatus Bononiensis, ubi tenuis conspicitur circa collum & caput, crassior penes circa ventrem, qui postea in caudam admodum exilem finit. *Color* tergi nigricat, circa alvum, color inter luteum, & viridem est, medius lineis nigris virgatus, hujus autem nota insignis est in collo; nam maculæ candicantes è pallido, instar torquis, circulum tamen non absolventis apparent. Inter utrasque maculas in summo cervicis angustum est interstitium duarum forma squamularum, ubi maculæ utrinque quasi triangulari figura in acutum desinunt. Deinde maculæ nigræ splendide utrinque etiam post torquem singulæ conspiciuntur.

Descri-
ptio.

De loco & Natura & aliis pauca occurrunt. In prates uliginosis, aquis, & sterquiliniis stabulari solent. Muribus victitant, & ideo circa Lucarnum atque Verbanum lacum non interimuntur, quod iisdem vineas purgent. Vaccarum ubera fugere, & postea sanguinem sequi, Flandri prodidere, quod veteres Boæ tribuunt. In fimetis quandoque pariunt. Gesnerus quandam mense Majo quatuordecem peperisse vidit; constitutione anni pluviosa, & iis gignendis commoda. Per ora dormientium irrepere, vapore lactis fervidi illectos, iterum egredi, quorundam traditio est,

Natura.

An

An verum sit, homines in quorum os intra-
runt suaviter canere, penes lectorem sit ju-
diciū.

Differen-
tiæ.

Huc *Natrix Rubetaria* spectat, quæ vo-
cem sonoram & rubetarum æmulantem
edit. Maculosa est valde, & venustate admi-
randa, sibiloque à rusticis agnoscitur. Po-
loni *Padalica* vocant. Ictus remedium pa-
tientis pedem, in terræ humidæ scrobe per
diem naturalem sepelire. Iconem & scele-
ton exhibemus.

ARTICULUS III.

De Boa.

Ambrosi.
H. S. l. i.
c. 19.

Agricola
de ani-
mal. sub-
terran.

Themast.
in præfat.
ad Ill. vi-
ros Ita-
liæ.

Severin.
Zoot.
Demo-
crit. p.
36.

DE *Boa* serpente paucissima occurrunt.
Nomen accepit, non tam ab effectu,
quod bovem integrum deglutire possit:
quam quod armentorum greges sequatur,
& rigua vaccarum ubera fugat: & ita lacte
bubulo alatur. Salmasius à voce *βόνς*, quæ
Æolibus Bæoticis *βόνς* deducit. *βόνς* vero u-
rinator est.

In ingentem excrescit molem, ita ut sub
Imperatore Claudio ex sententia Solini,
occisa fuerit, quæ integrum infantem in al-
vo gestabat. In Calabria in eam magnitu-
dinem crescere posse, verisimile. Nam &
M. Antonius Cuccinus Episcopus Anglo-
nensis ad Thomasinum scribit, quadragin-
ta & sex ab hinc annis, in agro oppidi
S. Archangeli, Anglonensis diæceseos, à
pastore sclopiectu interfectum, qui armen-
ta & greges depascebat, cujus mandibulæ,
duorum fere palmorum longitudinis, in
templo Deiparæ de Urseolo appensæ ex-
hibeantur. Morsu inflammationem dun-
taxat inducere, communis est opinio.

Huc *Anguem Caprimulgum*, quem Cervo-
ne vocant de quo duplex est M. Aurelii
Severini quantum ad Anatomica, illa sin-
gularis, observatio, quam cum iconibus
addo, referre libet. Prior se ita habet.
Larynx exerta atque conspicua quacunque
cordis diductione: sub larynge *lingua* per
meatum ultro citroque recurrens. Quod
sibulum ergo edit, ne quidem mirum. Hæc
enim velut fistula coniecta in infernam ge-
nam mediam recto ductu videtur. *Den-
tium* ordo superne quadruplex, inferne du-
plex. *Oculi* veluti vitrei. *Aspera arteria* par-
te anteriori circuli cartilagineis, posteriori
membrana tenui & ampla satis constructa.
Oesophagus latissimus pro corporis ratione.
Ventriculus item amplus, in quo repertæ
aviculæ tres nidacæ. *Cor* viscerum om-
nium primum & supremum apparet: Nam
sunt & inferiores eo *pulmones*, qui cavi &
fistulosi sunt, ductu eodem quo aspera ar-
teria. *Magna arteria* descendens reversi-
vi duo rami, alter ad oesophagum, alter ad
pulmones. *Vena cava* in parte hepatis cava:
porta vero in gibba. Hæ postquam fines

hepatis exceßerint, committuntur, & non
ante distinguuntur quam ad *testium* con-
finia pervenerint: ubi primum spermatica
vasa promuntur: *Fellis* vesica longe infra
hepar, duplicem ductum habet; alter à
porta insertus *per* mediam quan-
dam glandulam, forma & figura tonsil-
læ humanæ: cujus & à latere *splen* visitur
parviculus satis & ex rubro candicans. Al-
ter vero vesiculæ fellis ramus, ab eadem
glandula ad basin dictæ vesiculæ procedit,
media membrana cum corpore vesicæ ad-
alligatus. *Testes* situ dispares; nam dexter
superior, ad quem mittit aorta spermati-
cum & varicosum ramum, colore albidum
unum; minores deinde alios huic oblique
mittit inferne. Idem in sinistro. Sed ra-
mus spermaticus à vena cava simplex est
participatus ab utroque teste. *Reνες* infra
testes consistunt, ex multis quasi renibus
conflati.

Ab arteria magna rami conspicui de-
scendentes oblique ad testes utrosque.
Uterus hac figura tibialium vestimentorum
instar: *Cerebri* forma eadem est, quam ob-
servavimus. In alio *Caprimulgo angue*, hæc
observata. *Pulmo* interne cavus, oblon-
gus, veluti saccus, ubi primum inchoat
hepar, desinens mox per vesiculam ad re-
nes usque descendens. *Fel* sub stomacho,
convolutus gyris: huic adhæret *splen* (ve-
rius enim credo, quam glandula) ex albo
rubescens, parvus teresque, velut exile
pisum. *Vesica* oblonga, flatu plena, sub vis-
ceribus naturalibus piscium modo, con-
tinuo ductu descendens à pulmonibus ad
renes. Causam afferebat F. Thomas Cam-
panella nostras, quod cum certis quibus-
dam motibus assurgat hic serpens, copia
spiritus egebat, in longinquo alioquin
corpore, quatenus attollere & sustinere se
sursum posset. *Omentum* à fine hepatis ad-
usque anum. Inter nervosam & carneam
ventriculi membranam *glandule* miliares.
Uterus non intestino, sed huic intestinum
incumbit qua cervicis medium. Venæ re-
nis ramus in principium uteri, intra cujus
membranas miro quodam artificio vesica
latitat parva. *Masculorum* nota, cauda pro-
lixior, crassior, solidior; maribus penes
duos spinosi, quemadmodum viperæ. *Ute-
rusque* item spinosus duplici cornu. Quo-
rum utrorumque fines in acutum desinen-
tes cum cauda finiunt, & parie ejusdem gra-
cilitate. Aspritudinis finis delectatio. *La-
rynx* è faucibus exerta; credo equidem, eo
naturæ consilio, ne per amplos deglutitus
præfocaretur animal.

ARTICULUS IV.

De Hydro marino, & Scolopendra marina.

Ambros.
H. S. l. I.
c. 20.
Hydrus
marinus.Plin. H.
N. l. 9. c.
27.Scolopen-
dra.
Ambros.
H. S. l. I.
c. 21.
Arist. H.
A. l. 2.
c. 14.Plin. H.
N. l. 9. c.
43.
Arist. H.
A. l. 9.
c. 37.Ælia. H.
H. lib. 7.
cap. 30.
Ælia. H.
A. lib. 4.
c. 22.

DE Hydro seu serpente marino in Tomo de Piscibus libro primo, Titulo primo, capitis secundi articulo quinto dictum est: hic pauca duntaxat ibi omissa adjiciemus. Et de *Loco* quidem addi potest, nusquam in aquis dulcibus inveniri, & ab illis quos Aristoteles ibi reperiri ait diversos esse: tum quod illos parum ab aspide distinguat: hi veri congruo corpore & colore sint similes: tum quod illi veneno noceant, hi innoxii sint: tum denique, quod illi pulmones habeant, hi branchias. De *Natura* hoc duntaxat occurrit, captum, si dimittatur, arenam rostro quamprimam adacto terebrare, subireque totum. Quantum ad *Differentias*, dantur qui & e mari in terram egrediuntur, qualem circa Abydum in parvis quibusdam alveis seu canalibus falsis Bellonius invenit. Ejus qui in Balthico seu Suetico mari flavi coloris, teste Olao Magno versatur, iconem hic apponimus. Cum radice lilii adhibitum Plinius contra urinæ incontinentiam commendat.

Scolopendra marina propter similitudinem cum terrestri nomen obtinuit, quasi *ἑχέσπορα*, quod in extremo, quod caudæ loco est, corniculum quasi radius atque impactus aculeus superemineat. Marinum unguem æmuletur; & terrestri secundum Aristotelem minor est, coloreque magis rubens: nisi in loco mendum cubet, quod Vottonus suspicatur, sic enim ne minorem quidem hamum deglutire posset, quod tamen facit. Gillius digiti longitudine se vidisse asserit. Alberto animal quadraginta quatuor vocatur, cum tot pedes habere videatur. De *Natura* hoc duntaxat occurrit, quod apud Aristotelem & Plinium extat, hamo devorato omnia interanea evomere, donec hamum egerat, deinde resorbere. Addit Gillius, ob tetrum odorem piscatoribus infestissimum esse; quod hamum ab ea actum, pisces vitent. Morsu urticæ instar urit, ut Ælianus prodidit: qui etiam adjecit, sputo hominis interire, & rumpi. Duarum hic exhibemus icones, ad cubitum fere accedentes; quarum altera est *nuda* instar anguis, altera pedibus hirtis & coloris amethystini.

ARTICULUS V.

De serpentibus Exoticis Acoatl & Maripetis.

ACoatl dicitur serpens aquatilis (alii *Mioccoatl*, quod imitetur colore spicam Maizii) qui etiam vivum parere fertur. *Dentibus* parvis est, & innocenti morsu: longus quinque dodrantes, pollicem crassus: tæniis nigris & cyaneis alternis distinctus superne; inferne vero cyaneus est, capitis superna nigra, inferna lutea, latera cyanea. In paludibus regionum temperatarum invenitur.

De *Maripetis* ita idem: In Orientali India nonnulli angues, ut fallant instans senium aut fatum, post certum tempus petunt mare: ubi concussa in undas cauda, & velut flagellante, scinduntur in multos ramos velut pedes: qua astutia miro naturæ miraculo evadunt in genus quoddam polypi, tam simile illis quos Lusitani vocant *poluos*, ut fallant ignaros. Petrus Christophorus Borrus enarravit mihi (*verba sunt Nierembergi*) se vidisse quosdam Lusitanos, cepisse in India aliquos, rati poluos esse, ut iis sedarent famem: incolas tamen admonuisse ne facerent, noxios esse, nec poluos suos esse, & distinguere pedum numero, nam angues illi impares illos habent.

Huc ponemus tum illos, qui sesquipedales, eximii coloris, in Cuba insula vivunt, & *Boquatrara* vocantur: tum eum, cujus iconem à Pellicerio observati Rondeletius exhibet. Terrestris anguis specie est, colore rubro, cum lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eamque lineam à capite ad caudam secantibus. Scissura oris non admodum grandis, dentes acuti & serrati, branchiæ opertæ, squamosi piscis instar. In dorso à capite ad caudam fere, quædam veluti capillamenta tenuia, pariterque in alvo. Claudant agmen illi qui in flumine Americano Urquaja, quatuordecem passuum longitudine, duarum ulnarum latitudine, capitibus super undas eminentibus natant, & homines natandi vel bibendi causa flumen accedentes cauda involutos in eundem trahunt.

Nieremb.
H. E. l.
12 c. 7.Nieremb.
H. E. l.
12 c. 44.Bembus
Vener.
Histor.
l. 6.

HISTORIÆ NATURALIS

DE

SERPENTIBUS:

LIBER II.

De Draconibus.

TITULUS I.

*De Draconibus in genere.*Ambro-
sin. A.
H. S. l. 2.
c. 1.

Raconis nomen non tam *παρὰ τὸ δρᾶν ἄχος*, quod magnam hominibus molestiam creet, iis infensissimus; quam *παρὰ τὸ δεικνύναι*, quod visione valeat, venit. Græci *Δράκοντα* vocant. Syrenas alibi dictos apud Isidorum extat, & in Arabia alatis tale nomen.

Nomen.

Descri-
ptio.

In *Descriptione* non bene convenit authoribus. Abensina & Aëtius asperrimis *squamis* obsitos, magnis *oculis*, pelle *superciliorum* loco eminenti, cum pelle *barbae* instar sub mento, amplo *riktu*, *lingua* exerta, *dentibus* magnis instructos faciunt. At Solinus adeo parva ora habere scripsit, ut mordere non possint: id est, non dehiscencia ad morsum: *Dentium* quoque numerus in controverso est. Claudius Minos sedecem ponit. Nicander triplici ordine dispositos. Eidem Draco est colore nigro, ventre subviridi cum palaribus sunt mento rufi coloris. Philostratum si sequimur, montanorum juvenes modicam gerent cristam, ætate provecti grandiore, & crocei coloris barbam: palustres cristis carere. Plinius vero expresse. *Id modo mirum, unde cristatos Iuba crediderit.* Circa Atlantem media corporis parte crassescunt, cauda & collo gracilimi.

Plin. H.
N. l. 8.
c. 13.Leo A fri-
canus l. 9.
Locus.
Plin. l. c.
Sol. Poly-
hist. c. 33.
Philostr.
in vita A-
pollonii.
Beilon.
Observ. l.
2. c. 7.
Nicand.
in The-
riac.

In Africa imprimis & India reperiuntur. Nam Plinius apud Æthiopes Azachæos, Strabo apud Hesperios; Leo Africanus in specubus Atlantis; Solinus in montibus Æthiopie ardentibus meridiei obversis; Philostratus circa Gangem flumen; Abensina in partibus Nubiæ; in provincia Caraja Paulus Venetus; prodidere. In Calecut multosadolescere, alii authores sunt. Belonius ex quadam Arabiae parte in Ægyptum alatos deferri scribit. Nicander in Pelethro-

niis ad Pelium in Thessalia montem, vallibusquendam olim stabulatum. Fuisse & ad Cracoviam, in historia Polonica legimus.

Famen diutissime ferre possunt. Semel cibum aggressi, difficillime satiantur, ita ut rebus venenatis, herbis, pomis inprimis, quorum succo alvum laxant, vescantur: nausea ex illis vexati, lactuca sylvestri sibi medentur. Ova serpentum spectanda arte forbent. Aut enim solida hauriunt, si jam fauces capiunt, quæ deinde in semet convoluti frangunt intus, atque ita putamina excutiunt: aut si tenerior est, & catuli adhuc ætas, orbe apprehensæ spiræ, ita sensim vehementesque præstringunt, ut amputata parte ceu ferio, reliquam quæ amplexu tenetur sorbeant. Simili modo avibus devoratis solidis (dicuntur hos spiritu copioso de stabulis egressi attrahere) contentione plumas & ossa revomunt. Aristoteles sumptum ovum iterum atque iterum sibi admovere, quoad summam partem rectam statuunt, & tum, parum contractos secolligere, ut distento corpore, haustum ovum deorsum labatur, dixit.

Viens.

Arist. H.
A. l. 9. c.
6.
Plin. H.
N. l. 10.
c. 72.Æl. H. A.
l. 2. c. 21.
Phile in
Jambis.
Arist. H.
A. l. 8.
c. 4.

De *Generatione* vix habeo quod scribam, qui & apud authores nihil fere occurrit. Herodotus capite maris in fæminæ os inserto coire fabulatur: mutuo complexu congregi verisimile est. Afri ex lupæ cum aquila congressu, Draconem erumpere, rostro & alis patri, cauda matri similem, corio serpentino, multisque maculis versicolore, nugantur. Quidam fætus vivos parere docent; alii ova, quod de Ternatensibus Balthasar Diaz scripsit. Utrumque facile concederem.

Genera-
tio.
Herodot.
in Thalia.

Inimicitias cum Aquila & Elephante gerit; adeo ut Geoponicorum author prodiderit, non stabulari ibi Draconem ubi ster-
cus aquilæ inveniretur, auditoque alarum ejus strepitu, in antrum aufugere, Ælian-

Antipa-
thia.
Geopon.
l. 9. c. 5.
Arist. H.
A. l. 9. c. 1.

nus

nus scripserit. Dimicationem cum ea ita Nicander describit.

*Hunc petit invisum, magni Iovis armiger hostem,
Cumque genis parat acie suis ex athere bellum,
Pascentem in sylvis quam primum viderit illum
Quod totos ferus is nidos cum mitibus ovis
Et sinui ipsa terens, & vastans pignora perdit.
Non timet hoc serpens, immo quodam impete
durus,*

*Profiliens, ipsamq. Aquilam, leporemq. tenellum
Extrahit ex rapidis, visfraudeque fortior unus.
Cauta malum declinat avis, fit ibi aspera pugna;
Ut queat extortam victor sibi tollere prædam,
Sed frustra clapsam, & volitantem hinc inde
volucrem*

*Insequitur, longos sinuum contractus in orbem,
Obliquoque levans sorsum sua lumina visu.*

Plin. H. N. l. 8. c. 11. Quomodo cum Elephantibus dimicent, in horum historia scripsimus. Quæ de Gryphibus apud Philostratum habentur, fabulosa sunt.

Venenum. Plin. H. N. l. 29. c. 4. Venenum habere nonnulli negant: solo interficere morsu. Alii aërem inficere halitu, cujus exemplum apud Aristotelem legitur. Tempore Philippi Regis Macedonum inaccessible ideo montis cujusdam Armeniæ via, extinctis demum Draconibus paruit. At Gesnerus & Stumpfius venenatos probant. Prope Niderburgum oppidum, cum se Dracones in quodam fonte abluissent, quicumque post ex eo bibere, alvo tumefacta moriebantur. Is qui Helvetiam à Dracone supra pagum Wilver stabulantem purgavit, sanguine ejusdem conspersus, occubuit. Morsum dolor partis & fætor excipiunt, vulnusque paucum fundit sanguinem. Laudat Plinius gramen; Aëtius remedia quæ in aliorum ictibus adhibentur, præscribit. Ponzello caput abscissum, pelle nudatum & impositum placet.

Mores. Plin. H. N. l. 8. c. 27. Plin. H. N. l. 8. c. 13. Aëtia. H. A. lib. 6. cap. 4. Circa Mores observa, vigilantes esse, & ideo non tantum auditu exquisiti, sed & visus acutissimi. Auri micis si quas invenerint, incubare, Philostratus prodidit. Rem aliquam aggressuri ingentem sibilum edunt. Vernam nauseam lactucæ sylvestris succo adstringunt. In Æthiopia quaterni & quini inter se cratium modo implexi erectis capitibus velificantes, ad meliora pabula Arabiæ, fluctibus vehuntur. Indies majorem adipiscuntur vigorem, & ad extremam senectam perveniunt. Homines adorsuri mortiferas radices comedunt. Cicuri denique solent. Heraclides Philosophus exarmatum habuit, qui gradienti & quiescenti canis instar adstare solebat.

Ufus in Cibis. Æthiopes eis vescuntur, quod vitrei sint eorum carnes coloris & maxime refrigerent. Vesputius etiam, cum extra fortunatas insulas navigaret, populos quosdam similibus draconi animalibus demptis alis in cibo uti vidit. Ægyptii serpentibus vescuntur, ut Galenus scripsit. Quantum ad Medi-

cinam, commendat ad fugandas venenatas bestias adipem. Plinius: eadem in ulceribus illatis utitur. Cum melle commisto, inchoantes caligines sanat. Caput si gestetur, à lippitudine præservare scribit. Os ex spinâ dentium dolores sedat. Reliquia nugatoria sunt. De lapide alibi agemus.

Differentia Draconum à magnitudine, loco, colore, figura & venefica qualitate sumi possunt. Magnitudo pro ratione natalis soli variat. Marcus Paulus Venetus decem cubitorum in provincia Carazoni stabulari dixit. Tempore Philadelphi duo quatuordecim cubitorum ex Æthiopia Alexandriam delati fuere. Hieronymus unius XV. cubitorum meminit. Ælianus in Æthiopia XL. Octavianus Augustus L. cubitorum Romæ aluit, & populo ostentavit. Tempore Alexandri visus in India LXX. longus. Apolyfares LXXX. cubitorum nutrit. Strabo, centum reperiri, scripsit: jugeri in Macra juxta Iordanem longitudine, & tam altum, ut duo equites hinc inde locati se conspiciere non possent. Taceo Posidonius qui de quodam prope Damascum, centum quadraginta pedum scribit: Gelium, apud quem de illo, qui M. Attilii Reguli exercitum infestavit: Egnatium, qui de cujusdam intestine centum viginti pedes longo prodidit. Loci ratione sunt alii montani qui grandiores, & acriores, cristis insigniuntur: alii palustres qui tardi motus, caput vix attollunt, & cristis carent. Colorem si spectes, sunt Aëtio, nigri, rufi, cinerei; Nicandro ventre subviridi: Philostrato tergore nigri; Homero rubicundi: Pausaniæ fulvi; Lucano aurati.

Figurae sunt variae. Sunt auctori libri de natura rerum Draconcopades, facie humana, vultu venusto, reliquo corpore tortuoso: inter quos & ille qui primos parentes seduxit, censetur. Sunt suibus similes, corpore graciliore, rostro validissimo, dentibus aprinis, ut apud Aëtium legimus. Sunt in Congo arietis magnitudine, alati, fulvi, oblongi rostri, crudis carnibus vitantes. Sunt ad Gangem, si Philostrato credimus, quorum oculi, lapidis preciosi instar, coruscant. Sunt apud Plinium, pedibus anserinis: apud Thebanos cornu munitissimi, in regione Carajam quidam qui tantum anteriores pedes habent: alii qui pedum loco duabus ungulis arman- tur, ventre enormi, rictu amplo. Dari Alatos nullum dubium; eosque membrana ab anterioribus ad posteriores instructos, quam in volando expandunt, dum quiescunt ad alvum colligunt. Sane tales Aristoteles in Æthiopia, Lucianus in Lybia, Jovius in Georgiana, Bellerophonius qui & cadaver conditum habuit in Ægypto, povunt. Cardanus duos Lutetiæ bipedes vidit. Solinus, circa Arabiæ palu-

Galen. de Alim. facult. l. i.

Differentia.

M. Paulus Venet. l. 2. c. 40.

Ælia. H. A. l. 17. c. 1. Ælia. H. A. l. 15. c. 21. Strabo Geogr. l. 16.

Philost. de vita Apollonii. l. 3. c. 2. Homor. Iliad. l. 12. Lucan. Pharsal. l. 9.

Aëtius.

Plin. H. N. l. 11. c. 47.

Lucian. de Diplo- dib. Iovius. H. l. 18. Bellon. obs. l. 2. c. 70.

Mela. l.
2. c. 4.
Cicero
de N. D.
l. 2. He-
rodot.
l. 2.
Scalig.
de Exerc.
183.

des versari observavit. Visus & in Florida tam exiguis alis, ut vix se à terra attollere possit. De iisdem quoque apud Pomponium Melam, Ciceronem, & Herodotum habetur: qui ab Ibidibus in Ægypto perimi addunt. De *Venenorum* differentiis habet. In monte Atlante solo contactu interimere, capite & cauda graciles, sed ventre adeo immanes, ut vix sint ad rependum idonei. In monte regni Narfingæ, qui in arboribus versantur, obtuitu perimunt. Unde quidam in *arboreos* & *Chamodracones* distinxere.

T I T U L U S II.

De Draconibus in specie.

C A P U T I.

De Draconibus non alatis.

A R T I C U L U S I.

De Draconibus non alatis apodibus.

P U N C T U M I.

De Basilisco.

DRacones optime in *non alatos* & *alatos*: illos in *apodes* & *pedatos* distinguemus. *Apodes* sunt *Basiliscus*, *Draco Pythius*, & quidam *Exotici*. *Basiliscus* Latinis *Regulus* vel quod terrori aliis Draconibus sit, vel quod diadema in capite gerat, ut Festus, habet, dicitur. Sibilo ejus reliquos terreri, & prædam derelinquere, apud Ælium legimus. *Descriptiones* ejus variæ habentur. Galenus facit flavum, triplici apice frontis decorum. Abensina, ad flavedinem & nigredinem vergentem, capite valde acuto, oculis admodum rubentibus. Plinius XII. non amplius digitorum magnitudine, candida in capite macula, ut quodam diadema insignem. Grevinus ex Nicandro III. palmos longum, corpore flavo, tribus eminentiis superbum. Alas nonnulli tribuunt, sed exiguas & absque usu. Ille qui in Marchia, in Abbatis Zinnensis ditione prope Lucken Waldam interfectus est, erat cauti capitis, flavi coloris, tres palmos longus, & valde crassus, cauda in latus turbinata, alvo notis candidis distincta, ore magno, tergore ad cyaneum tendente, prout eum Encelius descripsit. Addidit pastor, circa paludes divagari, ranis, serpentibus & aliis animantibus vesci, vaccas sæpe interimere, & lacte delectari. Formantur & ex Raja, prout ex icone videre est. Servantur in Musæo Bononiensi. In Cyrenaica nasci prodidit Plinius: Africæ proprium Ælianus dixit.

De *Generatione* vix quicquam compertum. Ex ovis Ibidum prodire posse, Ægyptiis creditum: ex ovo galli in lutamine sepul-

to Alberto: figura, gallo, cauda excepta, futurum scribit: ex ovo galli decrepiti, vulgata sententia; ex sylvestris Encelio proditum. Quid sentiendum sit alibi dicemus. Quomodo formari à gallo intra ovum possit, cum utero destituatur non video. Incubasse à gallinis posita, non dissitor. Inimicitias gerit cum *mustela*, gallo *insectis* & aliis *Serpentibus*. De *Mustela* ita Plinius. Huic tali monstro (sæpe enim enectum concupivere Reges videre) mustelarum virus exitio est: adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. Injiciunt eas cavernis facile cognitis solitæ, necant illæ simul odore, moriunturque, & naturæ pugna conficitur. Mustelis tantum vinci dixit Solinus, quas illinc homines inferciunt cavernis in quibus delitescit. Vis tamen ne defuncto quidem deest. Ælianus galli præsentiam pertimescere dixit: ideo iterantibus per Africam comes. Mori quoque si canentem audivit, addit. De *insectis* Solinus. Basilisci reliquias amplo festertio Pergameni comparaverunt. Ut ædem Apellis manu insignem, nec caraneæ intexerent, nec alites involarent, cadaver ejus reticulo aurea suspensum ibidem locarunt. De *Gressu* habet Plinius, nec flexu multiplici ut reliquos corpus impellere, sed celsum & erectum in medio incedere. Cum movetur, media corporis parte serpere, media arduum & excelsum esse, scripsit Solinus.

Necat frutices, inquit *Plinius*, non contactos modo, verum & afflatos: exurit herbat, rumpit saxa. Talis vis malo est. Creditum quondam ex equo occiso hasta & per eum subeunte vi, non equitem modo sed equum quoque absumptum. *Solinus* vero tradit, non hominis tantum vel aliorum animalium exitiis datum, sed terræ quoque ipsius, quam polluit & exurit, ubicunque ferale sorritur receptaculum. Denique extinguit herbas, necat arbores, ipsas etiam corrumpit auras, ita ut aëra nulla alitum impune transvolet infectum spiritu pestilenti. Intuitu interimere, vix crederem, quis enim primus vidisset. Halitus pestilens interitus causa, qui per aërem diffusus, hominise insinuat. Ideo Nicander.

*Tam teter vacuas odor hinc exhalat in auras,
Atq; propinquantes penetrant non segniter artus.*

Venenum etiam per tela currere, & manum invadere apud Lucanum habetur. Morsus ex inflammatione, vulneris flavedine, & capillorum defluvio colligitur. Id Dioscorides, ex Erasistrato; hoc Aëtius prodidit, Remedio est colubrinum lignum, quod ex insula Zeilan adfertur. Adhiberi ibi contra serpentum coronatum, qui Hispanis Cobras de capolo dicitur, & sine ducio Basiliscus est, Carolus Clusius prodidit. Animalculum etiam quod ibi cum

Antipathia.
Plin. l. c.

Solin.
c. 27.

Æl. H. A.
l. 3. c. 31.

Solin. l. c.
Venenum.
Plin. H.
N. l. 8. c.
21.

Solin.
c. 27.

Lucan.
Pharf.
l. 9.

Diosc.
l. 6. c. 55.

Clus. Ex.
l. 1. c. 44.

Nomen.

Æl. H. A.
l. 2. c. 7.
Descriptio.
Galen. l.
de Theriaca ad
Pisonem.
Plin. H.
N. l. 8.
c. 21.

Encelius
cere me-
tall. l. 3.
c. 54.

Æl. H. A.
l. 1. c. 31.
Generatio.

cum eodem pugnat, eo sese munire observatum.

Differen-
tia.

Ambro-
sin. de
Serpent.
1. 2. c. 2.

Quidam tria Basiliscorum genera constituunt, *Helyochryson*, qui quæ vidit accendit, & inflammat, aurei coloris; *Chrysophalon*, capitis aurei qui quod videt per terre facit, & occidit: & *Hematiten*, sanguinei coloris, ad cuius ictum carne animal nudatur. Sed has ego fabulas esse puto. Encelius in *Sylvestres* & *Domesticos* distinguit. De reliquis ita ex Cardano Ambrosinus. Recitat Cardanus quod circulator quidam Serpentem, in maceriis domus dirutæ Mediolani inventum servabat, qui *caput* ovi magnitudine, & pro ratione corporis prægrande habebat, *dentes* in utraque mandibula viperinos, corpore & forma stellioni simili. *Pedes* illi inerant duo, cruraque breviora: unde constabat non satis proportionatum animal à natura fuisse fabricatum, cum longitudini corporeæ quatuor pedes necessarij fuissent. Tales pedes erant magni: Et *ungulis* veluti folium muniti, *cauda* longitudinem totius animalis adæquabat, cuius extremitas capiti stellionis æquali erat prædita. Cardanus ex genere Basilisci hunc fuisse credidit: Siquidem dum stabat, gallo similis esse videbatur, nisi quod corio, & non plumis tegebatur, alisque carebat. Denique in volumine de ostentis observatur icon cuiusdam Basilisci in solitudinibus Africæ stabulantis; quæ quoniam est figura animadversione digna, diciturque animal, sibilo, halitu cæteras animantes necare herbasque exsiccare: libuit ante legentium oculos talem iconem repræsentare.

PUNCTUM II.

De Exoticis, nempe *Dracone Pythio*, & *Serpentibus Bamba*.

DE *Dracone Pythio* pauca occurrunt. Putatur ita dictus, quod post Deucalionis diluvium ex putredine terræ natus fuisset. Suidas Delphinem etiam fuisse dictum testatur, quod ex Appollonii Argonauticis habet. Ratio nominis à Delphici oraculi custodia sumpta est. Dicitur habuisse os triplici dentium ordine armatum, oculos magnos, & visum acutum, magna sub mento palearia, & corpus ex flavo rutilans. Fure tamen & virides & cærulei, ut apud Statium videre est; Cyanei, quod Claudianus reliquit. Eminentibus fulgidis & duris squamis tegebatur. Iconem ex Grevino damus. Ex terra post Deucalionis diluvium genitum Poëtæ fabulati sunt. Ideo Deucalionæus dicebatur. De *serpentibus Bamba* ita Nierembergius. Serpentes sunt magnitudinis horrendæ, si conferantur cum nostratibus, & præcipue *palustres*, quorum a-

Apollon.
Argan. 1.
1. Stat.
Theb. lib.
cit.

Nierem.
A. E. 1.
12. c. 38.

liqui longitudine 25. & in latitudine 5. spiritus excedunt, ventre tam capaci, ut totum cervum, aut aliud ejus magnitudinis animal una vice devorent. Ex aquis egrediuntur & pasti eo redeunt: unde & ab incolis *magna matrices* appellatur. Ascendunt quasvis altissimas arbores, in quibus vagabunda animalia, quasi è specula contuentur: & ubi ea victum quærentia accesserunt, summa vi se in ea demittunt, atque ita & morfu, & mole occisa, in solitudinem aliquam vicinam tracta, tota cum pelle ossibus & carnibus deglutiunt. Et sæpius etiam accidit, ut cibo nimium repleti, quasi ebrii reddantur, & in somnum maximum incidant; ita ut puer etiam illos occidat; durat hæc satietas ac somnolentia per quinque aut sex dies continuos, post quos demum experrecti, ad consuetas suas venationes redeunt. Pellem statim temporibus mutant. Aliquando etiam nimia dilatione ex cibo nimio rugosam ante tempus exuunt, quæ inventa, homines in admirationem, belluæ magnitudinem inde cognoscentes, rapit. Magni ejus carnes tostas faciunt Æthiopes, & gallinarum habentur multum deliciores sed vix eas adipisci possunt, nisi cum aliquando nimio calore incenduntur sylvæ, & tum omnes, quæ à suis lacubus, aliquando fuerunt remota, semitæ ostæ inveniuntur, & in magnis habentur deliciis. Viperæ præterea inveniuntur ibi adeo venenatæ, ut morfi ab iis, post 24. horas summo cum dolore moriantur. Incolæ itaque diligenter se muniunt herba, quam ejus antidotum esse norunt.

Idem de illis & Jaricus prodit. Quod autem addit, esse quoddam genus, in cauda rotundam lagenulam, quæ dum se movet, strepitum edit habens, ad illum quem Teuhtlacacahuqui vocari diximus, referendum est.

PUNCTUM III.

De *Bitiu*, & *Serpentibus Senega*.

AD Exoticos quoque spectant *Bitiu* & *Serpentibus Senega*. Incola montanorum locorum *Bitiu* est, aspectu serpens terrifico, nigris punctis, rubeis ac candidis, vitulino capite, ampla fronte adusque oculos, qui nigri sunt lucidique, sed virenti circumdati iride, rictu oris magno, munito multis & acutis dentibus, caninis quaternis, digitum prolixis, sese mutuo invicem excipientibus, quatuor ulnarum longitudine & crassitudine hominis. Conscendit arbores, unde se vibrat appensus cauda: Rapit boves & apros, & alia hujus generis animalia, devorans ea quandoque integra, & hoc venatu vivens. Amat insulam Cubu, visusque est in Insula Lutaji à militibus

Nierem.
H. E. 1.
12. c. 18.

tibus Hispanis, cum vellent naves exonerare. De *Serpentibus Senegæ* superius diximus.

ARTICULUS II.

De *Draconibus non alatis pedatis.*

PUNCTUM I.

De *Hydra.*

Nomen.
Plautus
in Perseo.
Durip. in
Hercule
furente.

DRaconibus non alati pedati, sunt *Hydra* & *Draco bipes Bononiensis*. *Hydra* nomen *ὑδρῶν* accepit. Virgilius belluam *Lernæ*. à lacu *Lernæo*, in quod à Hercule interfecta dicitur: Plautus *Excetram*, seu ut Isidorus *Excedram*, quod uno capite detruncato, duo vel tria excrescerent vocavit. Euripides *κύναι* dixit.

Descri-
ptio.

Plurium capitum esse, Poëtæ fabulantur. *ἑννεακέφαλον* Alcæus, *Πεντηκοντακέφαλον*, Simonides. Unum habere Pausanias prodidit, quod verisimile: magnitudine à reliquis hydris discerni. Quarum Icones apposuimus, arti ortum debent. Una visa Venetiis in thesauro Principis, incredibilis obraritate pretii, ut Gesnerus ex amico accepit, septiceps. *Altera* est Equitis de Corneto. Allatam A.C. 1530. mense Januario, Venetias ex Turcia totidem capitum, Regique Gallorum oblatam, icon testis est. Visa ibidem non multis ab hinc annis bipes, sex unguibus armata, ut Ambrosinus reliquit. Lata valde corpori, septem arrificio singulari forinata capita, annexa erant. Cardani illa, quam Meona Pisanus fictitiam sectione comperit; medium Caput longius & crassius gerebat, viperarum omnia æmulabatur. Oculi post aures, hiatus maximus, dentes canini; lingua lati, Colla maculosa erant. Cauda toto corpore dimidio longior; pedes unguibus parvis armati. Magnitudine cuniculum æquabat. Color sub ventre candidus, circa dorsum flavus, seu viridi dilutus.

Locus.
Virgil.
Æneid.
l. 6.
Pausan.
Corinth.
l. 2.
Ortus.

Apud inferos stabulari Poëtæ dixerunt, Virgilius inprimis. Pausanias sub Platano quadam ad fontem Amydone altam scribit. In lacu *Lernæo* Argivis & Mycenis contermina vixisse, vulgaris est opinio.

Hesiodus Echidnæ ex Typhone filiam fecit. Ex sordibus in Lernam conjectis, ibidemque putrescentibus, extitisse verisimile est.

Venenum.

Vel ipso afflatu exitium attulisse, multi tradiderunt: sanguine infecta Herculis, qui eam superavit tela, exitialia fuisse, passim apud Poëtâs occurrit. Toxicum veterum, quod quidam napellum, alii taxum, nonnulli venenum Scythicum esse volunt, non facile dixerim. Linguam, si in illud incurras, inflammat, tussim siccam, phrenitidem, & tremorem cordis excitat. Cutis adusta quasi, Corii flammæ admori

instar, facile rumpitur. Æger in ululatus & vociferationes solvitur, quas strictum in se videns ensẽ excitare consuevit. Remedium à Colocasia, panace Asclepio, Carne inprimis cydoniorum, & sanguine hircino, quod apud Dioscoridem habemus, petitur.

PUNCTUM II.

De *Dracone Bononiensi bipede.*

DRaco hic Anno Christi 1572. III. Idus Martii primum in loco Malavolta sibilum edidit: post diem Ascensionis vero, juxta sepem apparuit, & à rustico currum & boves, qui eo viso ulterius progredi non audebat, hasta ictus & interfectus est.

Descriptionem ejus, verbis *Ambrosini* apponam. Admirabilis hic Draco, *inquit ille*, à capite ad extremitatem usque caudæ erat duorum cubitorum: ab ore ad initium usque *latitudinis* corporeæ dodrans inter corporis latitudinem & caudæ principium observatur. Deinde ad extremitatem usque caudæ *longitudo* cubitalis, nempe duorum dodrantum, hujusmodi partem adæquabat. Prope collum erat latitudinis duorum digitorum, & à capite ad primum usque & anteriorem pedem dodrantalis longitudinis & à primo pede ad eam usque partem, viperæ assimilabatur. Et corpus in ea parte latitudinis sesquipalmaris, nimirum sex digitorum visebatur. Posteriorem colli partem torques albus exornabat, ad instar Natricis torquata, vel instar Anatis sylvestris torquata, quæ Italis vulgo *Cesone* nuncupatur, vel tandem instar merulæ alpestris torquata quæ vulgo *Merla della collana* cognominabatur. Cæterum in hoc dracone torques non erat mutilus, ut in multis aliis animantibus observatur, sed absoluti circuli torquem integrabant. Supra dorsum *squama* latæ apparebant, æmulantes squamas Cyprini piscis Aristotelis, qui vulgo Raina appellatur. Major pars harum squamarum ad viriditatem tendebat: imo aliquæ erant subrubræ, sed inter has quædam nigrescebant: hinc deprehensum est hoc animal ad genus Draconum referendum esse: Propterea quod Dracones, ut plurimum, virides effigiari soleant. Pars *alvi* Draconem proprie representans squamis viridibus erat exornata. Si *pedes* contemplemur. Primum advertendum est quod *femur* junctum tibiæ erat latitudinis pollicis; & digiti suis articulationibus connectebantur ut in lacertorum digitis observatur. *Digiti* tamen non erant quini, ut in lacertis, sed tantum quatuor brevibus unguibus armati, qui adhuc eorum primordia præ se ferebant: unde Draconem juvenem esse conjecta-

Ambros.
Hist. Ser-
pent. l. 2.
cap. 5.

jectavimus: quemadmodum etiam ex dentibus dignosci poterat. Præterea altitudo *pedum* latitudinem corporis adæquabat. Immo magna admiratione tenebamur, quod pedes ex opposito juncti non essent: veluti in cæteris animalibus quadrupedibus, & in aliis exanguibus multipedibus observamus: sed *pedum* unus erat anterior altero, distantia sex digitorum, neque in eodem latere; immo per Diametrum erant oppositi: ut facilius forte corpus movere posset: propterea quod media pars corporis motu progressivo impellebatur, reliquæ autem partes, nempe colli, & caudæ per lubricos fluxus ritu serpentino movebantur. *Podex* ab extremitate caudæ duabus distabat palmis, pars *caudæ* superior viperæ erat similis, inferior vero dissimilis: siquidem squamæ partim nigræ, partim virides erant, hoc tamen ordine, & figura, ut quasi singulæ formam semicircularem referrent, & binæ tantum latitudinem caudæ amplectebantur. Secus vero in vipera se habent, quoniam squammæ rectæ sunt per totam corporis partem inferiorem. In hoc autem Dracone à podice ad caput usque squamæ inferiores, tam residuæ caudæ, quam ventris, & totius colli ad os usque rectæ erant, ut in vipera, hoc tamen ordine, ut imbricatim sitæ essent, colore usque ad alvum partim albo, partim nigro, sub ventre albæ, & latiores dimidio fere digito. At in extremitate squammarum rectarum non nihil coloris viridis conspiciebatur. Demum extremitas *caudæ* durissimo, & corneo fere apice munita erat, cujus una pars squamulis tegebatur, & extremitas apicis nigerrima, & aculeus instar literæ C. seu instar Centri scorpionis, erat repandus. Quamobrem verisimile fuit, hoc animal hujusmodi aculeo, pro tutela adversus cætera animantia uti. Cæterum, ut melius forma hujus draconis intelligatur, de-nuo singulas partes considerabimus. *Caput* erat admodum simile viperino, pars capitis superior juxta extremitatem, erat nigra, novem nigris squamis integrata, reliqua autem pars squamis majoribus leucophæis trigonam figuram æmulantibus. *Oris* hiatus longitudo erat duorum digitorum: *lingua* tenuis, longa & bifida, more aliorum serpentum conspiciebatur. Singula oris latera *dentes* ferrati, & graciles armabant, anterioribus tamen in vipera observatis carebat. Hinc colligimus hoc animal non valde fuisse venenosum. *Oculos* in comparatione ad molem corpoream magnos habebat, & aurei coloris: qua de re draconem hunc solaris naturæ fuisse judicavimus. Foramina *aurium*, ritu avium, habebat; deinde auriculis carebat, quamvis in Helvetiis Anno 99. supra millesimum & quadringentesimum Draco auribus lon-

gissimis præditus fuerit inventus. Idcirco ad monstrum in genere serpentum reducendum fuisse putavimus.

CAPUT II.

De Draconibus alatis.

DRACONES alatos dari negat Ammianus, comprobatur experientia. Dari in Æthiopia certum. Visus & in agro Pistoniensi squamosus, bipes, dentibus magnis, auribus urfi instar pilosis, cujus alæ, cubitum longæ & latæ, multis intertextebantur nervis. Sirenes Æthiopibus dari Isidorus author est. Descripsit & Scaliger longitudine pedum quatuor, crassitie brachii humani, cui alæ cartilagineæ de lateribus dependebant. Similem in agro Santonico occisum, & ad Regem Franciscum delatum, Galliam vidisse Brodæus testis est. Cardanus quoque Lutetiæ tam diligenter exsiccatos, ut vivi viderentur, bipedes, alis exiguis, capite serpentino, colore lurido, pilis nullis, cuniculi magnitudine vidit. Ex India allatæ dicebantur. Bellonius integra eorundem cadavera, diligenter condita se vidisse dicit; & quidem de eorundem genere, qui ex Arabia in Ægyptum advolant. Crassi hi circa alvum, bipedes, alis vespertilionum, & anguina cauda instructi. Respondit eis icon quam Gabriel Barbarus Aldrovando communicavit: & Æthiopicus exsiccatu Draco, quem à Francisco Cetenſi accepit; tubercula quinque in dorso prominentia si excipias, Squammæ virides, & subnigricantes erant; pedes bini, ungue armati, auriculæ totidem, alæ ad volandum factæ; Os dentibus acutis instructum; nares binæ; pars capitis inferior versus auriculas plana; Oculi pupilla cum circulo semiluteo nigra; Cauda longa flexuosa, subluteis squammis testæ. Nos hic quatuor icones exhibemus; quarum prior est ex Grevino; altera ex Pareo; reliquæ duæ Æthiopicos exprimunt, unum sine eminentiis in dorso; alterum cum eminentiis, quarum modo mentionem fecimus. Reperiuntur in Arabia, & si Herodoto fides, circa arbores thuriferas, si Plinio, circa Cassiæ. Inde in Ægyptum avolant & ab ibidibus confumuntur. Cicero Lybia discedere scripsit. In antris plerumque degunt. Cum aquila & elephanto dimicare, Plinius author est. Et tantum de Serpentibus & Draconibus. Si quæ interim occurrunt, vel in Paralipomenis, vel in editione iterata, reponentur, volente Deo, cui laus, honor & gloria, in sempiterna secula. Amen.

Brodaus
Miscell.
l. 3. c. 1.
Cardan.
de Variet.
rer. l. 7.
c. 29.

Cicero, l.
1. de Na-
tion.
Deorum.
Plin. H.
N. l. 8.

I N D E X

I N

HISTORIAM NATURALEM

D E

SERPENTIBUS.

JOANNIS JONSTONI

Med. Doctoris :

Prior numerus Historicæ descriptionis locum exhibet, posterior Tabulam
Iconismi demonstrat.

A Contias, Angelschlang / Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Natura, Differentia, Usus. Pag. 20. Tab. 4.

Ahuacatl. p. 13.
Ammodytes, Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Remedia. p. 11. 12. t. 1.
Amphisbæna, Nomen, Descriptio, Locus, Natura, Venenum, Differentia, Usus. p. 18. t. 5.
Anguis Angioleta Neap. p. 23.
Esculapii, Nomen, Descriptio, Locus, Natura, Usus, Differentia. p. 22. t. 5.
Bifognola Bononiens. p. 23.
Caprimulgus. p. 30.
Cervi: p. 22.
Cervonis. p. 22.

Apochycoatl. p. 26.
Argoli. p. 27.
Aspis, Nomen, Descriptio, Locus, Sympathia & Antipathia, Natura. p. 15. t. 3. Venenum, Usus. p. 16.

B Afiliscus, Nomen, Generatio, Venenum, Differentia. Pag. 34. 35. Tab. 11.
In solitudinibus Africa. p. 35. t. 12.
ex Raja effusus prone & supine pictus. t. 12.

Bitin. p. 35.
Boa. p. 30.
Bodty. p. 20.
Boicininga. p. 23. t. 6.
Boicininga. p. 23. t. 6.
Boiquira. p. 23. t. 6.
Boiguacu. p. 25. t. 6.
Bojobi. Brasil. p. 26.
Boitiapo. p. 26.
Boquatrara. p. 31.
Borobi. p. 25.

C Aninana. p. 23. 26.
Cascavela Lusit. p. 23.
Cæcilia Blindschleich / Nomen, Descriptio, Natura, Usus, Differentia. p. 20. t. 4.
Cega Lusit. p. 19.
Cenchrus, Nomen, Descriptio, Natura, Usus, Differentia. p. 19. t. 4.
Ceraastes, Gehornichte Schlang / Nomen, Descriptio, Locus, Natura, Venenum, Differentia. p. 12. t. 2.
Cesone. p. 36.
Chersydrus. p. 19. 20. t. 8.
Cobra de Cipo, Lus. p. 26.

Cobra de Coral. p. 25.
Cobra de veado. p. 25. 26.
Cobre Verde. p. 27.
Cuilcahuilia. p. 26.
Cumcoatl. p. 27.
Curucucu. p. 14.

D Ecurtati. p. 21.
Diplas, Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Differentia. p. 17. t. 3.
Domina Serpentum Nieremb. p. 24. t. 7.
Draco, Nomen, Descriptio, Locus, Virtus, Generatio. p. 32. Antipathia, Venenum, Mores, Usus in Cibis, Differentia. p. 32. t. 10. 11.
æthiopicus. p. 37. t. 10.
bipes Bononiensis. p. 36. t. 10.
Pythius. p. 35. t. 11.
ex Raja effusus Aldr. t. 12.
alter ex Raja exiccata Ald. t. 12.
Dryinus, Stinch-slangh / Nomen Descriptio, Venenum. p. 21. t. 5.

E Xcedra Isidori. p. 36.
Excetra Plauti. p. 36.
Elaps, seu Elops, Elaphis, Nomen. p. 22. t. 5.
Descriptio. p. 22.

H æmorrhous, Nomen, Descriptio. p. 13. t. 2.
Locus, Natura, Venenum, Differentia. p. 13. 14.
Hoacoati Mexic. p. 24.
Hyæna Eliani. p. 27.
Hydra, Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Ortus. p. 36. t. 11.
Hydrus marinus, p. 31. t. 8.
Hydrus, Nomen, Descriptio. p. 28. Locus, Virtus, Natura, Usus. p. 28. t. 8. Differentia. p. 29.
Hypnalis. p. 15.

I Biboboca Bras. p. 25. t. 6.
Ibyara Marcgr. p. 18. t. 3.
Illicinus. p. 21.
Iraraca. p. 26. t. 6.

K Okob. p. 13.

L Aphiat. p. 22.

M Aquizcoatl. p. 18.
Maripeti angues. p. 31.
Mater formicarum. p. 25. t. 7.
Mergoli. p. 27.

Miliaris. p. 20.

N Atrices magnæ. p. 35.
Natrix. p. 28.
Torquata. p. 30. t. 8.
Ruberaria, Nomen, Descriptio, Natura. p. 30. t. 8.

P Adalica Polon. p. 30.
Polpoch. p. 21.

Q uerculus. p. 20.

R Atel-slangh. p. 23.

S Scolopendra marina. p. 28. 31. t. 9.
ametysthini coloris. p. 31. t. 9.

Scytale, Nomen, Descriptio, Natura. p. 18. t. 4.
Seps, Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Differentia. p. 14. t. 2. & 3.
Serpentes in genere, Nomen, Descriptio, p. 1.
Locus. p. 2. Virtus, Generatio, p. 3. Sympathia. p. 4. 5. Natura & mores, Venenum. p. 5. Usus. p. 6. Differentia. p. 6.

Serpens alatus. p. 26.
americanus Indicus. p. 31. t. 9.
biceps. t. 1.
Manufectus. p. 26.
mari Norwegico familiaris. p. 31. t. 9.
Suctico. p. 31. t. 9.
marinus. p. 31. t. 9.
Serpentes aquatici. p. 28.
Bambæ. p. 35.
exotici. p. 23. t. 9.
Senegæ. p. 35.
Terrestres. p. 7.
Veterum. p. 27.

Situla. p. 17.

T Angedor Lusit. p. 23.
Tetrauchcoatl. p. 27.
Teutlacocauhqui Mexic. p. 24.
Texmineni. p. 20.
Tezauhcoatl. p. 18.
Tleoa. p. 27.
Trinhuitili. p. 27.

V Ipera, Nomen, p. 7. t. 1. Descriptio. p. 7. Locus, Virtus. p. 8. 9. Temperamentum, Generatio, Antipathia, Venenum, Remedia. p. 9. 10.
Usus. p. 10.
Vipera Chiappæ. p. 11.

Admonitio ad Bibliopegum quo quævis Tabula
suo sit loco inferenda.

| TABULA | I. | pag. | 8. | VII. | p. | 23. |
|--------|------|------|-----|-------|----|-----|
| | II. | p. | 12. | VIII. | p. | 28. |
| | III. | p. | 14. | IX. | p. | 31. |
| | IV. | p. | 17. | X. | p. | 36. |
| | V. | p. | 21. | XI. | p. | 34. |
| | VI. | p. | 23. | XII. | p. | 35. |

Vipera Mas.




Vipera Feminina.




Ammodites.




Serpens Biceps.



Cerastes Greuii Aldrou.



Cerastes ex Libya Aldrou.



Hæmorrhous Parei.



Seps Parei.





Seps Aetii ex Matthiolo.




Aspis Vulgaris.



Aspidis species Colore ferrugineo.



Aspidis species colore ferrugineo. Vipera parva Vulgo dicta.



Dipsas Greui.



Ibyara Serpens Margraf.






Scytale



Amblystoma Grevii




Cæcilia



Cæcilia Vulgaris




Cenchris Veterum Belloni





Acontias Iaculus



Acontias Alter







Elaphs



Anguis Aesculapii

niger Aldrov.



Boicininga.



Boicinininga alter.



Boiguacit.



Ibiboboca.




Iararaca.



Amore pinima.









Domina


Serpentum



Mater Formicarum Clusii



Serpens Peregrinus amputato Capite Clusii






Chersydrus Grenini Hydrus Natrix.



Natrix Torquata.



Natrix Rubetaria.



Natrix Rubetariae skeleton.



Serpens Marinus.







*Serpens Marinus flauī Coloris
Miris Suedici Aldro.*



*Scelopendra Marina.
Aldro.*



Scelopendra Marina amethystini Coloris Aldr.




Serpens Americano


Indicus.








Ouum galli putatum Aldro



Ouum galli natum Regii anno 1628 Aldro


Draco Apicios Gruini
Aldro.



Hydra septiceps Ges. Aldro.



Hydra Septiceps :
Aldro.



Handwritten text at the top left, possibly a title or description.

Handwritten text at the top right, possibly a date or page number.



Draco ex Raia effictus
Aldrou.



Draco alter ex Raia

exsicata concinnatus
Aldro.



Basiliscus in solitudine Africae vivens
Aldro.



Basiliscus ex Raia

effictus prone et supine pictus
Aldro.






*Draco bipes apteros captus in
Agro Bononiensi.*



*Draco alatus Apes
ex Greuino Aldro.*



Figura ex Pareo.



Draco Æthiopicus.





MUSEVM
BRITAN
NICVM

